

5020

RESERVE

20

ILLUMINARE MAIUS.

PROF. B. BIBLIOTHECA
FARMACOP. RV.
VRBIS ET TERRAR.

Compositor = Joannes Anglius, dictus Gaddesdon. V. fol. 39 r; f. 51 c, 52 a,

Opus hoc Luminaria Maioris in quindecim Sectiones est diuisum.

Prima Sectio, Electuaria, ac confectiones e quamplurimis selecta auctoribus continet.	
Secunda sectio, Conditorum secundum Mesue continet.	folio. 42
Tertia sectio, Eligmata, seu illinctus officinis. Loch e Mesue & aliis continet.	fol. 43
Quarta sectio, Zulapia uel cum officinis Iulepos e Mesue continet.	fol. 45
Quinta sectio, Serapia uel ut uulgo syrupus ex quam plurimis auctoribus continet.	fol. 45
Sexta sectio, Rob, uel robub, hoc est sapas, uel succos medicatos continet.	fol. 55
Septima sectio, Apozemata, uel decoctiones ex antidotario Mesue continet.	fol. 55
Octaua sectio, Pastillos, uel Trochiscos e quamplurimis auctoribus continet.	fol. 55
Nona sectio, Arida colliria, uulgo Sief, continet.	fol. 62
Decima sectio, Catapotia, seu Pilulas continet.	fol. 62
Vndecima Sectio, Pulueris, uulgo Suffuf continet.	fol. 68
Duodecima sectio, Cerotos continet.	fol. 70
Tertiadecima sectio, Vnguentra ex quamplurimis auctoribus continet.	fol. 72
Quartadecima sectio, Emplastra continet.	fol. 83
Quintadecima sectio, Olea, ex quamplurimis auctoribus continet.	fol. 87

Quid in vnaquaq; harum sectionum contineatur, poteris in calce huius Luminaris Maioris in Tabula amplissime videre.



NICOLAO A CAVALLERA

VENETO

PHARMACOPOLAE NOBILISSIMO

, IOANNES MARINELLVS

S. P. D.



A X I M V M profectò negocium, ac laude dignissimum sumpsit is, qui opus illud, quod etsi nunquam perfectum, præ manib. pharmacopolarum præsertim habetur, reliquit: nam plurimos & Arabum, & Græcorum, & Latinorum libros diligenter legisse necesse fuit: ut ea composita medicamenta colligeret, quæ pharmacopolarum usu essent necessaria, atque medicis. quapropter eius nomen coli, & obseruari meritum, ac debitum est, cum humanis commodis, utilitatq; tantum seruiret, &, quod maximum est, omne tempus consumeret in tuenda non solum hominum sanitate, sed & in perdita recuperanda. Cæterum, meo quidem iudicio, id uoluit scriptor, quòd, cum uidisset medicos nostros, qui naturæ adiutores, & æmuli dicuntur, ac dici uolunt, antiquos mores illos, præclarosq; minime tenuisse, imo negligisse (erat quidem hoc in more positum, institutoq; maiorum, ut ij medicamenta omnia componerent, & seruarent) curam, eamq; hominibus rei medicæ non admodum peritis commississe; L V M I N A R E aperiret ijs quos uocarunt pharmacopolas, quod lumen medicamentorum, quæ & præsto essent, & hominum salutis consulerent, parandorum, atq; paratorum seruandorum porrigeret: quæ res honorem, si consiliis obtemperarent; quo amplissimo olim medici ornati fuerunt, daret. sed de libro, & pharmacopolis id factum est, quod de medicis actum: nam primum id lumen, seu (ut dicunt) L V M I N A R E, cum splendor eius alios offenderet, & nonnullis uideretur neq; lucere, neq; eorum menti lumen perferre; omnino extinxerunt: cum id factum opinarentur omnibus & medicis, & pharmacopolis maiori fore adiumento: nam ij ueluti inscientes aliud medicamentum simplex pro alio notarunt, aliud adiunxerunt, & aliud detraxerunt; præterea, quod non parui est faciendum, doses mutarunt: cum fortasse id cuidam corpori ualidioribus, debilioribus uiribus prædito conferre uideretur. quas ob res spreto serè libro, hoc est, reiectis simplicibus medicamentis, neglectaq; dosi: quæ omnia ab antiquioribus medicis, atq; doctioribus summo studio, & diligentia tradita fuerant, alium scripserunt librum, & excudendum curarunt. præterea hæc miserrima tempora nostram salutem in deterius adduxerunt discrimen: quòd tum periti, qui pauci sunt, tum pharmacorum componendorum rei imperiti pharmacopolæ scientiam profitentur non spe iuuandi, sed lucrandi potius adducti: quod quidem communi uituperatione est reprehendendum, corrigendumq;: nam, si etiam, atq; etiam considerassent, quid in re sibi esset faciendum: præter hæc quam infamiam, & contrà gloriam consecuturi essent; mehercle uel aliam perciperent artem, uel desumptam in dies politiorem, perfectioremq; redderent, sibiq; utilitatem, & honorem maximum, quem iis deberemus, acquirerent: illud enim summum est beneficium, quo deuincti sumus pharmacopolis, uel iis maximè, qui in arte exercenda

alios præstarent. horum autem si quis unquam est cognitus cum aptus, tum etiam diligens; Tu certè **Mi N I C O L A E** es unus: quoniam à pueritia usq; ad istam ætatem tuum te ingenium inflammavit studio pharmacorum res prosequendi adeo, ut summum splendorem, immortalemq; gloriam sis consecutus. huius indicium est theriacle, cui præpositus fuisti superioribus annis ab Illustrissimo Senatu Veneto. is rem tam celebrem, tam arduam tibi merito commisit. & cui committenda erat, qui magis instructus, quiq; in peragendo negotio magis esset exercitatus? cui in simplicium disciplina magis uersatus? Nunc mihi sæpenumero cogitanti, quo pacto efficerem, ut pharmacopolæ tua persequerentur uestigia, uenit in mentem, si **L V M I N A R I S M A I O R I S** composita pharmaca cum scriptoribus medicis, è quibus translata sunt, conferrem; id fore consecuturum. quare illa præsertim à mendis purgaui, quæ deprauata erant, & mutila. quod iam actum est, & librum ad te mitto: magis enim idoneum, quàm tu es **N I C O L A E** excellens, reperi neminem, & qui limatiori, prudentiori; iudicio, quod natura peculiare tibi largita est, polleat. huic addo **L V M E N** Apothecariorum, & **T H E S A V R V M** Aromatariorum, in quibus multa correxi. ea quoq; accipias uelim: hoc quidem summi in te amoris mei, & benevolentie signum esse debet certissimum: non autem quod his præceptis careas: quis enim nescit te non solum simplicium medicamentorum scientiam habere: sed & compositorum omnium? nemo est ignarus te in quauis confectione seu fructuum, & huiusmodi generis cæterorum ex uariis rebus constructorum, & quod reliquum est, humanarum formarum paranda naturam non æmulari quidem, sed abs te longè superari. oro te igitur, ut hos meos labores suscipias: & me, ut facis, ama. Vale.

INDEX CVM SIMPLICIVM TVM COMPOSITORVM

omnium huius operis Luminaris Maioris, cuius A primam columnam denotat, B secundam, C tertiam, D quartam: in gratiam studiosorum summa cura & diligentia collectus.

122

A Aron	fol 22.d.35.d	Almezeceon ex inuentione nfa	16.d	Aqua casei	16.a	
Abel	10.b.32.c	Almezeceon herba	ibidem	Aqua lactis	16.a	
Abietinum	82.d	Alnabach 51.a	Aloe	Aqua mulla, uulgo aqua mell.	47.a	
Abiucndi aloen modi	12.d	Aloe quibus conducat	12.c	Aqua prima	61.d	
Abrotanum	22.b.54.c	Aloe abluta	4.a	Aqua rosata mixta cum mulco quomo	29.a	
Abungi	11.b	Aloes succotrinus	63.c	do fiat	63.a	
Abinthium	9.d.47.d.57.5.71.c	Aloes species	12.c	Aquila	40.b	
Acacia	17.c.61.d	Alofanthos	54.c	Aqua uiolarum	42.c	
Acacia conficiendæ modus	17.c	Alorotab 41.b	Alsebram	Aqua uitæ <i>trancium 90.d</i>	78.b	
Acaliphe 62.a	Accipiter 63.a	Alfeschabrá uel sechesabram	61.a	Arbor glandis	51.d	
Acedulæ	70.a	Alleis 36.b	Alfiraconst	14.c	Argentum merum	21.d
Acetum	7.d.46.c.50.c	Altalisafar confers ad frigiditatem	32.c	Argentum uiuum 74.b	79.d	
Acetum mulsu.	47.b.d	stomachi & uentositates acciden-	32.c	Argentum uiuum duplex	36.d	
Acetum passulatum	49.b	tes in hepate & stomacho	32.c	Argentum uitreatum	36.d	
Acetum squillitico, uel scillinu	49.a	Althea	51.c	Aristolochia absolute	19.b	
Acetosa	8.b.45.c	Altilia beregeff	66.c	Aristolochia rotunda 10.b.11.d	59.c	
Achantis leuce	16.b	Altilia aut altimilia	9.b	Aristolochia longa	21.d	
Acharistum 22.b	Acini uitz 78.c	Alulfulfumen siue sulfumen	66.c	Armel	19.c.65.c	
Acorus	10.a.19.a.31.b.43.a.54.c	Alumen	19.c	Armoniacum	23.d.62.a.20.b	
Acorus conditus	43.a	Aluminis species	36.d	Arnoglossum	49.c	
Acte 67.b	Adamas 82.c	Alumen de pluma	23.a	Aromaticum garyophyllatum	51.b	
Ad frangendi lapide in renibus	90.d	Alumen de rochia	28.a	Aromaticum nardinum	51.c	
Adeps gallinæ	76.d	Amaracus	52.c	Aromaticum rosatum	51.b	
Adeps vrsi	79.b	Amarus seu amaracus	51.a	Aromaticum moschatum	51.b	
Adiantum	51.b	Ambra	52.d	Arfenicum	58.b	
Adiantos 52.b	Adib 12.d	Ambiberberis	76.d	Arfenicum sublimatum	61.d	
Adhil 12.d	Adipes 74.a	Ambula	15.c.44.b	Arfenicum rubeum	61.c	
Adulstionis conularum modus	10.d	Amenum dulce	5.c	Arthanal	73.c	
Adusio cornu cerui quo fiat	28.c	Ameos 9.b	Ami	Arthemisia	23.a.29.a.41.a.54.a	
Aeneus uis uel mortarium	23.d	Amygdalæ	5.c.87.a	Artiatidos 32.a	11.a	
Agapis lapis	27.b	Amygdalæ purgata	5.c.87.a	Artasio myrobalanorum	30.c	
Agaricus	13.b.39.a.65.a	Amygdalæ amaræ	5.c.87.a	Asfar 1.b.23.a	28.c	
Agarici species	13.b	Amygdalæ dulces	5.c.87.a	Asfarabaccara	28.c	
Agnus castus	54.c.59.d	Amygdalæ pini	44.d	Asinus syluestris	86.d	
Agrestum	61.d	Amyli siue amydu	19.d.43.d.79.d	Asphaltum	23.b.72.a	
Agrimonia	75.c	Amomum	19.c.31.b.59.b	Asplenon	52.c	
Aizoon 70.a	Alabastrum 74.d	Ampelos leuce	16.d	Asphodillus	18.d.62.d	
Alargatum	82.d	Ampelos melana.16.d	11.a.31.d	Asteraticum	42.d	
Alhalce	6.c.16.a	Anabac siue nabat	66.b	Arthanasia	11.d.22.b	
Alharif 15.a	Albatheca 58.a	Anacardus 19.b	11.a.31.d	Atramentum vulgare, seu encausticum	90.b	
Albetaphyllon	35.c	Anacardorum præparatio	11.b	Attriplex	23.b.32.c	
Albelac 46.d	Albelach 56.c	Anagalliis	41.b	Auellana	33.a.4.c.87.a	
Alborina	23.b.44.d	Anagodom	30.b	Aureus	1.b	
Alcazaber	66.b	Andachoche	59.c	Aurea alexandrina	21.b	
Alchechengi	59.c	Andraphaxis	23.a	Auricula muris	41.b	
Alchelengi	17.a	Anethum	9.a	Auripigmentum	84.b	
Alchermes siue chermes	3.a	Angelocalon, siue alcaicalon	22.d	Aurum & argentum	21.a	
Alchermes siue chermes	10.b.45.b	Anguria 40.b	Anisum 1.d.5.d	Aurum & argenti quo limentur	36.d	
Alchekegi	28.d.53.d	Aniuden. 37.a	Anser 70.d	Aurum quomodo liquefat	21.d	
Alchilich	34.d	Anthasi 77.a	Anthera 82.d	Aurum unde	21.d	
Alchilich uel alchilichil	43.b	Anitidotum	23.a	Axungia porcina	74.a	
Alcohol uel alcohol uel alcohol	10.a	Antimoron, uulgo anatamaron	22.d			
Albadach siue dabach	86.a	Antimonium	23.b.62.d			
Alexandrum	23.a.34.b.39.d	Anthos	24.b.52.b.54.c			
Alfagradi uel alfagdi	60.a	Ancephali	24.a			
Alfafa	33.b	Apes	78.d			
Alfemenisch siue seleniemisch	2.d	Apium	5.a.14.d.30.c			
Alphesera	16.c.49.b	Apozema	21.b.55.c			
Alphelia	76.b	Apozema pectoralis	55.c			
Allium	44.c.81.a	Apozema de epithymo	55.c			
Alicacabum	28.d	Apozema adiantis, uulgo lapilli uene-	55.c			
Alipias	25.d.49.b	ris	55.c			
Alipra muscata	21.d.23.c.27.a	Aphronitrum siue baurach	18.b			
Albe & alkeis	36.b	Aqua	71.c			
Alkangi 10.d						

Palmarumina 75.c

• 3

INDEX.

Balsamum quomodo cognoscatur & probetur	30.b	Chamæpitys	16.b 41.a 50.b	Ceratum album Gal.	71.c
Barba aaron	22.d	Cameli unde	17.a	Ceratum alexandrinum	71.c
Bardana	28.d 77.b	Camphora	37.b 41.b 56.b 83.a	Ceratum coadunatiuū sciisi cranci	72.c
Barba hircina	36.b	Canobit	30.a	Ceratum ad hernias, uulgo ad crep-	72.b
Barba frista	22.a	Canapis renata	55.b	tos	71.b
Basilicon	20.d 29.c	Cancer fluuiialis	49.c	Ceratum diapente	71.b
Batheca	58.a	Canapis	49.b	Ceratum de storace	72.a
Baucia	9.a 24.b 43.a	Cantarides	80.d	Ceratum de sandalis	71.c
Baucie Conditæ	43.a	Capparis	57.d 90.a	Ceratum de galbano	72.a
Baurach	14.b 41.d	Capillus algul	55.c	Ceratum de bellio	72.c
Baurach rubeum	7.a 41.d	Capillus uene.	14.c 47.a 55.c	Ceratum de euphorbio	71.d
Bdellium	61.b 65.c 74.a	Capitellum	61.d	Ceratum hyssopi diatefferon Demo-	71.a
Bdellii species	10.b	Caprifolium	52.b 76.a	criti	71.a
Bedeguar siue bedeguard	16.b 48.a	Capella	39.c	Ceratum cespitū, uulgo Hyssopi.	70.c
Beduer	11.a	Caprie	36.a	Ceratum cespiti ex Philagrino.	70.d
Been	2.d	Caputius	39.a	Ceratum cespitum ex Paulo.	71.a
Been album & rubeum	2.d	Charabe siue chachabre	2.d 57.d	Ceratum pro capite	71.b
Bel & sel & phel confunditur	36.c	Charabes uel thirates chirat.	57.b	Ceratum quo asidue utor	71.b
Bellerici	8.d	Cardamus	27.c 30.a	Ceratum stomachicā Gal. uulgo cero-	71.b
Ben	87.b	Cardamomum maius	1.d 6.a	tum Gal. stomachū cōfortans	71.b
Benedicta simplex	23.b	Cardamomum minus	1.d	Chelmes	20.b
Berberis	49.d 57.a	Cardo	69.d	Cherua	87.b
Berillus lapis	21.a	Cardium genera	48.b	Cerulla	62.c 73.c 80.a
Berungi uel burungi	41.a	Cardunculus	76.a	Ceruus.	28.c
Beronica	23.b 54.d 86.d	Carenum	26.b	Chelmes siue alchelmes	20.b
Bezaard	35.d	Carica	26.a 40.d		
Blanca	23.b	Chariota	43.a	Celstron	54.d
Blacta Bisantia	24.a	Charophyllata	85.b	Ceterach	10.c 31.b 54.a
Bolus	58.a	Charmezith	9.b 90.b	Cicada	40.d 62.a
Bolus armenus	22.c 41.b	Carpo balsamum	9.d 19.a 25.d 29.b	Cicer erraticum	4.c
Bolus arm. seu lutum armenum	8.b	Charia alexandrina	61.c	Cicerbita	53.d
Bombax & bombox	51.c	Carthamus	40.c	Cicer album, nigrum	4.c
Borrage	26.c 49.c	Cartilago pectoris caprarum	20.d	Ciclamen	30.a
Boraginatum	38.d	Charub	69.a	Cicorea	52.d
Borax	76.d	Carur	5.a	Cicula	56.c
Borin	36.a	Carui syluestris	31.b	Cicuta	80.b
Bractys	10.b	Cassanus	30.a	Cydonium	45.c
Branca ursina	75.c	Cassia 85.d	14.c 32.a	Cimbalaria	92.a
Brasica	39.a	Cassia nitula	11.a	Cyminum	5.d 41.d
Brathys	22.b 90.b	Cassia lignea	1.c	Cyminum carmenum	5.d 69.a
Bryonia	16.c 153.b 67.c	Cassia filula pro clysteribus	93.c	Cimolea	27.b 53.b
Bryonicum eclegma	44.a	Cassanea	78.b	Cinnamomum 6.a	1.c 5.d 68.c
Brufcus	23.c	Castor	11.a	Cinnamum	32.c 38.b
Buglossa 43.b	4.b 15.d 49.c	Castoreum	4.a 25.d 66.d 93.b	Cinnamomi species	89.a
Buglossatum, siue diabuglossatu	38.d	Cathariace	30.a	Cinnamomi ouorum	38.b
Bulbus	24.c	Catharticum	66.a	Cinis corticum ouorum	37.d
Burungi	11.b	Catharticum imperiale	29.b	Cinis leporis	37.d
Bursa pastoris	39.b	Candum rotatum	21.b	Cinis uitri	37.d
Buthomariem	30.b	Cauda equina	78.b	Cinis scorpionum	37.d
Buyrum	4.c	Caulis	39.a 44.c	Cinoglossa	67.c
Buzeidem	41.b	Caulis capitatus	39.a	Cynporchis	4.c
		Caulis rubei	85.b	Cypoides Andromachi antidotus, uul	41.b
		Cebuli. 8.d	Cecis 19.d 22.b	go distodea	41.b
		Cedrus	22.b	Cyperus 3.c 57.d	Cypressus 34.c
Caballus marinus	27.c	Cheiri	77.b 88.c	Chirar 58.c	Chilt 89.b
Cacabus ueneris	42.b	Cheiron uel hairon	14.c 15.c	Chilus	59.b
Calcaedis	61.b 78.a	Ceifim	1.d 30.a 49.a	Cydonium 7.b.d	48.d 88.d
Chachia	58.c	Celsica spica	27.a	Cydoniorum species	43.c
Chachile	40.b	Chelidonia	40.c 61.d 64.c	Chitran 29.d	Chitri 8.d
Calamentum	5.a 48.a 75.c	Cenchrum	51.b	Citrullus 15.a 57.a	Citrum 2.c 45.d
Calamentum montanum	6.c 48.a	Centaurea a chirona centauro.	23.a	Citrus 3.c 43.b	87.b
Calamentum fluuiiale	6.c 48.a	65.c 75.d 81.b 86.c		Climia seu cadmia	62.b 82.a
Calamita	82.d	Centonitum	39.d	Climia auri	81.a 82.a
Calamus agrestis	1.c	Centum capita	30.a	Chrysomila	87.a
Calamus aromaticus	1.c	Centum neruia	75.d	Cocognidium 16.d	13.c 22.d
Chalceucamenon	62.d	Centum galli	51.c 80.a		
Calendula	50.a	Cepe humida	4.c		
Chalybs	9.b	Cepe marina	43.d		
Calx	58.b 62.b 9.d	Cepe muris	43.d		
Chalceucechaumenon	85.c	Cera alba	71.c		
Chameacte	67.c	Cera rubea	72.b		
Chamædriis	13.d 50.b 75.d	Ceratum	42.a		
Chamelea	13.c 29.d				

Columbi agrestis	84.c	Costi species	10.c	Diacurcuma minor	9.d
Colocynthe, seu colloquintidis.	14.a	Cozumbrum	16.b 75.a 67.c	Diadamafenon	40.b
16.a 67.d		Crassula maior	92.a	Diagarigi	39.a
Colloquintidis correctio	14.a	Crispula	76.b	Diadraganthum calidum	42.a
Colophonia	72.b 75.a	Crytallus	77.a	Diagyridium	23.c
Compositio <i>diu d'apridu</i>	84.a	Crocus	1.c 61.b 66.a 90.b	Diagyridium siue scamonea preparata	23.c
Conchulæ & earum species	10.d	Crocus hortenſis	27.d 40.c	Diaridos: uulgo diarids de melle.	26.a
Condex	90.c	Crocus orientalis	33.c	Diathirundinis	19.c
Conditum absolute	43.d	Cucube	1.d 37.a 39.a	Diathysopu	28.a
Conditum buglossi	43.b	Cucurbita	45.c	Dialacca magna	10.b
Conditum citri	43.b	Cucurbita agrestis	16.c	Dialacca minor	10.b
Coditum ex cydoniis, uulgo Miua cy		Cucurbita deserti	14.a 16.a 97.d	<i>diu d'acca</i>	10.b
toniorum sine speciebus	48.d	Cuminata alexandrina	23.d	Dialibanum: uulgo Diaolibanu	25.a
Conditorum genera	42.c	Cupressus cretica	12.b	Diambra	5.d
Conditum pastinacæ	43.a	Curt.	69.b	Diamanna Gal.	14.b
Conditum rosatum	43.a	Curcuma	9.c	Diamargariton	16.c
Conditum uioletum	44.d 43.a	Cuscuta	15.a 61.a	Diamargariton	23.d
Condrina	53.d	D		Diamargaru.	3.a
Confectio ad crepatos	34.c	Dactylus mucalis	15.c	Diamoron	50.b
Confectio alkermes	3.a	Dactylus thebaicus	15.c	Diamorusion	10.a
Confectio alkanzi	11.a	Daetylus	15.c	Diamolcu	4.a
Confectio Hamech	15.d	Daphnococcus	25.d	Diamulci matricalis	39.d
Confectio alia Hamech	16.b	Daphnoidis	30.a	Diamulcum pretiosum	34.a
Confectio anacardina	19.b	Dasteni	3.b 6.a 38.b 56.c	Dianasturtium	39.b
Confectio boli armeni	41.b	Dastifaha	37.c 41.a 41.c 60.a	Dianifium	5.d
Confectio condicti, ad ægritudines ner		Daucus	9.c 10.a	Dianthos Diaolibanum	25.a
uorum frigidas	19.a	Daucus creticus	22.a	Doronicum siue doronigum	1.b
Confectio de acerosi Gal.	8.a	Decoctio	21.b	Dosis quid	2.a
Confectio de alpheſera	16.c	Decoctio adianti, uulgo capilli uene-		Draganum	4.b 25.a 42.a 81.a
Confectio de cinnamomo	6.a	ris	55.b	Dragontea	22.d
Confectio de cytoniis	7.b	Decoctio absolute	55.c	Dragontea minor	22.d
Confectio de hyacintho Auicenn.	36.c	Decoctio communis	ibidem	Diapapauer	28.b 43.d
Confectio de Iacur.	17.b	Decoctio de epithymo	ibidem	Diapeganum: uulgo diapiganu	40.d
Confectio de mezeoreon	16.d	Decoctio pectoralis	ibidem	Diapente,	42.a
Confectio de pomis	7.d	De temploſtro pharmaco diachaci-		Diapenidion	25.b
Confectio de psyllio	15.c	-treos	72.a	Diaphœnicum	15.b 72.d
Confectio de seminis	7.c	Dende uel dendem	68.a	Diaprasium	24.c
Confectio de prunis	8.b	Dentali	77.a	Diaprunum	24.c 40.b
Confectio de luccis nucum	18.b	Diaboraginatam	18.d 47.b	Dipſacus	69.d
Confectio de zingibere	17.b	Diabugloſſatam	38.d 43.b	Diarob cum rheubarbaro	39.c
Confectio ex rhubarbaro	10.c	Diabutyrum	40.c	Diarob cum turbith	39.c
Confectio manz ex inuentione Gal.	46.d	Diabyronias	16.c	Diarob cum ſena	39.c
Confectio mithridati, ex descriptione		Diabyronias Democriti	6.c	Diardodon	16.b
communi C. pro vermibus 39.d	36.a	Diacartami	40.b	Diardodon unde	5.a
Confectio quid.	3.a	Diacalamenthum Galeni	6.b	Diardodon commune	5.a
Conſita rubra	27.a	Diacalaminthes, uulgo Diacalamin-		Diardodon e Tralliano	16.d
Confectio Philonii descriptione Ha-		tum	28.a	Diardodon Abbatis	25.d
mech.	11.c	Diacameron	24.a	Diardodon cum Agarico	39.c
Confectio Philonii perſici	36.c	Diaccappar	41.d	Diardodon cum rheubarbaro	39.c
Confectio Philonis ex inuentione pro-		Diacaryon	18.a	Diardodonum baſilicum	2.a
pria	11.b	Diacaryon Gal.	18.b	Diastatyrion	4.b 24.b
Confectio testiculorum uulpis	4.b	Diacaſia ſiſtula	42.b	Diaſene	26.c
Coniza	76.b	Diacaſia ſiſtula ſecundum Franciſc-		Diastematron	7.c
Conſerua ſlorum nenupharis	38.d	Pedemon.	21.a	Diaſulphur	11.b
Conſerua roſata	43.a	Diacaſtoreum	25.c	Diadragacanthum frigidum	25.b
Conſolidamajor	22.c 51.b 72.c	Diaceraſeos	42.a	Diathieu	12.b
Conſolidaminor	51.b	Diacyminum 5.c	5.d 7.a 25.b	Diatrion pipereon	6.d
Conſolidamedia	51.b	Diadodion	17.b 26.b	Diaturbith cum rheubarbaro	39.c 40.a
Conſtantinopolis	46.b	Diadodion Andromachi	17.b	Diazingiber	17.b
Coralli	20.d 25.c 38.d 57.d	Diadodion Critonis	17.d	Dies caniculares quot	18.b 23.d
Corallus rubeus	2.d	Diadodion Damocratis	ibidem	Diapolticon	7.b
Corſiliou	11.a 16.a 12.a	Diadodion Galeni	18.a	Diapolticon Gal.	41.c
Cordomenum.	35.d 54.b 85.b	Diadodion Heræ	17.d	Digitus Hermetis	23.c
Cordumeni ſpecies	12.a	Diadodion Sorani	ibidem	Diptatum	24.d 31.b
Corrigiola	57.b	<i>diu d'acca xid'ſi</i>	46.d	Diptatum album	42.b
Coriandrum ſiue coriandrum ſiue co-		Diacorallii	38.d	E	
riannum	20.d 57.a 70.a	Diacorus	19.a	Ebiſcus	75.d 76.d
Corneolus lapis	36.d	Diacaſtoreum	25.c	Ebulus	77.c 79.a
Cornu cerui quomodo aduratur	28.c	Diacoſtum	10.c 26.a	Ecligma	43.c
Cortex nere	27.c	Diacubebe	39.a	Ecligma ad aſthma	44.b
Cortex citri	2.c	Diacubebe theſaurus pauperum ibide		Ecligma de aliis	ibidem
Coſtus	1.d 10.c 26.a	Diacurcuma magna	9.c	Ecligma de caulibus	44.c

Eclegma ex radice de brionia	44.a	Elect. de feminibus	33.b	Fnula	29.a 34.c 79.d
Eclegma ex pineis nucleis	43.c	Elect. de ficleos	41.a	Enula campana	51.c
Eclegma de farfara	44.d	Elect. de spica romana	21.b	Oenanthum	28.b
Eclegma papauere	43.d	Elect. de succo rosarum	16.c 28.a	Oenomeli, uulgo Melicratum condi-	
Eclegma de pulmone vulpis	44.c	Elect. de stochados	18.c	tum	48.c
Eclegma de femine lini	44.d	Elect. de stinco	37.b	Ocypus quomodo extrahatur	70.c
Eclegma de squilla	43.d	Elect. de succo cytoniorum	7.b	Epilepsia	18.d
Eclegma de terebinthina seu albo-		Elect. de vino	37.c	Epilepsia siue epilenfia	34.a
tin	44.d	Elect. de vinea	32.d	Epithema absolute	70.c
Egeta	11.d	Elect. Ducis	27.d	Epithema pro corde	70.c
Elaterium	66.d 92.b	Elect. episcopi	15.d	Epithymum	15.a 48.c
Elleborus	61.b 79.c	Elect. e xyloaloe	3.b	Ericus	52.d
Electuarium alharif	15.a	Elect. e coccognidio	16.d	Eryngium siue eringus	21.d
Elect. ad oem epilepsiz speciem	34.a	Elect. e styrace uel de storace	12.b	Eryngium	30.a
Elect. ad rupturam, uulgo crepatos	34.c	Elect. ex hirundinibus absq; besala an-		Erythrodanus	60.a
Electuar. ad restauracionem humidi-		tidorum Alclepiade	20.a	Eruca	4.c 24.b
tatis	28.b	Elect. ex hirundinibus vna cum besa-		Eruum	20.b
Elect. ad scabiem pruritem	32.a 43.a	sa, antidotum Andromachi	19.d	Esfra magna	26.d
Elect. ad epilepsiam	18.d	Electuarium ex citro.	3.c	Esula	23.c
Elect. anacardinum, secundum filium		Elect. ex grauis tinctoris	3.a	Enanthium	28.b
Zacharie	19.b	Elect. ex inuentione nostra	10.c 20.c	Eubulus	67.c
Elect. anacardinum	10.a	Elect. indum	15.a b	Eufragia	54.d 64.d
Elect. coferus sanitatē oculorū	40.c	Elect. iustinum	29.a	Eupatorium	9.d 16.d
Elect. contra lumbricos	28.b	Elect. latificans	3.c 19.d	Eupatorium vnde	16.d
Elect. contra pestem	42.c	Elect. mixtura cordialis	38.c	Euphorbium	13.c 64.a
Elect. contra pestem fm dominum Be-		Elect. regium	8.a	Experientia theriacē	35.a
nedictum de Nursia	42.b	Elect. rolatum	16.b	F	
Eclegma de amygdalis	44.b	Elect. testiculorum vulpis	4.a	Faba	78.b
Elect. de anagallico syluestri	41.a	Elect. triafrandali	31.d	Farfara	42.b 44.d
Elect. de aniden	37.a	Elect. uomitus ualens tertianaris &		Faufel	8.b
Elect. de aromatibus Gal.	12	quartanaris	31.d	Febrium	75.b
Elect. de assa	14.a	Elemium	22.b 29.a	Fel terrē	14.a
Elect. de baccis lauri	34.b	Elefoph	15.d	Fez argenti	40.d
Elect. de camphora	37.a	Emblici	8.d 33.d	Foeniculus	1.d 31.d
Elect. de caulibus	38.a 39.a	Emerugit	60.b	Foeniculus algul	23.b
Elect. de cicadis	40.d	Emina	78.a	Foeniculus porcinus	ibidem
Elect. de cineribus	37.c	Emplastrum apostolicos	85.b	Foenum graecum	92.b
Elect. de dactylis	15.b	Emplastrum aureum	86.a	Feruzegi siue smaragdus	2.c
Elect. de enula	34.c	Emplastrum bouinum	86.d	Fescera	44.a
Elect. de eupatorio	16.d	Empla. colcozar	74.c	Filipendula	28.d
Elect. de farfara	42.b	Empla. de adipibus	86.c	Filix	73.d
Elect. de ficibus	40.d	Empla. de aliis Alexandri	85.a	Fisticus	4.d & 39.d & 85.b.c
Elect. de fisticis	39.d	Empla. de beronica	86.d	Flos aris	58.c 61.d 74.d 77.d
Elect. de fructibus	8.a	Empla. de caricis	86.b	Flos oleandri	27.c
Elect. de gust	16.d	Empla. de caseo	85.d	Flores vnz agrestis	84.d
Elect. de galanga	4.d	Empla. de centaurea	86.c	Folium siue malabathrum	2.d 28.c
Elect. de gemmis	2.b	Empla. de crusta panis	86.b	48.b 54.c 57.b	
Elect. de gentiana	20.a	Empla. de eupatorio	86.b	Folliculus seu	14.d
Elect. de granis myrti	6.b	Empla. de ficibus	86.c	Formica	82.c
Elect. de granis uiridibus	36.a 43.a	Empla. de gallia	84.b	Fragmenta cordialia	28.a
Elect. de heil	32.c	Empla. de granis lauri	84.a	Fragmenta lapidum pretiosorū	2.b
Elect. de iua	41.a	Empla. de meliloto	85.a	Fragmenta omnia pretiosa	38.d
Electu. de lacuna liberans ex venenis		Empla. de pentadactylis	86.c	Fragaria	54.d 74.a
pernitiosis	32.b	Empla. de ioliis	86.b	Fraxinus	51.d 91.c
Elect. de lepore combusto	40.a	Empla. diachalchiteos	84.d	Fructus	50.d 8.a
Elect. de mace, quod cofert &c.	32.c	Emplast. diachylon, uulgo Diachylon		Fuga demonum	91.b
Elect. de marchasita	38.c	nagnum	83.b	Fu	51.d
Elect. de margaritis	38.b	Empla. diaphoenicon confortarium		Fumusterrē	47.d
Elect. de medullis	38.c	stomachi	84.d	G	
Elect. de moris	41.b	Empla. diaphoenicon Alex.	84.c	Gafit	86.b
Elect. de moscho	3.d	Empla. filii Zacharie	84.d	Gagates	91.c
Elect. de nucleis fructuum	33.a	Empla. mistura ad uulnera	85.b	Galla	19.d 89.b
Elect. de orobo	20.b	Empla. mirabile Androma.	85.d	Galla cupressi	33.c
Elect. de ouis	40.a	Empla. oxycroceum	85.d	Galanga	2.d & 43.d
Elect. de passulis	37.c	Empla. relatum ad Andromachū	85.a	Galbanum	11.d
Elect. de persicis	7.d	Empla. relatum ad Aristarchū	85.a	Gallia sebellia	5.c
Elect. de pyrethro	19.a	Empla. sinapium Democriti	84.b	Gallia muscata	29.a
Elect. de polypodio	40.b	Empla. usuale pro crepatis	86.b	Galliz species	56.a
Elect. de sorbis	8.b	Encaustum scriptorium	93.b	Gallitrichon	51.c
Elect. de raudeseni	10.d	Endicum siue indicum	81.a	Gallia muscara quæ ingreditur pretio-	
Elect. de scorra ferri	34.b	Endiua	14.c 49.d	fas medicinas & electuaria	29.a
Elect. de sebesten	40.a	Endiua domestica	53.c	Gazel	32.b

I N D E X

Garyophyllos seu caryophyllus. f.c & f.c. 51.d	Herba muscata	76.a	Intuba	52.a
Gemmae 2.b.& 28.a	Herba paralytis	75.c	Intubus erraticus	52.d
Genera menthae 47.c	Herba sancti Ioannis	54.a	Iris 13.b.26.a 51.c.82.b	30.a.42.c
Genestra 62.a.82.a	Herba sanctae Mariae	75.c	Iringus	34.c
Gentiana 8.c.20.b	Herba sancti Christophori	52.b	Istigar	41.a.56.a
Gentianae inuentor 20.b	Herba venerea	31.b	Iuiube	16.b.47.a
Gerfa serpentaria 77.a	Herba aphrodisia	31.b	Iulep, uel iuleb	45.a
Gypsum 77.a	Herba syriaca	17.c	Iulep alchermes	45.b
Girboe 30.a Gith 27.c.37.b	Herba uenti	75.c.85.b	Iulep infusionis rosarū & uiola.	45.a
Glans 78.b	Herba frigidæ propriæ quæ	21.b	Iulep rosarū ex succo rosarum	45.b
Gliconium 28.b	Hernodactylus	23.c.65.d	Iulep rosarum ex infusione rosarum,	45.a
Glycyrrhiza 43.c.4.b	Hyacinthus	2.c	februm adustionis confersens	45.a
Gluten alborin 23.b	Hyacinthus unde nomē traxerit	36.c	Iulep uiolarum, seu ex infusione uiola-	45.a
Glutē alchanach, siue alchamach	Hidromel	47.a	rum	45.a
Gluten alimbat 23.b	Hydromalum ex succo cydonio-	45.c	Iulep uiolarum ex succo uiola.	45.b
Gluten danahā uel zanach 85.a	rum	90.d	Ium debedit	11.a
Gluten olibani 74.a	Hiera	13.c	Iuniperus	91.c
Gluten piscium 34.c	Hiera aloe	13.d	Isuquiamus	77.b
Gluten scriptorum 86.b	Hiera Archigenis	13.c	Iusium 29.a K	62.b
Gluten zanach 71.a	Hiera Archigeais descriptione vni-	13.d	Kaifum	21.c
Golenz 27.a	uersali	13.d	Kali uel al Kali Kermel 3.a	61.c
Grana alchilchil 33.a.& 54.d.37.c	Hiera Archig. descrip. Pauli	14.a	Kirtas combustum	61.c
Grana azelem 38.c	Hiera Constantini descrip. Irani, uulgo	14.b	L	
Grana fumoterræ 15.a	Diastiracoft	14.a	Labrusca	28.a
Grana paradisi 69.b	Hiera diacoloquintidos Rufi.	14.b	Lac	4.b
Grana solis 40.a	Hiera ex inuentione nostra	13.b	Lacca	10.a.57.b
Grana syluestria 37.c	Hiera Hermetis, uel hiera Luf	12.b	Laccæ ablendi modus	10.a
Grana tinctorum 3.a	Hiera picra, uulgo inepite hiera picra	32.a	Lachrymum	81.b
Granatus lapis. 2.c	magna	32.a	Lac mulieris	86.c
Granatum malum 15.b	Hiera Rufi	14.b	Lac papaueris	11.c
Granella 40.a	Hieroglodion empoditō, uulgo Hie	32.a	Lactarides	49.b
Granum ademeft 19.b	ralogodion Meftum	11.b	Lactuca	70.a
Granum alzeilem 33.a	Hyofcyamus	7.c.35.d	Ladanum	76.a
Granum culcul 19.a.42.c	Hyofcyami species	36.c.54.b.92.d	Lapaciolum	28.d
Granum nasturtii 44.b	Hypocisthis	78.b	Lappa uel lippa	27.b
Granum uiride 83.a.37.a 7.c	Hypericon	78.b	Lapis agapis	36.d
Gringus 15.a	Hippuris	38.a	Lapis aluminis	65.b
Gruis 63.a	Hircus cui sanguinis in medicinis po-	19.d	Lapis calaminaris	81.d
Ghus 47.d	nitur quomodo debeat ali	10.b.47.d	Lapideum semen	23.c
Gummi albotin 35.d	Hirci sanguis	71.a	Lapis chelidonias	29.d
Gummi arabicum 4.b	Hicundo	73.b	Lapides pretiofi	22.c
Gummi botani 35.d	Hirundines quō comburantur	19.a	Lapis hæmatis	36.d.38. b.52.d
Gummi iuniperi 29.d	Hyssopus	19.b.54.d	Lapidos calcis uel lapidos calcu.	28.d.3.b
Gummi nucis 38.b	Hyssopus humida	19.a	Lapis lazuli.	23.c.28.d
Gummi papaueris 11.c	Homotribes	11.d	Lapis lincis	27.b
Gummi simpliciter 35.d	Hueg	19.c	Lapis magnæ	38.c
H	Hueg uel huegi uel oegi	19.c	Lapis marchasita	38.a
Habel 3.c	I	22.d	Lapis spongæ adhærens	23.b
Hadrianum 22.a	Iabrol Iacyn. 17.b	82.a	Largatum	23.d
Halachic uel falachil 36.d	Iarus	59.c	Laudanum	51.d
Hamech. 16.b	Iatrum	34.c	Lauendula	76.b
Handal. 13.b	Ibeloe uel ibeleuche	30.a	Laureola 16.d.& 27.b.50.b 76.b	84.a.87.c
Hamel 63.d	Ilachyocolla	42.c	Laurus	22.c
Hafce 16.a.3.6.b.55.d.90.c	Ilaphicos	44.d	Lemnia terra	45.b
Hareogi 45.d	Illinctus	44.b	Lenitium	67.b.77.c
Haufega 35.c	Illinctus albotin	44.b	Lenticus	46.d
Hadesf 10.d	Illinctus ad asthma	44.c	Lenticula aquæ	1.d
Hedera 75.a.81.c	Illinctus de amygdalis	44.c	Lepidium	40.a
Hedysimon 1.c.47.c	Illinctus de aliis	44.d	Lepus syluestris siue marinus	20.c 33.c
Hilail. 32.c	Illinctus de caulibus	43.d	Lericifans Conciliatoris.	30.a 54.b
Hemina 90.c	Illinctus de farfara	44.c	Leucifium	52.a.29.b
Hemagogen 22.d	Illinctus de papauere	44.d	Leucopiper	24.c
Hemartes 40.b	Illinctus de pulmone vulpis	43.d	Lezar	24.a
Hemfitides siue haufitides 17.c	Illinctus de femine lini	44.a	Libanotis	40.c
Heptaphyllon 35.c	Illinctus de squilla	8.d	Licium	27.c
Hepatica 50.b	Illinctus ex radice bryoniz	15.a	Lycium unde faciant moderni	36.c
Herba adhil 40.c	Indi	15.b	Lyeum	41.c
Herba blanca 50.a	Indum maius	45.a	Lignum aloes	3.b
Herba benedicta 75.a	Indum minus			
Herba gratia dei 82.a	Insusio rosarum quō fiat			
Herbagradulæ 75.d				

I N D E X

Lilium	53.b	Marchasita	84.d	Myrtus alba	20.d	
Lilium coeleste	19.c 35.c 65.a	Marchasita lapis	38.c	Mithridates rex	36.a	
Liliagus	22.a 27.a	Margarita	24.a	Mithridatum magnum	29.c 36.a	
Limatura asphalti seu aspalet	41.c	Margarita lapis	38.b	Miua aromatica	2.a	
Limatura eboris	2.d 20.d 27.a	Margarita albæ	2.b	Miua cydoniorum simplex	45.c	
Limatio auri & argenti	21.a	Margaritæ perforatæ & non perforatæ	2.b	Miua cytoniorum sine speciebus	48.d	
Lini femem	44.d	Marinus lepus	40.a	Miua cytoniorum cū speciebus	ibid.	
Lingua arietis	50.b	Marmacor	10.a 43.c 92.c	Mizaram	68.a	
Lingua auis	4.d 24.b	Marmacur	10.a 88.d	Modus combustionis coralli	58.a	
Lingua bouis	36.d	Marmar	77.a	Modus comburendi scorpiones	37.d	
Lingua canis	65. & 67.c	Maru.	10.a	Modus conficiendi theriacam	35.b	
Lingua ceruina	52. & 7.b	Marubium	13.d	Modus conficiendi mel paffulatam	43.d	
Lipparium alumen	23.a	Mastix	1.c 4.a 89.b	Modus conuertendi radices in cinerem	37.d	
Liquiritia	5.a & 43.d	Mater herbarum	29.a	Modus conuertendi uitrum in cinerem	ibidem.	
Liquiritia syluestris	16.a 39.d	Marricaria	36.d 54.b 72.a	Modus faciendi firembac	37.b	
Lifen althaur	75.a	Matticaria minor	54.c	Mod⁹ faciendi mucillaginē psyllii	56.d	
Lififagus	75.c	Matrifyllua	52.b 76.a 82.b	Modus faci. mel anacardinum	18.c	
Lithargyrium	72.b 89.d	Maturella	76.a	Modus faciendi xenifur.	27.c	
Lithontripon	23.b	Medicamentum dicitur εὐφροβίου	76.b	Modus humectandi zingiber	42.d	
Lithontripon magnum	29.b	Medicamentum de turbith	70.b	Modus lauandi climiam	61.d	
Lithodæmonis	27.a	Medicamentum dicitur γυλῶν	83.b	Modus præparationis sanguinis hirci.	38.d	
Lithosperma	28.d	Medicinz solutiue q̄ sunt dandæ	16.c	Morus batus	41.b	
Lithospermaton	23.c 41.a	Medulla ceruina	76.b	Morbus caducus	18.d	
Loch	43.c	Medullarum uis	70.a	Mora celsi	50.b	
Loch ad asthma.	44.b	Mel	2.a 5.d 30.b 47.a	Morbus gallinæ	41.b	
Loch ad caliditatem & asperitatem pericloris. & ad tussim calidam	44.a	Melachion	36.b	Mum 85.c	Musa ennea 30.b	
Loch albotin	44.d	Mel album	17.b	Mugars 34.c	Mymia	22.c
Loch bonū conferens hæcticis, & confumptris, & phthisicis	44.b	Mel alabne	35.a	Mulca	Mulca 17.a 5.	79.a
Loch de alfefera	44.a	Mel anacardinum	11.a 19.b 37.a	Muscellinum oleum	27.b	
Loch de alliis	44.b	Mel anacardinum q̄to paretur	19.b	Mufcus 3. d	2.d	
Loch de amygdalis	44.b	Melanopiper	29.b	Mufcus tubacus	34.a	
Loch de caulibus	44.c	Melanthium	23.a 36.b	N		
Loch de farfara magistrale	44.d	Mel auium	19.c			
Loch de papauere	43.d	Mel calsix fistulæ	21.b	Nabac siue anabac	69.a	
Loch de pino	43.c	Melegeta 1.d	69.b	Nabac 51.a	Naber 15.a	
Loch de pulmone uulpis	44.c	Mel emblicorum	2.b 3.a 28.d 36.d	Napei uel napium	21.c	
Loch de femine lini	44.d	Q̄uo fiat mel emblicorum	34.c	Napei simpliciter	21.c	
Loch de squilla	43.d	Meliceratum conditum	48.c	Napta 23.b	Napus 4.d 46.c	
Loch sanum & expertum	44.a	Mellis species	36.a	Napus syluestris	35.c	
Lubon	40.c	Melissa	20.d 53.b 70.b	Nardus	27.a 20.b 49.d	
Luf	13.b	Melliphyllon	19.c	Nasturtium	4.d 39.b	
Lufplanum	4.c	Mel myrrinum	26.b 43.d	Nasturtium album	35.d 65.b	
Lumbrici tetrestres	72.b	Mel paffulatum	43.d 49.b	Nasturtium nomina multa	39.b	
Lupinus	23.a 60.a	Mel quomodo cognoscatur	17.b	Nebrefet & tebrefet	36.b	
Lupulus.	14.c 55.a	Mel quare in electuariis ponat	2.a	Nemen	59.d	
M		Mel rolatum	50.c	Nenuphar	50.a 88.d	
		Mel simpliciter	36.a	Nepita	76.c	
Mabathematicon 25.a	27.d 66.d	Mel tabarzet	17.b	Nepita, neuida, gattaria	39.d	
Machaleb uel mechaleb	27.c 28.b	Memithe	63.b	Neregil	3.c 93.b	
Macedonicum	23.a 35.c 52.a	Menta	47.c 69.d	Neremisch	32.c 33.c 48.c	
Macis 32.c	1.b	Menta sicca	1.c	Nigella	11.d 23.a	
Macropiper	52.a 28.b	Menta faracenica	75.d	Nigella species	22.a	
Magnes lapis	27.b	Mercurialis	40.b 42.b	Nymphaea	22.d	
Maiorana	3.c 75.b	Merdafengi	74.b	Nitrum	22.d 29.d 41.d	
Malabathrum	2.d 30.b	Merdafengi aureum	86.a	Nucis species multæ	18.b	
Malachæ	47.b	Mergulus	27.b	Nux.	18.b	
Malagma dicitur μελαγχρόν	85.b	Mespilum	51.a 78.c	Nux grossa	87.a	
Malua	46.d	Meu	9.c 11.d 21.c 31.b	Nux indica	33.a 87.b	
Malum	14.c	Mezereon 16.d	13.d 59.d 89.d	Nux muscata siue odorifera	1.c	
Malum granatum	15.b 45.d 50.c	Micon	22.b 30.a 47.a	O		
Malapunica	45.d	Micleta uulgo micleta	30.b	Oenomelei 118.e		
Malum fenii siue mororum	46.d	Millefolium	75.a	Offici	29.d	
Malum terræ	30.b 79.b	Milium folis	23.c 41.a & 51.b	Oleander	74.c 92.b	
Mambathematicon	25.d	Minium	81.a 81.d 81.d	Oleum	70.c 82.b	
Mamilla canis	1 40.b	Mira de salua	9.d 59.d 67.c	Oleum alchilchil	91.d	
Mandragora	31.c 77.b	Myrobalani	50.d	Oleum mezereon	16.d	
Manna 16.c	14.c 21.b	Myrobalani indi	30.c	Oleum anethinum	88.b	
Manipulus	15.d	Myrobalani nigri	36.b	Oleum balsami	9.d 35.c 36.b	
Manipularii	ibidem	Myrobalanorum species	9.b	Oleum balsaminum	91.d	
154 Manuscripti cum perlis 119.b	38.d	Myrobalanorum numerus	20.d	Oleum chamæmilinum, uulgo Camo-	88.a	
Marathrum	2.a 9.b	Myrtus 66	20.d	millinum	Oleum	

Oleum cyprinum uulgo de Alchan-	fuco	89.c	Pastillus colocynthis	57.c
na	Oleum sisaminum	86.d 89.b	Pastillus de croco	61.a
Oleum costinum	Oleum ficyonium, uulgo de cucume-	89.c	Pastilli de culcitra	60.d
Oleum darisahan	re asinino	89.d	Pastilli de dactylis	59.a
Oleum enulatū, uulgo de Enula	Oleum ficyonium simplex	90.a	Pastilli de decem medicinis	57.b
Oleum foenugraeci	Oleum ficyonium compositum	ibid.	Pastilli de elleboro	61.b
Oleum fraxinatum	Oleum sinapium	91.b	Pastilli de eruo	61.a
Oleum frigidissimum uiride	Oleum styracis, uulgo de Storaice	89.c	Pastillus de eupatorio	57.b
Oleum de alcana	Oleum uiolatum	88.b	Pastilli de garyophyllis	58.c
Oleum de balsamo	Oleum uulpinum	90.d	Pastillus de lacca	57.b
Oleum de ben	Olibanum	22.b 25.a	Pastillus de mezereon	60.d
Oleum de castoreo	Opacium	61.b	Pastillus de myrrha	59.c
Oleum de capparibus	Omphacometis preparatio	46.a	Pastillus muscatus	ibidem
Oleum de calce	Opium	11.c 36.b 53.a 58.b 68.b	Pastillus de olibano	56.d
Oleum de cherua	Opium thebaicum	22.a	Pastillus de rheubarbaro	56.d
Oleum de cinnamomo	Opopanax	65.d	Pastillus de rosis	56.b
Oleum de croco	Opopanax	13.d	Pastillus de rosis & eupatorio	56.c
Oleum de euphorbio	Opobalsamum	10.c 25.d	Pastillus de rubea	60.d
Oleum de frumento	Origanum persicum	59.a	Pastilli de scolopendria	62.a
Oleum de gagate sacrum	Oriza	69.a	Pastillus de siliquis	58.d
Oleum de granis sisami	Orobis	20.b	Pastillus de spodio	56.d
Oleum de hyperico	Orobis rubeus	28.d	Pastilli de squilla	60.b
Oleum de iunipero	Orobis albus	28.d	Pastilli de tamarisco	60.b
Oleum de lateribus	Orybis lentis	29.d	Pastillus de terra sigillata	57.c
Oleum de laudano	Os de corde cerui	20.c	Pastillus de tyro	59.b
Oleum de leuco	Os elephantis	30.c	Pastillus de Thure	59.d
Oleum de liliis purum	Os sepis	69.b	Pastillus de uiolis	58.c
Oleum de lilio compositum	Oua quæ meliora	40.a	Pastillus diaion, uulgo diani	59.b
Oleum de melliloto	Oxyacanthos	49.d 51.a	Pastillus diarhodon	56.b
Oleum de oleandro	Oxymeli de radicibus, uulgo Scæciana	47.c	Pastillus diacoralis, uulgo Diacora-	59.b
Oleum de ouis	bin de radicibus	47.c	alli	59.b
Oleum de piperibus	Oxymel	49.a	Pastillus e uescaria, seu halicacabo,	58.a
Oleum de pomis citreis, uel aranciis,	Oxymel Iuliani, secundū Gal.	ibid. b	uulgo de Alchechengi	58.a
vulgo de Pomis citrangulis	Oxymel simplex	47.b	Pastillus ex electo, uulgo de chara-	57.d
Oleum de ranis	Oxymel squilliticum descriptione De	49.a	bæ	57.d
Oleum de scorpionibus	mocriti	49.a	Pastillus galliæ sebelineæ	56.a
Oleum de femine lini	Oxyfacchara	50.c	Pastillus Galliæ muscaræ	55.d
Oleum de staphisagria	Oxyfacchar, uulgo oxyfacchara	ibid.	Pastillus galliæ elephanginæ	56.a
Oleum de sulphure	Oxos	50.c	Pastilli hedyroci	59.a
Oleum de tartaro	Ozimum	51.a	Pastilli orobi	58.c
Oleū de thymo, uulgo de Hæce	Ozimum citratum	3.d	Pastillus oxycanthæ, uulgo de berbe-	56.a
Oleum de ulnea	Ozimum maly	33.d	ris	56.a
Oleū ex saliciā, uulgo Salmenta	Ozimum caryophyllatum	2.d 33.d	Pastillus ramich	56.b
Oleum ex pomis mandragoræ, uulgo	P		Pastillus stellæ	61.a
de Pomis iabrol	Pharmacamanus deorum	38.d	Past seu trochisci de sandalis	54.c
Oleum ex thymelea, uulgo de meze-	Palea marina	69.b 71.c	Pastinaca	43.a 69.c
reon	Palma	15.c	Pastinaca syluestris	22.a
Oleum de uiperis, uulgo de Serpenti-	Panis	86.b	Peganon	27.a 28.b
bus	Papauer absolutæ	43.d	Phel & fel & bel confunduntur	36.c
Oleorū genera sunt multiplicia	Papauer nigrum	77.b	Phœnicon uel phœction	15.c
Oleum iasminum, seu sambucini	Papyrus	61.c	Penidii	15.b 15.c
Oleum irinum	Parietaria	75.c 85.b	Penith ex zucchero	33.b
Oleum laurinum	Parthenium	37.c 52.c	Pentaphyllon	35.c
Oleum leucoli, uulgo de cheiri	Pastillus alindaracaron, uel alindara-	60.a	Perdix	63.b
Oleum masticium	con	62.b	Perficaria	54.a 79.b
Oleum melini, uulgo de cytoniis	Pastillus aphodillorum	57.b	Perforata	54.a
Oleum myrrillorum	Pastillus de absinthio	57.b	Perforacia	28.d
Oleum mofcarum, uulgo Muscelli-	Pastilli de agarico	58.c	Pertria grana quid intelligendū	44.b
num	Pastilli de agno casto	59.d	Pes columbinus	52.a 59.b
Oleum muscellinum	Pastillus de alumine	59.a	Pes uituli	22.d
Oleum nardinum alterum	Pastillus de aniso	57.b	Petroleum	25.d 27.b
Oleum nardinum benedictum	Pastillus de balautis	59.d	Petroelinum	9.c 21.d
Oleum nymphetum, uulgo de Nenu-	Pastilli de bdello	60.b	Petroelinum domesticum	27.a
phare	Pastillus de charta combusta	68.c	Petroelinum agrete	24.d
Oleum omphacinum	Pastillus de calamento	61.b	Petroelinum macedonicum	28.c
Oleum philophorum	Pastillus de calce	62.d	Peucedanum	23.b 29.b 31.c
Oleum puerorum	Pastillus de camphora	57.d	Picra	12.b
Oleum rosatum	Pastillus de capparibus	57.d	Philantropos	28.c
Oleum rosatum completum	Pastilli de chelidonia	61.d	Philantropum magnum	28.c
Oleum rutaceum, uulgo de ruta	Pastilli de cicada	62.a	Philonis antidorus	11.b.c
Oleum sambucinum	Pastilli de cyperis	57.c	Philonium persicum	20.b
Oleum samphilichinum, uulgo de San-	Pastillus cochion	60.d	Philonium romanum tarsense	36.c
			Pilofella	28.b

INDEX

Pilula	63.c	Pilulæ fecidæ maiores	64.b	Pulvis capitalis	69.b
Pilulæ ad febrem quartæ	67.c.68.d	Pilulæ heptamere, uulgo optomeræ		Pul. contra dolores post partum	70.b
Pilulæ ad omnes morbos catarrhi co- ryzæ & tussis catarrhalis	65.b	Pilulæ	67.a	Pulvis cordialis	69.c
Pilulæ aggregatiuæ maiores	63.d	Pilulæ imperiales	68.c	Pulvis dulcis 109.6, 139.8	70.c
Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione no- stra	63.d	Pilulæ indæ haly	64.b	Pulvis de granis myrti	70.c
Pilulæ alephanginæ	63.c	Pilulæ lucis maiores	64.d	Pulvis de ligno aloes	68.d.69.a
Pilulæ ante cibum & post	67.c	Pilulæ lucis minores	ibidem	Pulvis galatinæ	70.c
Pilulæ arabicæ	69.b	Pilulæ mastichinæ	66.b	Pulvis impinguius bonus	69.a
Pilulæ arthriticæ	67.b	Pil. sagapeni, uulgo de serapio.	64.c	Pulvis piperatus communis	70.c
Pilulæ assaiaret	68.c	Pilulæ scellinæ	66.a	Pulvis pro botio	69.b
Pilulæ aureæ	66.d	Pilulæ sine quibus esse nolo	66.c	Pulvis pro exitu intestini	70.b
Pil. bechicæ, uulgo bechichæ	66.a	Pilulæ stipticæ	67.a	Pulvis pro fluxu spermatis, ibidem.	
Pil.cephalicæ, uulgo chochizæ	67.d	Pilulæ stomachicæ, uulgo stomachicæ	63.d	Pulvis pro oculis	69.b
Pilulæ cynogloticæ, uulgo de cyno- glossa	67.c	Pilulæ stomachicæ nostræ	65.a	Pulvis pro stomacho	70.b
Pilulæ communes	67.d	Pimpinella	50.b.51.b	Pulvis specierum præparatarum quo- modo intelligatur	2.a
Pilulæ conferentes ad omnes rheuma- ticas passionés	66.a	Pinus	43.c.87.c	Purpura arina	24.a
Pilulæ de aromatibus	63.c	Pinea purgatæ 43.c	5.c		Q
Pilulæ de agarico	64.c	Pingendo lactis	40.c	Quatuor granatorum	15.a
Pilulæ de haliacabo, uulgo de alche- chengi, ex inuentione nostra	64.a	Piper	6.d	Quatuor semina aqualia quæ	21.b
Pil. de bdello ex inuentione nra	65.c	Piper absolutæ	41.d	Quatuor semina communia maiora frigida	15.a
Pilulæ de bdello minores	65.c	Piper album	ibidem	Quercus terræ	13.d.50.b
Pilulæ de benedicta	66.b	Piper longum darful dicitur	1.b	Quercula maior	ibidem.
Pilulæ de castoreo	66.d	Pyrethrum 5.d.19.a	Pirites 78.c	Quercula minor	ibidem
Pilulæ de cynoglossa	65.b	Pyrum	8.b	Quinq; radices	ibidem.
Pilulæ de croco	66.a	Pyrus 4.a.45.d	Pistachia 4.d.28.b.39.d	Quinq; folium	35.c.75.d
Pilulæ de dende	68.a	Pix liquida	72.a	Quinq; myrobalani	67
Pilulæ de diamusco	68.b	Pix naualis	72.a	Quomodo utatur vngula asinini	70.b
Pilulæ de hermodactylis	67.a	Plantago	49.c.78.c		R
Pil. hermodactyl. maiores	66.a	Platocyninum	5.d.27.b	Rhabarbarum adulteratur	10.c
Pil. de hermodactylis minores. ibide		Plurjæsciticon	27.d	Rhabarbarum	1.d
Pilulæ de hermodactylis ex inuentione sua	65.d	Plumbum species est antimonij	72.d	Radices communes quæ	46.c
Pilulæ de eupatorio maiores	64.a	Podagra lini	15.a.60.d	Radices iari	76.c
Pilulæ de euphorbio	64.a	Polium	13.d.32.a	Radix pontica	22.a
Pilulæ de garyophyllis	68.c	Polypodium	16.a.40.b	Radix ficidis	76.c
Pilulæ de hiera composita	67.c	Polypodium quercinum	16.a.40.b	Rami cedri	29.d
Pilulæ de hiera magna	67.c	Polytrichum uel polytrichon	51.b.54.a	Ramich 56.c	14.b.27.c.84.d
Pilulæ de hiera simplicis Gal.	66.b	Pomum 45.f	20.d.49.c	Ramus	35.c
Pilulæ de lapide armeno	65.b	Pomorum tria genera	43.c	Rampocilus	ibidem
Pilulæ de lapide lazuli	65.a	Poma dulcia redolentia 7.d	3.b	Rana	80.b
Pilulæ de opio	68.b	Pomum ex laudano	69.d	Raphanus	4.c
Pilulæ de quatuor rebus.	66.c	Pomum granatum	50.c	Raphanus syluestris	35.c
Pilulæ de quinq; generibus myroba- lanorum	67.b	Pomum iabrol	89.a	Rapz syluestris descriptio	31.b
Pilulæ de raudeseni	64.c	Pomû odoriferum contra pestē	70.a	Rapistrum	35.c
Pilulæ de rheubarbaro	64.a	Ponticus fapo	8.a	Rauedeseni 10.c	9.c
Pilulæ de rheuponeico	68.b	Portulaca	9.a	Rheubarbarum	64.a
Pilulæ de sandaracha	68.b	Portulaca	5.a.46.d	Rheubarbarum unde dicitur	10.c
Pilulæ de sarcocolla	64.b	Prasium	35.c.85.c.48.a	Regula cōficiēti electuaria cum mel- le & fine	2.a
Pilulæ de spica	66.c	Prasium uiride	24.d	Refina	70.c
Pilulæ de storce	66.b	Primula ueris	51.d	Rheuponticum	22.a.29.b.68.c
Pil. de turbith, & dicuntur aureæ	64.b	Præparato aloes	12.b	Ribes 55.b	Rizum 69.a
Pilulæ de tapia	68.a	Præparatio mezereon	16.d	Rob	8.b.16.b.55.b
Pilulæ ex colocynthide, uulgo de collo- quintida	65.d	Præparatio myrteti	46.a	Rob de cornibus	55.b
Pilulæ ex elaterio, uulgo de electuario seu electerio	67.b	Præparatio omphacometitis	46.a	Rob de morisani	ibidem
Pilulæ de opoponace, uulgo de opo- panaco	65.d	Præparatio Squillæ	13.c	Rob de ribes	55.b
Pilulæ de fumaria, uulgo de fumoter- re.	68.b	Propoleum uel propoleos	85.c	Rob de fumach	ibidem
Pilulæ ex sagapeno, uulgo de serapi- no	65.b	Proprietas colloquintidis	22.d	Rob omphacō, uulgo de agresta ibide	
Pilulæ ex thymelea, uulgo de Meze- reon	64.c	Pruna 5.b	86.c.24.c	Rhodemeli, uulgo mel rosatum	50.c
Pilulæ ex trochiscis colocyntidos, uul- go Alandahal	65.a	Pruna damascena	14.d.14.d	Rhodostoma	59.a
		Pruna syluestria 78.c	Psidia 30.a.53.b	Romanæ fœminæ non utebantur ui- no	41.c
		Plyllium 15.c	Phu uel fu. 11.d.36.b	Romei	30.a
		Pulegium	26.b.52.b	Rosæ simpliciter positz minuunt ru- bras	1.b
		Pulegium indum	35.c	Rosa 45.a.8	19.d
		Pulicaria	76.c	Rosata nouella.	30.c
		Pulmo uulpis quō præparetur	44.c	Rosata rubra	20.d
		Puluis ad epilepsiam puerorum	70.b	Rosatum Gabriellis	5.b
		Puluis ad frangendum lapidem in ue- sica	70.b	Rosatum	16.b.46.a
		Puluis ad prouocandum	69.c	Ros syriacus	21.b.26.b.27.a
		Puluis aromaticus	69.a	Rosma-	

Rofmarinus	71.b	Scorpio	32.d	Syrupus de acoro	50.d
Roftrum porcinum	53.c	Scorpionum species	32.d	Syrupus de agreffa	45.d
Rotab	15.c 36.b	Sebelten	16.b 40.b 52.c	Syrupus de artemiffa	54.a 54.c
Rubea	17.c 30.d 60.d 85.b	Secacul	4.b 8.d 19.a 24.b 42.c	Syrupus de berberis	49.d
Rubea trocomagmatica, uulgo trochifcata	30.c	Secacul conditum	42.d	Syrupus de beronica	51.d
Rubea tinctorum	9.d 52.a	Secaniabin	47.b	Syrupus de bugloffa	55.a
Rubus	77.b	Schedengi	57.c	Syrupus de calamento, conferens fpile niticis	48.a
Ruta	7.a 31.d 41.d 75.d	Seitaragi	37.a 57.c	Syrupus de cannis	46.c
Rutella	33.c	Seitaragi indi	8.d 63.d	Syrupus de cicorea	52.d 53.c
S		Sedenegi	20.c	Syrupus de cydoniis	45.c
Saboch	63.a	Sel & bel & phel confunduntur	36.c	Syrupus de corticibus citri.	45.d
Sacculus carminatiuus pro stomacho	69.d	Selini fperma	23.c	Syrupus de fucco cucurbitæ	45.c
Sacculus pro stomacho	ibidem	Semecarenum	36.c	Syr. de daçtylis uulgo albelat	46.b
Saccul. pro stomacho frigido	ibidem	Semencina	40.a	Syrupus de endiuia	49.d
Sacculus frigidus pro corde	69.c	Semen Alexandrinum	40.a	Syrupus de endiuia, inuentione Gen tilis	54.b
Sacculus temperatus pro corde calido	ibidem	Semen calami	58.d	Syrupus de epithymo	48.c
Sacculus ad fluxum ventris	69.d	Semina frigida abfolutè	50.a	Syrupus de eupatorio	48.a
Salachil uel halachil	36.d	Semen granati fylueftris	37.c	Syrupus de ficibus	54.a
Sal armoniacus	18.b	Semen pæoniz	33.b	Syrupus de fructibus	50.d
Sal armoniacus quomodo fiat	18.b	Semen rofæ	57.b	Syrupus de granatis acetofis, ualeat cõtra febres cholericas	45.d
Sal Cappadocum	54.b	Semen fanchum, vel semen fantonici	28.b 39.d	Syrupus de granatis dulcibus	45.d
Sal gemma	24.c 64.b	Semodius	87.c	Syrupus de granis myrti	46.a
Sal indus	13.c	Semperuua	75.d	Syrupus de hepatica	49.d
Salinca	24.a	Sene	16.b 26.c 39.c	Syrupus de hyffopo	47.d
Sal naphticus	36.d	Spicauium	27.c	Syrupus de iuiubis	46.d
Salnitrum	79.d	Serapinum	13.b 64.c	Syrupus de iua fecundum Nicolaum	53.a
Salix	81.b	Serpens	90.d	Syrupus de lilio	51.c 53.b
Sambach uel zambach	64.a 93.b	Serpentaria	80.a	Syrupus de lupulis	54.d
Sambucus	75.d	Serpentaria maior	22.d	Syr. de metha ex inuentione nra	54.d 47.c
Samplicus	3.c 28.a 34.a 34.c	Serpillum 53.a	Serum 16.a	Syrupus de mezercon	51.d
Sanaminda	51.d 52.b	Sefami 88.a	Sefeli 34.d 37.a	Syrupus de myrobalanis	50.c
Sandalus	55.c	Seta cruda	3.c 3.d	Syrupus de nenufar	49.b
Sandali mahazari qui	55.b	Seta cruda & non cocta	43.c	Syrupus de opio	53.a
Sandaracha	81.d	Seta cruda, adulta, & non cocta	3.d	Syrupus de papauere	46.b 47.a
Sandarax fiue fandaracha	69.b	Sextarium	37.a 75.a 90.c	Syrupus de pimpinella	51.b
Sanguinis draconis	22.c	Sicya	67.b	Syrupus de piris	45.c
Sanguinaria	39.b	Sichi montanum	35.d	Syrupus de pomis fimplex	45.b
Sanguinaris lapis	20.c	Sief abfolutè	62.b	Syrupus de portulaca	46.d
Sanguis humanus	72.c	Sief de chalcante	82.a	Syrupus de plantagine	53.a
Sanguis hirci	62.a	Sief citrinum	62.c	Syrupus de prafio	47.d
Sanguis hirci exiccatus & præparatus	38.a	Sief de fellibus	63.a	Syrupus de raphano	51.d
Sauich 69.a	Santonium 28.d	Sief de plumbo	62.b	Syrupus de rubea tinctorum	52.a
Sapa	26.b 50.c	Sief de thure ibi.	Siefalbum ibid.	Syrupus de pffyllo	49.c
Saphyrus fiue frites	2.b	Sief menithæ	63.b	Syrupus de pulegio	52.a
Sarcocolla	62.c	Sief rofatum	62.c	Syrupus de fcabiofa	54.d
Sardonis fiue fardinis	2.c	Sief rubeum 62.d	Siefuiride ibid.	Syrupus de fcolopendria	52.c
Saturegia 24.d	Satyriion 4.a 4.c	Sigillum fanctæ marie	42.d	Syrupus de febeften	52.c
Sataragi 68.a	Sauina 10.d	Sigia	71.a	Syr. de ftoeca. uulgo de Sticados	48.c
Saufragia	21.c	Siliqua nabathia	59.d	Syrupus de fucco endiuiz	55.a
Saufragiz species	21.c	Sylueftris lepus	40.a	Syrupus de fucco acetofæ	45.c
Sazena	11.d	Sympharum	22.c 26.b 53.b 67.a	Syrupus de thymo	48.c
Scabiofa	54.d	Sinapi	19.b	Syrupus de turbit	50.a
Scamonea	13.c 66.b	Sinapifmi præparatio Aeginetæ	84.c	Syrupus de uua	ibidem
Scamonea antiochena	63.d	Spina babylonica	17.c	Syrupus digestiuis	51.c
Scamonea præparata	15.b	Sircocf 55.c	Sireblengi 37.b	Syrupus ex acido citri fucco, uulgo de acetofitate citri	45.d
Scariola	5.a 24.c 52.d	Syrupus acetofus fimplex	46.c	Syrupus ex omphacino, officinis de agreffa	45.d
Scatuncellus	77.b	Syrupus acetofus cum radicibus ibi.	49.b	Syrupus fumariz maior, officinis de fumo terre maior	47.d
Schea	28.b 25.d 39.d	Syrupus ad ægritudines melancholicas	54.b	Syrupus glycyrrhizæ, uulgo de Liquiritia	ibidem
Schea montana	35.d	Syrupus ad matricem	54.b	Syrupus Macedonicus	51.a
Scylla	13.c	Syrupus ad quartanam, inuentione Pedemontani S. albelac 46.b	50.a	Syrupus optimus ad omnem hæmor rolagiam vndecunq; fiat	55.b
Sincus uel stincus	24.c	Syrupus albus	25.c	Syrupus rofatus	28.a
Scolimus	48.a	Syrupus aromaticus	53.c	Syrupus rofatus ex infufione rofarum ficcarum.	55.a
Scolopendria	9.d 52.c 62.a	Syrupus bizantinus, uulgo fyrupus Dinarii, uel de bizantiis	46.b		
Scordeum	9.d 35.c	Syrupus columbinus	52.b		
Scoria	9.b	Syrupus cordialis	54.c		
Scoria argenti	74.b	Syrupus de abfinthio	47.c		
Scoria ferri	34.b	Syrupus de acetofitate citri.	45.d		
Scoriz ferri præparatio	9.b				

INDEX

Syrupus fabot	49.e	Sulphuris species	12.b	Trachiscus absolutè	56.b
Syrupus sancti Ambrosii	51.a	Sulphur citrium	83.a	Trachiscus alcadion	61.c
Syrupus uiolatus	21.b			Trachiscus alcadion	58.c
Syr. uiolatus, uulgo de uiolis	46.d	Talcho	61.a	Trachiscus alindaracaron	60.a
Silafum	4.c.8.d	Talisafar	32.c	Trachiscus alphodillorum	62.b
Sifelis uel filer 41.a	6.c.21.c	Talpa	78.d	Trachiscus cochion	35.d.37.b
Silymbrium	3.c.28.a.53.d	Tamarindi	14.c	Trachiscus colloquintidis, uulgo alà	
Smaragdus	2.c	Tamariscus	9.b.75.b.93.a	dahal	57.c
Smaragdus lapis	21.a	Tapia	19.b.31.d.38.b.58.d.90.c	Troch. croci magnetis	59.d
Smyrna	60.a	Taplus barbatus	69.d	Trochisci crocomagmatidis, uulgo cro	
Solarum	14.d	Tarabit	69.b	cinagnetis	59.b
Soldanella	24.c	Tartarum	62.a.92.d	Troch. de absinthio	57.b
Solidus	1.b.59.b	Tebescet. & nebescet	36.b	Trochisci de agarico.	58.c
Solsequium	52.b & d.53.c	Teda pinguis	49.b	Trochisci de agno casto	59.d
Sorba	8.b.51.a.78.c	Θεουπερ	38.d	Trochiscus de alumine	59.a
Sparagus	4.d	Tempus construendi theriacam	35.b	Trochiscus de aniso	57.b
Spargula	75.c	Theodoreto anacardinum	31.11	Troch. de balaustis	59.d
Species caulis	39.a	Terra sigillata	29.c.33.d	Trochisci de bdellio	61.b
Species coralli	39.d	Terra figuli	91.c	Trochiscus de berberis	57.a
Species hyacinthi	36.d	Tereniabin	16.a	Trochiscus de calamento	61.c
Species uitri	37.d	Terebenthina	23.b.31.b	Trochisci de calce	62.b
Species petrosellini	21.a	Theriaca	8.c.27.b	Trochiscus de camphora	56.d
Species plantaginis	53.b	Theriace conficiendæ modus	35.b	Troch. de capparibus	57.d
Species scorpionum	32.d	Theriace experientia	35.a	Trochiscus de charabe	57.d.78.c
Species storacis	12.b	Theriaca, uulgo thyriaca magna Gal.		Trochiscus de gariophyllis	58.c
Speln pultri	27.b	30.d		Trochisci de charta combusta	61.c
Spica absolutè	58.d	Theriaca de terra sigillata	34.d	Trochisci de chelidonia	61.d
Spica aromatica	10.b	Theriaca de fusio	34.d.	Trochisci de cicadis	62.a
Spica nardi	8.d.6.a	Theriaca diateffaron	8.c.34.d	Trochiscus de cineribus	61.c
Spica nardi siue spica aromatica, siue		Theriaca primæ Auicennæ, & cist		Trochiscus de cyperis	57.d
spica auium	10.b	scriptio Andromachi	34.d	Trochiscus de croco	61.a
Spica romana	21.b.66.a	Theriaca rusticorum	34.d	Trochisci de cuscuta	60.d
Spica simpliciter	1.c	Terrait seu herba terrait	75.d	Trochisci de dactylis	59.a
Spica species	21.b	Tellculus uulpis	4.c	Trochisci de decem medicinis	57.b
Spina alba	16.b	Thymbra	28.b	Troch. de elleboro	61.b
Spina rosarum	69.c	Thymiana	32.b	Trochisci de eruo	59.c
Spodium	5.a.56.d	Thymicomarinum	32.b	Trochiscus de eupatorio.	57.b
Sponfa folis	52.d.53.c	Thymus	48.c	Trochiscus de lacca.	57.b
Spuma maris	63.a	Theimon apyron	12.b	Trochisc. de mezereon.	60.d
Spuma nitri	17.d	Thyriac ad morsum rutellæ	33.b	Troch. de myrrha.	59.d
Squibale caprinæ	84.c	Thyriac contra scorpionum morius		Trochiscus de olibano,	59.c
Squilla	43.d.60.b	descriptio	39.d	Trochisci de olibano, & trochisci de	
Squinanthum	3.c.10.b	Thyriac de terra sigill. 33.b	49.b	thure differunt.	59.c.59.d
Staphisagria	93.a.90.c.62.c	Tyrus	69.b	Trochiscus de rhabbarbo.	56.d
Stella terre	61.a	Thitiuacrum	20.c	Trochisc. de ramich.	56.c
Stoechas	13.c.18.c.48.c	Tortellæ de fenî	84.b	Trochiscus de rosis.	56.b
Stynchus	4.c.57.b.87.c	Trazea	70.a	Trochiscus de rosis et eupatorio.	56.b
Stypteris	23.a	Trazea confortans stomachum.	70.a	Trochisci de rubea.	60.d
Styrax uel storax liquid a	12.b	Trazea ualens ardori urinæ	70.b	Trochisci de scolopendria.	62.a
Storax	89.c	Tremula arbor	51.d	Trochiscus de siliquis.	58.b
Storax rubea 67.c. 75.a.	23.d.26.b	Tres sandali	52	Trochiscus vi pastillus de spica.	47.d
Storax liquida	35.d	Triaphyllon acetosum	73.b	Trochiscus de spodio.	56.d
Terychnon 58.a.67.a	Stroncos 41.a	Tria sandalum	39.d	Trochisci de tamarisco, vulgo alcar-	
Such alaherif	56.c	Tria sandala	1.d	meffit.	60.a
Suchaha	48.b	Tribuli	52.c	Trochiscus de terra sigillata.	57.c
Suchelemele 58.c	Succus 45.b	Tribulus marinus	77.c	Trochiscus de tyro.	59.c.60.b.c
Succus malorum	14.c	Tricocum	51.a	Trochiscus de thure.	58.d
Succus nucum	18.b	Trifolium	50.b	Trochisci de viperis.	60.b
Succus squillæ quomodo fiat	43.d	Triophyllum M.c	50.b	Trochisci de violis.	58.c
Suffuf.	68.c	Tryphera	8.c.37.b	Trochiscus diacorallu.	31.b.59.a
Suffuf ad prouocandum	69.c	Tryphera de epithymo	18.d	Trochiscus diaion.	23.d.59.a
Suffuf aromaticum	69.a	Tryphera Galeni	9.a	Trochiscus diani seu diaui.	59.a
Suffuf capitalis	69.b	Tryphera magna	31.c	Trochisci diaphoradisy	58.b
Suffuf contra dolores post partû	70.b	Tryphera maior	37.b	Trochiscus diarhodon.	23.d.56.b.59.a
Suffuf cordialis	69.c	Tryphera minor Phœnonis	9.b	Trochiscus galliæ muscatæ.	55.d
Suffuf impinguatiuum bonû 69.a	69.d	Tryphera moschata Alchanzi	9.a	Trochiscus galliæ alephanginæ.	56.a
Suffuf de granis myrti	69.a	Tryphera persica	14.c	Trochiscus galliæ sebeline.	56.a
Suffuf de ligno aloes	68.a	Tryphera faracenica magna	8.c	Troch. hedyeroi, vulgo Idiocri	59.a
Suffuf pro botio	69.b	Triticum	69.a	Trochiscus muscatus	59.c
Suffuf pro oculis	69.b	Trituratio quot modis fiat	3.c	Trochisci orobi	58.c
Sulphurata	27.c	Trochiscus	2.d	Trochiscus squilliticus	31.a
Sulphur	12.b	Trochiscus alandahal	13.b	Trochiscus stellæ	61.a

Trochiscus

LUMINARIS MA.

Trochiscus tyri	61.a	Vnguentum de anthera magnum	81.d	Vnguentum pectorale	79.c
Tubel ferri	9.b	Vnguentum de anthera minus	83.a	Vnguentum philagrios	79.a
Tuber terre	30.a	Vnguentum de adipibus	82.c	Vnguentum populeon	77.b
Turbith	3.b 50.b	Vnguentum de arthanita magnum	73.c	Vnguentum pro capite puerorum	80.a
Tuderi	9.b 33.d	Vnguentum de bdellio	74.a	Vnguentum pro stomacho	82.c
Thuris species	25.a	Vnguentum de calce.	78.a	Vnguentum pro uermibus	79.b
Turugen	20.d	Vnguentum de calchantho, uulgo	75.c	Vnguentum psilotrum	78.d
Thus	59.b 62.c 82.c	calcadis	77.d	Vnguentum plicorium	74.c
Thus masculum	25.a	Vnguentum de camphora album	83.a	Vnguentum quercium	79.a
Thuria	62.d	Vnguentum de cancri fluuiatilibus	81.a	Vnguentum rosatum	73.d
V		Vnguentum de cantaridis	80.c	Vnguentum rubeum	83.c
Vacca	70.d	Vnguentum de castoreo	79.a	Vnguentum rubecampforatum	83.a
Valeriana	11.d 36.c 53.b	Vnguentum de centaurea	82.a	Vnguentum tripharmaceutum	74.c
Vas aneum	50.c	Vnguentum de cerussa	74.b 80.a	Vnguentum uiolatum	74.a
Vena adulta	65.c	Vnguentum de cicuta	80.a	Vnguentum uiride secundum chirur-	
Vena tinctorum	78.a	Vnguentum de climia	82.a	giam	80.a
Vena multipliciter capitur	65.c	Vnguentum & corticibus castanea-	79.b	Vngula asini	70.b
Verberna	80.c	rum	79.b	Vngula caballina	42.b 50.a
Vermicularis	77.c 92.a	Vnguentum de dragantibus	81.a	Volubilis	17.a
Vermis terrestres	82.b	Vnguentum de euphorbio	79.b	Vritica	62.a
Vernis	29.d	Vnguentum de elleboro	79.c	Vritica	31.d
Vesichago	28.d	Vnguentum de flore xris	74.d 77.d	Vua agrestis	32.d
Vespertilio	82.c	Vnguentum de floribus salicis	81.b	Vuz genera	46.a
Vcutus adeps	73.a	Vnguentum de formicis	82.c	Vualupina	77.d
Vinctoxicum	24.d	Vnguentum de hedera	81.c	Vua pontica	50.d
Vinum antiquum odoriferum	36.a	Vnguentum de ieros.	82.a	Vulpis	44.c 81.d
Vinum ascalonis	59.b	Vnguentum de lapacio	43.a	Vultur	86.d
Vinum mullum	48.c	Vnguentum de lilio, seu de radice li-		Vixar siue uxifur	27.c
Vinum ponticum	61.b 84.b	lii	80.c	X	
Vinum unde	30.d	Vnguentum de lithargyrio	80.d	Xantonicum	39.d 40.a
Viola	45.a 14.d 18.d 46.d 88.b	Vnguentum de matrisylla	82.b	Xyloaloes	3.b
Viper	60.b.c	Vnguentum de melle	77.d	Xylobalamus.	9.d 25.d
Viperina	22.d	Vnguentum de minio	91.c	Xiracost	14.c
Virga pastoris	69.d	Vnguentum de mucillaginibus	79.c	Z	
Vis coriandri	20.d	Vnguentum de plumbo	80.d	Zafaran	61.b
Vis enule	34.c	Vnguentum de pulegio	81.b	Zaror uel zarur	51.a
Viscus quercinum	72.c 79.a 85.c	Vnguentum de ranis	80.b	Zedoaria siue zedoar.	2.c
Viscum romanum	65.d	Vnguentum de sandaracha	81.c	Zenxisfur	27.c
Vitecella	66.c	Vnguentum de semperuiua	79.c	Zingiber 17.b	1.d
Vitis alba	16.c	Vnguentum de succo enule	79.d	Zingiber species	42.d
Vitis nigra	ibidem	Vnguentum de staphysagria	82.d	Zingiber uel zengibel	42.b
Vitriolum adustum	55.d	Vnguentum de thalpa	78.d	Zingiber conditum	42.b
Vitrioli adustio quomodo patet	35.d	Vnguentum de terebentina	79.d	Zinar	62.d 77.d
Vitrum	37.d 81.c	Vnguentum de terebentina	82.b	Zinzapha.	16.b
Vitrum adustum	37.d	Vnguentum de uespertilionibus	82.b	Zirbus	72.d
Vmblicus	77.a	Vnguentum de uiro	81.c	Zaccharinum alumen	19.c
Vmblicus stinci	45.d	Vnguentum de uulpe	81.d	Zuccharum	2.a 1.d
Vnguentum album	80.c	Vnguentum de zinar	77.d	Zuccharum alhusar	61.d
Vnguentum absolute	72.d	Vnguentum de diabution	80.d	Zuccharum boraginatum	44.b
Vnguentum ad scabiem, quo si plantae		Vnguentum dialthea	76.c	Zuccharum buglossatum	43.b
pedum re	83.b	Vnguentum diaphoenicum Arabicu	73.b	Zuccharum nenupharinum	38.d
Vnguentum agrippe	77.c	Vnguentum diaphoenicum uulgo Dia-		Zuccharum rosatum	43.a
Vnguentum alharriel	73.b	phoenicon	79.d	Zuccharum rosmarinatum uulgo zuc-	
Vnguentum alabastri nardi spicati	74.d	Vnguentum diaphompholygos	77.c	charum alchichil	43.b
Vnguentum apostolorum	73.c 78.a	Vnguentum diuinum	80.b	Zuccharum fulmanum	38.c
Vnguentum aregon, uulgo Aragon	76.b	Vnguentum ebulinum	79.b	Zuccharum tabazet	3.b
Vnguentum aureum	74.a	Vnguentum egyptiacum magnum	74.b	Zuccharum uiolatum	14.c 38.d 43.b
Vnguentum basilicon magnum	74.a	Vnguentum genestircum commune	78.a	Zucchozariz, i. agnus castus	30.a
Vnguentum citrum	76.d 81.b 83.b	Vnguentum gratia dei	82.a	Zeuserandi	11.d
Vnguentum comitiffi	78.a	Vnguentum irinum	81.d	Zulapium rosatum ex infusione rosa-	
Vnguentum compositio alsefericon	74.c	Vnguentum incarnarium	88.a	rum, febrili adustioni conferens	45.a
Vnguentum chrafcos magnum, uulgo		Vnguentum marciaton, uulgo Marcia-		Zulapium infusionis rosarum & uiola-	
Carafcos magnum	73.b	ton	75.b	rum	45.a
Vnguentum fulcum seu nigrum	77.a	Vnguentum mollitium uenetum	83.b	Zumdebeust	11.a
Vnguentum de amylo	79.c	Vnguentum palmeum	74.c	Zurumbet	2.d

FINIS.

IOANNIS IACOBI MANLII DE BOSCO,

Alexandrini, in Luminare Maius ad Bernardinum
Nigrum Ciuem Papiensem

PROOEMIUM.



CUM pleraq; in medicorum antidotis peruerse intelligi a plurimis animaduertentem, tum quod Græce, Arabiceq; scripta uocabula pesime acciperent, tum quod operandi artem, modumq; penitus ignorarent. Olim ego iuuenili ætate concitus, breues, ac succinctas annotationes conscripseram. Mox uero succedentibus annis, cœptum a me studium in magnis meis occupationibus deponere penitus, tamen eius semper animi fuerim, ut quoad fieri posset, de posteris bene mererer. Tua tamen me uoluntas nuperrime impulit **BERNARDINE** ut munus a me antea susceptum, non modo non obliterari paterer, sed & in corpus redigerem, adderemq; plurima, quæ posterior ætas, exercitiumq; quotidianum contulere. Itaq; factum est, ut quod breuissimum fuerat uolumen, longe amplius excrecere, utq; susceptæ a me prouinciæ modus, ordoq; seruaretur, diui Mesuæ in primis exponendum opus mihi proposui; occasionem uero nactus, nonnulla subiecti a reliquis medicis confuse, uageq; conscripta. Factumq; est, ut hoc unum opus, pro aliis multis sufficere uideretur, tam late, tamq; abunde in hac antidotorum materia sumus euagati, quod citra arrogantiam dictum sit, sed & ueritas nusquam reticenda, Scio ego incomparabilem ægris iacturâ eximiis doctoribus illatum esse dedecus, non sui culpa uerum administratorum potius inscitia. Dehinc autem (ut arbitror) fore confido, ut aromatariorum quisquis nostrum hoc opus diligenter tenuerit, tuto aggredi possit omnes pæterea composituras. Quæ ut recte fierent, huius gratia negotii, **Galenum**, **Dioscoridem**, **Serapionem**, **Rasim**, **Auicennam**, **Auerroym**, **Copiliatorem**, **Guilielmum Placentinum**, **Gentilem**, **Nicolaum**, **Franciscum Pedemontanum**, **Nicolaum**, **Michaelem Sauonarolam**, **Symonem Ianuensem**, aliosq; per multos exquisitissime perlegi, eorumq; sententias huic nostro uolumini inserui, quam tibi **BERNARDINE NIGER** dedico, ac nomini tuo inscribo, ut fauorem, assertoremq; elucubrationes meæ te recognoscant, obseruent, ac uenerentur. Nam cuius auxilium fauoremque potissimum implorauerim, quam eius qui de me locupletissime semper sit bene meritus? Vale.

LUMINARIS MAIORIS

EX GRAECORVM, ARABVM, AC

Latinorum monumentis: ad summum luminis candorem,

ingenti cura, miroq; studio restituti,

SECTIO PRIMA.

ELECTVARIA, AC CONFECTIONES, EQVAMPLVRIMIS, AVTHO-

ribus hinc inde maximo seſectu, continens: vna cum IOAN. IACOBI MANLII

de Boſco. Alexandrini commentarijs: Necnon cum NICOLAI MVTONI

perſinilium Antidotorum Appendicibus.

EX ANTIDOTARIO MESVE
PRIMUM.

ELECTVARIVM DE ARO-
MATIBVS GALENI.

R. Ligni* aloes crudi,
Roſarum: ana. aur. xii.
Galliz moſchatz,
Macis,
Doronici,
Piperis longi,
Nucis moſchatz,
Menthz ſiccæ,
Spicz,
Caſſiz,
Malliches,
Cinnamomi,
Garryophyllorum.
Aſari ana. aur. iiii.
Calami aromati. au. iiii.

Croci
Cardamomi utriuſq; maio-
ris nempe, atq; minoris,
Trium ſantalorum,
Rhabarbari,
Colli,
Cubebarum,
Zingiberis,
Fœniculi,
Sem. Aniſi,
† Cheiſim, ana. au. ii.
Zucchari, uncias. vi.
Mux aromaticæ. 3. xii.
Mellis deſpumati quantum
ſufficiat.

COMMENTARIA. MANLII.



INTERPRETATVRE impre-
ſentiarum hæc deſcriptiones
diui Iohannis Meſæ aliorum
Medicorū, onus humeris no-
ſtris impar, ſupplices Deo
voces reddimus: ut ſui roſis
intima noſtra, aſperſione ſœ-
cundet, ut tandem è vaſto pe-
lago in ſecurum ſalutis por-
tus nos redigeat. Intendi-
mus itaq; in hoc opere deſcriptiones quarumcunq; medi-
cinarum tam uſualium quàm non uſualium, tam ſolutiuarum,
quàm non ſolutiuarum: quæ communiter apud apo-
thecarios haberi debent, ex diuerſis omnium fere Medi-
corum uoluminibus excerptas aggregare, & Simplicia in
eiſ ingredientia (quo ad ingenij noſtri debilitas patie-
tur) declarare: eorū uidelicet complexione, electione &c.
ut legenti patere poterit: & ſi de copiam ſimplici Autho-
ris diſſentire inter ſe uidentur (ſi fieri poterit) conciliare
quod ſi minus, cui magis innitendum ſit, dicere propoſui-
mus. Quòd, ſiqua minus bene dicta extiterint (quod quidẽ
humanis ingenijs eſt familiare) ueniam poſtulant: ca le-
ctoribus examinanda, & corrigenda propoſuiſſe.

IN ELECTVARIO Igitur proximè deſcriptio mul-
ta ſimplicia ingredientur, quæ ſunt declaranda. Sed pri-
mò dicemus, quare dicatur Electuariū. Dicitur ergo Ele-
ctuariū, quafi electum; quia ex multis, & uariis rebus Ele-
ctaria conſtituntur. Et diſſerentia inter ipſa ſunt multa;
quia quædam ſunt quædam, quædam amara, quædam acetofa
ut Diapiron, uel Damalcenū (prout apparebit in deſcri-
ptione infra in antidotario Nicolai) & Diatamarindus,
qui ſit ex dactylis acetofiſ, & ſic de ſingulis. Secundum au-
tem Mattheum Syluaticum, electuarium Diaroma eſt ele-
ctuarium de aromatibus.

Recipe ergo ligni aloes crudi, iſeſt non cocti, quia co-
ctum in medicina nullam, aut paruam habet efficaciam.
Et poſſet dici, ſicut dicit Meſies de roſa. al. & de rhabar-
baro: quod lignum aloes coctum in medicina eſt, ſicut ho-
mo mortuus. De ligno aloes uide Mattheum Syluaticum
in ca. proprio autoritate Caſſii felicis, ubi inquit. Multi
arabes faciunt ipſum bullire in aqua, & illa aqua utuntur
ad multa. tale ergo lignum aloes amiſit uirtutem, & ſpū.
Iſtud uerò lignum eſt lignum arboris ſuauiſſimi odoris,
ſecundum quodſdam, & eſt lignum, quod reperitur in ma-
gno flumine ſuperioris Babyloniz, cui coniungitur flu-
uio Paradifi terreſtris. Vnde quidam dicunt, quòd i impul-
ſione fluij ab arboribus terreſtris Paradifi conſtruitur:
nullus tamen huius arboris fertur uidiſſe originẽ. Alii au-
tem dicunt, quod in cacuminibus montium ſupraſcripto-
rum locorum circa prædicta loca exiſtentiū oriū hoc li-
gnum, & impulſione uentorum, aut temporis uetulaſte ca-
dit in fluuium prædictū. Infrà in confeſtione de xylaloes
oſtendat modum cognoscendi bonum a malo.

Roſarum. Rubearū, de quibus ſemper intelligitur, cum
ſimpliciter roſæ proferuntur. Vnde Meſi in ca. proprio de
roſis, inquit: Melior eſt rubea uerz rubedinis, paucorum
foliorum & planorum: & ex albis melior eſt habens ſimi-
liter. Bulchaſim qui ſeruitor dicitur in tracta. 2. in cap. de
modo deſiccandi roſas & reponendi eaſ, ait: Sciendum
quod qui ſiccauerit lib. 10. roſarum mundatarum, conuer-
tentur ad lib. 1. quando erunt ſiccæ: & ſi roſæ fuerint ex mō-
tibus, poſſibile eſt quod remaneat plus: & roſæ de monti-
bus ſunt fortioris odoris quā hortulanæ, & ita earū aqua:
& ita eſt de omnibus herbis & floribus: quia quæ naſcun-
tur in montibus ſunt fortiores hortulanis, & his quæ naſcū-
tur in locis depreſſis. Et ratio eſt, quia in eis eſt minor hu-
miditas, & magis digeſta: & illa pauca nō impedit ac-
tionem partium calidarum.

Ana Græce ſignificat pariter, ſiue æqualiter: & ſi, ubi
hæc dictio ponitur, æquale pondus de unaquaq; medicina
nominata eſt aſſumendum.

Aureus ſecundū modernos, eſt pondus drachmæ unius
cum dimidia, & ſimiliter ſolidus, ut ait Simon Ianuen. un-
de. Si ſolidum queris, tres drachmas dimidiabis.

Gallia muſcata, ſicut apparebit infra in tractatu de trochiſcis.
Macis apud Aui. in. 2. can. ex autoritate filij Meſaſgue
eſt cortex nucis moſchatæ: ſed ſecundum Circæ inſans,
nō eſt uerum quod infra in electuario de Mace declarare
intendo.

Doronici ſiue doronigi ſunt quædam radices paruæ, ſa-
poris dulcis, ſimiles calamo aromatico in colore & ſig-
nura. Serap. cap. de doronicis, inquit: Varonigi. i. doronicum
& ſunt uenæ albæ interius, exterius uero ſunt ad citrinita-
tem tendentes, & deſertur ex Sim. & doronicum ex Sin,
eſt illud quod magis adminiſtratur in medicina. & hoc eſt
ſatis notum.

Piperis lōgi, quod apud Arabes uocatur darfulfel. Spe-
cies uero piperis ſunt tres, ut in diatrion pipercon deſcri-
ptione apparebit.

Lumi. Ma.

A

*Agallo-
chon Græ-
ci uocant.

† Alias Li-
guſtici.

Nucis moschatæ. Hæc oibus nota est: quidam uocant eā myristicā. Iodora siue suæ redolent. Inde carya myristica .i. nux odorifera, siue nux moscata. Circa instans ait: Nux moscata fructus est cuiusdam arboris in India nascentis: tē pore maturitatis colligitur, & per septem annos seruat.

Menthæ siccæ. s. menthæ hortulanæ, siue communis, siue odoriferæ. Hæc apud Diosc. uocatur & edysmoson. Ponitur autem in hoc electuario sicca, quia uirtuosior est uiridi. Circa instans in ca. de metha ait: Metha domestica uiridis: minorē habet efficaciam in medicina, quā sicca. Siccat autem in umbra, & per annum conseruatur.

Spicæ. spicæ nardi, uel spicæ aromaticæ, siue spicæ auiū, dicit Aui. in .2. can. in c. pprio. & sic semper quādo reperitur spicæ simpliciter, de spica nardi intelligitur. s. m. Circa instans: Spica per .x. annos potest seruari in loco sicco.

Cassia .i. cassia lignea. Aui. in .2. can. dicit qd est cortex mori aleni: & est specierum plurimū quāda una est rubea, boni saporis & odoris, & altera spēs eius ē cuius sapor est sapor spicæ & c. melior uero est illa quæ ē rubei coloris, purā plana, longi ligni, grosse canna, subtilis foraminis, solidā, grossā, boni odoris, quæ mordicat linguam: nigra uero est mala. Circa instans ait: Cassia lignea est cortex cuiusdam arboris nascentis iuxta Babyloniam. Est autē cassia duplicis maneris: scilicet cassia fistula, & cassia lignea. Cum autē cassia simpliciter iuenit, intelligēdū ē de cassia lignea.

Malix. est gummi cuiusdam speciei lentis, quæ nascitur in sola insula Chio, ut est apud Sim. Ianuen. seu secundum Isid. in cap. de arboribus: Malix arboris lentis gutta est, melior autem in Chio insula gignit odoris boni, ut Sera. in cap. de mallice autoritate Gal. Albus est mallice est ille qui dicitur gluten romanum & c. & melior secundum Aui. est ille, qui est albus, magnus, mundus.

Cinnamomum. s. cinnamomum subtile & electum: Species uero ipsius, ut dicit Serap. in suo cap. sunt multæ: & ibi dicitur ex autoritate Diosc. Darfeni .i. cinnamomū dicitur lingua persica arbor senis & darfeni quidē sunt multæ species: & denominantur pluribus nominibus & diuersis secundum diuersitates locorū. Infra in consēctione de cinnamomo, etiam de ipso aliquid ostendit.

Garyophyllorum, siue caryophyllorū, it dicit Græcus & sunt fructus satis noti oibus: tamē de ipsis melius declarabo infra in aromaticis garyophyllati descriptione.

Afarus .i. afara bacchara quam multi garyophyllatam agrestē uocant: quidam aromatariorū utitur foliis ipsius in medicina, sed male faciunt. Vide Mes. in capi. de afaro, ubi sic ait: Electio melior pars plantæ istius est radix: & melior radix quæ est grossa, spissa, & cuius odor est subtilis, & sapor acutus cum stypticitate modica. Apud nos in locis humidis nascitur: cuius folia sunt similia cyssio. i. hede ræ, sicut est notum omnibus. De afaro per simp. scripto ui de Diosc. Est enim alia herba quæ a multis uulgarī sermo ne prociuala nuncupatur.

Calamus aromaticus, sicut inquit Serapio ex autoritate Diosc. nascitur in India: & melior ex eo est cuius color est sicut hyacinthus, & habet nodos spissos: & quando tunditur habet in se neruositates: & canna eius est plena quadam re simili texturæ araneæ, cuius color est albus: & est uiscosa: & in sapore eius, ut dicit Gal. ē acutis, & punctio pauca. Diosc. autem de calamo duo cap. facit unū de calamo aromatico qui in India nascitur, cuius optim⁹ est in colore rufus cum nodis spissis: & iste est ille qui nobis usu uenit. Aliud caput facit de calamo agrestis: & iste uide tur esse species graminis, sicut patet per Sera. ca. de gramine, & hæc est planta uenosa animalibus, quia ibi Diosc. ait: Calamus agrestis maior est in omnibus abacotis, quem si animalia comederint citius affert mortem: & maxime ille qui in uis, Babylonie nascitur.

Crocus .i. croci cōis siue orientalis, siue zahafarā ut dicit Arabes: & est alius qui dicitur hortulanus, & insectiuus, eo qd ex ipso sericum tingitur: iste flos carthami Diosc. in c. de croco dicit: Crocus est medicus utilis, sed melior est recens boni coloris, & subtilis odoris, & mediocriter

subalbidus, & longus, non fragilis, sed plenus: cuius tactu inficitur manus, & qui nō habet secum odorem uiscidum: qd si ita non habuerit: signum est qd uetus est, aut infusus.

Cardamomum maius est heil, ut reperitur apud Serap. in cap. de cardamomo. ubi inquit: Siccola .i. cardamomum, cardamomum maius est heil, & est minus: & est hilbanæ, & mafculus. Bartholomæus Montagnia in suis consiliis in tracta. 21 de agritudinibus apparentibus in extremitatibus, & primo de hernia. & de oibus speciebus hernie, ait: Cobetbague, & est in rei ueritate maius cardamomum a uulgo nominatum mellegeta. Est sic etia uide Aui. in .2. can. qd de cobetbague cap. facit. & ibi dicit qd est granum paruū simile cardamomo, quod defertur de Sclauonia: & sic uerum est quod cobetbague est nux facta, quæ a uulgo mellegeta dicitur: eo qd grana eius similitur mellicæ granis. Et sic hodie ab apothecariis nobilibus ponitur pro heil, siue cardamomo maiori, siue granis paradisi mele geta, quæ apud omnes est satis nota.

Cardamomi minoris est hilbanæ, & non habet capita nec corticem, & habet grana habentia corticem: cuius color est sicut cardamomi maioris, & substantia eius est subtilior quam substantia maioris, & uirtus eius est sicut uirtus illius: & istud (secundum intentionem modernorum) est illud cardamomum quo communiter utimur: & istud intelligitur quādo simpliciter ponitur. Non autē est nigella citrina, nec nigra ut putauerunt quidam.

Trium sandalorum, uidelicet sandali, albi, rubei, & citrini, qui satis sunt noti.

Rheubarbarum uero, ut dicit Mes. ex medicinis bene didis sollennibus, in quo aggregatur multæ ex intentionibus quæ quaruntur in re faciente mundificationē. Rheubarbarum uero dicitur a rheu quod est radix & barbarum eo quod in Barbaria regione oritur, & in India. Neque illud omittendum censui, quod Ammianus Marcellinus de eodem refert, Tanai flumini qui Europā Asiāq; determinat uicinum esse Amnethra nomine: in cuius ripis & marginibus nascitur radix eiusdem nominis. Ex rheubarbaro laudauerunt magis illud ex eis, quod est subnigrum declinans ad rubedinē. Infra in consēctione, de raved seni nelius docebo discernere bonum a malo, si Deus uoluerit.

Costus est radix amara. Reperitur aliquando in multis consēctionibus scriptum costū dulces, sed nec iudi, nec audiui aliquem qui dixerit se uidisse de ipso tamē apparebit iterum infra in consēctione diacosti.

Cubebe est quidam fructus rotundus aliquantulum depressus & latus inter folia eius repetitur: qui quando maturus fuerit, uergit ad rubedinem, & intra ipsum est granum triangulatum, autor est Sera. Secundum Circa instans cuius bebæ est fructus cuiusdam arboris in India nascentis. Potest autem seruari per decem annos. Eligenda est quæ mediocriter acuti saporē cum multa aromaticitate, & modica dulcedine. Aui. in .2. ait: Cubebe eius uirtus est si milis rubecæ, ueruntamen est subtilior. Et infra apparebit electuarium diacubebe, & ibi de ipso iterum aliqua subiū gant, si Deus uoluerit.

Zingiber est radix satis nota. Circa instans ait: Zingiber quidam dicunt ipsum esse radicem arboris: alii dicunt ramulculum arboris, sed ipsum est uena seu radix, herba nascens in transmaritimis partibus, & in motibus Sclauoniae.

Feniculi semē est illud quod apud Græcos dicitur marathrum: unde Macer: Feniculum medicū calidum secū quod secundo dicunt esse gradu Marathrum Græcus uocat illud.

Anisi s. semen ipsius. Aui. in .2. can. ca. de aniso, dicit qd semen ipsius tesculi romani est, & est minoris acuitatis quam nabathi, & in ipso est dulcedo, & de forma ipsius plantæ reperitur apud Dio. sc. sub nomine ligusticæ: eo qd plurima quantitas ex eo nascit in Liguria provincia, & unde

nomen accepit. unde Macer: A ligurum patria fumpisse significat, nomen dicitur &c. & semen ipsius est illud quod efficaciam habet in medicina. Auic. in. 2. cano. de cheim. ca. facit. Circa infus aie: Semen eius leuissimum appellatur semen, non herba uel radix in medicinis debet poni. quod per tres annos feruatur.

Zuchurum est mel canna. Auic. in. 2. cano. de ipso duo cap. facit: unum de zucharo absolutum, & dicit ibi q. eius arundo zuchari in natura existit & aliud de zucharo al hufar, quod est manna cadens super alhuzar, & est sicut frustum salis. & reperitur aliud zuchurum quod uocatur zuchurum tabarzi id est album, ut est notum.

Miua aromatica. i. miua cum speciebus, siue miua aromata, cuius descriptio apparebit infra secundum Mesuem in tractatu de syrups, sub hoc titulo Modus conditi de citonij, &c.

Mel apud Diosc. est ros coelestis, quem apes colligunt: eius genera duo sunt: unum quidem quod cupilliones apes colligunt aliud quod sub terra inuenitur, & atticum dicitur quod uariolae & lauginoiae & foriores apes reponunt, & habetur melius ad oculorum claritatem faciens &c.

Mesues ponit q. istud electuarium debet fieri cum melle, sed hodie in nostris partibus sit in mellellis cu zucharo, sed tempore antiquo utebatur magis melle in electuariis ad coctionibus q. nostro type. Et hoc accidit, quia antiquo tempore non habuerit ita cognitionem cannarum zuch. sicut habent moderni. Si autem cu melle facere uolueris, hanc est regula, q. pro unaquaque libra mellis bene desumpti ponantur .3. iiii. specierum tritarum & cribellatarum: & tunc fiet electuarium effectus melioris, & operatio medici nobilior. Quodam ponunt in libra una mellis desumpti. 3. i. i. pulueris specierum tritarum, sed tunc confectio non est tate operationis, sed esset maioris delectationis ad gustum infirmi, in libi zuchari syrupsizati & cocti perfecte ponitur & poni debet. 3. i. specierum preparatarum & cribellatarum: & tunc electuarium uel confectio erit perfectior operationis fin intentionem medici & scientie. Si autem in libi zuchari syrupsizati, ut dictu est, ponatur. 3. iiii. uol. iiii. pul. specierum dictarum, tantum erit confectio melioris saporis, sed diminuetur illius operatio secundum medicum & pectus intentionem medicalem. Nos autem uoluntatem intelligere per pulueris specierum preparatarum oia que possunt conteri. Et si quis querit quid mel ponit in electuariis dico q. tribus de causis, mel ponit in electuariis, ut dicit Nicolaus in proemio sui antidotarii: Primo ad conseruandum electuarium: nam praeter ceteris liquoribus mel est bonum ad conseruandum. Secundario ponitur, quia mel est ualde mundificatiuum. i. correctiui malicie medicinarum et proprie solutiuari. Tercio quia sua dulcedine amaritudinem speru temperat.

Dosis est limitata mensura uel pondus aliquius rei medicinalis simplicis, uel compositi, uel electi specierum, herbarum, aut electuariorum, & sic de singulis. Mesue habet. Dosis eius scilicet electuarii est an. 3. ii. hoc est, q. possunt dari aut sumi. 3. ii. sine molestia.

APPENDIX.

Cosimile tunc inscriptione, ut uiribus, tum ingredientium catalogo compositionem apud ACTARIUM inter Graecorum recentiores haud postrema nota: autorem in suis de Medicamentorum compositione monumentis, habet, Quae ne dum, nos ueris peritioris extollere, pro fus res ipsa belle in dicat: modo illam ad uerbu subscriptam percurrere studiosi minime grauentur: inuicem comparate, meliorem quisque feligere ualeat. Verum prius annotandum, non inordinat DIARRHOMATON. Basilicum inscribi, cum ex Odoramentis Regium sane existat Antidotum.

Re. Spicz,	Florum maioris	† Rosifarmi,
Calsiz,		
Maltiches,	Croci,	
Garyophyllorum,	Citrini,	
Cinnamomi tenuis,	Santalb,	Rubei,
Assari,	Candidi,	
	Costi dulcis,	

singulorum unciam

* Maceris,
Cinnamomi,
Zingiberis,

Seminis Foeniculi,
Anethi,

singulorum sescunciam.

Mel ex aqua cotoneorum, aut malorum, aut puniceorum, coquito igni molliuiculo, quo deinde species subigito.

II.

DE GEMMIS.

R. Albarum margaritarum. 3. iiii.

Saphiri, Garyophyllorum, 3. iiii.

Hyacinthi, Zingiberis, 3. iiii.

Fragmentum Sardinis, Piperis longi, 3. iiii.

torum, Granatorum, Spicz, 3. iiii.

† Feruzegi, Folii, 3. iiii.

ana. 3. i. s. Croci, 3. iiii.

Zedoaria, Heil: ana. 3. i. s. 3. iiii.

Doironici, Trochilicorum, 3. iiii.

Corticum Citri, 3. iiii.

Macis, Ligni Aloes, ana. 3. y. 3. iiii.

Seminis Alfeniemitch, Cinnamomi, 3. iiii.

ana. 3. ii. Coralli rubei, 3. iiii.

† Charabz, 3. iiii.

Limaturz eboris, 3. iiii.

ana. 3. i. s. 3. iiii.

Albi, Moschi boni, 3. s. 3. iiii.

Been Rubei, Ambra, 3. ii. 3. iiii.

Confecit cum melle Emblicorum, & colatura e Gele-

niabini. i. de Rosis, partibus aequalibus, quantum sufficit.

COMMENTA. MANLI.

Gemmae sunt lapides preciosi qui ingrediuntur istud electuarium. Iusto in ca. de gemmis ait: Post marmorum genera gemmae sequuntur, quae multum auro decorum tribuunt uenustate colorum: primordia earum a rupe. Quae casti. Fabulae sunt Prometheum primum fragmenta saxi eiusdem inclussisse fero ad digitum circudacti, hoc fuisse uolum, & gemmam, ut tradit Plinius naturalis historiae lib. 37. Genera gemmarum innumera illa esse tradidit: quibus nos ea tantum quae principalia sunt notissimae annotabimus: Gemmae uocatae sunt q. in inter gummi transluceant. Preciosiores lapides ideo dicti sunt, quia magno precio enuntur: siue ut a uilibus discerni possint, seu q. rari sint: & istud electuarium apud nos est in usu, & ualet mirabiliter ad ea quae dicit Mesue.

Albae margaritae sunt lapides dicti Perlae, qui in ostris, reperiuntur: quaedam sunt perforatae, aliae non perforatae: & perforatae, ut dicit Matth. Syl. sunt artificiosae factae, & non naturaliter: sed non perforatae, quae naturales sunt, meliores sunt perforatae. Et ideo quando in medicinis ponuntur, non perforatae intelliguntur. Sed sunt aliquae oblique ad trinitatem tendentes non perforatae, quae perforatae aequo possunt: & ideo eligenda sunt clarae & albae: quae uero obscurae quasi albidae sunt, non sunt ponenda in medicinis. Origo margaritarum inquit Plinius, conche est haud multum ostrearum conchis differens. Dos omnis in candore, magnitudine, orbe, & pondere, uide ibi.

Fragmenta secundum Mes. sunt ex quinq. lapidibus preciosis qui omnes quinq. istud electuarium ingrediuntur. Et sunt multum in usu in medicinis cordialibus, & ad multas alias necessitates: & sic quando doctor ostendat fragmentum cordialium aut preciosiorum, intelligitur de illis quinq. quae inferius nominabo.

Saphyru siue sircus uocatur, eo q. in litore firmiter inueniatur: & est lapis, sicut narrat Matth. Syl. ex auctoritate Alberti qui uenit ab oriente & India et Ipidomnio apud podium prouincia regione & ciuitate: sed non est adeo preciosius, ut per omnia sit similis orientali. Est autem coloris perspicui sicut coeli serenatum, sed uincit in eo flauis color. Melior autem est qui non satis est perspicuus. Opti. Lumi. Ma. A 2

Nuclei indicz,
Agallochi,
Calami odorati,
singulorum semiunciam.

* Macia
uulgo ap-
pellatur.

* al. 3. ii.

† Corneo
lus nunc
appellat.

† idest tina,
regi.

† hoc est
oximi ga-
ryophylla
ti.

† al. Ele-
gri.

† i. Ro-
sis.

† i. carda-
momi.

† al. fue-
co.

† Quocet
chyros di-
citur.

mus autem qui habet nubes obscuras ad rubedinem declinantes. Idoloris aic. Saphyris caruleus, & cum purpura habens pulchres aures sparsos, optimus apud Medos, nunquam trā. per lucidos. Hic lapis est apud nobiles notus.

Hyacinthi us lapis est apud Sera. cuius species sunt tres una eorum est coloris rubri, secunda est coloris citrini, tertia uero coloris cinis. Hic coloris antimonii, sed nobilior omnibus est rubeus; & quando inciditur in species super eum rubescit multum. Virtus hyacinthi est multum uulgata & honorata inter homines: unde si quisquam hyacinthum secum portauerit aut sigillatim edidit, & portauerit sigillationem illā secum si intrauerit in regione aliquā, uel provincia, in qua cadunt fulgura multa, seu in terra pestifera, nullatenus noceant ei &c. Est item hyacinthus herba ut tradit poeta, & nōmīnē hyacinthi pueri amati ab Apolline & in florem sui nominis cōuerſant. ut Plinius refert a cruore sanguinis Aiacis xedito ita discurrunt uenis, ut Græcorum literarum figura ea legatur inscripta: quod & Ouidius & Virgilius in buco. testantur.

Sardonis siue sardinis lapis, secundum Mattheum Syl. ex auctoritate Alberti, est lapis ab antiquis inter preciosos lapides numeratus, est autem habet ruborem spissum cum substantia parua, sicut si parietas imaginetur in rubra terra: & secundum hanc diuersitatem inuenitur quinque modis. Et Iddo. Sardonis sunt quique species scilicet quæ omnes appellata est, quæ habet in se permixtum candorem in finititudine unguis humane: Græci enim unguem conychem dicunt. In India uel Arabia gignitur: & aunt hunc lapidem accendere animum ad gaudium, & acuire ingenia. Sardis uero dicta est, eo quod primum reperta fuit a sardis: uel dicitur sardis a regione unde reperitur. Hæc rubrum habet colorem.

Granatus lapis, secundum Matthei. Syl. ex auctoritate Alb. est de genere carbunculi. Est autem lapis rubens & per lucidus in colore similis cygnis id est balauis. Est autem rubens aliquantulum obscurior carbunculo, & cum subiicitur ei in sigillis niger color, inuenitur quidam modus qui intra ruborem sordis habet uioleam colorem: propter hoc quod uiolata dicitur: & est preciosior alijs granatis, leuiter cor, & pellit tristitiam.

Feruzegi, sicut dicit Mes. est smaragdus, & se reperit apud Matthei. Syl. in cap. de lapide smaragdi. Mirandum est de Simone Ianuē. ingenio suo in simplicibus, qui dicit, quod feruzegi est stannum, & quo in hoc non conuenit. postea ipse in cap. de lapide feruzegi, sic ait: Lapis feruzegi secundum Alhani, est lapis topaciū, si dicit feruzegi, id est: quod non est credendum, quia intentio domini Mes. est quod feruzegi sit smaragdus & non stannum nec lapis topaciū, cum ibi non conueniant. Aui. autem in 3. can. in fen. 3. can. in ca. de medicinis cordialibus, habet feruzegi: & in 7. can. in simplicibus exponit quod est smaragdus, & sic est. Smaragdus animam uiriditatem dicitur. Sera. de lapide smaragdi dicit quod ille qui est uiridior & fortis uiriditatis, est melior alijs &c. Hic lapis est satis notus. Valer autem smaragdus ad præcognitionem futurorum, arguit substantiam, & percipit motus laeuigie, tempestates eliminat. Hemitriteum sanat, & obliuit epilepsia.

Zedoaria, siue zedoar arabice: Sera. autem facit nūm. ca. de zedoaria, & duo capit. de zumbet, sed in uno est scriptum sic: Zumbet; & de quo infra in prædicta declaratione istius electuarij uidebis quid est aliud cap. facit quod dicit zumbet cum h. & istud idem est quod zedoaria. Tu uero considera differentiam, quæ reperitur pro una syllaba; & hæc sunt radices rotunde similes radicibus aristolochie rotunde in rotunditate earam, & sunt similes in sapore & colore zingiberi & afferuntur de Seni. Auicē. in 2. can. duo cap. facit, unum de zedoaria, & aliud de zedoar, quod idem est, ut dicit Simon. Ianuē. & hæc satis sunt nota.

Cortex citri est fructus magnus siue uocatus. Sera. ca. de citro, dicit atrog. i. citrū. Gal. fructus huius arboris nominatur in Græco pomum aquæ, & cortex eius non est frigidus: immo est aut æqualis complexionis aut minus æqua-

lis parum & iste fructus notus omnibus. Quidam uero de nouo scribentes intinatalus L. vi. n. Apothecario formi, qui potius est differe uolentium tenebras, in hoc ualde deceptus est, dicit. n. corticem citri. i. cedri, quod non est bene expositum, quia uide Dioscori quoniam cap. facit de citro & aliud de cedro, & non sunt idem. Melius uero, si Deqs uoluerit, infra i. antidotario quod Nicolaus scripti declarabo quid est cedrus: de quo hic pice cedaria siue alchitra. Quomodo autem citrangulum differat a citro, uide in 7. cano. & quæ sunt folia iuxta cordialia, uide eundem. x. ceteri.

Alfeniensiū siue feleniensiū est ozimium garyophyllatum, ut dicit Serap. in cap. de ozimo. garyophyllator: & dicitur quod folia eius sunt parua: quoniam color est inter uirorem & glaucedinem: & odor eius herbe est similis odori garyophyllorum: & eius semper est minimum, nigrum: & colligitur in mense Iunij. Sciendum quod quando reperitur feleniensiū, siue ozimium, fuscū, basilicon garyophyllatum in electuarijs & in cōfectionibus semper intelligitur, sed in unguentis & emplastris herba, intelligitur: hoc apud Aui. in 2. can. uocatur salamanichi, & ibi dicit quod est ozimium garyophyllatum ipsius odor est similis garyophyllo, & secundū Circa inflas eius semper per tres annos cōstat.

Corallus rubens est nobilior alijs. Dios. corallus quem multi liethodendrea dicunt, abor est in fundo maris, quædam uelli cepit accepto aere grauētur. Nascitur uero multum in promontorio Siciliæ nomine Pachino. Eligendus est colore coccineus id est rubens, post in bonitate est albus, & deſerit ei uiger.

Charabe siue chachabe est gummi in Aui. sicut sanda racha, uernix tendens ad citrinitatē & albedinē & puritatem, & quæ declinat ad rubedinem: quæ attrahit palcas & fracturas plantarum ad se: & pphoc noſtur charabe, & rapiēs palcas pſice: & de hoc fit patet qd. quibus utuntur multæ res pro deſcriptione: & ibi melius satis est notū. Limatura eboris, i. limatura siue calura dentis elephantis, unde uide Simon. Ianuē. in cap. de ebore ubi ait: Ebor est dens elephantis. Inde eburneus, aptum est medicina in multis adfectionibus ingrediens, & sic est.

Been albi & rubri sunt quedam radices quæ de Armenia deferuntur. Sera. dicit: Species eius sunt duo, i. rubra, & alba, & sunt ambe uenē in magnitudine radicis palinae paræ: quarum quedam sunt tortuose, & deferunt ab Armenia. Odor eius est bonus, & est in eis uiscositas. Moderni herbarij inueniunt in nostris partibus de utraq. specie, sed in odore non conueniunt, ut in Armenio.

Folium siue malabattrum, ut dicit Serap. herba est quæ nascitur in India, & habet folia quæ expanduntur super faciem aquæ in illis partibus, sicut cuculecula aquæ, & non hęc radice, & quæ colligitur inferitur in filo. Gal. in 7. simpliciti inquit: Malabattrum folium. i. foliū Indianum spica simile est fm uirtute, & sic est. Aui. in 2. can. in ca. de folio dicit, quod loco eius ponitur pondus ipsius de mace, aut etiam de spica, & sic fit. Quidam mercatores uendūt folia garyophyllorum pro uero folio: sed uerum folium nunquam uidi nec audiui aliquem citra mare uidisse: est enim preciosum.

Troch. diarthodō. Trochiscus autem dicitur a trochos quod est rotatus, quia trochiscus est similis rotæ curuæ. Diarthodō. i. de roſis deſcriptio ipsius apparebit infra.

Galangæ sunt quedam radices odoriferæ, sicut sunt notæ infra apparebit diagalanga, & ibi melius ostendetur.

Zumbet est species zedoariæ, idem tamen non est, ut quidā uolunt. In isto electuario possumus certificari, quod zumbet non est zedoaria, quia Mes. habet zedoariā & zumbet quoniam non sunt idem. Radices uero zumbet sunt radices similes cypero in figura: sed multo maiores & duriores: intus subcitri coloris, odore & sapore zedoariæ. Serap. cap. de zumbet dicit ex auctoritate Gale. Zumbet ex speciebus odoriferis: & propter hoc admiscetur cōfectionibus aromaticis. Aui. in 2. can. dicit Zumbet est herba similis cypero sed est maior, & minus odorifera.

Folia auri & argenti sunt nota, & ambo debet esse mera, Mufcus apud Auicē. in 2. can. est folliculus animalis, sicut

sicut gazel, ipse, nisi quia habet duos dentes albos flexos, ad interiora, sicut duo cornua. Ser. uero in cap. de musco, vulgo muscus fit folliculus gazel: qui cum Auic. non conuenit. Ego uero interrogans quemdam mercatorem, si gazel est animal proferens muscum, ipse respondit quod uo, sed in similitudine differunt parum. Muscus uero melior est ille qui defertur de regionibus Tumbaci, ut dicit Sera. quia illud animal in illis regionibus comedit spicam nardi, & alias species odoriferas: & quanto muscus magis refolet, tanto melior est. Hodie raro reperitur bona: falsificatur enim cum hepate lupi, & aliis rebus.

Mel emblicorum est illud quod docet Ras. in 9. Almā. in fine electuarii leucistanis: sicut apparet infra.

Colatura geleniabin de ros. secundum modernorum usum, est mel rosatum colatum. Au. in 3. can. in cap. de ros. sic ait. Aqua rosa est bona capiti & stomacho, & confortat quæ ex ea nutrita est cum melle, stomachum: & est geleniabin. In 5. uero can. in distinctione de conditis, de geleniabin loquitur. Paulus in cap. de dolore stomachi ait: Addatur muraba. i. geleniabin. Matheus Sylua. in litera muraba, dicit quod est conditum aliquod, sicut rosæ, uolæ &c. & ita dicit Simon Iunuen.

APPENDIX.

Nec prorsus absume ad Aquarum habetur antidotum, D. I. A. M. A. R. G. A. R. V., ex unioibus nepe, per pulchre inscriptum, hæc suscipiens.

Cinnamomi,	Syracis,
Garyophyllorum,	singulorum scilicet quum.
Spice,	Vn. onum.
Galangæ,	Zingiberis,
* Dulcis radices,	Osis Ceruini cordis,
Xyloaloes,	Eboris,
† Rosæ,	† Blatrii bysantis,
† Violis,	† singularum. 3. i.
† Passillorum e	Molchi scilicet quum.
† singularum. 3. i.	Ambaris,
Nucis myristicæ,	Caphuræ,
Maceris,	singulorum. 3. i.
Zedæaræ,	
Rhæi,	

Mellis modus, qui fecerit satis.

III.

EX GRANIS TINCTORIIS,
uulgo Confectio Alchermes.

De Setæ tinctæ ex chermes circiter libram unam. Et pro priæ super cuius tinctura non præterit spatium extelum, & submerge eam in succo pomorum dulcium, & aqua rosarum añ. l. i. s. & dimitte die una: deinde fac modicū bul lire, donec aqua rubeat: deinde extrahe ab ea setam, & ex prime eam, & pone in ipsa aqua, zuchari tabaret. 3. cl. & coque usque ad spissitudinem mellis, & remoue ab igne, & proice in ea acta calida Ambre crudæ minutim incise. 3. iiii. & dimitte in eo liquefieri, deinde proice super ipsum puluerem harum rerum.

Ligni aloes crudi,	} ana. 3. vi.
* Darfeni,	
Lapiz lazuli loti, & præparati,	} ana. 3. i.
Margaritarum albarum	
Auri boni. 3. i.	
Mulsi boni scrup. i.	
Confice & fiat.	

COMMENTA. MANLII.

Confectio idest simul factio, & deriuatur a conficere scilicet: quia ex pluribus rebus conficitur: & potest esse mollis seu solida, seu dura. Hæc apud nos est in usu, sed non multum. Dominus Mesue in cap. de lapide stellato, habet confessionem lapidis lazuli: idem est.

Alchermes siue chermes sunt grana tinctorum quibus tinguntur panni. Reperitur aliquando scriptum chermes cum s. & tunc sunt passule sine osibus: de quibus Serap. in cap. de granis tinctorum, cum quibus tinguntur panni, inquit: Chermes, idest grana. In cap. uero uite & eius specibus, & quæ ex eo sunt, dicit alius Philosophus, Alche-

smes ita nominatur in linguis serifis, & sunt passule sine granis. Et sic etiam Dioscorid. uocat cocum infectum: idest, quo tingitur. Et hæc grana, ut dicit Mathe. Sylua. in qua tingitur scarlatum, unde dicitur de Christo quod fuit uestitus ueste coccinea, idest, tincta cocco: scilicet grana de scarlatto.

Poma dulcia apud omnes, poma parifana, siue de paradiso sunt magis laudata quam alia poma: & si illa habere non poteris accipiantur redolentia: quæ etiam sunt laudata ad confortandum cor.

Zucharum tabaret. i. zuchari album, de quo Mathe. us Syl. in litera tabaret ait: Tabaret, idest album, quod fit in illa regione sic nominata.

Darfeni. i. cinnamomum grossum, non est autem foliū ut exponit synonyma Nicolai, nec darfeni, est cinnamomum finum, ut quidam dicunt. Intra apparebit confectio de cinnamomo: & ibi melius ostendat.

Lapis lazuli, secundum Circa instans, determinatur ab authoribus uena terre, & est de qua fit lazulus: similiter la pis Armenus dicitur, quia in Armenia reperit. De modo lauandi lapidem lazuli, scias quod debet heri: fit de la pide armeno, ut docet Mes. in cap. de lapide armeno: & modus eius est iste. Teratur lapis lazuli uel armeni in uase lapideo, uel in mortario lapideo: deinde fundatur super ipsum aqua dulcis, idest aqua communis, & lauetur sic terendo, & fiat illud trigiesis semper in nouando aquam, & adhuc decies. Post illud lauetur cum aqua rosata. Et dixit Alchindus: Lauetur cum aqua rosa. & buglossæ post purgatione eius: acquiritur enim mirabilis proprietas ex hoc ad ægrotudines melancholicas. Mes. de lapide lazuli loquitur in cap. de lapide stellato, & ibi describit confessionem de lapide lazuli, quæ uidetur esse eadem cum confessione de alchermes: & sic si legis istam descriptionem de alchermes eam illa de lapide lazuli, uidebis quod in simplicibus, & in uirtute, & in omnibus conuenit.

IIII.

E. XYLOALOE, uulgo Confectio
Ligni Aloes.

* Ligni aloes crudi,	Folii,
Rosarum, ana. 3. viii.	Setæ crudæ,
Garyophyllorum,	Margaritarum,
Spice nardi,	Corallorum rub.
Macis,	† Charabæ,
Nucis muschatæ,	Foliorum citri,
Gallix muschatæ,	Corticum citri,
Cubebe,	Alfelengemifch,
Cardamomi utriusq.	Samplici,
Malticis,	Silymbrii aquatici,
Cinnamomi,	Menthæ sicæ,
Cyperis,	Piperis longi,
* Squinanti,	Zingiberis, ana. 3. iiii.
Zedoariz,	Molchi boni. 3. i.
Been,	Ambre. 3. i. s.
Albi,	
Rubei,	

Confice cum melle Emblicorum, & miua aromatizata.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de xyloaloes, idest cōpositio de ligno aloes quæ etiam ad formam electuarii reducitur. Au. in 5. can. ponit unam aliam descriptionem, sed non est eadem cum ista quam facit Mesue. Ras. etiam in libro de diuisionibus habet unam descriptionem, quæ non concordat cum ista tamen apud nos nulla illarum in usu est.

Xyloaloes apud Græcos est lignum aloes, & sic reperitur apud Auicennam in secundo can. quamuis Christophorus de honestis super confessione de damulco credēs se inuenire capite de ligno aloes in litera 1. & non aduertens, quod uocatur xylo oes, dicit: Mirandum est, quod Auicenna non facit de ipso capitulum: scilicet ligno aloes in secundo can. ubi de simplicibus tractat. Sed hoc recte non dicit, quia bene Auicenna in secundo can. de xyloaloes loquitur in litera x. & ibi docet modum cognoscendi

Lumi. Ma.

A 3

† alia, Sue
cini, uel
electri.† alia,
Scharuan
thus.

* Glycyrrhiza uulgo.

† Diarhodon nomen.

† Dialon uocant.

† Onichis præci dicitur.

* Cinnamomi genus.

bonum a malo, dicens: Vniuersaliter melius xyloaloes eff illud quod magis submergitur in aqua: natas uero est priuatu uita & spiritu. Alio modo cognoscitur, uidelicet in colore: quia oportet esse nodosum, fuscū, & obsecuri coloris: in odore quando comburitur super carbonem, facit fumum boni odoris. & facit uelut spumam in sapore, quod sit amarum: & in pondere si natat super aquam est malum; si submergitur: est bonum.

Cyperus est species iunci, & sic a multis triangularis dicitur: apud nos in pratis ac locis aquosis nascitur. Radix uero eius competit uisui medicinz.

Squinantum eff palea camellorum, quia cameli eam comedunt. Circa instans & Sera, cap. de squinanto dicunt, Quod de ipso administratur, sunt flores, & radices, & folia hoc est notum.

Sera cruda ideo non cocta, quæ nullam aut paucam efficaciam habet in medicina, ut infra i diamusco melius ostendat. Samplicius. I. maiorana. Circa instans in ca. de maiorana dicit: Maiorana. i. samplicius flores & folia uisui medicinz competunt: colligitur in astate cum floribus, & in umbrato loco desiccatur: per annum seruat.

Silybrium. i. menta aquatica, siue balsamita. Auic. in 2. ca. dicit nemen. i. silymbium: sed fuit error trallatoris, utputo, quia tamen apud Serap. est serpillum, & sic est magis credendum auctoritati Serapi in simplicibus quam Aui. uide etiam apud Ioan. Arculanum in cap. de cura cephalæ, tam calidæ quam frigide: qui dicit nemen. i. serpillum, & non est silybrium: & sic est licet Christophorus Barziculus super illo passu exponat nemen esse silybrium uel serpillum: quod non acceptatur.

V

L A E T I F I C A N S, Hamech filij Zachariz, ideo Rasis uulgo Sarborteng.

R. Rosarum, Cinnamomi,
Ligni aloes, an. 3. vi.
Croci, an. 3. i. s.
Makis, Cyperi. 3. v.
Nucis muscatæ, Garyophyllorum,
Galliz moschatæ, Maltiches,
Cardamomi utriusq; Spicz,
ana. 3. ii. Afari, an. 3. iiii.

Conifice cum melle Emblicorum, & aromatiza cū Moschi boni gran. xv.

COMMENTA, MANLII.

Ista descriptio electuarij sarborteng. i. lætificantis, secū dum intentionem Mes. est descriptio Hamech filij Zachariæ. i. Rasis: sed ego non repeti istam descriptionem apud ipsum. Verum est quod Rasis in 9. Alia habet unam descriptionem que est nobilior: ista uero infra ostendat. Illa uero simplicia que in isto electuario ingrediuntur, declarata sunt superius.

Trituratio fit tribus modis, ut docet Mesue in l. primo, summa secūda ca. 4. & ibi docet de modo triturationis dicēs, quod officium triturationis est necessariū tripliciter.

A P P E N D I X.

Apud Rasm lib. 5. Continentis (quibusdam tamen immutatis), hæc compositio habetur aliter in libro. 9. ad Almanforem, cap. de Melancholia, multo præstantior ista, ut & inferius belle apparebit.

Alia etiam apud Mesuem ca. de Melancholia. Alia apud Mes. & Nicolaum ex Galeno (nescio unde) citata. Alia de niq; apud Nicolaum, Salernitanis usu frequēs. Verum harum omnium loco frequētius usu est Electuarium lætificans Conciliatoris, ex differentia CXCVI. cuius tum descriptio, tum explicatio inferius abunde legemus.

VI.

EX CITRO, Inuentione nostra

R. Corticum citrorum, aur. xx.
Garyophyllorum,
Ligni aloes,
Cinnamomi,
Makis,
Galangæ, an. 3. ii.
Cardamomi,
Zingiberis, an. 3. i.
Moschi. 3. i.
Conifice cum melle,

COMMENTA MANLII.

Modus electuarij de citro ex inuentione nostra non est in usu.

VII.

DE MOSCO. Confectio dulcis.

R. Croci Ozimi citrati, an. 3. ii. s.
Doronici, Been Rubei,
Zedoariz, Albi,
Ligni aloes, Folij,
Makis, an. 3. ii. Spicz,
Albarum margaritarum, Garyophyllorum, an. unc. i.
Sera cruda adusta, Zingiberis,
Charabæ, Cubebe,
Coralli rubri, an. 3. ii. s. Piperis longi, an. 3. i. s.
Galliz muscatæ, Moschi scrup. ii.

Conifice cum melle crudo, quod fit quadruplum ponderis omnium, & pone in uase uitreo: sit Dosis eius an. 3. i. usque ad ij. Si autem hanc compositionem amarā facere uolueris, ualentior efficitur ad ea que dicimus, & ad excitandum humiditates stomachi, & putrefactiones eius, & propriæ si addatur in permutatione eius.

Abinthij, * Cheifim,
Rosarum, an. 3. iiii. Calorei, an. 3. i.
Aloes ablutz. 3. iiii. Cinnamomi, 3. i. s.

COMMENTA, MANLII.

Confectio uero de musco dulcis A musco dicitur ista cōfectio: dulcis autem dicitur, quia fit sine additione rerū amararum, quæ in fine ponuntur descriptionis. tunc appellatur diamusculum dulce. Auic. in 5. can. de hac habet multas descriptiones, sed non sunt in usu. Ras. ponit unam descriptionem, quæ nominatur diamusculum preciosum: sicut infra apparebit. Ista Mes. apud nos est nobilior alijs descriptionibus. Haly. autem in 1. o. præc. ait: Musci medicaminis dulcis: & est quæ fit idem.

Sera cruda adusta & non cocta. Reperiuntur uero multi deceptores, qui faciūt ipsam bullire in aqua, & tali aqua utuntur ad multa commoda, sed uenæ talis seta efficaciam nō habet in medicina, sicut homo mortuus. Scias ergo quod est quidam uermiculus qui textit seta super se, & facit coepturam, & dimittit donec perforat illam telam, & exponitur soli donec moritur uermis. & ista seta deserta ultra marinis partibus. Mes. habet adusta, sed Serap. in ca. de seta sic ait: Est bona cordi, & confortat substantiam, uel totaliter eius, & clarificat sanguinem eius: & propter hoc ponitur in medicinis cordis: & præcipue in diamusco: & quidam comburant eam, ut possit facilius teri & melius puiuerizari propter deficcationem, & quibusdam non uidetur hoc bonum, ne amittat uirtutem suam, sed melius est teri incidere ipsam cū forficibus: & postea terat in mortario cum margaritis, charabæ, & corallis: & tūc teritur facile. Haly. ibi. dicit. Serici noui & non adusti autem cōburrere polueris, oportet ut accipias setā nouam nondum tinctam, & incidatur minutum: & pone ipsam in olla noua, & ponatur in furno panis, & ibi dimittatur tantum quod fit parum combusta, & nō oportet comburere ualde, sed solum afflatur parum ut possit terere: & utere ubi oportet.

Ozimum citratum. i. mellissa. Quiddam uero de nouo scribens intitulus lumen Apothecariorū in hac expositione deceptus est: nam putauit quod ozimum citratum sit mellissa, quod non est uerisimile. Nā quando reperitur ozimum garyophyllatum, non intelligimus ozimum & garyophyllos, & quando reperitur ozimum carmeum, non intelligimus ozimum & ciminum carmeum. Sic ergo cōpositor dicit ozimum citratum, debemus uidere omnes species ozimi: & illud quod odorem habet citri intelligere & est propriè mellissa, quod si fricaueris folia ipsius odorem citri habebit. Præterea uide Simo. Ianuæ, qui inquit: Turungen arab. dicit citraria: est autem mellissa aut ozimum citratum: quod habet odorem citri: & sic uolunt moderni doctores. Præterea uide quod Auic. etiam habet ozimum citratum. quod idem est.

Beca

Beem ibi debet scribi per duplex e. ad differentiam ben periculum. e. q. id. o. s. o. uocat balanum reperficum, & non est cataplasma, ut exponit Lumen Apothecariorum. Num Mesf. docet facere oleum de ben, & de cherua. i. cata pacia. Hic etiam dicit q. beem cordiale debet scribi per. h. quod apud probos medicos non reperitur. Mesf. dicit: Si autem hanc confectioem amaram facere uolueris, oportet q. accipiantur supra scripte species diamusci dulcis omnes & supra ipsas admiscantur res quas inferius ipse describit & tunc appellatur diamuscum amarum, quod etiam in usu non recipit.

Aloes optimi abluti. i. loti cum aqua endiuiz. Infra in hiera Gal. o. ten. melius. optimum uero aloes secundum Mesf. est succocrinum. i. de illa provincia.

Castoreum sunt testiculi animalis quod uocatur castor ut dicit Sera. & hoc est satis notum. Ipsius testiculi uero uocantur gendebubuli: & ab aliquibus, iumdebuduli: de qua infra in confectioe Anacardina melius ostendam, si Deus uoluerit.

APPENDIX.

Hanc etiam perbelle Aetarius ad uerbum expressit. DIAMOSCHV, hoc est e. moscho. inscriptam, iis sane uerbis.

Zedoaria,	Cardamomi,
Zarnabi,	sing. drach. quatuor.
Vniouum candidorum,	Auri, dimidium tar.
Succini,	Scolimia climati,
Coralli,	Castori,
sin. drachmæ octo.	Piperis longi,
* Setæ crudæ,	Zingiberis,
Hermodac.	sing. scitellus, sesquialter.
Candidi,	Puluis,
Punicet,	Moschi, sesquidrachma.
Spicæ,	
Folij,	

Ea tunduntur, crerantur cum despumato melle fermentesunt. Moschus cum stillatio rosarum liquore supra calidi cineres soluantur, ut cum reliquis in unitatem coeat.

VIII.

TESTICVLORVM VVLPIs,

id est Satyrion.

Be. Satyrionum qui absconditur a patre suo, lib. i. & terantur, & coquantur cum lacte ouino dulci in quantitate sufficienti super prunas, quousque decocti sint, & sic consumptum lac, & tunc funde super eos olei Amygdalarum dulcium unc. iiii. & agitur sic conterendo cum ligno, & postea funde super totum syrupum, cuius descriptio talis est.

Succi Buglossæ cocti, & despumati, lib. ii.

Succi pomorum dulcium, lib. i.

Zucchari boni albi, lib. iiii.

Misceantur agitando cum prædictis, usq. dū fiat eius comperens decoctio: & deponatur ab igne, & projiciatur super ea.

Cinnamomi subtilis,	Santali cicini,
& electi. 3. v.	Dragaganti,
Been,	Gummi arabici.
Albi,	* Alfelcengemisch,
Rubei. 3. ii.	Cubebæ,
Ligni aloes. 3. iiii.	Macis. ana. 3. i. s.
Croci,	

Confecte, & pone in uase uitreo.

COMMENTA. MANLII.

Mesue habet confectioem testiculorum uulpis: & dicit q. est satyrion inferius uero habet unam aliam descriptioem: & hoc dicitur q. est diastyrion: & est illa qua nos uti maxime ostendit infra.

Satyrion. i. testiculi uulpis qui absconduntur a patre suo. Hæc radix dicta testiculus uulpis. Dixerit quidam sapientes, uir comederit partem maiorem eius generat masculos: & si minorem comedit, generat feminam: quod experimentum reperitur apud Nicet. Floren. in lib. 6. in ca. de sterilitate. ubi sic ait, ex autoritate Kaldæ. dicens: Cū uolueris generare masculos. Be. duos testiculos apri asfo & co-

mede: & eodē die coeas. Nam generabis, si nō fuerit defectus ex parte mulieris: si solum uinum testiculum comedieris, nascitur infans cum uno testiculo.

Lac apud Auic. in. 2. cañ ex tribus compositum est substantijs, aqueitate, & caliditate, & butyrositate: & in uacino quidem multiplicatur butyrositas. Lac uero camellari partui ueniunt minus habet butyrositatis, & caliditatis. & est subtile ualde: & lac asinarum etiam minus existens butyrosus est subtile: caprarū uero lac est tēperatū, & lac ouinum est grossum ualde: & istud est illud q. ingreditur hac descriptione: & lac uaccinū ē pinguius & grossius. Equarū uero lac est sicut lac camellarū partui uicinarum subtile: aquosum uero melius ē lac in aliebre oibus spissius lactis. Istud. in cap. de elcis ait: Lac a Græco sermo ē deriuatum est pro candore: Græci enim albam glaucō dicūt.

Buglossa uero est herba nota omnibus, hæc apud Græcos uocatur buglossa: apud nos uero lingua bouis, unde Macer: Lingua bouis Græco sermone buglossa uocatur. Dragantum uero est gummi dictum apud Dioscor. dragacan. & quanto albius tanto melius est. Circa instans in cap. de draganto ait. Est autem eligendum dragantum, quod non est obscurum, sed clarum, nihil terrenum admixtū. Et nota q. album in frigidis medicinis, subrustum & citrinū in calidis debet poni: per decē annos potest seruari. Gummi Arabicū secundum Sera. ex autoritate Dioscor. est gummi quod reperitur super arbore acaciæ, sicut alie species gummarum: & quando simpliciter reperitur gummi de gummi arabico intelligitur: & secundum Circa instans potest seruari diu in multa efficacia.

IX.

TESTICVLORVM VVLPIs.

hoc est Dyastyrion.

Be. Secacul albi, mundi, & elixati in aqua Cicerum, quorū electa fuerit prima aqua, lib. i. s.

Testiculo uero uulpis. unc. viii.

Radici raphani. unc. iiii.

Lupulani. unc. ii.

Terantur, & infundantur super ea lactis uaccini, aut ouini quātitas, quæ superemineat radicibus duobus digitis: olei sesamini, & butyri uaccini recētis, an. vi. iiii. Et coquantur cum facilitate usque ad spissitudinem: & si adhuc radices nō bene decoctæ sint, fundantur super eas ex lacte, & oleo, & butyro iam dictis, usque dum perfecte decoctæ sint. Et post hæc, funde super hoc totum mellis boni, & despumati. lib. vi.

Succi cepe humidæ, lib. i. s.

Decoque omnia simul usque ad perfectam decoctionem: tunc enim deponē ab igne, & proice super ea puluerem, cuius permistio hæc est.

Be. Caudarum stinci cum renibus, & semine. 3. viii.

Seminis erucæ,

Zingiberis,

Been,

Albi,

Rubei,

Lingux aui,

Seminis nasturtij,

Et conficiantur cum eis, ultimum uero ponantur in Medicamine.

Pinearum mundatarum, lib. i. s.

Fisticorum mundatarum, unc. x.

Cerebellorum passerum, unc. ii.

Conficiantur omnia bene, & aromatizentur cum. 3. i. boni moschi, & usui referua.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio est illa qua nos utimur, & maxime secūdam istam descriptionem. Nico. in suo Antidotario habet unam aliam descriptionem, sed non fit apud nos: tamen si facere uolueris descriptionem suam intra inuenies.

Secacul secundū modernos est sigillum sanctæ Mariæ, & non irignis, ut quidam herbolarij uolunt quare Sera. pio aliud cap. facit de secaca, aliud de irigno. Præterea uide Sera. in. 7. ca. de cōditis, q. n. inquit q. secacul est radix,

* Mexæ
necant.

* id est fo-
minis ou-
ni garyo-
phyliati.

* alias sē
napiæ.

SECTIO PRIMA

ficet zingiber, & afortatur ex India: & sic ex eo in gibba dum est recens. Et sic est secundum veritatem, quod fecit secundum modernos habet radicem similem zingiberi: & hæc est quæ nostris idiomate vulgariter zongello vocat in partibus nostris, & in multa quæritate reperitur.

Cicer secundum Sera. ex auctoritate Gal. cicerum tria sunt generalia: enim alba & nigra, & est alia species, quæ dicitur cherfenne: & ciceræ minuta quæ dicitur cherfenne sunt alba, & asmilantur orobo, & nigra nominantur chubus & c. Plin. inquit, arietinum ciceris genus, quæ capit arietis asmilat, quod ceteris magis diureticum creditur, est & agreste, & est erraticum, & colubinum quod aliqui uenerunt dixerunt candidum, rostratum, lenne, arietinum minus.

Cicer eraticum apud Dioscor. vocatur a quibusdam persillis. Gal. in sexto simplici. inquit: Cicera sunt species leguminum.

Testiculij uulpi sunt satyrium. Diosc. de satyrio tria ca. facit, sub litera satyrium: & aliud cap. facit de orchis, & ibi ponit duas species, quæ etiam inter species satyrii sunt: & mirab. & hic apud Auic. vocantur testiculij canis: alij cynosforchini. canis testiculij. Idem. in cap. de herbis aromaticis siue communibus ait: Satyrium dicta a satyris propter incen dium libidinis, quam uulgius stincum uocat, uenerè enim suscitatur eadem: & orchis, quæ radix eius in modum testiculorum fit, quod Græci cynosforchini narrant: in pratis apud nos reperitur. Circa instans: Satyrium herba est, cuius radix ului medicinz competit dum est recens.

Raphanus. s. radix domesticæ. Circa instans ait: Raphanus est herba cuius radix simili nomine appellatur, & per an nū feruatur: radix cõpetit ului medicinz. Quidam de nouo scribens intulit Lumen Apothecariorum: super istam conscriptionem exponit, quæ per radices raphani intelligunt radices syluestres, sed nõ est uera expositio: quia regula est apud nobiles apothecarios: quæ quando reperitur raphani simpliciter, de usuali semper intelligitur.

Luf planum. i. dragõrea. Mel. in ca. de luf, dicit quæ est fer pentaria, & est planta quæ dicitur collum draconis: & ex ea alia est plana habens folia, alia crispata: & melior totius pars plantæ est radix. Circa instans ait: Serpentina, colubri na, dragõrea, crocodilla idem est, herba est cuius radix ma xime ului medicinz cõpetit: & dicitur serpentina, quia ma culas habet distinctas, sicut serpēs: uel quia uenenum ser pentis fugat. Infra in hiera Hermetis ostendam aliam spe ciem quæ uocatur iarus.

Sisamum est semen ex quo oleum sisaminum exprimitur: sicut infra in distinctione de oleis.

Butyrum uacuum recens. Auic. in a. canon. duo capit. facit, unum de butyro, quod est calidum, & humidum in primo, & eius gradus in humiditate est altior. aliud ca. facit quod dicit butyrum nõ recens: & dicit quod facit operationem buty ri crudi, & est fortius in maturacione. Hoc est satis notum.

Cepæ humidæ. i. recentis. Auic. in a. can. dicit: Bulbus. i. cepe quod comeditur. Idem. in ca. de oleis dicit: Cepe uocatur, quia non aliud est nisi totum caput. Nicolaus loco eius habet semen bulbi, quod idem est.

Stincus cum renibus & semine. i. ab umbilico, secundum Dioscor. est quoddam animal quod in India inuenitur quia drupes, & simile lacertæ, sed multo maius & longius & ue nenosius. Hoc apud Auic. uocatur guaril, & in Aegypto ca pitur. Circa instans ait: Stinci pisces sunt qui in fluminibus & maxime in aquis dulcibus iuxta Sagittam inueniuntur, & lacertis asmilantur: per hyemem potest feruari. Infra in electuario de stinco, de ipso iterum ostendam.

Eruca secundum Marthæ. Syl. sunt duæ species domesticæ & syluestres, & ambæ sunt omnibus notæ. Domestica minoris est efficacia quæ syluestres: ului medicinz compe tunt semina sicut folia. Secundum uero Circa instans est cõ trarium: quia eruca domestica maioris est efficacia: & syluest. minoris ului medicinz competunt semina. Plin. ait. in ca. de eruca. Est ex ea domestica & syluestres, misce in con dimentis in quibus carnes & pisces intinguntur: tanta sua uitas est ut Græci euzomon appellauerint.

Lingua auis est semen fraxini. Christophorus de honestis super isto passu exponit, quod lingua auis est semen deß agrestis: quod ignoro. Auic. in a. can. de ipsa loquitur, etiam in tertio in fen. xx. in ca. de medicinis singularibus ad cõ tum: inter medullas cõputat. Antio. Guainerius in cap. 24. de pulueribus, & conscriptionibus aliis ab intra fumendis, quæ adaugent ad coitum: & ibi ponit ad literam quæ lingua auis est semen fraxini. Præterea uide Nicol. qui habet præ dictam descriptionem diasatyrion: & ibi habet linguam, aus, & in suis synonymis exponit quod semen fraxini, & sic est sibi modernis: sed secundum Circa instans lingua auis est herba satis communis quæ folia habet parua & acuta, similia linguæ auis uiridis, multæ est efficacia: & per id credo quod ignorauit eam.

Nasturtium. Secundum Circa instans quando reperitur Nasturtium simpliciter, semen debet poni: & eius semen per quinque annos feruatur. Hoc apud Diosc. cardamus uocat: & species sunt duæ. s. domesticus & agrestis: dome sticus uere est ille cardamus qui intelligit. Syluestris uero est senatio, siue crisonis, ut dicit Matth. Sylua. in cap. de cardamo. Infra in dianasturtio de ipso melius ostendam.

Napus secundum Idem. in cap. de oleis similitudine rapæ uocatus, nisi quæ habet radices & folia latiora. Exi stant quidam quod Diosc. uocat ipsum buimas. i. napitium. Napi uero semen ului medicinz competit, & sunt semina nauoni domesticæ.

Sparagus secundum Circa instans fructus eius & semine medicinz competit. Diosc. dicit: Vocatur asparagus aspra tilis quam multi Myracantham, aut myon appellant. Gale. in lib. de cibis: Vocatur omnis summitas plantæ dum est in teneritate sua, asparagus.

Fistici. pistachia. Diosc. ca. de pistachiis dicit: In Syria nascuntur similia strobilibus. i. seminibus pini sunt, & ueniunt de Damasco. Circa instans: Pistachia sunt fructus qui ultra mare nascuntur, & sunt similes pineis, & interior substantia ponitur in medicinis.

APPENDIX.

Laudatissime insuper Actuarij DIASATYRIUM, id est, e Satyris Antidotum, in hunc sane modum prescribit.

Testium satyrii uiridis, Seminis Anisi,
Dauci Syluestris, Eruce, singulorum, 3. v.
Satiui, Cinnamomi,
Nucis Indicæ, Scinci,
Pistachiorum, Bulbi feminais,
Nucis Pineæ repurgatæ, sing. scilicet, & sequisque
singulorum 3. xii.
Zingiberis, Moschi, scilicet, 3. vii.
Garyophyllorum, Mellis sequislibram.

Radices Satyrij Dauci tam satyri quam agrestis priuatiu, & seorsum tridentur: colleatque in unum: molliuscule igni paululum feruescent Rursum Pistachia, & Pineæ tustæ, & adiectæ rigantur, dum aliquam crassitudinem conceperint: deinde sublato ab igne uase, tustæ & cribratæ species adduntur: postremo Molecum cum exiguo liquore, quem stillantes Rosæ remiserunt, infertur.

X.

DE GALANGA.

R. Galangæ,	Calamentis fisci,	
Ligni aloes, ana. 3. vi.	Menthæ siccæ,	
Garyophyllorum,	1 Heil,	* Idem lib. gultic.
Macis,	Spicæ,	
* Cheilum, ana. 3. ii.		
Zingiberis,	Apii,	talias Cat damoni maioris.
Macropiperis,	Feniculi,	
Piperis albi,	Carui,	
Cinnamomi,	Ausi, ana. 3. i.	
ana. 3. i. s.	Calami aromatici, 3. i. s.	
	Zuechari tabazet. unc. x.	* Idem lib. bi.

Mellis desumptum, quantum sufficit.

COMMENTA. MANLI.

Galanga sibi Serap. ex auctoritate Isaac eben, amarum est uena in grossitudine calisæ lignæ: & cortex eius est rubeus, & interior eius est puluerulentus, & defertur ex

Sim. Auie. de ipsa duo cap. facit unum de casuruda, ex auctoritate Mesaugue, & inquit qd est galanga aliud ca. facit de galanga. Secundum Circa instans, galanga per quinque annos seruatur in multa efficacia.

Hæc cōfectio reperitur etiam apud Auic. 5. can. in tracta. 6. de uentre inferiore debilitatis stomachi: sed nō est eadem. Ista uero est illa qua nos utimur. Io. Anglicus in ca. de passionibus stomachi: Et ponatur manus calida super stomachum diuissil conforat & calefacit stomachum calore naturalideinde detur diagalaga. Vnde dicit uerificator: Conforat stomachum diagalaga meū &c. ibi describit suam descriptionem: sed non est similis.

Macropiper. i. piper longum siue darufel, ut dicitur Arabes: Album uero piper appellatur leucopiper. Infra in diatrion piper pipereon declarabo.

Calamentum siccum. i. uisale siccum, & non uiride, quia maiorem efficaciam habet in medicina, ut dicit etiam Circa instans.

Apium scilicet semen apij domestici. Circa instans inquit: Cum autem inuenitur in receptis medicinarum apium simpliciter, semē apponendum est Macer ait: Est apium dictum qd apex hoc ferre solebat, Victoris ueteris fieret dum more triumphus &c.

Carui scilicet semen ipsius. Diosc. dicit: Careos semen est omnib. notū. Est & alia species carui que dicitur agrestis: & ista a modernis cordumenum dicitur. Circa instans: Carui herba est, & semen appellatur in transmarinis partibus Siciliæ, & in multa quantitate reperitur per quinque annos in magna efficacia potest seruari.

DIARRHODON COMMUNE.

R. Foliorum rosarum rubea- Cardamomi, rum. 3. xxx. Portulacæ, Troch. Diarrhodons. 3. i. (Lactucæ, e Spodio, Scariolæ, Liguiritiæ, ana. 3. iiii. Seminum Cucumeris, Garyophyllorum, Cucurbitæ, Gallicæ moschatæ, Melonis, Trium fantalorum, ana. 3. iiii. Citrulli, Spodij, Margaritarum albarum, Croci, Alfelencemisch, Malliches, Eboris rafuræ, Ligni aloes, ana. 3. ii. Dragaganthi, Alari, Gummi arab. ana. 3. i. Spicæ Indæ, Camphoræ. 3. i. s. Macis, Moschi. 3. s.

Conficet cum syrupo de rosis, & aqua rosarum.

COMMENTA. MANLI.

Diarrhodon dicitur a rosis, quas recipit magis quam de alijs speciebus. Nicolaus habet unā aliam descriptionem que nominatur diarrhodon Abbatis: & ambz apud nos sunt in usu infra apparebit descriptio Nicolai. Descriptio troch. de spodio apparebit infra in tractatu de troch.

Liguiritia est quidam radix dulcis saporis, nota omnibus.

Spodium secundum Auicem. est radix cannarum adusta: moderni uero pro spodio utuntur ebore combusto, siue osibus elephantis combustis.

Trium fantalorum, scilicet albi, rubei, & citrini, qui sunt noti.

Portulaca. semen ipsius. Circa instans dicit. Portulaca uiridis multa est efficacia: exsiccata uero non tantæ.

Lactuca. semen illud. in cap. de oleib. dicit: Lactuca dicta est ab abundantia lactis exuberantis, seu quod lac multiplicat illis, quæ lactare puellis.

Scariola secundum Sera. ex auctoritate Diosc. in ca. de endiuia, habet duas species, una est ex ea domestica & lca riola. Secūdo uero Simonē Ianuen. est uelut lactuca agrestis. Secundum Circa instans: Endiuia est scariola. Moderius uero distinguunt species scariolæ, endiuia, & cichoreæ per alia nomina: tamen una pro alia potest poni in bladis autem scariola reperitur.

Semina cōia maiora frigida sunt quatuor ad numerum & sunt proprie melonis, citrulli, cucumeris, & cucurbitæ. Conficet cum syrupo de rosis. i. quod secundum istam confectionem debet heri cū syrupo rosa. cuius descriptio hæc est. Bz. aquæ infusionis rosarum ex quo fit syrupus ros. sicut docet Mes. in distinctione de syrups, & clarificetur zuccharum cum prædicta infusione & aqua rosæ. & simul coquantur usq; ad consumptionem aquæ: & quando prædictus syrupus fuerit bene coctus, secundum artem addatur species, & fiat confectio in morcellis, uel in forma liquidæ sed in morcellis apud nos fit.

XII.

AROMATICVM ROSATVM.

R. Foliorum rosarum rubearum. 3. i. s. Ligni aloes, Galangæ, Macis, Zingiberis, Garyophyllorum, Nucis moschatæ, Troch. Diarrhodon, ana. 3. ii. s. Gallicæ moschatæ, Heil, ana. drach. iiii. Spicæ, ana. 3. i. Liguiritiæ mundæ. 3. viii. Rosati, Sympliciorum Corticis citri, ana. quantum sufficit.

Sunt qui aromatizant Moschi scrup. dimidio.

COMMENTA. MANLI.

Aromaticum rosatum secundum istam descriptionem apud Apothecarios non fit: nec apud medicos est in usu. Simplicia uero quæ ipsum ingrediuntur, sunt declarata supra.

XIII.

ROSATVM GABRIELIS.

R. Foliorum rosarum rubearum. 3. xv. Liguiritiæ rase mundæ. 3. vii. s. Ligni aloes boni, ana. 3. iiii. Sandalorum mahazari, ana. 3. iiii. Cinnamomi boni, subtilis & electi. 3. v. s. Macis, Nucis moschatæ, Garyophyllorum, Cardamomi, ana. 3. i. s. Galangæ, ana. 3. i. s. Spicæ, 3. ii. s. Gurræ arabicæ, Mochi. 3. i. Dragaganti, ana. 3. ii. s. 3. ii. Ambre. 3. ii. Syrupi rosarum, & syrupi corticis citri, ana. quantum sufficit.

COMMENTA. MANLI.

Istud aromaticum est famosum & ociosum apud medicos, & sic generaliter secundum istam descriptionem fit: simplicia uero quæ in ipsum ingrediuntur, quæ nō sunt de clara, declarabo.

Sandali mahazari secundum modernos sunt sandali citrini. Et sic reperitur apud Gal. in suis secretis, in c. de icteria causæ calide, in quadam confectione, quæ sic ait: Mahazari. i. sandali citrini, & sic intelligimus nos. Partes duas alterius. i. duas partes alceris drachmæ & sunt. 3. ii.

Aromaticum rosatum minus secundum istam descriptionem non est in usu, simplicia uero declarata sunt. Dicitur autem minus respectu præcedentis, quia pauciora simplicia ingrediuntur compositionem ipsius.

Aromaticum muscatum. Nec istud aromaticum apud nos fit muscatum autem dicitur a musco in bona quantitate ingrediente.

XIII.

AROMATICVM GARYOPHYLLATVM

R. Garyophyllorum. 3. vii. Macis, Spicæ Indæ, Zedoariæ, Piperis longi, Galangæ, Heil, ana. 3. i. Santali mahazari, Rosarum rubearum. 3. iiii. Trochiscorum Diarrhodon, Liguiritiæ, Cinnamomi, Gallicæ moschatæ, ana. 3. ii. Ligni aloes, 1. Folia.

* idest citrini.

SECTION PRIMA

Cububz, ana. 3. ii. Ambre 3. i. Moschi 3. s.
 Syrupi de citro quantum sufficit, & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Istud aromaticum secundū istam descriptionem apud nos non est multum in usu: tamen apud apothecarios reperitur, & dicitur Aromaticum a rosīs: Garyophyllorum a garyophyllis qui ingrediuntur.

Garyophyllus, siue caryophyllus, Arabes dicunt hani phel: & sic reperitur apud Serapionem in cap. de garyophyllo: & ibi dicitur ex autoritate Gale, quod nomen suum in Græco est foliū nucis &c. Secundū circa istas: Garyophyllus per sex annos seruat in multa efficacia. Aui. in 2. cano. dicit: Quod garyophyllus est sicut sambucus, sed est nigrius: & masculus est sicut nucleus oliuæ & longior & uenientis nigredinis, & est fructus arboris in insula Indię & gluten ipsius existit in uirtute glutinis albotini. cerebini hinc. Electio ille qui est melior est similis nucleo sicco, suauis odoris, & acuti: sed moderni opinantur quod ille garyophyllus, qui est in magnitudine nuclei oliuæ, non habeat multam efficaciam in medicina: & hoc est notū omnibus. Et prædicti garyophylli uocant a multis antophali. i. garyophylli magni. Illi uero quibus nos utimur noti sunt omnibus, & sunt minores satis quā nucleum oliuæ. Sunt quidā flores in aliquibus partibus Italij, qui garyophylli uocantur, eo quod odore garyophylli spirant: quorum alij sunt coloris albi, alij uero rubei. Et isti apud Lombardos tepere riuntur in multa quantitate, & maxime apud nobiles uiros. De nomine suo apud auctores non reperi, sed uidi depictum in li. qui dicitur Manfredus de monte imperiali, & ipse uocat tunici. Reperitur et herba quæ uocatur filius ante patrem siue oculus Christi, siue oculus consulis, ut uolunt herbarici, forma uero ipsius reperitur apud Mathæi Siluaticum, & hæc herba apud nos nascitur in pratibus.

XV.

AROM. NARDINVM.

R. Spicz Indz 3. ii. Anisi, Rosarum 3. iiiii. Corticum citri, Liquiritiz 3. ii. s. Trochiscorum Diarrhodoni, Galliz sebellenz, ana 3. i. & 3. i. Pinearum purgatarum, Cubebz, Amygdalarum mundatarum, Ligni aloes, ana 3. v. Gummi Arabici, Cinnamomi, Dragaganti, ana 3. ii. Moschi 3. s.

Syrupi rosati quantum sufficit, & conficiatur.

COMMENTA. MANLI.

Istud aromaticum nardinum idest de spica nardi, apud nos non multum in usu est. simplicia uero quæ ipsum ingrediuntur, quædam sunt declarata, quædam non.

Galliz sebellenz siue sebellen, est quædam cōfectio quæ fit in trochiscis, quorum descriptionē describit ipse Mef. in distinctione de trochiscis, ut infra apparebit.

Pineæ purgatz. s. a cortibus suis. Aui. in 2. cano. facit cap. de geloum, & ibi dicit quod est granum pini maioris, & est melioris nutrimenti quā nux. Postea uero aliud cap. facit de grano pini, & dicit quod est minus silitico. Et aliud cap. facit de pino, hoc est satis notum: melius tamē ostendam infra in loch de pino, si Deus uoluerit.

Amygdalæ purgatz. i. a cortibus suis Mef. hēr amygdalarū, & nō dicit si sint dulces uel amare. Pet. de Crescētis in proprio cap. de amygdalis ait: Amygdala est arbor satis nota, & ē quæda diuersitas in eius fructu: quoniam quædam faciunt fructus dulces, quæda amaro: dulces uero hominibus in cibum competunt, amare quæ sunt calidiores magis competunt uisui medicinz. Et sic est regula quod amygdala dulcis est conuenientior in escis, & amara in medicina.

XVI.

DIACYMINON BONVM.

R. Cimini pridiæ in aceto infusi, & exccicati. 3. x. Zingiberis, Garyophyllorum, Cinnamomi, ana 3. iiiii. Ligni aloes,

Macis, ana 3. ii. s. Galangæ, Piperis longi,

Cardamomi, ana 3. ii. Moschi 3. s. Mellis despumati q. s.

COMMENTA. MANLI.

Diacyminū dicitur a cymino quod recepit. Maxe descriptio reperitur in multis aliis locis secundū diuersos auctores. Mef. habet diacyminum bonum: & inferius habet una alia de qua infra. Et Aui. in 2. s. can. habet multas descriptiones, sed illa descriptio quam ipse uocat diacyminum Gale. quod facit ad uentositates frigidas, est dialpoliticon sicut infra ostendam. Nic. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem, sed non est similis huic. In partibus nostris generaliter secundū descriptionem. Melue, si tamē etiam secundū descriptionem Nicolai si facere uolueris, infra apparebit descriptio sua.

Cyminum. i. cyminum uisale quod notum est. Circa instans inquit: Cyminum semen est herba in multa quantitate nascens nō sophisticatur, propter eius copiam, & per quinque annos seruat. Aui. in 2. can. dicit: Cymini aliud est Carmenū, & aliud Persici, & aliud Eniū, & aliud Nabatiū carmenū uero est nigri coloris, & Persicum est citrini coloris, & persicum est fortius: nabatiū uero est illud quod inuenitur in aliis locis. Serap. cap. de cymino ex autoritate Gale. dicit quod ex eo est domesticum & agreste: domesticū uero est illud quod magis administratur, & sic est. Infundatur ergo cyminum per diem in aceto: postea ad falem desicceetur siue ad umbram, & cum alitis tetatur.

Mel secundum Aui. est rosæ occultus cadens super flores & super reliqua, quod colligunt apes. Secundum intentionem Mef. diacyminum debet fieri cum melle: sed hodie in partibus nostris generaliter fit cum zucharo, & fit in morcellis seu in bolis.

XVII.

DIANISON.

R. Anisi 3. xx.

Liquiritiz, Maltis, ana 3. viii. Carui, Macis, Galangæ, Zingiberis, Foeniculi, Cinnamomi, ana 3. v. Trium piperum.

* Calamenti.

Pyrethri, Calsiz, ana 3. ii. Hell, Garyophyllorum, Cubebz, Croci, Spicz, ana 3. i. s. Zuccari 3. ii.

Mellis despumati quantum sufficit. COMMENTA. MANLI.

Dianisum dicitur ab aniso, quod ingreditur magis quā de aliis speciebus: apud nos est multum in usu, & ualet mirabiliter contra grossas uentositates.

Anisum est semen omnibus notum. Gal. in 6. de simplicibus inquit de aniso: Id quod ualet ex hac planta est semen eius. Circa ista uis ait: Anisum. i. cyminum dulce semen in telligitur in medicinia.

Pyrethrum est radix fati nota Hoc apud Aui. uocatur darzon. Circa instans ait: Pyrethrum herba est satis communis, cuius radix in medicinis ponitur, cum inuenitur in hyeme colligitur: radix eius per quinque annos feratur. Est autem eligendum quod est acutum, solidum, & nō perforatum, & cum frangitur non poluerizatur.

XVIII.

DIAMBRA.

R. Cinnamomi, Doronici, Garyophyllorum, Macis, Nucis moschatz, Folij, Galangæ, ana 3. iiiii. Spicz,

Cardamo. Maioris, Minoris, an 3. ii. Zingiberis 3. i. s. Santalorum citrinorum, Ligni aloes, Piperis longi, ana 3. ii. Ambrai, Moschi 3. s.

Confice cum syrupo rosato, & aqua rosata.

COMMENTA. MANLI.

Diambra dicitur ab ambra ingrediēte in bona quantitate.

tare. Hoc apud medicos est multū in usu, & maxime ista descriptio Mesue. Aui. in. 5. can. inquit. Electuariū alchei sim dictū electuariū ambræ: & hoc electuariū uis fuerit reges Græciæ: non fit secundum Aui. sic.

Cardamomū maius est heil, ut dicit Serap. & generaliter ponimus loco eius grana paradisi siue meilegetam, & pro cardamomo minori ponimus uisuale.

Ambra secundum Serap. ex autoritate Dios. nascitur in mari, & generatur in eo sicut generat species fungorū in terra: & quādo mare turbat eicit a fundo eius lapides magnos, cum eis eicit frusta ambræ: & plurimū quod ex ea egreditur ex mari in terris Zig. Aui. in. 2. can. ait: ambra secundum quod existimo est manatio fontis in mari: illud uero quod dicit quod est de spuma maris aut stercore animalis maris longinquū est electio: melior est griffa fortis asclethi. deinde uaria, post eā citrina: & deterior est nigra mala: multo uis assumitur ex uentre piscis qui eā comedit & moritur. Circa instantiā ait: ambra. i. sperma ceti. i. balenz: non est ergo gummi, ut quidam dicūt. nec est spuma, nec est stercore animalis, nec est iecur piscis, ut quidam mercatores dicunt. Auer. in. 5. col. ait: ambra est una ex speciebus camphoræ quæ oditur in fontibus maris, & natat super aquam maris. Cōfice cū syrupo rosato & aqua Ro. Vide supra in confectioe diarrhodon descriptione communi, ubi ostensum fuit de hoc.

APPENDIX.

Habet actuariū suū quoq; non illaudatum D I A M A R, ex ambræ nimirum celebre Antidotum, hac accipiens.

Ambaris, } fing. sexulam, tar ununa
Agallochi, }
Molchi, tar ununi, istimma, id est sexulam.
Garyophylli, }
Nuculæ moschatæ, } fing. drachmam.
Maceris, }
Galangæ, }
Cinnamomi, * duellam.

Zulapii Rosarum quantum esse satis uidebitur.

XIX.

DE CINNAMOMO.

¶ Cinnamomi, subtilis, & Cardamomi, Maioris,
electi, 3. xv. electi, 3. xv. Minoris,
¶ Darfeni, Zingiberis,
Cymini, Macis,
Enulæ, ana. 3. iiii. Nucis moschatæ,
Galangæ, 3. vii. Ligni aloes, ana. 3. iiii.
Garyophyllorum, Croci, 3. i.
Piperis longi, Zucchari tabarzet, 5. v.

Confice cum melle despumato & quandoq; ponitur in eo duplum ponderis medicinarum de zucharo puluerizato sine melle: & accipitur sicut suffus, & alii addūt in eo Molchi 3. ii. & puluerizetur cum eo.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio de cinnamomo apud nos non est ualde in usum: tamen simplicia quæ ipsam ingrediuntur declarabo. Aui. in. 5. can. habet unā aliam descriptionem, sed nō est eadem. Cinnamomi subtilis & electi. i. fini. Serap. in cap. de cinnamomo ex autoritate Dios. ponit multas species secundum diuersitatem locorum. Aui. dicit: Cinnamomū notum est, & eius quidē species est una bona ad aliquantulum declinās nigredinem. Electio, melius est illud quod est boni odoris & acutum habet saporem sine mordicatio ne, & color eius est purus & non cōmixtus. Aliud cap. facit de chersæ cinnamomi, & ibi dicit quod est de cinnamomo, & dicit quod est alterius generis, & ipsum quidem est durum ficut cinnamomum: de ipso tamen est quoddam quod non durefit. Sera. uero de chersæ loquitur in ca. de cinnamomo: & uult quod sit genus cinnamomi. Quando autem reperitur cinnamomum simpliciter, de fino intelligitur. Auer. in. 5. col. ait: Cannella uel cinnamomum id est recapal ereca.

Darfeni. i. cinnamomū grossum dictum scauzum. Non

est autem folium, ut exponunt synonyma Nicolai. Vide Sera. in cap. de cinnamomo, ubi ponit darfeni. i. cinnamomum. Præerea uide apud Auer. in. 5. coll. ubi inquit: Darfeni. i. canella subtilis, dulcis, aromatica. In hac oportet uidere, si darfeni sit cinnamomū finum aut non. secundum uero Mesuem est cinnamomū grossum: quia ipse Mef. in ista cōfectione habet cinnamomū subtilis & electi, & darfeni. i. cinnami, uel cinnamomi grossi: & sic credo. q. a. Aui. in. 5. can. in prædicta cōfectione habet cinnamomi, & lo co darfeni habet cinnami, quod idem est. Præerea uide apud Auenzoar in suo antidotario, in electuario quod cōfert stomacho, & adiuuat digestionem, & est delectabile ad comedendum. qui inquit: Darfeni & est cinnamomum nigrum & odoriferū ualde. Sapientes dixerunt quod quādo reperitur in cōfectionibus cinnamomum, intelligitur de fino: & per darfeni de grosso.

Heil est cardamomum maius: sed Lumen obscurū scripsit prædictam cōfectionem, & exposuit quod heil est cardamomum minus: quod falsum est quia ipsemet in aromatico garyophylli dicit: Heil. i. cardamomum maius. ergo sibi ipsi contradicit. Ser. sicut ostensum est supra, uult quod he il sit cardamomum maius: & sic secundum ueritatem.

XX.

DE GRANIS MYRTI.

R. Baccharum Myrti tenuissime tritarum, lb. i.
Myrabolanorum, in aqua cy. Nigrorum,
donitum, & uino odorife. Emblicorū, } ana. 3. vii.
ro semel seruæfactorum, Bellericorū,
Seminum, acetō horis Anisi,
xxiii. maceratorum Cymini, } ana. 3. v.
& siccatorum, Apii.

Additur id totum electuario de Aromaticis, ac conficitur cum Miua aromatica, & datur cum syrupo decoctionis cydoniorum.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de granis Myrti. i. de semine myrtillorum, apud nos nō est in usu, nec apud alios simplicia uero quæ ipsam ingrediuntur, declarata sunt.

APPENDIX.

Alteram ex Serapione in tract. vii. cap. xx. nequaquam deteriorem, uel forsan meliorem, in hunc modum perpulchre habemus.

R. Granorum myrti ex siccis bonis, Minam. i.

Mirabola - Nigrorum, Cardumeni,
norum, Bellericorum, * Charabæ,
¶ Talisafar, ana. 3. xx. Spice,
Garyophyllorum, Casisæ lignæ,
Cymini, * Cardamomi,
Calami aromatici, Colti, ana. 3. vi.
Heil, Nucis mulchatæ,
Carpobalsami, ana. 3. xii. Seminis apii,
Piperis, Ameos, ana. 3. v.
Zingiberis, ana. 3. x. Folii,
Amomi, ana. 3. iiii.
Malticis.

Terantur & cribellentur, & conficiantur cum melle de spumato.

XXI.

DIACALAMENTVM, GALENI.

R. Calamintbes, Flualialis,
Montanæ, } ana. 3. iij.
Seseleos,
Petroselini, ana. 3. vi.
Zingiberis, 3. iij.
Seminis apii, } ana. 3. iij.
Extrematatum talisafæ,
Chesim, 3. vi.
Piperis nigri, * 3. i. s.

Mellis despumati, quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Diacalamenthum dicitur a calamētho ingrediente: hos

* al. carui

† hoc est
Macis.
* i. mino-
ris.

† i. Thy-
mi.

* al. 3. iij.

* i. scrop.
vili.

† i. Cinn-
momi
uili.

DIATRION PIPEREON.

R. Trium Piperum, ana. aur. v.

Zingiberis,

Anisi,

* Hæcæ, ana. aur. ii.

Spicæ,

Amomi, ana. aur. j.

Cassia,

Seminis apii,

† Seseleos,

Afari,

Enulæ siccæ, ana. aur. v.

Conface cum melle desupumato, & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Diatrion piperon dicitur a tribus generibus piperû, quæ ingrediuntur compositionem ipsius: & sunt proprie nigrum, album, & longum: hoc apud nos, non est valde in usu. Auic. in. 5. can. habet unam descriptionem quæ videtur quasi esse eadem cû ista. Mesues habet hæfecæ, Auic. uero non. Aui. habet xylobalsam, Mesues non, in reliquis concordantur in simplicibus eius.

Piper secundum Serap. ex authoritate Diosco. est arbutum in regionibus Indię nascens, habet semen quod in ortu suo est longû simile fæscolis, & elógatur in forma sua, & est macropiper. i. piper longum, & intra ipsum sunt grana parua similia geggers, quæ quando maturant fit piper & hoc quia separatur & fit sicut racemus in quo sunt grana parua primo: & sunt grana piperis: & quando colligitur perfecte maturum, est piper nigrum: sed quando colligitur ante maturationem est piper album. Nã color eius est albus & non recipit in colore suo nigredinem ante maturationem. Eligédum autem est ex pipere nigro illud quod est notum, in quo non est res similis grano furfuris & pleum. Sed ex pipere albo, melius est illud quod non est rugosum, album & graue. Sed ex pipere longo eligendum est illud quod quando frangitur apparet densum, habens grana quæ sunt intra ipsum ad inuicem iuncta: & sapor eius est acutus mordicans linguam.

APPENDIX.

Quarto Tuendæ Sanitatis, δία τριῶν πειπεῶν, tribus nempe Pyperum generibus Antidotum, Galenus ijs uerbis tam belle explicat, ut viam apertam inspicere, necdã Arabum, uerum Græcorum compositiones egeamus. Cum in primis Antidotum non admodû medicamentorum, ex uarijs confectum desideret, sicuti a plerisque Medicorum cõponitur, mixturæ cuiusdam ritu, quam κατὰ φύσιν uocant, aut Apria mirificis istis Coquis cõdit. Adeo ut non minus negotium sit medicis, aut illis qui apparent, quæ imponuntur medicamenta probe in ipsa mixtione digerere ac perficere: Ammi, Sefeli, Libistifici, & alia id genus. cruda enim minime; mutata, ijs qui ea sumperint lógo tempore durare in uentre intelliguntur. Hæc igitur subtrahenda Medicamento sunt: præterq̃ hæc Helenium, & Nardi spicæ: uero nõnulli componit etiam Cassia. Expedit autem præparatum hoc Medicamentum ad manum simplex præsertim habere idq̃ tripliciter.

SIMPLICISSIMUM.

Trium piperum, ana. 3. L.

Anisi,

Thymi,

Zingiberis,

} ana. 3. viii.

SIMPLICIUS, seu magis simplex.

Trium Piperum, ana. 3. L.

Anisi,

Thymi,

} ana. 3. viii.

Aufertur enim zingiber,

SIMPLEX uel compositum magis.

Trium Piperum, ana. 3. L.

Anisi,

Thymi,

Zingiberis,

} ana. 3. xvi.

Debet autem si haberi pōt, Anisum Cretense esse: Thymum aut Atticû, aut plane ex ipsis locis, & siccis, cuius quicquid lignosum est circuncis, coma ipsa una cum floribus iniicietur. Est uero & Piper quod lógum quiddam est, integrum, minime; foratum: aque uero & zingiberis

naia

apud nos est multum in usu, & maximè secundum istam descriptionem. Mes. dicit, quod est descriptio. Gale. sed Christophorus de honestis dicit, quod non ponitur sicut Gal. sed non uidit bene Galenum, quia est uerum, q̃ Gale. composuit & ipse describit ipsum in. 4. de regimine sani. & uidet eoucordare in isto, & maximè in simplicibus, in pondere uero non. Nicolaus uero in suo antidota. habet unam descriptionem, sed non fit nec concordat cum ista: tamen si facere uolueris secundum Nicolaum, infra apparebit descriptio sua. Auic. in. 5. can. de electis habet: Diacalamentum fluiale, & electuarium de calametho, quod est quasi idem cum isto.

Calamenthi fluialis idest aquatici. Quidã herbolarius dicebat, q̃ calamentum fluiale est mentha aquatica uel mentha aquetris, quod non est. Vide Nicolaum qui exponit, quod calamentum fluiale est menthaltrum, & similiter ait Petrus de crescentiis, sicut ostendit in cap. de calamentho montano. Et sic uolunt sapientes, quod calamethum fluiale fit uerum menthaltrum.

Calamentum montanû idest nepita siue gattaria. Quidam dicunt q̃ est origanû, alij pulegium, quod non est: uerum q̃ est quidam ponunt unû pro alio: quia in omnibus istis plantis non curant Arabes ponere in medicinis unã pro alia: quia ipsi iudicant habere eandem uirtutem. Sed uerû calamentum montanum idest nepita siue herba quã rusticis nostri gattaria uel gatam uocant herbam: & di. i. tur herba gata, quia cati libenter ipsam comedunt. Diosco. in cap. de calamentho habet diacalamentum, & loco calamenthi montani habet nepitam. Nicolaus dicit, q̃ calamentum montanum idest nepita. Item Macer in cap. de calamentho inquit: Herbam quã nemtam uulgaris sæpe uocamus. hanc medici Græco calamentum nomine dicunt. Item uidit Pet. de crescen. in cap. de calametho ubi sic ait: Calamentum aliud est aquaticum idest fluiale, & uocatur menthaltrum: & aliud est montanum & uocatur nepita. & sic est secundum ueritatem.

Seseleos uel siler uel platocyminum, est siler montanû. Petrus de crescentiis dicit: Siler montanû, siue seseleos, & sic est.

Alhæfecæ siue hæcæ est Thymus: & extremitates utroque ipsius sunt notæ, quid sint.

APPENDIX.

Mesues, ac Nicolaus non longe Galenum, suo Diacalamentho, sequuntur, ac etiam Actuarius, quanquam pondera non nihil immutent, ut ex Galeni descriptione clarius fiet, quam ex Quarto Tuendæ Valetudinis ad uerbum Mesues perbelle fumpsit. Hæc sane accipiens,

Calaminthes,
Pulegii,
Petrofelinii,
Seseleos,
Seminis apii,
Caciminum. Thymi,
Lybistici. 3. xvi.
Piperis. 3. xlviii.

} cuiusq̃ * uncias duas.

} utriusq̃. 3. iiiii.

At piper quiddè grauis esto ponderis, quod Capra ad piper uocant: Sefeli uero Malsiensie, Petrofelinum Macedonicum, huiusq̃ præcipue Altreoticum, Calaminthe, & Pulegium potissimû ex Creta: sin minus, certe ex regionibus æditiis, & siccis. Simili ratione & Thymum: atq̃ herbarum quidem quicquid lignosum, durumq̃ est, id abieciendum. Accipienda uero ad medicamentum folia, atq̃ ex his maximè quæ subtilissima sunt, atque in summis herbis nata. Ad hæc flores, & quæ cum his sunt una minutissimas, tenuissimæque festucas. Hæc omnia simul tundenda, cribrandaque sunt tenui cribro: quippe eiusmodi medicamenta in totum corporis habitum maximè digeruntur, ueluti & diuerso crassiora in uentre hærent, ut quæ angusta uenarum oscula, subire nequeant. Miscendum uero his ita preparatis est mel optimum, curiose desupumatum. Licet & sine admixto melle siccum medicamentum reponeere.

* Alii legunt. 3. p. 2. y. 1. 18. hoc est. 3. xii. Hæc nescio unde corrigent, ne di cõsequi nãtes, cum maximè Basim cæteris inferiori reddant.

nam ambo perforari facile solent. Quinetiam non solum perforatur, sed & uerū illud, quod ex Barbaris affertur, Piper esto. Hic namque quod adulteratur duplex est, alterū quod in Alexandria maximè conficitur, alterum quod herba cuiusdā germē est. Quā uero maximè rōe internoscis, quod adulterinum est, possit, ipse docebo. Principio. n. experiedum gustu est diligenter; æstimandum, an Piperis qualitates seruet. Postea in aquā mittendum: nam quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur, illico liquat, ac soluitur. Si ergo tū Piperis ei qualitas plane inest, nec maceratur resolutum, sitque (ut dictum est,) minime foraminibus pertusum Piper, id longum idoneum iudicabis. Nigri uero nec exile, nec rugosum, nec crassi corticis esto. Sed ex eo quod ponderosum uocant, id quod cum maximum, tum plenissimum est. Itemque de Albo simili modo eligatur, quod maximum est; quod plenissimum. Deinde omnibus simul tuis, & per tenue cribrum transmissis. Mel optimū curiose desumpatum, admisceor. Sane id odorum, flauumque, præterea accerrimū, dulcissimumque fuerit, tū crassitudine nec plane crassū, nec liquidū, sed quæ ita cōtinuita est suam tuatur, ut si digitum in id dimiseris, post in sublimē attollas, quod Mellis ab eo destituit, longissima quali linea fibi cōtinuatum uideas. Coquitur hoc recte, aut super carbones, aut ligna omnino arida, quæ etiā ἀκάρτα Græci uocant. Præterea etiam Zingiber, quod ex Barbaris affertur acetō maceratum, est id uirētis herbæ radix, a collectū statim in acetum cōiecta. Hæc Galenus.

XXVII.

DIACIMINUM.

Rx. Cymini Carmini pridie in aceto macerati & exiccati, drach. xx.

Zingiberis, Ameos, 3. i. s.
* Alhalce, ana. 3. iiii. Foliorum rutæ siccorum,
Piperis, † Baurach rubel, †
Cinnamomi, ana. 3. iiii.

Conficue cum melle desumpato.

COMMENTA. MANLI.

Diacyminum dicitur a cymino, uidelicet a cymino carmeno quod intrat: sed Christophorus de honestis dicit: Diacyminum. i. diacinnamomum quod nō est. Superius est possum diacyminum bonum. i. diacyminum, quod fit de femine cymini usuali: hic uero habet diacyminum. i. de cymino carmeno: quia ipse Melles non habet aliud cymini nisi carmenum, sed hoc apud nos non est in usu. Cymini carmenum ēm Galenū in suis secretis medicinz, quod incipit sic, Herodi ad stomachū, exponitur, quod est fiseleos Serap. in ca. de cymino ex autoritate Ralis dicit, quod cymini carmenum est agreste. Aui. dicit quod est nigrum. Matte. Sylua. in ca. de cymino dicit quod carmenum est fiseleos. Et sic uolunt moderni: tamen ego nō nec assero: uerū unum pro alio ponitur quandoque.

Ameos. Dios. multi cyminum Aethiopicū dicit aut bafilicon: sed ameos alterius est naturæ. Est enim semen penes Aethiopicum cymino simile, sed minus: & est albidius, & quodammodo spissius, gustum habens similem origano. Ser. ex autoritate Gal. dicit, magis iuuatiuū quod est in eo, est semē eius: & in sapore eius, est amaritudo pauca & acuitas. hoc est notum.

Rutæ. f. domestica. Carina instās dicit, rutæ folia & semina competūt usui medicinz. Quā autem reperitur ruta sola, folia debent poni, et per annum feruantur. Secundum Dios. melior est ruta quæ nascitur circa cucumeres. Et secundū Aui. cū. est melior quæ nascitur apud arborem fici. Inuenitur autem alia species rutæ quæ uocatur pigamum, & una alia quæ uocatur harmel: de cuius forma ostendam in tractatu de pilulis.

Baurach rubeum. i. f. rubrum uel armenum, uel aphronitrum. i. spuma nitri, ut dicitur a Ser. de Baurach. Mel. in c. de baurach dicit: Aliud est minerale, aliud artificiale. Minerale, aliud Armenum, aliud Africanum, aliud Romanum: aliud Aegyptiū &c. Moderni apothecarij loco bau-

rach sunt qui ponunt fal panis rubrum: & sunt qui ponunt fal nitrum, quo utuntur bombardarij.

APPENDIX.

Suum nec incellebre, DIACYMINON Antidotum

Actuarij in hunc modum perpulchre habet.

Cumini, sextulæ quinquaginta i. 3. viii. & 3. viii.

Cinnamomi, Iris,

Spice, Cyperi,

Zingiberis, Cardamomi,

Piperis nigri, Rutæ,

Fructus balsami, Libylici,

singulorum sextulæ. x.

i. 3. xl. i. 3. xx.

Mellis anquum sufficit.

Ad hæc Gal. Paulus Aegineta, Actuarij haud proflus ab similem, tum uiribus, tum ingredientium historia, compositionem explicant, quāquam Inscriptio maxime distat, DIOSPOLITICVM, ac si Iouis ciuili foliatolum dixerimus, uocitatem. Verum Galeni descriptionem cæteris præferendam non abre censemus, cum plantioe abiq; controuersia omnes illam prædicant. At interim Galeni, in Sanitatis Tuendæ monumentis præferim. iamā audiamus, compositionem ex ponderibus ita modo eurijs, nedum in Quarto, uerumetiam in Sexto.

Prima, pro iis qui aluo sunt atstia.

Cumini, }
Piperis, } pari pondere.
Rutæ, }
Nitri, }

Secunda, pro iis qui aluo sunt soluta.

Cumini, }
Piperis, } pari pondere.
Rutæ, }
Nitri, dimidio.

Præsterit autem Cuminum esse quod uocat Aethiopi cum Nitrum uero Berenicarium, Piper postmodū uel lō gum, uel album. Macerabitur Cuminum in aceto maximè acridē in continuo id tunditur, aut etiam prius, modice friguit in uase fideili, quod coctum in camino, quam optimè sit, quæ enim exacte, penitus: cocta nō sunt, hæc luto sapotius, si fulginea sunt, & qualitatū suarum non nihil Medicamentis remittunt. Sunt uero & Rutæ folia modice siccata. Vt enim si plusculum siccetur, acris, amaraque redduntur, & supra quā par est calida. Si cū proflus nō siccet, excrementitium quendam humorem retinet, nondū ex toto concoctum cuius uitio statū diluere minus possunt. Quatuor his aliquando desumpatum mel additur ali quando nihil: sed sola siue melle reponunt, ac Pisanæ cre mori, & alijs quibus maximè conuenire uidetur, cibis ini ciuntur. Sumitur & per se medicamentum hoc, & ante, & post cibum. Porro ad eum usum optimum est, quod mel admixtū habet, quod utiq; curiose sit desumpatū. Id. n. flati maxime discedit. Sit autē oportet & mel optimū, si modo quod statum discedat, quodq; maximè discedat, futurū medicamentum est.

XXVIII.

DE CYTONIIS.

Rx. Carnium cytoniorum coctorum in uino Mellis boni, & desumpati. } an. i. iiii.

Decoq; cum facilitate, & postquam coctū fuerit, proice super ipsum.

Cinnamomi, Darfeni, 3. iiii.

Garyophyllorum, Zingiberis,

Cardamomi, Piperis, longi,

Galangæ, ana. 3. i.

Macies, ana. 3. iiii.

Et quandoq; inuitat necessitas, & coquantur cytonia in aceto ad causas calidas. Et quandoq; permiscetur eis, aceti tertia pars eorū, aut media. Et quādoq; permiscetur eis succus granatorum acetosorum, in medio ponderis eorū. Et quādoque succus citri in quarta parte ponderis eorū. Et quādoque fit sine speciebus. Et quādoq; cum speciebus prædictis. Et quādoq; cum puluere isto.

Lumi. 12.

B

SECTIO PRIMA

Spodii,
Berberi,
Semiinis acetosæ,
Trium sandalorum,
Rofarum rubearum

} partes æquales.

Et quædoque ponuntur alia, secundum intentiones Physicorum. Et quandoq; aromatizatur cum musco, aut camphora, aut utroq; Et quandoq; fit cum zucharo, & quandoq; cum melle.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de cytoniis boni. i. de caribus cytoniorum est in usu. Verum sunt ex hominibus qui faciunt eam cum speciebus & sine speciebus: & sunt qui faciunt eam cum zucharo: & sunt qui faciunt eam melle: sed cum zucharo est magis laudata: quia retinet mirabiliter fluxum ventris.

Ioan. autem Anglicus in ca. de passionibus stomachi inquit: sed nota quod dyacitonitem parum valet in materiis calidis, sed cum pipere & zingib. in materiis grossis & frigidis valet. Eius descriptio est hæc. R. Succu cytoniorum acetosorum uel aquosorum parum ponticum. lib. i. uel de substatia eorum eodem modo, mellis ad calefaciendum, zuchari ad refrigerandum. li. i. aceti fortis, & boni li. i. præparentur super ignem lentem & calidæ reponentur. Quod si uis fortius facere ad calefaciendum, ponat ibi zingiber & piper. Vnde apothecarii accipiunt cytonia, & scindunt per medium, & extrahunt grana & semina & arillos, & medullam eorum coquunt in aqua, & addunt succum, & pistant simul in modum electuarii: & tunc uocatur carocytoniorum, uel dyacitonitem purum, & cum speciebus calidis sic compositum: de quo dixit uersificator in his uersibus: Si uis me mitem, si uis dissoluere litem, Da dyacitonitem, da mihi frater idem: Nec multum plangam si iungas diagalangam.

XXV.

DE SEMINIBVS, uel Diaspermaton.

R.	Cimini,	} Aceto horis, xxiiii. maccratori, & scicatorum, } ana. 3. vi.
	Anisi,	
	Foeniculi,	
Seminum,	Cari,	
	Dauci,	
	Ameos,	
	Apii,	
	Amomi.	
Cinnamomi,	Cardamomi,	
Zingiberis,	Spicæ nardi,	
Macropiperis,	Garyophyllorum.	
Siseloos,	ana. 3. iiii.	
Galangæ, ana. 3. v.	Cheiffim, 3. iiii.	

Mellis despumati quantum sufficit.
Et quandoq; ponitur in eo zuchari duplum, pōderis omnium, & sic sicut suffus, & est sanum & expertum.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de seminibus. i. diaspermaton secundum Mat. Sylin litera diaspermatō: & dicit ipse qd est ex seminibus herbarum. Nicolaus Floren. in lib. 5. in tra. 4. in cap. de cōplexione stomachi nō pura in generali, inquit: Diaspermaton. i. electuariū de seminibus: quod describitur in antidotario Mes. & sic est, sed non est in usu. Infra apparebit uia alia descriptio quæ est ex autoritate Ras. Nicolaus habet diaspermaton, sed non est in usu.

APPENDIX.

Parum ab hoc differt, quod a Serapione describitur, plurimum uero quod. 2. can. Anicen. ponit, sicuti & quod Galenus, ac posteriores Græci *diacamparion* uocant. Verū Serapionis compositionem in antidotario cap. xx. non illam daram, iam describamus, quæ nempe accipit.

Carui,	Cardamomi minoris,
Anisi,	Garyophyllorum, ana. 3. ii.
Cimini,	Zingiberis,
* Heil,	Macropiperis, ana. 3. iiii.
Cinnamomi,	Zuchari tabarzeth,
Ameos,	aur. xj.
Sem. Apii, ana. 3. iiii.	

* i. Cardamomi maioris.

Terantur, & admixtrentur.

XXVI.

E SVCCO CYTONIORVM.

R. Succu Cytoniorum,	} ana. lib. iiii.
Mellis despumati,	
Aceti boni puri, lib. ii.	

Deinde coquantur cum facilitate, & continue auferatur spuma eius & spe, & cum mellis spissitudinem habuerit, puluerizentur super ipsum:

Piperis longi,	Garyophyllorum,
Zingiberis,	Ligni aloes, ana. 3. iiii.
Cinnamomi, ana. 3. i.	Moschi, 3. i.

Et quandoq; fit sine speciebus, & quandoq; cum speciebus aliis, sicut necessitas conducit: & quandoque fit cum zucharo, & quandoq; uariatur aliis modis.

COMMENTA. MANLII.

Ista cōfectio de cytoniis facta ex succo cytoniorum Pa-piz non fit, nec est in usu: sed apothecarii Mediolanenses faciunt ipsam: & illi medici utuntur ea.

Acetum apud Græcos dicitur oxos. Serap. ex autoritate Dioscoridi, qd acetum infrigidat & stypticat, & est bonum stomacho, & prouocat appetitum. Petrus de Crescens docet qualiter fit acetum, & de uirtute aceti.

XXVII.

DE POMIS.

R. Carnium pomorum dulcium, & redolentium, mundatorum, & incisum per frusta, lib. vi.
Zuchari albi boni, lib. v.
Aquæ rosatæ, lib. ii.
Ligni aloes, 3. v.
Sandali citrini, 3. iiii.
Garyophyllorum, 3. iiii.
Cinnamomi electi, 3. iiii. s.
Ambraz, 3. ii.
Moschi, 3. i.

Hoc etiam modo fit electuarium de pomis acetosis, & electuarium de pomis paruis, & aromaticis, & dulcibus.

COMMENTA. MANLII.

Electuariū de pomis non est in usu: tamen hic uolo ostēdere, quare dicitur pomum ex autoritate Isidori dicentis: Quia poma sunt dicta ab opimo. i. a copia seu ubertate Mes. habet carniū pomorū dulciū, quæ sunt dicta, poma paradisi siue parifana. & hoc pomum est magis laudatum, quam sint alia poma redolentia, & sic a uulgo uocantur.

XXVIII.

DE PERSICIS.

R. Carnium Persicorum mediocrium inter maturitatē, & acerbitatē, & mōdarorum a corticibus suis, 3.	} ana. li. iiii.
Succi Persicorum,	
Zuchari tabarzeth, lib. ii.	

Terant Persicæ, sint sicut medulla, & exerceas in eis decoctionē quæ syrupo, sicut diximus in cōfectione de Cytoneis: & cum coctum fuerit, puluerizentur super ipsum: Ligni aloes, 3. ii. Macis, ana. 3. iiii. Sandali citrini, 3. ii. Cubebæ, Moschi, 3. s.

Et quandoq; fit sine speciebus, & est sanum, & expertum.

COMMENTA. MANLII.

Electuariū de Persicis non est in usu. Persicum autē apud multos inter genera chrysolimorum est positum. Ifigdo. in ca. de propriis nominibus arborum habet capitulum de malo Persico, & aliud capitulum habet de Persico foliū In ca. uero de malo Persico ait: Malū Persicum cuius breue est quemadmodum uita cōcessa est: & tria genera dicuntur, scilicet duracemū, armeniacum, & Persicum. Duracemū nōcupatur, eo quod pomum eius in gustu acorē refert. In c. uero de Persico dicit Persicum uocatum quod eam arborē prius in Aegypto seuerint Persæ, a qua se oriūdos Ptolemæi ferebant.

Regium

XXXI.
REGIVM.

℞. Pincarum mundatarum, ʒ. viii.
Amygdalarum purgatarum, ʒ. vi.
Zuechari albi, lib. i. i.
Aque rosaceæ, lib. i. s.
Olei amygdalæ dulcis & recentis, ʒ. iiii.
Cinnamomi electi, ʒ. iiii. s.
Garyophylorum, ʒ. iiii.
Ambræ bonæ, ʒ. i.
Moschi, ʒ. s.

Et est bonum, & expertum: & confortat stomachū, cor,
pectus, & cerebrum.

COMMENTARIA MANLII.

Electuarium quo utuntur reges & prelati, nō est in usu.
Primus arbor picea ab acumine foliorum uocatur. Pinū
antiqui acutū nominabant: pinum autem alii pytin uocant
Græci piceum uocat, quam nos piceam dicimus: eo quod
desudet piceam. Nam in specie eius differre. In Germaniæ
autem insulis, huius arboris lachryma electrum gignit, ut
inquit Iulio. Sed miror quod Iulius dicat, quod lachryma huius
arboris electrum gignit: quod non credo: quia Simon Ia
nuen. dicit: Electrum succinum & charabe uel chachabre
quod idem sunt. Similiter dicit Mar. Syl. quod electrum succi
num, & charabe idem sunt. Istud electuarium uocat apud
quosdam, electuarium de piceis.

XXX.
DE FRUCTIBVS.

℞. Carnium Cytoniorum, & Pyrorum pōticorum, & ma-
lorum acidiorum, quorum singulorum elixatum fuerit in ace-
to uini fortis, in quo infusum fuerit Sumach, die ac nocte &
succei agreste, super cuius trituratione elaborandū est, usq;
ad consumptionem ultimū granorum, ana. lib. i.
Carnium fo. borum immaturorum, ʒ. v.
Zuechari, lib. iiii.

Coq; ad spissitudinem mellis, deinde ponet super ipsum
Succi Berberi, ʒ. ii.
Spodii, ʒ. ana. ʒ. i.
Seminis acetosæ, ʒ. ana. ʒ. i.

Repone postquam confectum est, in uase uitreo, & da a
ʒ. ii. usq; ad. iiii. cum aqua frigida & rob citri, aut ribes, aut
aliquo talium.

COMMEN. MANLII.

Electuarium de fructibus magnum nō est in usu. Pyrus
uocata quasi in ignis speciem formata. Nā hoc genus po-
mi ab amplo incipit & in angustum finit sicut ignis. Pyrus
arbor, fructus eius Pyra fuit. Iliodor.

Ponticus. s. sapor. Sera. in ca. de diuisione generali secū
dum saporē in uno ca. de styptico & pontico loquitur, &
ibi sic ait: Sapor stypticus est sapor ponticus & debilis: &
hūius. Ponticus & stypticus non differūt nisi in multa &
parua stypticitate. Ponticum etiam appellatur in quadam
insula ubi reperitur rheuponticum.

XXXI.

DE ACETOSIS GALENI.

℞. Xyloaloes,	Spodii,
Cubebæ, ana. ʒ. iiii.	Charabæ,
Rosæ,	Gummi arab.
Coralli rubei,	Tragaganthi, ana. ʒ. iiii.
Margaritarum albarum,	Boli Armeni, ʒ. i. s.
Saurai citrini,	Seminis acetosæ, ʒ. iiii.
Faufel, ana. ʒ. iiii.	Portulacæ,
Berberi,	Seminis, Buglossæ,
	ana. ʒ. iiii. s.
Cucumeris,	Camphoræ, ʒ. i.
Cucurbitæ,	Confec cum rob. citri,
Citrulli,	Melonis, ana. ʒ. iiii.
	aut rob agrestis.

COMMENTA. MANLII.

Confectio alia Gal. non est in usu: sed illa simplicia quę
ingrediuntur, & quę declarata non sunt, hic declarabo.

Faufel fm Ser. est auellana indica, & dicitur quod est sicut
dactylus, & arbor ipsius non est in terris Arabum. Aui. in
1. can. de ipsa duo cap. facit: unum de faufel: & ibi dicit, quod
uirtus eius est propinqua uirtuti sandali: aliud ca. facit de
roba: & ibi dicit, quod est auellana indica, quod dominus Raf. uel
le etiam uidetur in lib. 2. apho. in cura fluxus. Faufel uero
fm Simonem Ianuen. est fructus similis nuci mulcæ: nisi
quia pars prima eius est aliquantulum peracutior: & alia est
plana, ita quod possit stare erectus sicut calculus qui i ludō di-
cit pedes: in ceteris interius & extra nuci moschata similis
est, sine odore, & sapore. Nascitur inclusus in quadā lan-
guine simili folliculo ferici. Multo citius desecit inter alias spe-
cies aromatics & simplicia: maxime cum cinnamomo, &
æquiparatur sandali in frigiditate.

Bolus Armenus siue lutum armenum, est quædam terra
rubea quę desecatur ab Armenia. Circa instans dicit: Bolus
est quadā uena terrę quę præcipue in Armenia reperitur
unde dicitur bolus Armenus. Nō sophisticatur, ppter mul-
tam eius copiam: per centum annos potest seruari, & hoc
est satis notum.

Acetosia secundum Auic. alia est domestica & alia sylue.
stis Dios. uero uocat eam lapathium, & illius sunt qua-
tuor genera: unum quod māducatur, & illud est illud quo
nos utimur & est alterū quod dicitur oxilapathium, id est
acutum lapathium. Hoc est satis notum, quod semen intel-
ligitur, alia legas ibi.

Rob est succus cuiusdam fructus coctus ad spissitudinē
ut seruari possit. Rob uero citri descriptio nō reperitur a
Mef. sed fit sicut rob de berberis. Quādo autem reperitur
rob absolute, ponitur faufel uel carenum.

XXXII.

DE PRVNIS.

℞. Carnium Prunorum nigrorum, oblongorum, & * Mu-
zorum accedentium ad dulcedinem, & elixorum in aqua,
in qua prius portulacæ elixata fuerit, lib. ii.
Zuechari albi, lib. ii. s.
Aque uiolarum, lib. i.

Decoq; cum facilitate, usq; ad spissitudinem, & recon-
de in uase uitreo.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de prunis nō est in usu, infra in antidotario
Nicolai apparebit diaprunis uel diamafeno, & secundū
illam descriptionem est & potest fieri solutium, & non di-
cur posica ostendam.

Pruna secundum Mef. dantur ad alterandum & ad soluē-
dum, & sunt ex eis alba, aut citrina, aut rubea. Damafena
& Armena sunt fortiora omnibus aliis. Iliud. dicit: Coqui-
mella quā Latini a colore prunū uocat alii a multitudine
enixi fructus nixam appellat, cuius generis Damafena di-
cta sunt a Damasco oppido: unde prius aportata sunt, cui-
us solum pomum stomacho mederi probatur.

Muzum proprie dicitur, cuius sapor est compositus ex
dulcedine & acetositate. Et hoc dicitur Arabice muz.

XXXIII.

DE SORBIS.

℞. Carnium sorborum immaturorum, uicinorum maturi-
tati & elixatorum, in aqua, in qua rosā prius decoctæ fue-
rint, & cortices granatorum, lib. iiii.
Mellis, aut zuechari, lib. ii. s.

Coquatur usq; ad spissitudinem, & reconde in uase.

COMMEN. MANLII.

Electuarium de sorbis. s. de carnibus ipsius nō est in usu.
Sorba fm Ser. ex autoritate Dio. est arbor spinosa, folia
eius sunt similia nanarico: & habet fructum paruum simile
malis paruis, bonū ad comedendum est: & unumquodq;
pomum eius habet tria ossa, & ideo nominatur triconium
& eius expō est trium granatorum. Sera. allegat de forma
sorbe fm Dios. quod apud ipsum Dios. in cap. de sorba nō
reperitur: ita tēd uide cap. de mespila apud Dio. cum c. de
sorba apud Ser. uidetur quod in omnibus idem sunt. Aui.
in 1. can. in cap. de zarur, uidetur loqui de sorba: quamuis
Sera. uult quod zarur sit sorba uel species eius.

Lumi. Ma.

* Dulcaci-
da uocantur.

XXXIII.

THERIACA DIATESSARON.

R. gentianæ,
Baccarum lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ,

} ana. partes æqua-
les.

Conficue cum melle desumpato, & fiat confectio.
COMMENT. MANLI.

Theriaca uero secundū quosdam dicitur a tyro serpente. Alii dicunt quod non: quia reperitur multæ aliz theriacæ quas non ingreditur tyros, ut est in theriaca de terra sigillata, & ita q̄ fit ex quatuor rebus. Potest bene aliquis dicere q̄ theriaca dicitur a tyron Græce, q̄ est uenenū quia omnes tyriacæ sunt medicinz quæ ualent cōtra uenē nū ut lapis bezaar. Ioā. Anglicus in ca. de uenenis, inquit: Si igitur illa medicina faciat euadere ex uenenis optima est, & de illis quæ faciunt euadere ex uenenis habentium uenena quæ non cognoscuntur per experimentum est theriaca, quæ componitur ex carne tyri quæ est uenosa: tamen uenenum suum est humiditas expulsa per uerberatio nē eius, unde uersus: Allia, nux, ruta pura, raphanus & theriaca: Hæc sunt antidota contra mortale uenenum. Dr̄ autem theriaca diateassarō n. i. de quatuor rebus. Nam thessaron Græce, id est de quatuor rebus: descriptio ipsius, reperit in multis aliis locis. Nico. in suo antidotario habet unā descriptionem, sed in ipsa quidam philosophi postea addiderunt alias res, sicut sc̄enugræcum, nigellam, zedoariū, diptamum &c. Aut. in. 5. can. habet unam descriptionem quæ eadem est cum ista Melse Ras. etiam in. 3. Alman. in cap. de morbis scorpionum, habet unam descriptionem quæ est eadem cum ista: sed apud nos non est in usu.

Gentiana secundum Serap. est basilica. Idem dicit Papias. Basilica etiam aliquando inuenitur pro serpentaria. Auicē. in cap. de gentiana dicit quod non nominatur gentiana: nisi quia primus qui eam agnouit fuit Gentinus rex: & ipsa quidem crescit in montibus altis, & sic credo: quia reperitur in multis confectioibus gentiana Romana, ut habet Auicē. in prædicta theriaca. Illa est proprie gentiana quæ reperta fuit a Gentino rege Romanorū, radix ipsius competit usui medicinz.

Baccæ lauri, siue granum lauri. Circa instans dicit: Lauri folia & semina usui medicinz competunt. Infra apparet electuarium de baccis lauri, & ibi melius ostendam, si Deus uoluerit.

XXXV.

TRYPHERA Saracenica magna.

Myrobalanorum,	Chebulorum,	Garyophyllorum,	Indorum,	Been Albi,
Emblenco.	Bellericorum,	Rubei,	Zingiberis, ana. 3. ii.	Nucis moschatæ,
Citrinorum,	ana. 3. v.	Sesami excocti,	Macies, ana. 3. iiii.	Dulcium,
Cinnamomi,	Trium piperum,	Secacul,	Folii,	Spicæ,
Cardamomi,	Maiores,	Minoris,	Cassia,	Seitaragi Indi,
Cyperi,	Apii,	Origani,	Pellicis, ana. 3. i. s.	

Fruxentur Myrobalani cum butyro uaccino, & cætera species cum oleo amygdalino, & conficue cum melle quod sufficit. Addunt aliqui Turbith. 3. v. Moschi, gra. xv.

COMMENT. MANLI.

Tryphera Græce est dicta delicata: saracenica, quia a Saracenis inuenta fuit. Nicola. in suo antidotario habet unā descriptionem: & dicitur tryphera, quia hominem inuenē reddit. Saracenica uero, quia a saracenis fuit inuenta. Descri-

ptio Nicolai non concordat cum ista Melse. nec fit secundū ipsum scilicet Nicolaum.

Chebuli alio nōie myrobalani chebuli uocatur. Melse. de ipsis loquitur de tribus generibus in uno ca. & sunt: ppric citrini, chebuli, & indi: & laudat chebulos ut sint grossi & q̄to grossiores tāto meliores, & sint lubnigri declinantes ad rubedinē, & sint graues in pōdere citē lubmeris: ista aqua: & sint habentes spissitudinem corticis suorum. >

Indi. f. myrobalani dicti nigri, ut dicit Serap. ca. de myrobalanis. Melseus laudat nigros ut sint grossi & graues & cauentes obsibus: quanto aut̄ ab his elongat̄ur proprietatibus, tanto a bonitate remoti. Auicē. dicit: Nigri indi sunt illi qui ultimi sunt in maturitate, & sint pinguiore.

Bellerici myrobalani sunt ex medicinis benedictis, ut dicit Melseus, & meliores sint grossi & spissi, ponderosi & densi cortice.

Emblisci myrobalani fm Mesuem sunt ex medicis confortantibus stomachum, cor, hepar, & uiscera: & meliores ex eis sunt habetes fibra grossa, & densa, & graui: & quā minus crescent in obsibus, & plus in carne rari quoq; non habent spiritum. Melse. ibi docet modū faciendi sc̄embla: Inunde emblicos in lacte dulci, & mutetur super eo lac mane & sero: & hoc per triduum, & exiceantur in uentō & in umbra, & recondantur. Ser. in ca. de emblicis inquit: Medici nomināt emblicos firemblicos: & hæc ideo quod quando infunduntur in lacte in terra in qua nascuntur, nō minantur fireblengi, & ipsi ponuntur in lacte sicut dixi.

Citrinos myrobalanos fm Melse. laudauerunt sapientes in colore, ut sint citrini multæ citrinis declinātes ad uiriditatem, & sint pondere graues & densi: & ut in cōtractis suis inueniat̄ sicut gumolitas, & ut sint grossi: & ut cortex eorū sit spissus densa compta & parua. Similiter ait Auicē.

Secacul. sigillum sanctæ Mariæ: & alio nomine, a uulgo dicitur zonegeto, ut dictum fuit.

Spica nardi siue persica. Melse. habet in ista descriptione spicā nardi, & infra iterum habet spicā q̄ igno. Verū dixerūt quidam sapientes quod per unū spicā in 3. eligitur spica nardi: & per aliud spica celtica: & ambæ debet pon.

Seitaragi aut̄ indi est genus erucæ. Auicē. in. 2. can. ag. dei taragi ille qui est indus & frusta ligna parua subtiia, & cortices sicut garyophyllineq; p̄ id agnouit qd̄ fit. Gal. in. 7. simpliciū notat lepidium: & ibi dicit q̄ est genus erucæ, & sic est. Quid aut̄ sit cōter ignoratur: etiam Dio. uocat lepidium. & qui mihi non credit quod lepidū sit seitaragi indi legat ca. de lepidio apud Diosc. ca. de seitarago apud Sera. & uidebit quod idem est. Simon uero Iauuē. in. c. de hiberida cū haderibit de forma hiberidos, q̄ est uerū seitaragi in fine cap. ipse inquit. Hæc ut quā nalturtium agre te noiamus. in. c. uero de ibederidos p̄. seitaragi inquit: ex autoritate Pauli ibederidos herbe usui quam & lepidium. Alii uero agriocardum. i. nalturtium agrete appe lant. In cap. de seitaragi iterum dicit ex autoritate Pauli quod in c. de sciatia, ibideridos inquit: quem lapidium alii agriocardum appellant: quidem uocat ipsum capsum in dam. Tu uero uide certitudinem huius plantæ quod uerū seitaragi secundum Paulum est agriocardum agrete: & agriocardum agrete est nalturtium aquaticū, & nalturtium aquaticū fm Circa instans est senation. Et senation fm Dio. est illa herba quam Lombardi uulgo crisonum uocāt: & sic sine dubio seitaragi est species nalturtii: quia Ser. in suo cap. dicit ex autoritate Gale. Virtus eius & sapor & odor sunt similia uirtuti saporis & odori nalturtii: & sic lo co seitaragi indi potest ponere semen nalturtii, q̄ est species eius, & infra in dianalturtio de ipso aliqd ostendam.

Sifamus. s. semē ex quo oleo sifaminū exprimit: tunc anti quo nō reperiebāt istud semē in partib. nostris: sed hodie aliqui detulerūt ad nos: & hodie reperit in multa quantitate, & siculi appellāt illud gioreclia, de modo ex cortice di docet liber qui d̄ bulchafim in tra. 2. cuius modus est iste. De sifamo & illud purga a terra quæ est in eo & alijs lupulitibus, & pone in uale sc̄illi cū aqua frigida, & dimitte per noctē, & in mane cola, & dimitte sicari parū ab humiditate

humiditate aquæ & pone in pecia lini forti, & liga os & percutte sifamum ab omni parte eius donec excorietur totum & protice super ipsum aquam frigidam & misce bene. Nam cum uidebis corticem eius natare super faciem aquæ protice cum aqua, & fiat ita quousque nihil remaneat ex cortice: deinde sicca illud ab aqua & seruetur.

Origanum periculum non reperitur ab autoribus, quare ita appelletur. Moderni uero per origanum accipiunt: quidam herbam, quam Lëbardi uulgo cornabobium uocant. Circa instans inquit: Origanum. i. gola exiccatis folijs cū floribus abiectis stipitibus in medicina debet poni: per animum feruatur, singulis annis renouetur. Ser. in c. de origano describit multis species illius, & ponitur diptamus inter species origani.

XXXVI.

TRYPHERA MOSCHATA Alcanzi.

R.	Chebulorum,	Seminis Bauicæ,
Myrobalanorum,	Nigrorum,	Rosarum,
	Embloricorum,	Nucis moschatæ,
	Bellericorum,	Garyophyllorum,
Piperis,		Cinnamomi, ana. 3. i. s.
Macro piperis,		Macis,
Zingiberis,		Heil,
Cyperis,		Galangæ,
Caisis Indæ,		Ligni aloes crudi,
Spicæ, ana. 3. v.		Mofchi, ana. 3. i.
Seminis,	Anethi,	Granorum Nasturtii,
	Porri, ana. 3. ii.	3. x.

Conifice cum melle despumato, Et quandoque ponuntur in ea scoriz ferri nutritæ, 3. ii.

COMMENTA. MANLI.

Tryphera. i. delicata: muscata dicitur, quia recipit muscū apud nos uidelicet, in Papiā non est in usu: sed in Mediola non utuntur ipsa multum.

Anethum secundum Circa instans, quando simpliciter ponitur, semen intelligitur. Hoc semen est fatis notū. De forma ipsius plantæ non reperitur ab autoribus: sed folia habet sic ut abrotanum, uel fœniculus: hausta similis fœniculo: & capitellum simile fœniculo: semen uero est minus & in hortis reperitur.

Porrum fm Sera. est ex eo domesticum, & est hyspanū: & est ex eo nabati, & est montanum, & est porrum uineæ. Auidicit aliud est sceum, & aliud est nabathū, & aliud est quod dicitur porrum sylestre: & est illud quod est inter porrum & alium quod est melius in medicina quam in cibo: sed nabathum magis ingreditur in curationibus quā sceum: semen ipsius intelligitur.

Bauicæ. i. pastinacæ, de semine intelligitur infra apparebit bauicæ conditæ, & ibi ostendat melius. Auerr. in 5. col. uocat ipsam halgaræ.

XXXVII.

TRYPHERA GALENI.

R.	Myrobalanorum omnium,	Piperis,	Nigri,
	ana. 3. x.	Piperis,	Longi,
	Zingiberis,	Caisis, ana. 3. iiii.	
	Masticis,	Nucis moschatæ,	
	Cinnamomi,	Macis,	
	Garyophyllorum, ana.	Cardamomi Maioris,	
	3. vii.	Minoris,	
	Galangæ,	Calami aromatici,	
	Marathri,	Ligni aloes, ana. 3. ii.	
	Apii,	Tuderis, Albi,	
	Ameos,	† Alulufumen,	
	Spicæ,	Cyperis, ana. 3. iiii. s.	
	Alari,	Ambraz, 3. i.	
	Crocis, ana. 3. iiii.	Mofchi, 3. i.	
	Costi,		

Friceantur myrobalani cum oleo amygdalarum dulciū, & cōfice omnia cum melle despumato. Et Gal. quidē quādoque addidit scoriā ferri nutritā in aceto uinis, secundum mensuram medicinarum omnium, & quandoque secundum medietatem earum.

COMMENTA. MANLI.

Hæc descriptio istius tryphæ apud nos non est in usu: sed simplicia quæ ipsam ingrediuntur declarabo, si De' uoluerit.

Marathrum. i. semē fœniculi, de quo Macer: Fœniculū medici calidum uocant; secundo, Dicitur esse gradū, marathrum Græcus uocat illud Auer. in 5. col. dicit: Alrimég, idest fœniculum.

Ameos est fenum notum oībus. Gal. in 6. simpliciū inquit: Enochai. ameos magis inuatiū ex hac plāta est semē eius. Nota quod meo tempore uidi multos herbatos uēdere ameos apothecariis indoctis pro apio, & generaliter ultra Padum apud ciuitatem Papiensem utuntur in cōiuijs folijs ameos pro folijs apii: quod erroneū est.

Tuderī fm Aui. ex autoritate Diof. est herba habēs folia similia pralsio, & radicem quadratā: & eius radix mensuram habet mediū cubiti, & habet caput in quo, sunt semina lōga nigra: & est hæc uisita. Tuderī sylestres uero semen est rotundum. Aui. a. can. declarat formā tuderī ex autoritate Diof. sed nō reperit sub illo noīe: quia a Diof. uocatur horminon, & Latini emolū uel aurigalis siue reicalis; & reperitur ex eis duples, unus cū flore rubeo & alter cum flore albo. Ambæ apud nos nascūtur in tectis ac parietibus, & iuxta hortos abundanter inueniuntur.

Alulufumen siue fulfumen est radix piperis secundum Sera. in ca. de radice piperis. Aui. in 2. can. air. Fulfumē est radix piperis. Idem in synonymis quæ sunt in fine quinti can. dicit: Fulfumen. i. radix piperis non lignum eius, & sic est: & loco eius administratur piper nigrum.

XXXVIII.

TRYPHERA Minor Phenonis.

R.	Chebulorum,	Perfici,
	Indorum,	Olibani,
Myrobalanorum,	Bellericorum,	Ameos,
	Embloricorum,	Zingiberis,
	Nucis moscha. ana. 3. v.	* Charnuzith,
	Nasturtii,	Spicæ,
	Alari,	Squinantii,
	Origanis,	Cyperis, ana. 3. iiii.

Scoriz ferri nutritæ in aceto dieb. quinq; & assatæ, 3. xx.

Myrobalani assentur cum butyro uaccino, & inuoluatur cætera cum oleo amygdalarum dulcium, & aromatizetur cum Mofchi. 3. i. & cōfice cum melle despumato, & da post sex menses.

COMMEN. MANLI.

Hæc descriptio istius cōfectionis apud nostros medicos est multū in usu: ualeat mirabiliter ad corruptionē, & exuberationem menstruorum & hæmorrhoidarum.

Carmezith autem fm Serap. est fructus tamarisci. Nam ipse Sera. in ca. de tamarisco, inquit, ex autoritate Diof. Tamariscus est arbor erecta, quæ nascitur in aquis, & habet fructum qui assimilat floribus, & est similis in flexibilitate sua uincæ. Et est in Babylonia, & in Sceni, tamariscus domestica quæ nominatur carmezith, & sic est. Auid. in 2. can. dicit: Carmezith est fructus tamarisci. Et quidem uocat nucem tamarisci, & idem est. Auer. in 5. colligit ait: Alcharfar, idest tamariscus.

Ferreū fm Aui. habet tres spēs. s. feneburucam & lieréchē & suluder. Aliud c. facit de scoria, & ibi dicit, q̄ fortioris exiccationis est scoria ferri. Idē ait: Sarfari. ferrū lfid. in c. de lignariis inquit: Clauī autē dicti quasi chalybi, quia ex chalybe sunt. i. ferro. Chalybs. n. ferrum est. Sera. ex autoritate Diof. dicit: Tubel ferri, est squamma ferri seu batitura. Nutritur autem scoria ferri per quinq; dies in aceto fortissimo, omni die mutando acetū. Post hoc proicitur super lamiam ferreā ignitam & torrefactā: deinde puluerizetur subtiliter & referuetur & utetur ubi oportet.

XXXIX.

TRIPHERA Minor descriptione cognita.

R.	Chebulorum,	} ana. partes æquales.
	Indorum,	
Myrobalanorum,	Bellericorum,	
	Embloricum,	

Lumi. Ma. B 3

* al. boea
vel, ut alij
fantasi.
T. i. radix
piperis.

SECTIO PRIMA

Inuoluatur in butyro uaccino, & friganur, & conficiatur cum melle emblicorum, & aromatizentur cum moscho.

Addunt alii,

Cyperii,

Olibani,

Alari,

Seminis Apii,

Nasturtii,

Scoriz ferri nutritz, partes tres.

COMMENTA. MANLII.

Tryphera minor descriptione cognita non est in usu, si plia quæ ipsa ingrediuntur declarata sunt.

XL.

DIACURCVMA MAGNA.

R. Croci,

Alari,

Petroselini,

Dauci,

Anisi,

* i. Rheubarbari.

Seminis apii, ana. 3. iiii.

* Rauedfeni,

Meu,

Spicz, ana. 3. vi.

Costi,

Myrrhæ,

Calsiz,

Squinanti,

Carpobalsami,

Rubez tinctorum,

Succi Abinthii,

Eupatorii,

Olei balsami, ana. 3. ii.

Calami aromatici,

Cinnamomi, ana. 3. i.s.

Scolopendriz,

Succi liquiritiz,

Scordeon, ana. 3. ii.s.

Dragaganti. 3. i.

Confice cum melle despumato, & fiat.

COMMENTA. MANLII.

Diacurcuma autem dicitur a dia, quod est confectio, Curcuma dicitur, quia in colore sit sicut curcuma, & est species chelidoniæ. Non autem dicitur diacurcuma a radice curcumæ, sed dicitur diacurcuma a croco quod recipit ibi in bona quantitate, & in colore ipsius fit citrina: sicut ipsa radix quæ dicitur curcuma. Sed melius esset quod diceremus diacrocuma a croco quem recipit, ut ait Saladinus. Christophorus uero de honestis dicit, quod diacurcuma sumitur p. rubea tinctorum, quod non credo: quia Mat. Syl. in litera. Dios. inquit sic: Sed illa regula habet exceptionem in uno electuario posito a Gal. in antidotario suo: & etiã in Damasceno quod uocatur diacurcuma, & non est electuariũ de curcuma, quia non recipit aliquid de curcuma.

Vbi sciendum est quod illud nomen fuit impositum prædicto electuario, propter quandam similitudinem quã habet in colore cum curcuma: quoniam recipit crocũ, cuius tinctura tingitur electuariũ tãquam si receperit curcuma: & ob hoc diacurcuma uocatur, quia recipit crocũ qui tingit colore curcumę. Aui. in. 5. can. habet duas descriptiones. f. maiorem, & minorem, & non habet curcuma. Mes. habet diacurcumam magnam & minorem: & dicit quod minor ualeat ad ea sicut maior, sed maior est illa quæ usui uenit. Curcuma est radix satis nota. Mes. laudat ipsam in ca. de scabie oculorum sub nomine huruch. i. hauruch.

Petroselinum scilicet semen eius. Iisd. in ca. de oleribus ait: Petroselinum uocatum quod sit simile apio, & nascitur in petris montibus: præruptis, quos petrapium dicere possumus, & hoc est satis notum.

Daucus secundum Auicennam in. 2. can. est semē baucie syluestris, & ibi dicit: Distinctio eius dicitur in ca. bauciz syluestris, sed non reperitur.

Rauedfeni. i. Rheubarbarum. Mes. in ca. de rheubarbaro, inquit. Electio est specibus raud, alius est quod nascitur in India, & est rauedfeni: & alius est raud barbarũ, & alius est raud turcinum, & melius est rauedfeni. Io. Anglicus in lib. 5. quasi in fine ait: Rheubarbarum diuersimodè administratur, aliquando in colatura tantum, aliquando in electuariata substantia, aliquando in pilulata, aliquando in liquida: & dicunt aliqui quod in substantia plus laxat, & alii quod in colatura eius plus.

Meu apud Aui. uocatur mu: & dicitur quod est frusta diuersę figurę in colore agarici. Dios. dicit meu quod athamanti cū dicitur. Quidam uero anethum syluestre uocant. Radix ipsius competit usui medicinæ: sed Lunę male lucens expo-

suit in prædicto electuario quod meu ē semē anethi syluestris cuius falsa est opinio: & qui mihi non credit uideat Auicennam. cap. de mu. i. meu. Et Serap. & Circa instat omnes uolunt quod radix sit illa quæ est efficacior in medicina. Infra in confectione dicta aurea Alexandrina, de meu iterum aliquid ostendam, si Deus uoluerit.

Myrrhæ secundum Auicennam est gummi currens super arborem in Iamania quæ dimittitur donec congeleatur. deinde colligitur sicut galbanum & oppopanacum. In terra nostra Græcus appellat smirna.

Carpobalsamum est fructus, seu semen balsami, ut dicit Dioscor. in cap. de balsamo. Lignum ipsius appellatur xylbalsamum, succus oppobalsamum.

Rubea tinctorum secundum Isidorum dicta est, quod radix eius sit rubra: unde & colorare lanas perhibetur. Christophorus de honestis putauit, sed non recte, quod diacurcuma efficiatur in colore curcumæ propter rubeam tinctorum, sed non est.

Abinthium secundum Mes. est multiplex, sed illud, quod intendimus est abinthium Romanum: & melius est illud quod est remori ab odore maris, & quod oritur in terris liberis: & habet folia alba, plana, & leuia: hoc est satis notum. Ille est modus operationis succi eius: exprime succi eius quantitatem quam uolueris, & proprie in medio ueris, & purifica illud secundum artem, & fac siccat cinere calido in uase uitreato, sicut siccatur aloes.

Eupatorium secundum Serap. dicitur: non est ergo pollicaria ut dicunt quidam Arabes. In ista planta Mes. & Auicenn. sunt differentes. Nam Mes. dicit, quod ipsius flos est sicut subcitini. Aui. uero ait: Flos eius est sicut nenufarig: non concordant. Infra iterum de ipso loquimur. Succus uero ipsius sit sic, oportet ut teratur folia ipsius, & exprime succum eius usque ad quantitatem quam uolueris, & dimitatur soli donec siccetur ut possint fieri troch. sunt etiã qui ponunt succum ipsum in uessica porci & fificant. Liber qui dicitur bulcasim in tract. 2. docet modos exprimiendi succum ex gasti. i. eupatorio.

Oleũ balsami quod ex ligno balsami manat. Descriptio nem ipsius describit ipse Mes. sic: flos ostendam infra: sed quia illa descriptio Mes. non potest fieri apud nos, ego describã unam descriptionem quæ reperitur apud Petrum de Ebano. Et em illam facere debemus: etiã si uisi facere per aliũ modum, ut docet Guil. Lombardus quod infra. Ioã. Anglicus in ca. de paraly. inquit. Septem sunt cara, quigũ sunt bona, uel quia rara. Balsamus, ambra, tyrrus, caro, lignũ, camphora, muscus. Per tyrrũ intelligitur thetira uel trochisci de tyrru quos recipit, per hoc nomen caro, caro leonis, per lignũ lignum aloes. & alia sunt satis plana. Et nota quod balsamus est succus balsami. Illius arboris, quæ est parua, quasi frutex circa Babyloniam tantum crescit, & uocatur oppobalsamus, & lignum eius uocatur xylbalsamus: & est uersus de hoc: Est opus succus: xylb, lignum, carpos, fructus.

Scordeon em Auicennam est alium agreste. Circa instans inquit: Scordeon est alium agreste, solius flos eius medicinę competit. Sera. in cap. de alio ait: sed scordeon est alium agreste, & est fortius alio domestico.

Scolopendria secundum modum usus, est lingua ceruina. Antiqui autem utebantur alia scolopendria, & hæc est illa quam hodie nos cetherac uocamus. Infra apparebit syrupsus de scolopendria. Et ibi melius ostendemus, si Deus uoluerit.

XLI.

DIACURCVMA MINOR.

R. Spicz,

Myrræ,

Calsiz,

Croci,

Floris squinanti,

Costi,

Cinnamomi,

ana. partes æquales.

Confice cum melle despumato.

COMMENTA. MANLII.

Diacurcuma minor est in usu f. intentionem Mesue, minor ualeat ad ea sicut maior, sed non sit. fed poterit dicere aliquis, si Mes. laudat minorem sicut maiorem, ergo possumus

mus facere minorem pro maiore. Ad hoc dici possit, & sic inoleuit usus apud nos, & quòd etiam illa possit fieri.

XLII.

DIAMORVSION.

R. Croci,	Seminis Apii,
Acori, ana. 3. ii.	Anisi,
Myrrhæ, 3. iii.	† Cordumeni,
Baccarum lauri, 3. ii. s.	Spicæ,
Dauci,	Menthæ siccæ,
Cinnamomi,	* Marmacur,
Calsiæ,	Ameos, ana. 3. i.
Cymini,	Albi,
† Carmani,	Trium piperum Nigri,
Carpo balsami,	Longi,
Florum squinanti,	Costi, ana. 3. i.

Confice cum melle desumpato.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium apud nos non est in usu. Hæc descriptio uidetur concordare cū descriptione quam Aui. in 5. canon. describit sub nomine homorusia.

Acorus secundum Diosc. est herba ueneræ, uel aphrodisia, uel piper apum &c. Radix ipsius competit uisui medicis: quidam uocant ipsam geliam, alij gladiolum.

Dauci, id est semen dauicæ syluestris. Aui. in prædicto electuario habet dauci: & ibi exponitur, quòd est semen bauicæ syluestris.

Carpo balsamum secundum Diosc. in cap. de balsamo est semen balsami, & hoc satis est notum.

Cordumeni sive Ser. est carui agrestis, & a Romanis dicitur Karda. Mirandum est qd Diosc. concludit sermonem de cardamomo, cum sermone de cordumeno apud Ser. quod non est credendum qd sint idem. Quidam uocant ipsum filer creticum. Matth. Sylua. uocat ipsum cordilior. Infra in athanasia magna ostendam qui sit is Deus uoluerit.

Marmacur. i. maru de quo Aui. in 2. can. speciale c. facit & ibi distinguit in plures species. Secundum uero Stephanum est marubium: autem reperitur marmacori, est melissa. Guil. Place. ait Maru est species lingue bouis, & uocatur in Cremona selarea. Sapientes dixerunt qd per marmacur uolumus intelligere prasium, filis marubii: & per marmacori uolumus intelligere citrarium. i. melissam.

XLIII.

DIALACCA MAGNA.

R. † Lacæ lotæ.	Rubæ tinctorum,
* Ruedeniana, 3. iii.	Seminis feniculi,
Spicæ aromaticæ,	Anisi,
Masticis,	Asari,
Seminis apii,	Aristolochiæ,
Squinanti,	Gentianæ,
Absinthii,	Croci,
Succi eupatorii,	Cinnamomi,
Ameos,	Hyssopi siccæ,
Saminæ,	Calsiæ,
Amygdalarum amararum,	Cimmarum squinanti,
Costi,	Bdellii, ana. 3. i. s.
Myrrhæ,	Piperis,
	Zingiberis, ana. 3. i.

Infunde myrrham, & bdellium in uino, & cætera tere, & confice cum melle desumpato.

COMMENTA. MANLII.

Dialacca magna, dicitur magna, quia compositionem ipsius plura simplicia ingrediuntur qd in minore, uel dicitur magna, quia habet maiorem efficaciam. Aui. in quinto can. habet duas alias descriptiones, quæ non sunt similes, sed ista Mes. est illa qua nos utimur. Lacca secundum Serap. ex autoritate Diosc. est gummi arboris cuiusdam, & nascitur in terris Arabum, & est similis mirrhæ: & storaci. Ipse Sera. quasi in fine ait: Lacca est res rubra, quæ est sup. ligna subtilia, & sapor eius est bonus, & ipsa coquit, & tingitur inde panni in rubeum colorem, & dicitur tinctura illa Kermes: reperitur apud ipsum Karmen, quod est grana tinctorum cum quo tinguntur panni. Aui. in 2. can. duo ca.

de ipsa facit: unum sub nomine kei Kens, sed in Arabico est kan kamon. Et dicit Aui. qd est gummi horribilis saporis: & uidetur ignorasse quid esset, & quia ignorauit, scripsit aliud ca. de lacca. Et qui mihi non credit, uideat c. de lacca apud Ser. cum ca. de kaiken apud Aui. & uidebit qd idem est. Modum autem abluionis docet Ser. in proprio ca. de lacca in fine, & sic ait: Modus abluionis eius est qd accipiuntur gummi eius, & teruntur, & projiciunt super aqua calida in qua bullierint aristolochia, & squinantum, & mo utur bene cum pistello & dimittitur residere, & eiecitur aqua: deinde deficcatur in umbra, & reponitur in uase uitreo. Et si non clarificatur prima uice, facias secundo: & de prædicta decoctione sunt troch. de lacca.

Spicæ aromaticæ. i. nardi.

Squinatum sicut dictum est, est palea camelorum. Mes. in isto electuario habet squinatum, & inferius habet cima rum squinanti, & ambo debent poni.

Sauinæ secundum Circa inueniuntur folia compertit usui medicinz. Macer ait: Braçeos Graeca, sauna uocata Latine. Ser. in ca. de sauna dicit: Abel. i. sauna, de qua mirandum est qd Aui. in 2. can. in cap. de abel inquit. Abel est fructus inuiperi quod non est uerum, quia fructus dictum est Sera. uult qd abel sit sauna, & sic magis est credendum auctoritati Serap. in simplicibus quam Auicena.

Aristolochia. Aristolochia rotunda, de qua Circa infas in ca. de aristolochia ait: Aristolochia rotunda magis medicinz competit quàm longa, & radix intelligitur, & per tres annos feruatur. Radix in autumno colligitur & siccatur.

Hyssopus. s. herba sicca, dicitur ad differentiam humidæ quæ est pinguedo lanarum. Auicena in 2. can. duo ca. facit: unum de hyssopo humido, & aliud de hyssopo sicco, quæ est herba satis nota.

Bdellium secundum Aui. aliud est bdellium Metchium Aliud est bdellium Iudaicum, aliud est Siculum, & aliud Arabicum, quod est aliud a bdellio palmarum syluestriū: & ambo sunt ex palmis syluestribus. Metchium autem est ex fructu arboris palmarum syluestrium: & non reperio alium quem auctorem dicentem qd bdellium fiat ex fructu arboris palmarum syluestrium, ut dicit Aui. Plini. ait: In Bactria nascitur bdellium nominatisimū, cuius arbor est magna magnitudine oleæ folijs arboris fructu caprifici, cuius gummi alij præco appellant, alij malachin. Hoc nomē Arabes imitantur mochal, alij maldachon &c.

XLIII.

DIALACCA MINOR.

R. Lacæ ablutæ,	Liquiritiæ,
Croci,	Piperis, ana. 3. i. s.
Costi,	Ruedeniana, 3. iii.
Florum squinanti,	Myrrhæ,
Rubæ tinctorum,	Bdellii, ana. 3. i.
Aristolochiæ rotundæ,	Confice ut primum.

COMMENTA. MANLII.

Dialacca minor non est in usu.

APPENDIX.

Actuarii *ἡδὲ λακκὰν* bis belle perstricit, nihil fere ab ipso Mes. euarians, modo inuicem probe comparantur.

PAINA DESCRIPTIO.

Lacæ, 3. xv.	Garyophyllorum,
Cinnamomi,	Molchi,
Ligni calsiæ,	* Cari,
	Carpefi,
Aristolochiæ Rotundæ,	Eupatorii,
Longæ,	Gentianæ,
Fructus balsami,	Polij,
Rhei,	Anisi, ana. 3. iii.
Costi, ana. 3. ix.	

Mellis quantum satis erit.

SECUNDA DESCRIPTIO.

Lacæ repurgatæ, 3. x.	Calsiæ,
Costi dulcis,	Asari,
Spicæ Indicæ,	Cinnamomi tenuis,
Fructus,	Croci,
Balsami, Surculorum,	Tunci odorati.

* i. nucis
molcha
tæ.

SECTIO PRIMA

Rhei Indici,
Mastiches,
Aristolochiæ Longæ,
Rotundæ,
ana. 3. v.
Myrrhæ ueracis,
Gentianæ,
† i. Carpe
di.

Seminis feniculi,
Polii,
Garyophyllorum,
Cumini latioris,
Abinthij,
Eupatorii,
† Combebez, ana. 3. viii.

Melle excipiuntur.

X L V.

DE RAVEDSENI, idest, ex Rheubarbaro.
R. Ravedseni,
Succi Eupatorii,
Abinthij,
ana. 3. v.
Fumi terræ,
Spicæ,
Anisi,
Cimarum squinantæ,
Seminis apii,
Alari,
Calsiz,
Amygdalarum amararū ex
corticatarum,
ana. 3. s.
Myrrhæ,
Croc. ana. 3. i.

Conficet cum melle despumato.
COMMENTA. MANLII.

Cōfectio de ravedseni, nō est in usu: & hęc est cōfectio de rheubarbaro. Ravedseni, sicut dictū fuit, est rheubarbarum. Et Auer. in. 5. col. inquit: Rued. i. Rheubarbarum. Ipsi do. ait: Rheubarbarū fuit reupōticum, sed nō recte. Illud quod trans Danubium in solo barbarico: istud quod circa pōticum colligitur nominatū est. Rheu. aut radix dicitur, barbarum græca: quasi radix barbarica. Mes. laudat illud q̄ magis est subnigrum declinans ad rubedinem, & quod est tincturæ croci. Adulterat. n. in illis partibus: & accipitur ex eo integro sicut est quantitas magna, & submergit in aqua per dies quinq; & dimittit aqua illa siccari, & hūc inde trochisci, & sunt ipsi medicina regum. Rheubarbarū uero siccatur & uendit, sicut est: quod iam perdidit animā & est sicut homo mortuus, & illud in quo nō cadit adulteratio est rarū, & habet tincturā croci. Adulteratū uero habet contrarium, & cōseruatur per annos tres uel quatuor: si sepeliatur in pillio, aut in millo, sicuti est consuetudo.

X L V I.

DIACOSTVM.

R. Costi amari,
Calsiz,
Cinnamomum. ana. 3. v.
Seminis apii,
Anisi,
Cimarum squinantæ,
Ravedseni. ana. 3. iiii.
Asari. 3. iiii.
Croc.
* Aristolochiæ
Myrrhæ. ana. 3. iiii.
Mellis quantum sufficit.

u. f. pecunia
da.

COMMENTARIA. MANLII.

Diacostū aut dicitur, q̄ a costo recipitur: hoc apud nos nō est ualde in usu. Auic. in. 5. can. habet unam descriptionem quæ uidetur quasi esse similis huic. Nicolaus describit unā aliam descriptionem, sed non est similis isti quam infra de feribemus. Costum autem est radix amara: hoc satis notū est. Reperitur aliquando in cōfectionibus costum dulce: sed nostri auctores de eo non loquuntur. Nam uide Sera. in c. de costo ex auctoritate Gal. qui inquit. Sapor eius. f. costi est amarus multum, fortis, acutus. Macer ait.

Costi sunt geminæ species, grauis una rubensq;,
Est & amara nimis, hęc indica dicitur esse,
Altera uero leuis nec amara, colore subalba.

Hanc Arabes mittunt, prior utilior medicinz, scilicet Secundum Circa instans. Costum potest seruari per decē annos in uirtute.

X L V I I.

EX INVENTIONE NOSTRA.

R. Ligni aloes,
Spicæ,
Galliz moschatæ,
Cyperi,
Calami aromati.
Cymini carmeni insusū in aceto die ac nocte, & assati. 3. iiii.
Seminis porri torrefacti. 3. i. s.
Emblicorū, & Bellericorum insusorum in succo cytonio-

rum, & tostorum,
Nucis moschatæ,
Granorum nallurtij, tostorum. 3. vi.
Granorum passularum. 3. v.
Granorum myrti tritorum sicut alcohol. 3. xxvi.
Balauftij,
Conchularum adustarum,
Olibani,
Fructus tamarisci,
Ameos. 3. iiii.

Tere omnia, & frignantur in uino odorifero, & exiccentur, & frigrantur iterum in aqua cytoniorum, aut aqua granorum myrti, & exiccetū. Deinde dimitte ficcari super uase uitreo, & iterum terantur sicut alcohol, & inuoluatur in mīa aromatica, & sit dosis. 3. iiii. cum syrupo de cytoniis, aut myrrino.

COMMENTA. MANLII.

Confectio electuarii ex inuentione nostrā nō est in usu: sed simplicia quē nō sunt declarata clarabo, alcohol. i. subtile sicut atomi folis. Nicolaus Floren. in lib. 3. in capi. de curatione ægritudinis oculorum inquit: Administratū aut medicinz oculis, aut in forma pulueris: & uocant cohel uel chofel flos alcohol uel alchofol, & significat puluerem debere esse subtilissimum sicut atomi qui apparēt in sphaera folis. & sic intelligere debemus per alcohol puluerem subtilissimum.

Balaustia sūm Auic. Diosc. & Serap. & Isidorum est flos mali granati agrestis. Iisd. in ca. de propriis nominibus arboris ait. Flores malorū a Græcis appellati sunt cyrtini: La tini caducum uocant. Agrestiu aut malorum flores Græci balaustion appellauerunt: quorū alij albi, alij purpurei alij rosei repeririunt: similes floribus mali punici.

Conchulæ apud nostros auctores repeririunt multæ species. Nā Sera. de ipsis diuersa capitula facit: ipse facit unū ea. de conchylis, & ibi sic ait: Hedef. i. cōchylum cochlæ parū, sicca: quando aduritur cinis eorum, secundum q̄ dicitur, est cinis multum adures. Aliud ca. facit de ostracha marina & testa cōchylum, & ibi de ambabus loquitur dicens Ostrachorum ex mari quæ dicitur barcora. non usus sum corporibus eorum, nisi cōbuerunt prius ea quæ sunt testa dura multum & c. etiam in cap. de blata bifantia. i. pur pura marina inquit: Cōchylum est ex speciebus ostrachorum, & est similiter de conchylis palpi, & reperitur in regionibus Indiz, in aquis iuxta quas orit spica nardi & c. Dio. facit c. de cochlea terrena. i. limacia, quæ est inter species conchylorum est posita. Reperitur apud nos alia species quæ nascitur in aquis dulcibus, & hæc uocatur cōchula aquæ dulcis. Inuenitur alia species cōchulæ quam peregrinantes portant de sancto Iacobo, & iste uocatur ueneriz. Auic. autem. 3. can. in sen. xxi. in. ca. de cura fluxus sanguinis, & in fine eius patientis fluxum mēstruorū inquit, Conchularū marinarum quæ asportantur a sancto Iacobo adustarū. Aduruntur aut, ut docet Bulchafim, & modus ipse suis ille est: terantur in primis, & ponantur in olla munda & ponantur in furno una nocte: deinde extrahat si sunt cōbultæ, sicut cinis bene: si nō alba calcinata, & utere ubi oportet.

X L V I I I.

AL KANZI.

R. Rosarum,
Costi,
Spicæ. ana. 3. iiii.
Florum acheil. 3. i.
Nucis moschatæ,
Calami aromatici,
Garyophyllorum,
Macis,
Cardamomi. ana. 3. iiii. s.
Zingiberis. 3. iif.
Emblici,
Myro. Bellerici,
balani, Ind. ana. 3. vi.
Granorum myrti lib. i.
Balauftiz,
Corricum citri,
Fructus tamarisci,
Thuris. ana. 3. iiii.

Bulliant cō bono uino antiquo, bullitione una, & exiccentur: deinde bulliant cō succo cytoniorū bullitione alia & exicca in uase terreo uitreato: & tere omnia sicut alcohol, & confice cum mīa.

COMMENTA. MANLI.

Confectio alkanzi non est in usu: simplicia quæ in ipse ingreditur declarabo. Aui. in. 5. can. habet duas descriptiones electuarii alkanzi, quæ non sunt in usu. Florum alchell. i. florū roris marini, siue coronæ mōris, siue alcheliges, ut apud Græcos. Si uero reperies scriptum in cōfectionibus granorum alchell. intelligitur granata syluestria.

XLIX.

DE ASSA.

R. Affz, Foliorum rutæ siccorum,
Piperis, Myrrhæana. 3. iiii.

Confectio cum melle desumpto, & est dosis ana. 3. i. usq; ad aur. i. & proprie cum oxymelle in horâ ante accensione & uenenosis moribus cum uino calido.

COMMENTA. MANLI.

Cōfectio de assa. i. de assa fetida nō est in usu. Aui. in. 5. can. habet unam aliam descriptionē, quæ eadem est cū ista Mcrassa sūm Diosc. est gummi filii, apud Plin. interdum uocatur laserpitium, uel assa, uel herba eius quædam est fortè dā, alia est dulcis: quem locum apud Simonem nunquā uidi nec audiui aliquem uidisse. Sed Matt. Sylua. exponit qd assa dulcis est gummi liquiritiæ. Rasis in libro diuisionum in cap. de dimiutione coitus inquit: Alitit. i. assa dulcis.

L.

ANACARDINVM, officinis confectio Anacardina.

R. Piperis, Costi,
Macropiperis, Anacardi,
Chebnilorum, Zuchari tabarzeth,
Myroba. Bellericorum, Baccarum lauri,
Lanroba, Emblico, Barrungi, ana. 3. vi.
Indorum, Cypeni, 3. iiii.

* Iumdebedust, ana. 3. ii.

Tere anacardos per se: deinde medicinas alias, & confice cum butyro uaccino & melle quantitate æquali bullitis prius, & da post sex menses.

COMMENTA. MANLI.

Confectio anacardina est confectio sapientium, & illorū qui desiderat scire: acuit enim intellectū. Aui. in. 5. can. habet duas descriptiones cōfectionis anacardinx, sed non sunt similes huic, quam scripsit. Mef. inferius uero habet electuariū anacardinum quod subtilitat cogitationem & sensum & est electuariū sapientium: & dicitur qd est Salomonis, & hæc descriptio uidetur esse eadem uel Mef. ipse Mef. in ca. de ægritudinibus neruorum scribit unam aliam descriptionem, de qua infra erit sermo.

Iumdebedust siue zumdebedust sunt testiculi castorei. Quidam apothecariorum falso dixerūt qd debet dicere uinum debedust, & uolūt intelligere per uinū debedust duas res. qd ium sit uinum, & debedust sit quedā herba: sed falsæ sunt opinio eorū. Nam uide Aui. in p̄dicta cōfectione, qd loco iumdebedust habet castorei: similiter habet Io. Serapion. antidotario. Item uide in 3. prac. Haly. in p̄dicta cōfectione qui habet zumdebedust. i. testiculi castorei & sic moderni doctores uolunt qd intelligamus per iumdebedust testiculos castorei & aīal illud secundum Sera. uocat castor. Et secundū Guil. Placē. est quoddam animal quod appellatur bauera. Nota qd herba debedust in partibus nō fuit, ut dicit Matt. Syl. non reperitur. Mef. in ca. de debilitate usus laudat ipsam. Vide Simo. Ianu. in c. de bedust, ubi sic ait: Bedust apud aben. Mef. herba est quam ignoro. Idē debedust sunt testiculi castorei, & sic est. Itē Circa instās ait: Castoreum est testiculus cuiusdam animalis dicti castor, uel beum alii ieiū, quod idem est.

Anacardos secundū Nico. est fructus cuiusdam arboris quæ pediculus elephantis uocatur. Circa instans dicit anacardi. Dicunt quidam qd sunt pediculi elephātis, sed falso. Ser. inquit: Anacardi est fructus arboris similis cordi aui: cuius color est rubeus parum, & inter ipsum est resimilis sanguini: & est id quod adnistratur in eo. Aui. dicit: Est fructus similis osi dactyli, & medulla eius est similis medullæ nucis dulcis: & etiam ipse Aui. in. 4. can. enumerat

anacardos inter uenenosas plantas, sed oportet antequam administrentur in medicinis ut preparantur, ut infra ostēdatur in p̄dicta cōfectione, nascuntur in Sicilia in motibus igneis. Auer. in. 5. col. ait: Balador. i. anacardi.

Burongi uel abrungi idem sunt, ut dicit Simon. Ser. de ipso capitulum facit sub nomine abrigi, & dicit qd est granum paruum punctatum nigredine & albedine rotundum: sicut granū mes. i. robiliæ nullius odoris defertur de Seni in sapore ipsius est amaritudo & c. nō est bederege, siue crī simon. i. erucha gorgana, ut quidā apothecariorum dicūt. Nam Sera. aliud ca. facit de erisimoi, & dicit qd est granū, sicut grauum nascitur: ergo non conuenit bederege cū burugi. Gētilis super. 5. can. Aui. exponit qd burongi est granū in magnitudine piperis, & hæc est modernorū opinio. Non est aut nigella, ut exponit Lumen male lucens. Nam Rasis in. 9. Alman. i. ca. de lumbicis, & uermibus qui nascuntur in ano & in uentre, habet burongi exorticiati: & intellige qd non sunt idem. Quidam uero sapiētes dixerūt qd uerum burongi est myrtus alba siue myrtus agrestis: & sic sine dubio uidetur, quia myrtus alba est cubebe, quod est granum in magnitudine piperis. Et sic Matt. Syl. in ca. de cubebe inquit: cubebe. i. damytra uel burugi apud Arabicos. Et sic nostri doctores uolūt qd per burongi ponamus cubebe, quia iuxta materia multū ualeat: & sic est experientia apud multos, qd si accipiat cubebe & masticetur, conuenit memoriz. Mef. inquit, quod ista cōfectio non debet dari si non transierint menses sex. Quidam admirantur talibus uerbis dicentes: quod in ipsa ingreditur opium: & si opium non ingreditur: quod potest dari in omni ætate. sed non ualet hoc. Nam in ista cōfectione ingreditur in bona quantitate de anacardis qui sunt uenęuosi, & oportet administrali ipsos paratos, ut docet Raynaldus de uilla noua. in. 1. in c. de defectu memoriæ, & de iuniorib. ad memoriam, ubi sic ait: Anacardi autē ante medicinas alii quas primo debent in hunc modum preparari. Accipiant anacardi, & optime terantur in mortario, & in aceto fortissimo ponantur, & ibi stēt dieb. septē, postea lēto ignē in p̄dicto aceto coquantur, quousq; tertia pars acetī remaneat: & cola scēm illam que in fundo ipsius remanet in aceto extra colato, & in medicinis ponē: nūquā anacardi debēt in medicinis poni nisi prius hoc modo preparati. Et si mel anacardinum facere uolueris, pone cū ipsis anacardis cum p̄dicto aceto coctis tantūdem mellis desumpti: & bulliant ambo simul usq; ad spissitudinē: & habebis mel anacardinum, quod in p̄dictis ægritudinibus operat mirabiliter, & sic debent preparari in ista cōfectione.

L.I.

PHILONIS, ex inuentione propria.

R. Piperis albi, Croci, 3. v.
Hyoscyami albi, Spicz,
ana. 3. xx. Pyrethri,
Opii, 3. x. Castorei, ana. 3. i.

Confectio cum melle desumpto, quod fit, quadruplum ponderis omnium, & sunt qui ponunt Mulschi. 3. i.

COMMENTA. MANLI.

Hæc cōfectio Philonis est famosa & maxime de istis duabus descriptionibus, quas describit hic Mef. Verū reperit̄ur aliz descriptiones, quæ et in usu sunt, ut est Philoniū persicum Mef. quod desiderit in sua practica Aui. & etiam alii describunt, sicut ostendat infra, si Deus uoluerit.

Hyoscyamus, uel iusquiamus Græce, Latine secundum Diosc. dicitur canicularis, secundum alios dens caballinus, & bengi, apud Arabes. Mef. habet iusquiamum albi: & apud omnes autores est herba nobilior aliis speciebus, sed quia in nostris partibus non reperitur, ponimus loco eius illum qui habet semen subfrustum: sed illa quæ habet semen nigrum est fugienda, ut dicit Macer.

Iusquiamum Græci, quomodo nostri caniculatam dicunt: Huic herbæ uirtus est frigida ualde.

Tres habet hæc species semen profert prior album,

Altera subfrustum producit, tertia nigrum.

Nobilior reliquis est semen quæ gerit album;

SECTIO PRIMA

Pro quo si desit, mos est apponere rufum:
Nigrum uero frequens medicorum respuat usus.
Et ista est illa herba quæ in Papiæ a vulgo herba pinula uocatur. Idem sentit Auic. 2. canonicus.

Opium fmi Dios. succus est herbæ, & lac papaueris quod colligitur: ut ipse ibi docet. Opium autem componitur ab opo, quod est succus & lachryma Apud Auic. est succus papaueris nigri, & Aegyptij ipsum feminant: quandoq; uero fit opium etiam ex femine lactuæ agrestis, & est stupefactum debile subtile. Sera. de opio nullum facit ca. led in ca. de papauere de ipso loquitur & dicit: Gummi uero papaueris nigri est opium. Auic. & dicit: Non ponunt doim opii, sed quod debet sumi sine documento. Sera. ait in ca. allegato quasi in fine inquit: Et dosis eius. f. opii est ab uno danich usq; ad ij. & quantitas occidens ex opio est: ij. j.

APPENDIX.

Non inegantur hoc Philonis antidotum, nono cõpõ sitorum medicamentorum κατὰ τέχνην, per loca nẽpe Galeni, Elegiacæ carmine per ænigmata de industria ferẽ scriptum habetur: Romanæ coloniz aliteratissimo medicorum nostri temporis Iano Cornario quam felicissime, ijs uerbis iam iam donatum.

Philonis Antidotus,
En me Tharsensis Medici præ grandæ Philonis
Inuentum, mala quod multa dolore leuo.
Siue Colum doleas, seu tu fecur, auxiliabor.
Seu Lapis infestet, difficile aut Locum.
Et medeor Spleni hinc, Orthopnæq; molestæ,
Consultæ, acque Tabem protinus exupero.
Pleuritimoq; malam, & spiritum uomitumque Cruoris.
Euinco, Mortis terror, & hostis ego.

Viscera tentantes omnes ego sedo dolores,
Internæ, & quicquid membra dolore quatit.

Tulsum, singulum, destilantesq; Fluores
Sisto etiam si quid strangulæ excipio.

Me dedit ille autor sapienti munera magna
Discipulo, & Stupidos nil quo curo uiros.

Odorum fuluorumq; Pilum pueri cape cuius
Fulget aduch campis Mercurij ille cruor.

Pondus ad humanos sensus perpendio prudens,
Dein drachmæ pondo Nauplion Euboicum.

Inde: Menaxiadæ occisoris ponito drachmam,
Qui pecoris densis uentribus excipitur.

Viginti & drachmas candentis conijce flammæ,
Et totidem fabæ post suis Arcadizæ.

Et drachmam dictæ falsæ radicis ab ipsa
Terra, pilulo quo Ioue clara manet.

Quumq; pion scribes, uoci caput amplius addes,
Masculum Achiorum nominis articulum.

Indeq; post drachmas expensæ sumito lancis
Quinque bis, acque isthæc prouidus excipito.

Natarum tauri texturæ Cecropidarum
Sic mecum Tricæ progeniesq; facit.

Verum ex Gal. rei summan nunc breuibus exponemus.
Croci, 3. v. Piperis albi,
Pyrethri, Hyoscyami, ana, 3. xx.
Euphorbii, Opii, 3. x.

Spicæ nardi, ana, 3. i.
Superest postremum quo ola hæc trita excipiuntur, ip sum mel, nempe Atticum, quo pasto etiã Asclepiadas hoc phar macum parare testatur.

L. II.

PHILONIS, descriptione Hamech.
R. Nigellæ, Foliorum rutæ,
Castorii, Calamenthi,
Piperis, Opii,
Ameos, Hyoscyami,
Baccarum lauri, Cortic. rad. mandragoræ,
Cymini, ana partes æquales.

In alio opii ptes. ii. croci, part. i. cõfice cõ mele desuma.

COMMENTA. MANLII.

Confectio Philonii descriptione Hamech non est in usu,

secũdum istam descriptionem, sicut dixi: simplicia quæ declarata non sunt declarabo, Nigella secũdum Sera. ex au thoritate Dios. est: quoddam semen nigrum, acutum, boni odori: quidam miscent hoc semen cum massa palstæ, & faciunt inde panem. Moderni uero apothecarii utitur quo dam femine triangulato, habente citrinum colorem & odorem iocundum, & de hoc nostri auctores non loquũtur nam omnes scribũt de nigella, & non loquuntur nisi de illa nigella quæ uocatur melachion siue melanchium: ut dicit Dios. Sapientes uero dixerunt, q. quando reperitur in receptis nigella, de citrina debet intelligi: & quando reperitur melachion siue git, intelligitur de nigra: non est illud git quod dicitur giron: sed est aliud. Auer. in. 5. col. ait Scamum. i. nigella. Mandragoræ. f. corticis ipsius. Auic. uocat labrol, & dicit: est radix mädragoræ syluestris: & est radix omnis mädragoræ, & magnæ similis forme hominis: & propter hoc nominatur mädragora: est. n. nomẽ imaginis naturalis, sicut plãta exiſtes in forma hominis. Et fm Petrum de crescen. uerba Aut. sunt male traducta, ut infra ostendamus in oleo de pomis labrol. Auer. in. 5. coll. appellat Lefaha. Ioan. Ser. in antidotario in confectioe dicta kes Kigeru inquit: Zuferandi, id est radix mandragoræ.

L. III.

EGETA, VEL SAZENEA.

R. Castorei,	Cinnamomi,
Myrrhæ,	Phu,
Opii,	Men,
Piperis,	Dauci,
Macropiperis,	Asari,
Galbani,	Croci,
Costi,	ana, partes æquales.

Conſice cum melle desumato, & hæc.

COMMENTA. MANLII.

Egeta secũdum inuentionem Mes. est fazenea, & si cre do, quia Aut. in. 5. can. habet fazeneam magnam & mino rem, quæ uidetur esse idem Albucasis autem in tertia particula azarauti, inquit. Antidotũ quod Arabicæ fazenea maior, & antiqua nominatur, quæ ab antiquis multum experta fuit, & dicitur quod fazenea infinitis cõferat passio nibus &c. ibi describit suam permixtionẽ quæ quasi est ea dem. Apud nos est in usu maxime ista Mesle.

Galbanum secũdum Dios. est lachryma cuiusdam her bæ similis ferulæ, quæ in Nicomedia nascit & Syria: cuius optimum est quod est mĩdissimum, & simile armoniaco: & hoc est fati notum. Apud Auer. in. 5. col. galbanum ap pellatur halcharina.

Phu. i. ualeriana uel potentilla, uel amantilla: secũdum Dioscor. phu multi appellant uardum agrestem. Circa istas dicitur phu intelligitur radix, & sic est. Apud nos nascit iuxta fossas, & multi uulgares nomine uocant ipsam herbam benedictam.

Meu, ut dictum est, quando simpliciter ponitur, radix in telligitur in medicina. Sed Lumẽ tenebrosum seu male lu cens scriptis predictam confectioẽ, & exponit q. meu est semẽ anechi syluestris: cuius falsa est opinio, sicut est notũ nobilibus Apothecariis. Plini. ait. Meu in Italia non nisi a medis feritur.

L. IIII.

ATHANASIA MAGNA.

R. Opii,	Seminis pap. nigri,
Croci,	Spicæ,
Myrrhæ,	Eupatorii,
Castorei,	Hepatis* adib.
Hyoscyami albi,	Cornu dextri capræ, uel (ut alii legunt) cerui,
Costi,	ana, partes æquales.
Cordumeni,	

Tere quæ terenda sunt, & alia liquefiant in uino, & con fice in melle desumato, & da post sex menses.

COMMENTA. MANLII.

Athanasia autem magna dicitur respectu minoris, eo q. pauciora simplicia ingrediuntur: tamen Mes. non describit nisi magnam. Aut. uero in. 5. can. habet athanasiam magnã

& minorem, quæ satis uidetur concordare cum ista: & dicitur minor habet illa iuuentura quæ sunt in magna. Nic. in suo antidotario habet athanasiam de qua infra: sed ista Mef. est illa qua nos utimur. Halyb. autem in .10. practice habet athanasiam quæ cum hepate lupi fit.

Cordumeni. i. carui agreste, Quidā de nouo scribens in titulus Lumen apothecariorum super istū passum, loco cordumeni posuit carui: cuius falsa est opinio. Nam aliud est carui agreste, aliud est carui domesticū. Quidā dicit quod cordumeni est ciminella, quod nō est: alii cardamomū quod non est quibus mirandum est quod illud cap. de cardamomo apud Diosc. est idem cum cap. de cordumeni apud Ser. sed modè distinguunt per alia nomina, uidelicet quod aliud est cardamomum, aliud est cordumeni. Nam Sera. duo cap. facit in ca. uero de cordumeni dicit, quod cordumeni est carui agreste. Præterea uidet eūdem in suo antidotario in cōfectione theriacæ, qui exponit cordumeni. i. carui agreste. Et sic dicit Guil. Plac. in prædicta cōfectione. Democritus uero ibidē dicit, quod est chemi capēstre siue filer creticum. Matt. uero Syl. in ca. de cordilion inquit: Cordilō Græce, Latine uero carui agreste, uel filer creticū uel cordumeni: & dicit ex autoritate Diosc. quod est herba quæ nascit in Sicilia, cuius fructus est sarmetolus, habēs semē rotundum, & duplex, sicut est faba, uiscidum & odoratum. Vide ergo quod uerum cordumeni est carui agreste. Et secundum Democritum est chemi campestre, & chemi campestre est leuiticum, & sic est secundum ueritatem.

Adib. i. lupus: similiter Auic. habet hepatis adib. Quidā scribunt apip. inde hepatis adib. i. lupi. Halybas loco eius habet hepatis lupi, quod idem est: oportet antequā administrēt in medicinis, optime lauēt uino albo odorifero, & bene mundet ab omnibus stupefactionibus: deinde excutatur & inuoluatur cum absinthio, & ad usum referuetur.

Reperitur quædam herba dicta adhil, quā Mef. in ca. de ægri tudinibus oculorum laudat, & est eufragia: s̄m Matt. Sylua. Ioan. autem Anglicus in ca. de debilitate uisus, & cæcitate accidēti inquit. Herba adhilis, est herba lupi in terficiens eum, & est satyrion. Ipsa. n. s̄m omnem modum administrationis eius est subtilis in confortatione uisus secundum aliquos est herba eufragiæ, & utraq; est bona, Verum ex meo iudicio herba adhil magis potest dici esse eufragia quam satyrion, quia in illa materia magis ualeat;

APPENDIX.

Athanasia, immortalis nempe antidoti (ultra Arabum placita) Græcorum permixta non pauca memoriæ mandā rūt inter quos Aegineta, ac Aetius maxime occurrūt, quā quam plurimum ab Arabica schola distēt, modo inuicem comparant: uerum Græcis sūx etiam uires probe cernūtur, uti ex eorum descriptionibus iam eligere quisque facillime poterit.

Aeginetæ ex Oribasio, lib. vii. cap. xi.

Cassia, 3. viii.	Opī,
Spicæ nardi,	Styracis,
Amomi,	Myrrhæ,
Croci,	Coffia, ana. 3. iiii.

Mellis despumati, quod satis est.

Aetii, ex Aegyptiorum inuentione, lib. xiii. cap. CV.

Croci,	Coffi,
Spicæ nardi,	Fœnugræci,
Folii malabathri,	Glycyrrhizæ,
Radici eupatorii,	Cassia,
Petroclini,	Opī,
Styracis,	sing. æquales partes.

Miscendi ratio uaria; iuxta multiplicem morborum cōplicationem cernitur: quamobrem sic pure seruetur.

Galenus in super athanasia Antidoti in Sanitatis Tusæ ac Methodi Medendi libris passim meminit, eā theriacæ comparans, sed non describit: uerum abunde in secūdo antidotorum Michridatis, athanasiam ab aliis longe diuersam explicat: cuius compositionē inde studiosi petant, quā de industria nunc omittere placuit.

LV.
DIASULPHVR.

℞. Piperis Albi,
Longi,

ana. 3. vi.
Sulphuris citrini,
Thuris,
Meu,
Hyofcyami albi,
Myrrhæ,

* Cordumeni,
Styracis, ana. 3. viii.
Rutæ,
Coffi, ana. 3. vi.
Mandragoræ,
Opī, ana. 3. iiii.
Croci, 3. ii. s.
Cassia, 3. vi.

* al. Carda
moni.

Conficæ cum melle despumato, & utere post sex menses.

COMME. N. MANLI.

Hæc descriptio diasulphur apud nos nō est ualde in usu, Aui. in .5. can. habet unam aliam descriptionem quæ uel esse eadem. Sulphur citrinum est satis notū: reperitur uero diasulphur quod a multis lapis sulphuris dicitur, siue sulphur uiuum, siue theon apyrō. i. quasi sine igne: inde theapiron. i. sulphur, Papias dicit: Sulphur dictum, quia igne accendit ignis enim est. nam uis eius in aquis feruentibus sentit, neque alia res facilius accendit. Fulgur quoque sulphuris odorem habet, & lux ipsa sulphurea est. Nascitur autē in insulis Eoliis inter Siciliam & Italiam &c. post iterū ait: Sulphur dicitur quasi soli pyr. i. terræ ignis.

APPENDIX.

Utra alias, unam habet nec multū absumit Diathema, hoc est, e sulphure, descriptionē actuarii, hæc perpulchre continens.

Sulphuris ignem non ex-	Coffi, sextulæ, decē, idest. 3.
perti,	xl.
Cardamomi,	Cassia, sextans. i. 5. ii.
Styracis,	Libyfici, 3. i.
Apollinaris herbæ,	Croci,
Rutæ,	Piperis,
Myrrhæ,	singulæ sextulæ quatuor, idest.
Singulorum sextulæ octo. i.	3. xvi.
3. xxii.	

Mellis quantum sufficit.

LVI.

E STYRACE, uulgo de Storace.

℞. Syracis liquidi,
Opī,
Alari,
Semini hyofcyami albi,
Castorei,

Croci,
Myrrhæ,
* Olibani,
ana partes æquales,

* i. Thu-
ris.

Mellis quantum sufficit.

COMME. N. MANLI.

Hæc cōfectio apud nos nō est ualde in usu, Rasis in .9. Alman. in cap. de fluxu uentris, describit unam descriptionem quæ est eadem, nisi in una re uidelicet quod Mefues habet crocum, Rasis non in reliquis concordat.

Styrax, uel Storax liquida s̄m Io. Sera. in suo antidotario in cōfectione dicta kes, est mel storacis calamitæ. Species uero storacis tres sunt. i. storax calamita, siue lubæ & muscata; & ista est illa quæ intelligitur quā absolute ponit & est storax liquida dicta figia, & ista s̄m quosdam fit ex fructu qui nascitur in arbore: lubæ exprimitur, & est storax liquida, & est storax rubea dicta apud quosdam cozi-brum uel thus ludæorum: & secundum quosdam omnes species ab una arbore nascuntur. De qua storace Nicola. ait: Storax est triplex, liquida, rubea, & calamita, & omnes sunt gummi de quadam arbore.

LVII.

HIERA PICRA, Galeni.

℞. Cinnamomi,
Mastiche,
Alari,
Spicæ nardi,
Carpobalsami,

Croci,
Xyloaloes,
Cassia,
ana partes æquales.

Et quidam addiderunt storum squinantia, partem unam & quidam addiderunt absinthium, & alii alia. Aloes autē fit duplum ponderis omnium.

COMMENTA. MANLII.

Hiera. i. sacra picra. i. amara. inde hiera picra. i. confectio amara, sacra fm intentionem Mef. ex autoritate Gale. & sic est, q Gale. composuit ipsum, & describit ipsum in trac. 2. m. emir. in c. de dolore capitis qui a stomacho fit. Aui. in 5. can. habet unam aliam descriptionem, & est similis huic & ibi inquit: Hæc est hiera aloes, & afficiatur ei cinnamomo propter subtilitatem suam & inuamētum, quod facit ulcibus & stomacho: & malix similiter ut conseruet: et similiter casia & crocus propter digestionē & confortatio nē cordis & stomachi: & fortasse crocus facit incurrere in eadoleorem capitis: quare oportet ut minores pōtus eius aut expellatur. & asfarum: qm inest ei adiutoriū ad solutio nem faciendam & pcpitationem humiditatum: & qñ ponunt loco eius cubebe, & sunt subtiles, & carpopallamus & xyloballamus propter confortationem stomachi & resolutionem albezararati. Et de hominibus sunt quidā qui ponunt in ea florem squinantique phibet rasurā quæ ti met ex aloë & rosas, ut expellat maliciā caliditatis aloes a stomacho & a capite. Mef. in sua descriptione nō habet xyloballamū, Aui. uero habet. Et Aui. nō habet xyloaloes. i. lignū aloes, Mef. uero habet: tu uero uides q Mef. uult q ingrediatur xyloaloes, & nō xyloballamum. Auicenn. est contrarius. Gal. compositor nō habet xyloaloes, sed loco eius habet xyloballamum, ut habet Auicenn. est Gale. magis laudat xyloballamum, q xyloaloes, debetis ponere. Genti lis super. 5. Aui. ait: Intelligentiā qñ q hiera de aloë intel ligitur, quia principalis medicina qñ ponit ē aloes &c.

Aloë fm līd. est succus herbæ amarissimæ panacæ. Mef. in c. de aloë inquit, q unum est quod fit in Succuri regio ne, aliud in Persia, aliud in Armenia, aliud in Arabia, & melius ex eis est succocitrinū: post illud Persicū, & illud fm est hepaticum, deinde Armenium, & deterius est Arabicū & istud apud quosdam est caballinum: & dicitur q est fex aliorum. Moderni uero cōmūter utuntur hepatico pro meliori. Sed Mef. & alii auctores magis laudat succocitrinū, q hepaticū. Species uero aloes fm Mef. sunt tres uel qua tuor, & similiter ponit Aui. sed Dios. & Sera. non ponunt nisi duas species: sed fm multos, spēs alios sunt tres. uide licet succocitrinum dictū ab illa provincia sit nominata. He paticum, quia in colore suo assimilatur hepati: & istæ duæ species sunt nobiliores aliis. Et est aliud quod dicit cabal linum: & istud est fex aliorum, & est deterius in medicina Mef. de forma ipsius herbæ nō describit, sed uidet apud Dio. & ibi reperies, & hæc herba uocatur zaabera. Et de modo faciēdi ipsum docet Albucaſis in tra. 2. de pparatio ne medicinarū quæ sunt ex plātis. Sera. laudat illud aloes quod est glutinolum, nō habes in fe lapides: splendidū ad rubedinē declinans: cito frangibile & fortiter amarū qua si in fine ponit modum faciēdi hieræ picræ, sicut habet Ga lenus. Mefus inquit q illa medicina in qua pijcitur aloes confortantior est: & si nō lotus illa efficitur plus solutius, et minus confortatiua, Nico. Floren. in lib. 5. in trac. 4. in c. de complexione stomachi nō pura, in generali cum matē ria inquit in prædicta confectioe. Et dixit Gal. aloë lotū efficacius est ad confortandum stomachum, sed non lotū efficacius est ad purgādum ipsum, & dicit. Si hiera picra data fuerit ad purgādum stomachum tempore cōgruo, est efficacior omnibus aliis: ita tamen q patēs ambulet post potum eius moderate, & permuet aliquid in mensa regimi nis eius, & dixit: Nō debet picra distemperari cū mel le confortatio, & corroboratio quam facit in stomacho cū melle, siet minoris effectus. Hiera quidē hæc uocat hiera Gal. simpliciter, & a quibsdā uocatur hiera de octo reb. & est illa de qua intelligitur cum absolute ponitur. Cuius descriptio reperitur duplex, una cū aloë loto, alia cū aloë non loto. Nic. autem dicit q ista descriptio hieræ uocatur a quibsdā hiera de octo rebus, in hac nescio quid dicā. Nam Gal. compositor istius confectiois in ca. nominato inquit sic: Pessima autē fit dispositio in prauis humoribus imbibitis abiectis in tuncis uentris, quorū optimum auxilium est id quod per aloë pharmacum, quod uocant qui

dam picram. alii aut hieram quæ per aloem, & ponunt qui dem centum. 3. aloes. vi. uero de unoquoq aliorum, quæ ibi miscetur, quæ sunt numero sex. i. cinnamomū, spica, xy loballamum, malix, asfarus, & crocus. Vide ergo q Mef. Aui. Nico. & alii ponunt in pēdicta cōfectione octo res ad numerum sine aloë: & Gal. non ponit nisi sex. Vere credo q sit error scriptoris. Scias q de pēdictis speciebus possunt fieri, & sūt pilulæ, quæ dicunt de hiera simplici, uel de hiera Gal. & etiam fit confectio hieræ Gal. quæ conficitur cū melle in modū electuarii. Reperitur alia hiera, quæ dicitur hiera magna, & ista reperit in antidotario Nicol. sicut in fra ostendam. Scēdum intentionem Nico. aloë debet esse lotus in ista descriptione, sed in alia non. & modus ablu tionis eius fit multipliciter. Nā quidā lauāt ipsum cū aqua endiuiz, alii cū aqua pluuiālī, sed melius est lauare ipsum ut docet Bulchah in tra. 2. ubi sic ait: Modus ablu tionis aloë, seu pparationis ad expellendam maliciā et acuitatē eius, & confortandi ipsum. &c. de aloë succocitrino mundo, q cito frangitur, & habet colorem hepatis, & cuius odor est bonus, pondus libræ unius, tere bene & cribra: deinde accipe casia lignæ, spica nardi, asfari, squinanti, carpo balsami, xyloballami, cinnamomi, ligni aloë, croci, masti cis, iaccæ, ana. 3. iiii. contunde, & coq: ut ipse docet in fine eius cap. ubi ait: Et utere eo. f. aloë in medicinis laxatiuis & speciebus hieræ, & aliis medicinis in quib. aloë ingre ditur. Item Ser. in ca. de aloë, quasi in fine ait: & quado ali quis uult illum sumere, misceat ipsum cum mallice, aut abluat ipsum cum aqua specierum, sicut spicæ, mallicis, affa ris, sicut dicit Bulchah. Dominus Mef. in descriptione pilu larum de aromatibus, etiam de modo abluēdi aloem ostē dit: sed scēdum ipsum administratur in prædictis pilulis.

Sed ut melius dicitur de compōne hieræ simplici fides adhibetur, describam quæ a Sera. in suo antidotario dicitur, & dicit: Permisceatur hæc hiera fm tres modos. Quidā enim cōponunt eam fm q composuit eam Adromachus ponentes secundū oēs centum aureos ex aloë, sex aureos ex unaquaq aliarum medicinarum, quas proiciunt in eā: et medicinz quidem reliquæ sunt etiam sex. i. cinnamomū xyloballamum, asfarum, spica, crocus, & mastix. Et in libr. de cōseruatione fanitatis Gal. loco xyloballami carpopal lamum ponit. Hæc est ergo hiera picra quam fecerūt om nes homines Komæ: & Adromachus quidē addidit istis sex medicinis, medicinā aliam septimam, & est cuius squi nantia: & proiciebat oleum postquam ipsum: & reliquorū quidam fuerunt, qui proiciebant ipsum ablutum, & quidā qui nō abluēbat ipsum: & oportet ut sciamus nos q aloes qui non ablutur est conuenientior in solutioe uentris: q est quia est plus solutius, & minus confortatiuus stomachi & ablutus est ecōtrario illius: q est, quia est minoris acui tatis, & calefactiois illo propter illud. propter illud est er go minoris mūdificationis, & plus confortatiuus, & cōfor tat stomachū proprie aloë humilifidū. Medicus enim cōn fortasse ipsum in dando eum ei qui habet febrem, & nō oportet ēt quādo est febris acuta, ut detur, immo, quando est debilis ualde: q est quia aloes quāuis ablutus sit, tamen est contrarius ei qui habet maliciā cōplexionis calidæ, i. cēs, abq: humiditatis malis: & etiam ergo permisceo cū hac medicina duas medicinas alias, & multiplico ita ea rum quantitatē medicinarū calefacientiarum, & in altera minore ex eis. Multitudo autem quātitatē earum, est qñ minimius ex quantitate aloes, donec nos proiciamus sup lxxx. aureos aloes ex unaquaq medicinarum reliquarum sex aureos aloes: & minimius ex quantitate earū, quādo multiplicamus quantitatē aloes, & addimus super eam xl. aureos: donec nos proiciamus sup. cxxx. aureos ex aloë sex aureos ex unaquaq reliquarum medicinarum: et illa quæ permisceatur secundum centū aureos aloes, est equata inter illam in qua cadunt lxxx. & inter illam in qua cadūt cētum, & uiginti. Et oportet ut scias etiā quod illa in qua cadunt ex aloë. cxx. aurei uehementius soluit uētre, quā illa in cuius permixtione cadūt lxxx. aurei, & illa in cuius permixtione cadunt C. aurei est media inter utraqque, ui

de suis perambulis ad longum in eodem Serap. loco iam allegato lib.iii.ca.xvii.lib.7.ca.8.De medica.comp.5.cano. lib.10.pract.in antidotario.

APPENDIX.

Græcorum Aetius, Aegineta, atq; Actuarius: Arabum uero Auic. Haly. ac Mesues hanc Galeni ex hiera picra compositionem ab autoris instituto longe diuersam tradiderunt ut mox (fi conferantur) clarius è Galeno fiet, at cū tribus præsertim in locis illa nõ intelligenter perscribatur, rem inde summam per loca colligemus, ut planius, quicquid Gale. sibi uoluerit, studiosi intelligant.

E VII. Methodi Medendi. Cap. xi.

Aloem expedit paratâ habere, quam oēs Medici picram idest, amaram uocant; atq; hanc dupliciter confectam, utiq; ex aloë elotâ, & non elotâ: cui probe hæc admiscetur.

Cinnamomi, Mastiche chiz,
Xylobalsami, Croci, ana. 3. vi.
Alari, Aloës, 3. c.

Spice nardi,

Ex aqua præsertim ad succos uentriculi uitiosos paratur sunt uero qui reponunt medicamentum, excipientes id depumatum melle: & fit quidè ita durabilis, ut a uentriculum minus roborat, & magis aluum deicit.

E VI. Sanitatis tuendæ.

Aloë pituitosis haud ualde conducit, quoniam ei biliosi trahendi humoris facultas insit, eoq; excogitata salubriter est compositio, quam picram uocant, quæ acrimonia caloreq; eorum quæ in se habet, crassos, & lentos succos dissectat, ac deterget: cuius generis cinnamomum est. In totum ergo ad aloës drachmas centum, reliquorum cuiusq; coniciuntur drachmæ sex: quæ ipsâ quoq; sex sunt: atq; hæc est picra quâ Romæ oēs præparant. Ego uero etiam alias duas cõpono: atque in altera eorum quæ calefaciunt plus, in altera minus conicio. At plus quidem reliquorum immiscebimus, si de aloës solius pondere detraxerimus sic:

Cinnamomi, Mastiche chiz,
Xylobalsami, Croci, ana. 3. vi.
Alari, Aloës, 3. lxxx.
Spice nardi,

Minus uero, quum aloës modum augebimus,

Viginti drachmis adiectis, sic.

Cinnamomi, Mastiche chiz,
Xylobalsami, Croci, ana. 3. vi.
Alari, Aloës, 3. cxx.
Spice nardi,

Minime uero latet, & q; in penuria cinnamomi, ponendum pro eo fit optimæ cassiæ duplum, quam alias ea esse uirtute nonnulli putant, ut nihil ab inualido cinnamomo abste: nã generoso, etiam talis cassia longe superat. Verũ sicut in boni panis inopia, uel uilissimum uescimur: sic in cinnamomi penuria, exquisitissima utemur cassia.

E II. De Medicamentorum compositione per Loca. Cap. I.

Ad uiciosos humores in uetris tunicas inelubiter imbibito, optimum remedium est ex aloë pharmacum: quod ali qui picram, hoc est amarum, aliqui hierâ, i. facrũ ex aloë appellat. Inq; eius compositionem aloës drachmas cẽtum coniciunt, & sex uniuicuiusq; reliquorũ, quorum etiam sex numero existunt Cinnamomũ, spice nardi, xylobalsami, mastiche chia, alari, crocus. Præstantius autem fit pharmacum, ubi minus de aloë addit. Visum nãq; mihi est, nimiam eius copiam centum drachmas esse, ad proportionẽ reliquorũ qui bus hæc addunt: quapropter etiam per .xc. drachmas ipsum cõponi, & per .lxxx. quin & per pauciorẽ aliquando cõponi, propterea quod quidã ex eius usu capite ledantur, q; ipsum expe ex solo croci odore perperimur. Quare optima erit compositio, quæ ex aloës drach. xc. & croci drach. v. cõstat, hæc ego uxor. His uero qui neq; croci odore citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis pharmacum compono. In sussis, homacho affectis, aluo astricta, ac mensuris suppressis maiorem efficaciam habet, ubi aloës drach. lxxx. & croci .vi. fuerint com-

missæ. Præstat autẽ & carpesium pro asaro conicere, quãquam etiam utriq; coniectis aliquando composuerim. Plurimi autem ad pharmacã (uti. viii. de compo. medicament. per loca. cap. 2. etiam testatur) quæ aloë miscetur, florem iuncti odorati apponunt.

LVIII.

HIERA Hermetis, uulgo Hierâ Lus.

R. Aloës .3. i. Bdellii,
Trochiscorum Alandahal, Hellebori nigri,
aur. viiij. uel .3. i. s. Euphorbiũ,
Turbieth, Alari,
Agarici, Cassiæ lignæ,
* Lus utriusq; siccæ, Salis Indi,
Ireos, Castorei,
Crocii,
Myrobalanorum, Chebulorum .
lanorum, Indorum, *
† Serapini. ana. 3. i. s. * Seminis Mezereon,
Zingiberis, † Cheisim,
Cinnamomi, Stœdacos, ana. 3. i.
Masticis, Scyllæ assatæ, 3. ii. s.
Scammonæ bonæ, 3. ii.

*.i. dracũ-
culi utriusq;
que sicci.
†.i. sagapẽ-
ni.
*.i. ligulati
ci.
†.i. coi. ci-
guidii.

Fiat omnium contritio bona, gummi autem ponant in uino odorifero, & inuoluat puluis in succo cucumeris asinini, quãtitate quæ bene inuoluat, & excicet: iterum denou inuoluat in prædicto succo, & pauco oleo nucum, & iterũ siccet: & conficiat potum cũ melle depumato quãtitate quæ fiat totum sicut pasta, & detur post sex menses.

COMMENTA. MAN LII.

Hiera Hermetis fm intentionem Mes. est hiera lus. Hermetis autem dicitur a compositore. Auic. in 5. c. cano. habet duas descriptiones confectionis: quæ nominatur confectio Hermetis: sed non concordant cum illa Mes. illa uero Mes. est illa quæ utimur.

Troch. Alandahal. i. trochisci de colloquintida. Nam Arabes uocant handal colloquintida. Descriptio ipsius reperit apud Mes. in distinctione de trochiscis, & ibi ait: Trochiscorum alandahal qui ponuntur in hiera Hermetis, & in aliis confectionibus loco colloquintidæ, ut infra erit sermo.

Turbieth fm Mesue est radix herbe: cuius folia sunt sicut folia ferulæ, minora tamen, & est ex habentibus lac, & est ex eo syluestre & domesticum, & ex eo est illud magnum & paruum & adhuc ex eo aliud albu, aliud citrinu, aliud nigrũ: sed melius est illud quod sit albu & uacuum, harundinosum & gummosum, & sit cortex eius cineritius & plauus: & sit recens & facile frangibilis: citrinum est malum.

Agaricus fm Diosc. est radix sitis laferpitio. i. radici aniden, siue arboris affixæ foetide, sed non est sic dura. Agarici genera sunt duo, masculus & femina. Masculus rotundus est, & in se collectus & maior. Femina uero pectini similis est, quo capilli discernunt &c. & ille qui est albus & lenis, & uelociter frangibilis, & porosus & rarus ualde, & ut appareat dulcis in primo gustu eius, deinde succedat ei amaritudo, ista est femina, ut dicit Mes. &c.

Lus utriusq; .i. lus maioris & minoris. Mes. de lus capitulum facit, & dicit q; est serpentaria, & est planta quæ dicit collum draconis, & ex ea alia est planta habens folia, alia crispâ. Electio, melior pars totius plantæ est radix, & melior radix est grossa completa & orta in locis liberis, & melius tẽpus collectionis ipsius est uer & principium æstatis Diosc. facit unum cap. de Aaron. i. dragontea minora, uel pẽs uiculi, uel barba Aaron: aliud cap. facit de dragontea, & ista est serpentaria maior, siue colubrina, siue uiperina, siue bisaria: & hæc ambę sunt notę: & in hortis reperiuntur. Petr. de Crescentis in cap. de serpentaria ait: Radix eius per frustra minuta diuiditur: & ficcatur, & puluerizatur, & per pannum cribellatur & conseruatur.

Ireos secundum Auic. est radix lilii coelestis: quę fatis est nota.

Serapinum fm Mes. est gummi alacæ hundeg, & est arbor similis oleidro mótano, & melius est cuius uitra subtrahatur & subalbidu est, & quod habet odorem porrorum: & quod est facile resolubile in aqua, & quod est clarum.

Lumi. Ma.

C

Euphorbium secundum Aui. est gummi calidū cuius uir-
tus alterat post tres aut quatuor annos . Circa instans in
cap. de euphorbio ait: Eligendum quoque est grossum & cla-
rum & purum & lucidum in substantia, in colore citrinum
& per decem annos seruatur .

Sal indus secundum Aui. in .x. cano. est sal niger, non ni-
grede nāplicitatis quæ sit in ipso, sed propter substantiā
ipsius, & marinus quidem cum aqua obuiat ilico liquefit,
& non est ita terrenus. Mes. in c. de speciebus salis dicit: Sa-
lis indi alius subniger, alius subrufus, & obscurus ē. Ser. in
cap. de baurach de ipso loquitur Matt. Syl. dicit: Sal indus
est i colore salis & dulcedine mellis, ut Aui. in .4. can. Fē. i.
de asperitate linguæ. Et est zuchcharum quod inuenitur coa-
gulatū super cannam mellis in India sicut sal: loco eius po-
nitur zuchcharum candidum. Aui. autem in .4. can. in cap. al
legato: ex autoritate Mat. Syl. non ita dicit ino ait: aut sal
tem quia asportantur de India, & sunt in colore salis, & dul-
cedine mellis. per ista uerba nō possumus intelligere, si sal
est zuchcharū candidum, ut uult Mat. Syl. Verum multi mo-
dernorum sunt qui in loco salis indi ponunt zuchcharum cā-
didum: etiam sunt qui ponunt sal panis qui est species eius.
& dixerunt sapientes qd est melius ponere sal ruberū, seu sal
panis, quam zuchcharum candidum uel candum .

Mezereon. f. semen ipsius quod appellatur cocognidium
Diof. in c. de chameleaza. i. mezereon dicit: Chamelea aut
cocognidium non est semen laureola: ut dicit Circa instans
in c. de laureola. Ser. de laureola loquitur in cap. de lauro.
Alexander in c. de hydropis inquit: Chamelea unde coco-
gnidi colligitur, & est lacticinū folia oliuæ habens: & sic
est. Et propter id apud multos herbatikos uocatur herba
oliuella, propter similitudinem foliorum ipsius .

Stœcadus, uel sticados fm Mes. laudat sticados Arabicū
& melior pars plantæ eius est flos, post hunc flos .

Scylla, seu squilla fm Aui. est coepe muris: eo qd interfi-
cit mures. Mes. in cap. de squilla docet modum præparatio-
nis eius in assatione: & est ut accipiantur lamina ipsius, &
separatim inuoluunt in pasta, et sepeliuntur in cinere calido,
donec coquantur sufficiens: postea extrahant ex pasta, &
admisistrent ubi oportet. Modus assationis ipsius:
ponat in uase luteo uitreato stridit officii, & sigillat lica-
tione forti cū pergameno, & dimittat diebus .xl. & proprie
diebus maioris estus, & moueat in uis, & mouetur uicissim
omni hora, ita qd æqualiter in singulis partibus calefiat: de
inde extrahat squilla, & admistret ubi oportet. Albucasi-
as aut in lib. a. de Præparatione medicinarū inquit: Modus
præparandi squilla in omnibus modis præparationis eius,
& est coepe muris: & primo de modo affandi squillam: uide
ibi qd eius modus est ut faciant moderni .

Scammonia secundum Mes. est solutium magnū. Et di-
xit Democritus, quod est solutiuū antonastice, & qd est
genus solutiuorum, & generale est super omnia solutiuā.
Planta uero ipsius, ut dicit Mes. est species uolubilis. Et di-
cit quod uocatur dominus lacticiniorum, laudatur antio-
chena & armena .

Cucumer aspinus est fructus, sicut cucumer paruus, &
melior pars plantæ eius est fructus ipsius, & proprie eius
cōpleti succus & post ipsum radix: & melior fructus eius
est completus citrinus, iā expoliatus a uiriditate, & qui est
ueræ amaritudinis: & melius tempus opationis succi eius
est finis æstatis, & collectionis radicis eius est finis ueris,
& modus opationis succi eius, ut docet ibi Mes. ille est .x.
ex succo eorum quantitate in quam uolueris, & proprie qd
citirene sunt, & sunt maturitatis completæ, & fiat extractio
succi cum facilitate, non cum compressione & expressione
laboriosa, & excietur ut excicatur scammonia & aloes .

LIX.

HIERA Archigenis, descriptio uniuersali .

Rx. Pulpæ colocynthi-
dos, .3. ii.
Praisii,
Stœcadus,
Ellebori nigri,
Chamedryos,
Scammonæ,
Leucopiperis,

Macropiperis, ana. 3. ii.
† Coepe muris affat,
Euphorbii,
Aloes,
† Croci,
Gentianæ,
Petroselinii,
Hammoniaci,
Oppopanacis, ana. 3. i.

Polii,
Cinnamomi,
Sagapeni,
Myrræ,
Spicæ nardi,
† Squinanti,
Calamenti montani,
Aristolochiæ rotundæ,
ana. 3. ii.

f. i. Scyllæ
affat.

* i. Scha-
nuthus.

Mellis quantum sufficit, & sit dosis aur. .iiii. cum decoctio-
ne epithymi, & uuarum passulorum mundatarum .

COMMENT. MANLI.

Confectio hierz archigenis descriptio uniuersali, nō
est in usu Aui. in .5. cā. inquit: Descriptio uniuersalis hierz.
Archigenis, si legis ambas descriptiones sunt idem. Archi-
genes autem est compositor istius confectionis, de quo Pa-
pias ait: Archigenes est princeps medicorū. simplicia uero
quæ in ipsa ingrediuntur, declarabo si declarata non sunt .

Prasium. i. marrubium album, sed prasiū est porrum. Dio-
sc. de ipso duo facit cap. unum quod incipit marrubium,
quod Græci, prasium uocant, propter amaritudinem, aliud
ca. fact. de prasio, quod idem est hoc: est satis notū Papias
ait: Piolopes herba quæ a Græcis prasiū uocatur, a latinis
uero marrubium dicitur .

Chamedrys fm Aui. est quercus terræ, quæ habet folia
parua, similia foliis quercus. Gulielmus Placentinus dicit:
Quercus terræ, uel quercula minor, est chamedrys, hæc a
Lombardis uulgo calamandrina uocatur .

Armoniacum, siue hāmōnium fm Serap. ex authorita-
te Diof. est gummi plantæ similis plantæ galbani in figura
sua: nascitur in dicta terra a rege minoris & est in partibus
Codi, & dñ herba eius græce alios. Huius radix uulneratur,
& egrediuntur lachrymæ, quæ colliguntur & seruantur .

Opopanax fm Diof. succus est herbæ quæ panax dicitur
secundum Mes. est gummi plantæ cuiusdam similis ferulæ:
apud Auer. in .5. col. appellatur inhauf .

Polii, polii montani. Circa instans dicit: Polii montani
diuerfa sunt genera: unde quando simpliciter ponitur mon-
tanū debet poni cū flores producti debent colligi: & per an-
num secuat. Apud Aui. in .x. can. Polium est species fce. i.
santonci, in qua est caliditas & acuitas pauca . Auer. in .7.
col. dicit: Sedes. i. polium. Polium montanum .

LX.

HIERA Archigenis descriptio Pauli .

Rx. Prasisii,
Agarici,
Camædryos,
Pulpæ colocynthidos,
Stœcadus, ana. aur. .iiii.
Opopanacis,
Sagapeni,
Petroselinii,
Aristolochiæ rotundæ,
Piperis albi, ana. aur. v.
Cinnamomi,
Spicæ,
Polii,
Croci ana. aur. .iiii.

Tere ex medicinis quæ sicca sunt, & gummi conuassato,
& infunde in melle, & permisce, & sit dosis aur. .iiii. cum sa-
lis tritici pondere .3. i. cum aqua mellis .

COMMENT. MANLI.

Hiera Archigenis descriptio Pauli nō est in usu. Aui.
in quinto cano. habet unam descriptionem, quæ est eadem
cum illa Mesue .

APPENDIX.

Longū esset ostendere quærit eā e. vii. cap. viii. desumptam
genuina distetantur facit eā e. vii. cap. viii. desumptam
subscribere: unde hoc nimirum planius apparebit .

ARCHIGENIS HIERA.

Marrubii,
Agarici,
Trisaginis,
Colocynthidis medullæ,
Stœcadis,
singulorum 3. x.
Aristolochiæ rotundæ,
Piperis albi,
uniuicuiusq; drach. v.
Cinnamomi,
Spicæ nardi,
Myrræ,
Polii,
Croci,
cuiuslibet drach. .iiii.

Arida

* aliqui li-
bri het. j.
xxii. alii
unc. ii.

Arida simul cōtunde, & attamina. Succus uero panacis, acq; sagapenum, myrrha; contusa, melicrato in pila pnoctē macerato deinde leuigato, atq; in iuce arida, & assumpto melle optimo, in uitreo, aut plumbeo uase recondito. Hic sane modus omnibus hieris cōis ē. Exhibito integra 3. iiii. Mellis hārmiz dux, aqua quātum facis est. Quod si ad purgandum efficaciores, quæ scammonia carent reddere animus est, admisceatur & his singulis, singuli ipsius oboli.

LXI.

HIERA Diacoloquintidos Rufi.

Rx. Stoechados, Piperis albi, ana. 3. v.
Agarici, Calsiz, 3. vii.
Chamedryos, ana. 3. x.
Colocynthidos, 3. xx.
Sagapeni,
Opopanacis, ana. 3. viii.
Petrofelini,
Anistoloche rotundæ,

* alii-
gē Colo-
chydus, tro-
chiscorū
alidahal.
an. 3. xxv.

Myrrham uino infunde, cętera tere, & melle despumato excipe.

COMMEN. MANLII.

Hiera diacoloquintidos inuentio Raf. non est in usu. Mefues dicit q̄ est ex inuentio Rafis: sed ego nunquam uidi apud Rafim: sed in antidotario uniuersali est scripta una descriptio.

Colocinche, seu coloiuicida secundum Mef. est quam Perfes cucurbitam deserti uocant etiam sel terræ appellatur eo q̄ in totō ambitu ortus eius interficie herbas, & est sicut uenenum eis. Mef. inquit: Colocynthidos bonæ. postea ait in loco coloiuicidæ troch. alandæ. & sic est q̄ in omnibus locis, ubi ingreditur coloiuicida, poni debent troch. alandæ. Et si queratur si coloiuicida debet poni in medicinis grosso modo contrita, aut subtiliter puluerizata uide Mef. in suo cap. ubi inquit ex autoritate filii Zezari. Non oportet enim ut multum cōteratur: ultima enim puluerizatio eius exoritur uias & uenas. Et dixit filius Serap. Oportet ut non perueniat ad ultimum puluerizationis eius aliter enim ulcerat uiscera Mef. dicit ex autoritate filii Sera. q̄ oportet ut non perueniat ad ultimum puluerizationis eius, aliter ulcerat uiscera. Vide Serap. in capit. de coloiuicida quasi in fine qui dicit: Oportet quidem q̄ coloiuicida non teratur multū, ne adhæreat intestinis ulcerando &c. Mefues iterum inquit: Et mihi uidetur q̄ in ultimo puluerizata confringitur uirtus a permixtione adiutorum eius, & perfrāit loca uiscerum absq; impressione nocuementorum in ipsis, & forsitan in ea in qua non exquisita sit illius pars sensata grossa ex ea adhærens in uis & inuolutionibus apostematibus, & ulcerat loca. Trita uero ultima contritione non operat illud. Modus tamen rectificationis eius fin Mef. est, ut incidatur minutissime cum incisorio & inuolatur subtili inuolutione cum glutino dragagari, aut bōelli, & excutetur, & cōterat post illud ultima cōtritione, & sicut trochici cū pauco melle resoluti in oleo rosa to, uel cū ladano, uel cū aqua mellis: hæc enim ars eam facit sine molestia. Et scias quod de decoctione rem completam & hoc modo corrigendo coloiuicida rectificantur quatuor nocuēta, quæ ut plurimum reperiuntur in ea corrigibilia quæ sunt, quia nocet stomacho, cordi, & hepati, & est cōtributua, subuersua uisceris, faciens operationes difficiles, & aperit orificia uenari apertione sanguinem fluere faciente, & operatur illud uehementius q̄ aloë, & uelocius.

APPENDIX.

Velis (q̄ aiunt) ad remissum nostrum ut hoc Lumen prorsus ad hæc usq; tpa obcecatū, sole clarius hincinde splendet, cū opus fuerit, passim conabimur. Quare nō hiera diacoloquintidos Rafis, at hiera diacoloquintidos Rufi, Ephesi nempe, hæc cōpositio rectius inscribitur nec amplius apud Rafim illam unam cum olim obtenebatur lumine, studiosi querunt: uerum sacra Græcorum monumenta uolunt, unde illius inuentū pfacile apparebit: maxime apud Actua

rium, Aeginetæ, atq; Actium, ut interim Galenum silentio inuoluam. At cū Aetius li. iiii. cap. cxv. magis ad Mef. (præsertim ponderibus) accedere uideatur, iam eius descriptio nem hic subtexere non grauabor.

Hiera Rufi.

Medullæ colocynthidis, sextantem, & unciz dimidium.

Chamæpytyos, Aristolochiz rotundæ,
Chamædrios, Piperis albi,
singulorum, 3. x. singulorum, 3. v.
Calsiz, 3. v. Cinnamomi,
Agarici, } utriusq; 3. x. Spicæ nardi,
Marrubii, } Croci,
Opopanacis, 3. i. Myrrhæ trogloditis,
Sagapeni, Polii,
Petrofelini, singulorum, 3. iiii.
Excipe melle, & exhibe 3. iiii. perfectam dosim cum aqua multa, & sale.

LXII.

HIERA Ex inuentioe nostra.

Rx. aloes boni, 3. xv. Mastiches,
Epithymi, Calsiz, ana. 3. vii.
Costi ana. 3. v. * Xyllobalfami, 3. iiii.
Euphorbii, * Albi,
Croci, Piperis Nigri,
Spicæ, Gentianæ,
Chamædrios, ana. 3. vi. Amomi, ana. 3. i.
Agarici, 3. ix. Scammoni in malo cydonio
Garyophyllorum, 3. ii. costi, 3. ii.
Calami aromatici, Mellis quantum sufficit.

COMMEN. MANLII.

Hiera ex inuentioe nostra non est in usu.

LXIII.

HIERA Constantini descriptioe Irani, uulgo Diaphracost, idest, Diamanna.

Rx. Alfracost boni, & recentis, 3. iiii.

Tamarindorum * cheiron, 3. vi.

Medullæ calsiz, 3. iiii.

Zucchari uiolati, 3. xvi.

Endiuiz, }
Apii, } ana. 3. iiii.
Succi, Malorū Dulcium, }
Acetorum, }
Muzorum, }
Acetofittatis citri,

Dissoluatur alfracost, & tamarindi, & calsia fistula, in liquoribus iam dictis, prius tamen depuratis: deinde cola, & munda a sordibus, & impuritatibus: deinde accipe.

Radici Endiuiz, } ana. 3. iiii.
Apii, }

Foliorum lupuli, } ana. 3. ii.

Capillorum ueneris, }

Prunorum ficeorum, numero c.

Violarum, 3. i. s.

Rosarum, 3. i.

Spicæ, 3. iiii.

Decoquantur hæc omnia in tribus libris aquæ fontis, usque ad libram. i. s. & proice in ea,

Zucchari tabazeth, lib. iiii.

Aceti boni, lib. i.

Et coq̄ ebullitione una: deinde proice super illud, cocturam priorem, & coque cum mellis habeat ipsi situdine: ultimo uero proice in medicamine,

Sandalici citrini, Melonis,
Rosarum, Sem. Cucumeris,
Spodii, Cucurbitæ,
Charabæ, Citrulli, ana. 3. iiii.

* Berberis, Ligni aloes, 3. iiii.
Cnabæ, 3. v.

Sem. Portulacæ, Camphoræ, 3. i.
Acetofæ,

Repone in uase uitreo: est enim medicamen nobile. Dat

ur zlatæ cum qua frigida ab 3. i. ad 3. ii.

C

* alii Xy-
lobal. 3.

† i. māg.
* i. imma-
turorum.

† alii 3.
i. iiii.

* i. oxya
cantiq.

SECTIO PRIMA

COMMEN. MANLII.

Hiera Constantini a Constantino compositore dicta, nō est in usu simplicia uero quz sunt declaranda declarabo.

Alfira cost, arias, xiracost, est spēs manne, aut ait Auicē. in 2. can. cap. de Manna. Nam ipse Auic. ait: Manna est omnis ros cadens super lapide aut arborem, & sit dulcis & coagulat sicut mel, & exicatur sicut gummi: quemadmodum terebinab & alfira cost, & mel a portatū de terra Cusura syluestri nos loco eius ponimus manna usuale.

Tamarindi fm Mes. sunt dactyli acetosi, & sunt ex fructibus palmarum syluestrium in India, ipsi quoq; sunt ex medicinis nobilioribus, in quibus non est excessus.

Cheiron aut est quāda p̄uincia ubi tamarindi & dactyli abundant. Mat. Syl. in litera heiron ait: Heirō uel cheirō est regio in qua antonomastice dactyli abundant. Ser. in c. de dactylis dicit ex auctoritate Abonij: Chairō est species dactylorū. Ego autem puto q̄ est differentia in literis. Nam Heirō est regio, & chairon scriptū per a. est quāda spēs dactylorum, ut dicit Ser. Mesus laudat nigros nō uerū nigredinis cū luciditate: & q̄ sunt teneri & mixti cū uillis: q̄ sunt sicut radices, & sunt recētes et pingues absq; desiccatione & sine cū dulcedine acerositatis paucē, ueri, puri & nō mixti & sunt ex adulteratoribus q̄ eos falsificat cū carne prunorū: sed de occultat fallaciā nigredo sine luciditate in ipsis: & quia sunt humorosiores, & quia in eis est odor & sapor prunorum. Auic. in 4. can. in Fen prima. in cap. regiminis sitis, eorum superflue dicit Almofofpat: & sunt tamarindi.

Cassia fistula. f. medulla uel pinguedo ipsius est satis notū uerum reperitur aliquando cassia fistula que potest capi pro cassia lignea. Circa instans de utraque cap. facit.

Zuccharum uiolarū siue conditū uiolatū est conditū q̄ fit ex tribus partibus zucchari, & una parte uiolarū: de quo infra in tract. de conditis ostendā. Deus uoluerit.

Endiuia nomē latinum est: post græcū intybum. Arabes ē post Græcū, hundebe. Secundū Circa instāns endiuia est sca riola. Per. de Crescē. dicit: endiuia q̄ alio nōe dicitur sca riola uel laſuca agreſtis. Verū moderni diſtinguūt per alia nomē. Nā aliud est endiuia, aliud est ſcariola: aliud cicorea, aliud est taraxacō: quauis una p̄ alia poſt poni, ut infra ap̄parebit in ſyrupo de cicorea fm Nic. Flo. & ibi ſi Deus uoluerit ostendā species endiuie, uel cicoreæ, uel ſcariolæ, quæ sunt ad numerum ſeptem. Endiuia uero ſatis eſt nota.

Malum, fm Iſid. in ca. de propriis nobis arborum inquit, Malū a Græcis dictū, q̄ fit fructus eius pomorum oīum rotundisſimus: unde & hæc ſunt uera mala, q̄ uehementer roſtū da ſunt. Meſus dicit: Succ malorum f. pomorum granarum, ut dicunt quidā ſapientes: Acetorum. f. in ſapore, & mazorū. i. ſaporis compositi ex dulcedine & acetoſo.

Lupulus fm Meſum ſpecies uulubilis, & eſt habēs folia ſiſia foliis, citruli: cuius ſtos eſt ſicut ſunt ampulæ adhærentes ſimul. Petrus de Creſcentiis ait: Humilis. i. Joleuertigo: & ſic eſt quod nos uulgo uocamus Joleuertigo.

Capillus ueneris fm Sera. eſt beſceguafen ſiue coriadrū putei, ſiue capillus algol, & capillus porcinus. Aui. in 2. cā. de beſceguafen & ſinace eſt capillus porcin⁹: & arabice eſt capillus algul. Meſus dicit: Capillus ueneris, dicitur apud quoldā capillus fontū dicitur capillus hominis memorialis & ab aliis dicit coriadrū putei, & cetis: hæc herba eſt ſatis nota. Auic. in 5. col. dicit: Cuſtarabber. i. capill⁹ ueneris.

LXIII.

TRYPHERA PERSICA.

Solarri, }
R. Succorum Endiuiz, } ana. lib. i.
deputatorum Apii, }
Lupuli, }

Et proiciantur super eos, Violarum ficearum, aut uiridium.

Rolarum, }
Folliculorum fenæ, } ana. 3. iiii.
Agarici, 3. i.

Prunorum Damascenorum pinguium numero L.

* Cnſcutæ, 3. s.

Myrobalanorum, fricatorū Citrinorum, }
in oleo uiolarū, aut amygdalorū, } ana. 3. iiii.
dalarum dulcium. Indorum,

Spicæ aromaticæ, 3. iiii.

Bulliant super prunas cum facilitate, usq; dū remaneant lib. ii. & proiciantur super illa epithymi boni mundi 3. xl. & bulliant ebullitione una, & deponantur ab igne: & colentur, & dissoluantur in una parte iſtis colaturæ.

Tamarindorum bonorum recentium, 3. iiii.

Mannæ, 3. i. s.

Pulpæ casie, 3. iiii.

Zucchari uiolū, 3. xii.

Colētur, & mendentur a granis, & scosis. i. sordibus. Et

in alia parte aquæ, seu colaturæ proiciantur.

Zucchari tabazeth. i. albi, lib. iiii.

Aceti ex uino, lib. i.

Coquantur cum facilitate: deinde proiciantur super illud quod dissolutum est in prima parte dictæ colaturæ, & aggentur simul in unum, & coquantur usque ad melis spissitudinem. Vltimo uero puluerizentur super illud.

* Rued boni, 3. ii.

Citrinorum, 3. i. s.

Chebulorū,

Myrobalā Indorum, } ana. 3. i.

norū, Bellericorū,

Embulorū, } ana. 3. iiii.

Granorum fumeræ,

Trochisch. diarrhodon,

Macis,

Masticis,

Cubebz,

Spodiis,

Santal citrini,

Inuoluantur in oleo uiolarū, & reponē in uasē uitreo, & da cum aqua frigida, aut succo endiuie, aut succo solatri.

COMMENTA. MANLII.

Triphera dī delicata, & persica dī, quia apud Persas in uerā fuit uel dicit persica, quia in illis partibus urunt ipsi: cut fit in nostris partibus. Nic. Flo. in 1. 5. in cap. de de bilia te stomachi inquit sic: & Medicamē perlarum, & pro idest triphera p̄lica eius descriptio ipse Nico. describit, sed nō concordat cum ista Mes. in simplicibus, nec in reliquis. Ipse Nicolaus habet myrobalanorum Indorū afforū cum butyro uaccino, nasciturū, & c. fed ista Dñi Mes. est nobilior illa.

Solatri. f. succus ipsius herbz. Diosc. de ipso quatuor capit sub nomē strichnon, & dicit q̄ prima est herculana, & hæc apud nos dicit herba morellā uulgo. Alia spēs, est alche chingi dictū halicacabū siue facho a uulgo. Alia dicit cabalaris uel a Latinis lunaria: & ista est faba in uersa. & est alce ra dicta manicō, aut persifō & c. Macer dicit: herbā quā græci strichnō dixerē, latini maureolā dñt. uis eius frigida ualde, fm Serap. solatri est una uulpis: alii uis caninam uocāt.

Aprii. f. succus ipsius. Iſid. in ca. de oleribus ait: Aprium dī tū: q̄ ex eo apex. caput antiquorū triphantiūm coronabat. Hercules autem hanc herbam primus capiti circumtulit & c. Auic. in 5. col. dicit: Alcharas, idest apium.

Viola fusalis. Sera. c. de uillis dicit, q̄ flos eius a p̄prietate q̄ ē i eo q̄ bibit q̄ aqua coſert ſoninat⁹ & epilepsie: q̄ accidit pueris, & ē illa quā uulgares nōiant matrē puerorū.

Folliculus fenæ. Mes. de ipso loquit in ca. de fenæ dicens: Sene ē folliculus plær, quā uocāt Perſes halzemer, & ei⁹ uer⁹ est fm ſemita orobi, & inuenit ex eo domesticus & syluestris. Electio melior pars plær eius ē follicul⁹: deinde folia: fed tñ in eis est uirtus debilis ualde: & melior folliculus ē cuius color rēdit ad uiriditatem & ſubnigredinē & c. Miror q̄ Auic. eo utit in multis caſi. & nunquā de ipſo ſcripſit. in 2. can. Secundū Circa inſtāns folia ſola cōpetunt medicinæ, & ponunt in medicinis abiectis ſtipitibus. p. x. annos ſeruatur.

Pruna Damascena apud oēs autores ſunt magis laudata quam alia pruna. Circa inſtāns in cap. de prunis inquit: pruna alia nigra, alia rubea: q̄ nigra ſunt, & aliquantulum dura, magna uo cāt, & p̄cipue Damascena: cū matura ſunt colliguntur

* Linode-
ram,
Teophra-
ſtus appel-
lat.

* J. Rha-
barbari
electi.

W.i. Cassia
fistula in-
telligitur,
elec. enim
purgato-
rium exi-
stit, lenie-
re aliquo
indigens

*cardi-
momi ma-
ioris.*

†.i.fuluo-
rū uel im-
maturorū
* alii.3. c.
†.i. hor-
deatorum
† Alii.3. l.
* alii.3.
xxx.

LXXII.

Succi fumiterræ, lib. i.

* alii addunt, hæc.

Violarum, 3. xv.

Epithymi, 3. ii.

Prunorum numero. lx.

Passularum enucleatarū, 3. vi. Anisi.

Infundantur oia in aquæ Rosarum,

casei sufficienti quantitate, po- Fœniculi, ana. 3. vi. nantur in uase uitreato stri

cti orificiis, & obturetur os ei⁹, & dimittatur per dies. v. de mum bulliant ebullitione una, postmodum coletur, & in tali colatura ponatur.

Cassie fistulæ mundæ, 3. iiii.

Tamarindorum, 3. v.

* Tereniabin, 3. ii.

Fricent manibus & colentur, & proiciantur super illud,

Zuchari boni albi, lib. i. s.

Scammoneæ, 3. i. s.

Et coquantur usq; dum habeant spissitudinem mellis :

deinde puluerizentur super illud.

Citrinorum, Rheubarbari,

Myroba- Chebulorum, Seminis fumiterræ,

lanorum, Indorum, ana. 3. iiii.

ana. 3. s. Spicæ nardi,

Bellericorum, Anisi, ana. 3. ii.

Embloricum, Et fiat.

COMMEN. MANLII.

Confectio hamech idest illius hominis qui ipsam composuit. Hæc apud nos est in usu : & maxime secundū istam descriptionem.

Myrobalani nigri sunt indi, ut ait ipse in suo capitulo & sunt sine ossibus.

Coquintida secundum Mes. est quam Perse uocant cucurbitam deserti. Et secundum Serap. coquintida est melō agrestis. Mes. describit trochiscos alandahal, & ibi ait quod ponuntur in hiera Hermetis, & in aliis cōfectionibus loco coquintidæ : ergo in ista cōfectione prædicti trochisci debent poni.

Polypodium secundum Mes. est radix plantæ, & ortus eius est super arbores & super lapides, & eā uocauit Græcæ silicem arborum : & melius ex eo est illud quod nasci super arbores ferentem glandes. Circa instans inquit : Polypodium herba est similis filici, quæ crescit super quercus & muros & lapides. Hoc apud hereticos dicitur liquiritia syluestris : & ab aliis dicitur polypodium quercinum. Auer. in. 5. coll. dicit Belegeg. i. polypodium.

Haſce secundum Serap. in cap. de thymo, est thymus : aliquando inuenitur alhaſce uel haſce quod idem est. Aui. in. 3. can. speciale facit ca. de haſce, & dicit quod est herba habens florem album declinantem ad rubedinē : sed apud Diosc. et Ser. flos eius est purpureus : ergo nō cōueniūt cū Aui. Præterea ipse Aui. dicit : Dio. dicit qd est arbor, cuius spinæ sunt parux : quod nō reperitur apud Diosc. sed fit quo modocunque thymus, est satis notus.

Sene. folliculus ipsius & non folia, ut quidam apothecarii dicunt. Mes. in cap. de sene dicit : Melior pars plāte eius est folliculus : deinde folia, sed tamen in eis est uir eius debilis ualde.

Aqua casei : aqua lactis, siue serum secundum Mat. Syl. Mes. dicit : aqua lactis est materia infusionum : & ipsa per se est medicina bona carens nocumēto : melior est sumpta ex lacte iuuenum caprarum & nigrarum, & boni pastus. In proprio cap. ipse ait : Operatio aquæ casei : si succi rosarum, unc. i. miscetur cum aqua casei & pauca spica est fo lutiū conueniens : & similiter infusio, 3. vi. foliorum rosarum in aqua casei cum pauco melle soluit sine molestia.

Tereniabin secundum Aui. est ros qui plurimū cadit in Corasceni, & in locis qui sunt ultra fluuium. Est et manna uel species eius. Sera. ca. de tereniabin ait : Expositio eius est de melioribus : sic dixerunt mihi quidam sapientes, qd tereniabin est māna purum, & est ex melioribus aliarum specierum. Auer. in. 5. coll. dicit : Tergebin. i. manna, est ex speciebus antiquis mannarū.

Alterum Hamech, uulgo confectio alia Hamech.

R. Myroba- * Nigrorum, Glycyrrhizæ,

lanorum, Chebulorum, Buglosi, ana. 3. x.

Indorum, Stœcados,

Epithymi, ana. 3. l. Chamædryos,

Fumiterræ, Campegydos,

Absinthii, ana. 3. xx. 1 Bedeguard,

Haſcæ, Anisi, ana. 3. v.

Calamenthi, Prunorum.

Polypodii, Iuiubæ,

Agarici, Sebesten, ana. num. lxx.

Passularum enucleatarum, libram. i.

Coquantur in aqua sufficienti, usq; ad consumptionem ter

tia partis, & pone in ea.

* Rob. lib. ii.

Mellis, lib. ii.

Scammoneæ, 3. ii.

Coquantur cum facilitate quousq; mellis spissitudinem

habeant.

COMMEN. MANLII.

Secundū istam descriptionem apud nos nō fit. Simplicia uero quæ sunt declaranda declarabo.

Myrobalani nigri sunt myrobalani indi, ut ipse Mes. dicit c. de myrobalanis. Ser. etiā in ca. de myrobalanis dicit : Nigri, & sunt illi qui nominantur indi. Miror qd Mes. in ista cōfectione habeat myrobal. nigrorū & indorū : ex quo idē sunt, sed uere credo qd ex errore scriptoris, quia ipsemet & Ser. uolunt quod myrobalani indi, & nigri idem sint.

Chamæpitys Græce interpretatur infima pinus, a chamæ & pitys quod est pinus, eo quod secundum omnes doctores uel aromatarios fuit species odorem habent pyni. Colligenda est quando semen eius est maturū, & est colligenda cum suo semine. Isido. in cap. de herbis aromaticis, siue communibus dicit : Chamæpitys a græcis dicta est, qd terræ adhaereat : & odorem pini habeat : hanc Latini cucur bitarem uocant, qd ex parte odorem cucurbitæ refert.

Bedeguard secundum Dio. est achantis leuce, siue spina alba etiam secundū Sera. Bedeguard est spina alba. Aui. duo facit capitula : unum de bedeguard, aliud de spina alba, qd idem sunt. Infra in syr. de eupatorio ostendit formā bedeguard, & differētiā qd reperitur in ipso, si Deus uoluerit : Iuiubæ fm Dio. sunt zinziphæ : istæ qd fructus, satis notus.

Sebesten secundum Sera. ex autoritate Abonifadi, dicitur Mochaitar, fructificat fructus dulces, & nominat eos gentes pharas sebesten. Matth. Syl. dicit : Sebesten in lingua Perſica uocatur mamilla canis : unde sebesten mamilla canis fertur a Perſica lingua.

Rob quādo absolutus ponitur, est idem qd carenum : nos uero uocamus mustum coctum, aliquando sapam.

LXXIII.

ROSATVM.

R. Succi rosarum rubearum completarum, lib. iiii.

Zuchari 1 tabarizet, lib. i. s.

Tereniabin puri, & recentis, 3. vi.

Scammoneæ Antiochenæ, 3. i. s.

Coquantur omnia cum facilitate, super ignem qui fit cut candelæ, usq; dum mellis habeat spissitudinem : deinde proicie super illud.

Trochiscorum de spodio, 3. i.

Galliz moschata, 3 ana. 3. ii.

Croci,

Trochiscorum de berberis, 3. iiii.

Repone in uase uitreo, & referua.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuariū est famolū, & apud nostros medicos in usu est. Gal. in ca. de medicinis Zenonis in suis experimētorū libris, hēt electuariū rosarū, sed nō est in usu : nec cōcordat cum illo Mesice. Istud electuariū potest appellari catharticū : catharticū Græce est purgatorium : & sic de prædicto electuario cōficiunt pilulæ de hermodactylis minores, de quib. infra Nicolaus in suo antidotario habet

* Ego legerem Clwinorum.

† i. spine albe.

* i. s. s. p.

† i. albi.

electuarius de succo rosarum, quod etiam in usu est. Sed quando medicus ordinat electuarii rosarum, intelligit de illo Mef. & quando ordinat electuarii de succo rosarum, est intelligendum de illo Nicol. Hippocrates in lib. suo Apho. dixit: Non oportet quod detur medicina laxativa quando ascendit sari, & in magna hyeme: & intelligit in Iunio Iulio, & Augusto: & per hyemem voluit intelligere Novembrem, Decembrem, & Ianuariu. In his igitur duobus temporibus anni non oportet quod detur medicina laxativa, & proprie acuta, sed solum duobus temporibus anni: volo dicere in iunio & in autumno. Quia igitur bibitur colloquenda in hora magni caloris, nocet membris interioribus fortiter: nec etiam stomacho, expellit sanguinem per ora venarum abradendo eas: quod datur in hora magni frigoris, fatigat patientem fortiter, quia natura non assentit ei, quia facit tormiones.

APPENDIX.

Bis Alexander Tralianus Diarrhodon quoque & Rosas nempe antidotum belle componit, cui admodum affine catharticum seu purgans ex Actuaria Rhodomeli exitit: verum Tralliana primum mox Actuaria placita explicemus.

Diarrhodon & Tralliano.

Succi rosarum rubra Agarici, 3.s.
rum, 11. i. Piperis, 3. i.
Scammonii, 3. i. Mellis, 5. vi.

Cum succo coque ad crassitatem, tunc præsticia cætera læuiganda.

Diarrhodon alterum & Tralliano.

Succi rosarum, 3. iii. Lactis tithymali, 3. iii.
Scammonii, 3. i. Mellis atticis, lib. 1.
Rhodomeli ex Actuaria purgans.

Succi rosarum, lib. 3. tres vel quinq.
Scammonii sextans, semuncia, aut quadrans.
Agarici sextans.
Mellis lib. 3. sex.
Miscentur.

LXXIII.

Diabryonias, e uite alba Democriti: officinis Confectio de Alphefæra.

R. Radicis alphefære mendate, & contrita, lib. s.
Mellis passularum, lib. iiii. Garyophyllorum,
Squillæ assatæ, Piperis longi, ana, 3. i. s.
Pinearum mundatarum, Sclæos,
ana, 3. i. s. Salsæ gemmæ,
Nucis moschatæ, Galliz, ana, 3. i.
* Cordumeni, Spicæ, 3. s.
Macis, Agarici, 3. iii.
Zingiberis, ana, 3. ii. Stoechados, 3. i. s.

* al. Caria
momii.

† al. v.
mesures
in simplici-
bus.

Dosis eius est a 3. ii. usque ad 3. iiii. da post sex menses.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de alphefæra non est in usu. Ipse Mef. in cap. de alphefæra habet unam aliam quæ idem est.

Alphefæra uel phæfæra secundum Mef. est planta quam uocat uitam albam: cuius radix est terrei coloris exteriorius interius uero alba. Auic. de ipsa duo ca. facit in 2. can. unum de phæfære: & ibi dicit quod est alharazam, & est uitis alba. Phæfæra aliud cap. facit de hezerizen, ubi dicit quod de ipsa loquitur exquisitè in cap. de phæfære. Item in 3. can. in fen. xv. in cap. de curationibus splenis dicit: Radix alphefære j. radix uitis albe. Apud Dioscoridum uocat ampelos leuce, aut bryonia, aut cucurbita agrestis, siue ut latini, uitis alba Dioscorid. facit aliud ca. de ampelos melan. i. uite nigra, siue uhefæresin, ut apud Aui. & hæc nostrum idiomate uulgari ter uocat tanarus. ambe iuxta hortos reperitur.

LXXV.

DIAMANNA Galeni uulgo confectio manna ex inuentione Galeni.

R. Mannæ puræ, & recentis, lib. i.
Scammonæ Antiochenæ, 3. i.

Dissoluatur manna cum succo rosarum rubearum, & sit succi quantitas conueniens, circiter lib. i. & coquantur cum facilitate donec habuerit sufficientem coctionem: deinde pone super illud masticis, 3. iii. & da 3. s. inquit Galenus; Officium cõpo-

sicio huius medicinæ nobilitatem eius, est enim composita ex partibus conuenientibus cõplexione, & proprietate.

COMMENTARIA MANLII.

Confectio Mannæ ex inuentione Galeni non est in usu.

LXXVI.

Id est, xō xuxxwvδov & Cocco Cnidio: officinis confectio de mezeoreon, uel rectius almezeoreon ex inuentione nostra.

R. Foliorum * almezeoreon preparatorum, partes. x.

Carnium cytoniorum elixato-

rum in aceto uini.

Zuchari tabarzeth,

Aquæ casei infusonis agarici, partes. xl.

* Terenabin, partes 7 xl.

Olei * almezeoreon partes. xii.

Dissoluatur zucharum, & terenabin, in aqua casei prædictæ, & miscantur cum carne cytoniorum, & coquantur cum facilitate, usque dum mellis habeant spissitudinem & inuoluatur pulvis foliorum almezeoreon, cum oleo iam dicto: & conficiatur cum eis.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio apud nos est in usu. Ipse Mef. in c. de mezeoreon habet unam aliam descriptionem, quæ idem est. Almezeoreon uel mezeoreon secundum Dioscorid. est chamelæa uel cognonidum. Aui. autem in 4. can. in fen. vi. inquit, de almezeoreo & chamelæa, & eorum cura. Hic uidetur secundum intentionem Aui. quod mezeoreon & chamelæa idem non sint, sed contra est intentio Dioscoridi & Serapionum aut uis. Mezeoreon est planta uocata apud Persas rapiens uitæ, & a quibusdam facies uiduas, & a pluribus leo terat Christophorus de honestis super istum passum errauit dicens: quod confectio de almezeoreon est de lauro ola, quod non est: nam moderni possunt certificari quod mezeoreon non est lauro ola, quia mezeoreon est chamelæa, & est planta habens folia sicut oliua. Lauro ola uero habet folia similia foliis lauri, & quod hoc sit uerum, uide Dioscorid. cap. de daphnoides cum quarta specie lauri apud Serapionem & uidebis quod idem sunt. Quidam sapientes dixerunt: quod mezeoreon habens folia parua est uerum mezeoreo, sed mezeoreon habens folia magna est lauro ola. Apud herbatos mezeoreo dicitur herba oliuella, & semel eius cognonidum. Præparat autem mezeoreon isto modo. accipias mezeoreo quantitas quæ uolueris & teras grossum modo & infundas in aceto fortissimo p die unum uel duos: postea exice & usui reseruetur. Descriptiones olei almezeoreo, i. herba oliuellæ describit ipse Mef. sic ut infra apparebit.

LXXVII. DE EVAPTORIO

R. Succus eupatorii, Citruli,
* Raued boni, ana, 3. iii. Sem. Cucumeris,
Croci, 3. ii. Portulacæ,
Lacæ, Succus absinthii, ana, 3. iii.
Seminis cuscute Scammonæ coctæ, 3. i. s.
Cimarum squinanti, cytonis, 3. i. s.

* i. Rhabarbari.

Fiat omnium coctio bona, & sit dosis eius aur. i. cum lacte camellarum, aut aqua casei alcherigi. Et si illic est caliditas reprimere cum succo solari, & endiuiz, & uolubilis.

COMMENTA. MANLII.

Confectio de eupatorio non est in usu. Gal. in suis experimentis habet electuarii de gastic. i. de eupatorio, sed non est in usu tam simplicia quæ sunt de claranda declarato.

Eupatorium secundum Serapionem est gastic. Auer. in 5. dicit. Oli barda est. i. eupatorii. Miror quod Aui. in 2. can. ait: Quod eupatorii habet florem sicque nensur, quod non conuenit cum sententia Mef. nec conuenit cum illo quo moderni utuntur. Circa instant inquit, quod salua agrestis est eupatorium, quod non est. Nam uide Simonem Iauenen. & Mart. Syl. qui dicunt quod non est coniza: ut quidam dicunt, nec est marrubium, ut quidam dicunt, nec est salua agrestis, ut quidam dicunt, unde miror qualiter medici nostri tempore non aduertentes uerba Dio. Aui. Pli. Gal. & Damasceni credant potius herbarum saluam agrestem eupatorium esse, quæ nec in sapore, nec in odore cum eo conuenit.

eleci. Ci.

Eupatorium uero dicitur ab eo quod est bonum, & par-
tor quod est hepar. Vnde eupatorium id est bonum, hepato
apud nos nascitur iuxta uias.

Camellorum duo sunt genera. f. inasculus & foemina,
Isido. dicitur: Camello causa nomen dedit, siue quod quando
onerat ut breuioribus & humiliores fiat accubant, quia Graeci
camum humile & breue dicunt siue quia curuus est dorso.

LXXVIII.

ALCHELengi.

Lupul.
indurati.

R. Succorum }
purgatorum } ana. lib. iiii.

Prolicce super eos,
Citrinorum, }
Chebulorum, } ana. j. xii.

Myrobala }
Embsicorum, j. d.
norum, }
Indorum, }
Bellericorum, } ana. j. viii.

Agarici, j. x.
Abinthii,
Cuscute,
Radicum }
Apii, } ana. j. iiii.

Foeniculi }
Anisi,
Ireos, j. x.

Pastularum enucleatarum, j. lxxx.

Bulliant cum facilitate usque ad medietatem succorum: de-
inde colentur, postquam omnia fuerint manibus bene con-
fricata, & proiciantur super unam partem succorum.

Tamarindorum cheyron, j. viii.

L. i. m. m.

* Terenabin, j. iii.

Calsie fistule, j. viii.

Deinde colentur a scolis: & in alia parte aquae proiciantur.

L. i. hor-
deorum.

Penidiarum l. fabri, lib. iiii.

Deinde misce omnia simul, & bulliant ebullitionibus duab.
tunc uero prolicce super illud.

Olei sesamini recentis, j. xv.

& agitentur omnia simul: deinde coquantur usque ad mellis
spissitudinem: tunc uero deponantur ab igne, & pulverizen-
tur super illud totum.

Diarrhodon, Succorum Eupatorii,
Tro. De eupatorio, Abinthii,
chif. De abinthio, Laccæ ablute,
De rheubar- Myroba. Citrinorum,
ro, ana. j. i. s. sanorum Chebulorum,

Ireos, j. i. Croci, ana. aur. iiii.

Agarici, Bellericorum,

L. i. Thy-
mides.

Foliorum * almezeoreon

nutritorum in aceto,

an. aur. viii. Emblicorum,

Scammonæz. Indorum, ana. aur. iii.

Spicæ, Anisi, ana. aur. ii.

Turbith boni, j. vi.

Involuantur omnia prius cum olei almezeoreon, j. iii.

& dissoluantur cum predictis & bene incorporentur: & sit

dosis eius a. j. iii. usque ad. iiii. cum aqua endiuiz.

COMMENT. MANLI.

Alchelengi medicamentum est magnum, & non est in usu.
Hoc medicamentum videtur conforme in multis proprietatibus.
illi quod Aui. nominat alchelcheli. Simplicitas quæ sunt de
claranda declarabo.

Volubilis secundum Mes. sunt plures species, quarum una
est quæ dicitur funis arborum, cuius flos est albus, & ista est
volubilis maior. Et est alia species, cuius rami repunt super
terrâ, & super ramos plantarum, cuius folia & flores sunt
minores, & dicitur volubilis minor. Et est alia habens folia
subalida lanuginosa, & habet lac, & est spēs tertia, & est
habens folia aspera sicut folia citruli, cuius flos est sicut am-
pullæ adherentes & uocatur lupulus. Et est alia ex qua fit scā-
monea. Sera. ca. de volubili, ponit cyffos. hederâ inter spe-
cies volubilis. Dios. uero in ca. de cyffos, cōfundit sermo de
hippoquittidos, ladano, volubili & hederâ. Arabes uocant
lebleb. Io. Anglicus in cap. de phthisi inquit. Volubilis ma-

ior & minor quæ funis paupis uel corrigia monachi uocatur
apud nos uolubilis dr., & nascitur in uineis, & super arbores.

LXXIX.

DIAZINGIBER, Vulgo confectio
de Zingibere.

R. Zuechari albi, partes. viii.

Mellis tabarseth, partes. iiii.

Zingiberis boni albi puluerizati puluerizatione ultima, si-
cut alcohol, partes. iiii.

Aque infusionis zingiberis, quantum sufficit.

Dissoluat zuecharum cum aqua, & melle dictis, & coquantur
usque dum sufficit: deinde proiciantur super illud pulvis zin-
giberis, & agitur, & incorporetur cum eo, & admixtetur.

COMMENT. MANLI.

Confectio de zingibere non est in usu. Aui. in. j. can. habet
electuarium de zingibere, quod non est in usu. etiam Guliel-
mus Placen. habet unam descriptionem: sed non est in usu.
Simplicitas uero quæ sunt declaranda declarabo.

Mel tabarseth. album. Aui. in. j. can. in cap. de melle ta-
barseth loquitur dicens: Mel uero tabarseth est mel album
cadens de caelo ad modum rosis secundum quosdam. Alii di-
cunt quod est mel quod reperitur in illa regione siue nomina-
ta & sic per mel tabarseth intelligitur mel album. Ego autem
in partibus nostris uidi mercatores uendere mel album,
sicut tabarseth, & erat artificiatum cum farina fabarum &
aliorum rerum similium. Si uero reperitur mel album quod
sit naturale, habet efficaciam in medicinis, alioquin non. Sera.
in ca. de melle docet modum cognoscendi mel, dicens ex au-
thoritate Dio. quod mel bonum est illud quod est dulce, & in quo
est acuitas aliquantula in gustu, & habet odorem bonum &
color eius est uergens ad rubedinem neque est nimis liquidum
& quando immiseris in eo digitum adhæret digito, & illud
est bonum & c. Auer. in. j. co. dicit: Alces, id est mel.

LXXX.

DIACODION, ex papaueris nempe ca-
pibus, purum Galeni: officinis confectio
de Iacur, secundum inten-
tionem Galeni.

R. Decem capita papaueris albi, in quibus sit mediocritas
inter paruitatem & magnitudinem, & humiditatem, & exic-
cationem: proiciantur super ea aquæ sextarii unus, id est, lib.
i. i. s. & sit aqua pluuialis, & si sint humida plus quam sicca di-
mittantur die ac nocte, & si sint ficiora dimittantur plus:
tunc coque ea usque dum decocta sint, & aquæ duæ partes sint
consumptæ: tunc uero cola succum eius.

COMMENT. MANLI.

Mesues inquit, quod confectio de iacur secundum inten-
tionem Gal. est diacodion purum: & sic est secundum ueritatem.
Ipse uero Gal. in tract. 7. meirui habet diacodion, & ibi do-
cet conficere per varias intentiones, ut docet Mes. nā scias
quod descriptio supra scripta nihil minnendo, nec addendo
est diacodion purum. Inferius uero ostendit per ordinem consi-
dere alia. Ipse Mes. in ca. de phthisi quodam in fine habet conse-
ctionem de iacur, sed non est in usu. Nicolaus in suo antido-
tario habet diacodion: & dicitur a codia quod est papauer ni-
grum, sed non est in usu. Ioan. Cōcoregus in ca. de catarrho
dicit: Laudat & cōuenit electuarium quoddam seu loch deseri-
ptum a Mes. in suo antidotario: quod dicitur confectio seu loch
de iacur, & sub isto nomine ibi describitur sed alio nomine
dicitur diacodiō, & sic ab aromatariis uocatur. Mes. inquit:
Et restat post illud duplex consideratio: quoniam si catarrhus sub-
tilis fuerit, & cimetur fluxus eius ad pectus & pulmonem
& canna & timentur uigilæ: oportet tunc ut misceat ex rob
quātitas, cuius sit medietas aquæ, & coquat super ignem in
quo non sit flamma neque fumus, sed super prunas tino. Intelligit
autem hic dominus Mesues si in diacodion puro misceat pro
qualibet lib. i. diacodion, j. vi. rob., & coquantur simul super
prunas, tunc appellat diacodion cum rob. Et non conuenit
in hac intentione mel: quoniam mel est ex habentibus acumen:
quare est subtiliatum, & est præter hoc quod intendimus, &
quoniam est materia subtilis ualde, & mel est ex subtiliatibus.
Cum autem plenitudo continetur in thorace, & pulmone, &

uelis medicamen facere absterfium, tunc mel cōueniētius est, quoniam dormire facit, & materias quæ sunt in pectore ad expellendum habitat. Et quandoque fit medicamen ex ntro; quando cadunt in occupatione duplicis intentionis. Et sic dosis eius, 3. i. & plus & minus secundum quod exigit dispositio, & oportet ut teneat eam patiens in ore suo, & transglutiat ut inde modicum quod dissolvitur ex ea cū salua. Similiter nota fit uis facere diacodion cum melle, facit fecit aliud, uidelicet si in diacodio puro loco rob addatur mel, & tunc appellabitur diacodion cum melle. Si autem uelis ut sit recetis natura, & eruptionis sanguinis a locis qui sunt super diaphragma, & ab aliis locis manationis, & a partibus ulcerum: tūc ad unā quāq; illi ipsius præcipiat acaciæ, rubæ, euphthidis, croci myrrhæ, balauftiæ, ana. 3. i. & ramieh. 3. iiii. & administretur. Scias etiā quod pro quolibet libra una diacodion duri, addatur loco mellis species supradictæ: tunc appellatur diacodio compositum. Tol. Ser. in suo antidotario habet diacodium compositum, & ibi addit acaciā, rubæ tincturā, & alias spēs sicut facit Mefues. Pli. inquit: Medicamentum quod diacodion & altere uocatur utilissimum fit, aut ex papaueris, aut euuifue, sylue stris capitibus cxx. in aquæ coelestis sextariis tribus biduo maceratis, in eademq; decoctis: deinde fectatis iterum cum melle decoctis ad dimidias partes uapōre tenui addidere postea, 3. fenas croci, hypocythido, thuris, acaciæ, & præfii cretici sextarium. Hac ostentatione, simplex, quidem & antiqua illa salubritas ex papauere & melle constat.

Acacia secundum Ser. est spina Babylonica, & est arbor gummi arabici. Illi autem Zillo quippe dicunt lignum licō dulce, cui arboris pomo succus expressus acacia a Græcis dicitur moderni quia carent uero fructu acaciæ, faciunt acaciā ex succo prunellorum syluestrium, & accipiunt prædictum fructum & expriment, & sic in sole siccatur, & ibi inuenitur idonea uirtus. Liber qui dicitur Bulchasm in trac. 2. docet modum faciendi acaciā dicens: Modus extrahendi de succum prunorum syluestrium ex quo fiat acacia &c.

Rubea. f. rubea tinctorum. Gal. in 7. simpli inquit: Coccus baphicis i. rubea tinctorum. Hæc radix a rusticis dicitur rozia. Auerois in 5. col. ait: Ena, id est rubea tinctorum. Hic apud quosdam uena tinctorum dicitur.

Hensithides sue haustides, ut apud Aui. in 2. can. habet est succus plantæ, quæ dicitur barba hircina: ergo est hypocythis, ut reperitur apud Ser. ca. de hypocythis. Fit autem hypocythis ex quodam fundo qui nascitur in radice rose caninæ, & ille quodam torachit, exprimitur succus & siccatur, & ille est hypocythis. Dios. in c. de cyffos. i. hedera de hypocythis loquitur, tamē Simon Ianue. in ca. de barba hircina dicit, quod textus Dios. est falsus, quia hypocythis non est hedera, nec est species eius, ut dicit Dios.

Ramic est quedā confectio quæ fit in trochiscis, cuius descriptionē describit Mef. de qua infra. Istud est ultimū simplicium quod ingreditur, diacodion compositum nūc uero alia inquit, si Deus uoluerit. Et sunt qui ponunt in iacur puro loco mellis penidias. Hic est notandum quod si ponant in diacodio puro loco mellis penidias, tunc est diacodio cū penidiis & qui ponunt zuecharū & quandoque exigit dioppositio aggritudinis quæ est multæ caliditatis & acuitatis medicamen ex papauere nigro, & sint eius capita usq; 50. & quicq; ex albo, & nigro, & loco mellis ponitur zuecharū aut penidie. Etia est notandum quod si ponatur in diacodion puro loco penidiarum zuecharum, tūc est diacodion cū zuecharo. In Mediolano repertū de omni genere, & in usu sunt.

A P P E N D I X.

Purum (quod aiunt) ac simplicissimum Diacodion, sepius medicamentorum per Loca, abunde Galenus exponit, ueterum primo compositiones, ac inde propriam simplicium perferens: ut probe perspecta aliorum placita, an sua reicienda, an potius pulchre probanda ueniant, facillime dignoscamus. Quare iam breuius ne dum permixtas ac magis (ut sic dixerim) medicamentosas Antiquorum Compositiones, uerum Galeni simplicissimas, subiciamus.

DIACODION Andronachi

Capita papaueris uiridia mille, & ducenta.

Mellis atici lib. iiii.

Croci cilicii. 3. v. ali. x.

Succi hypocythidis. 3. x.

Acaciæ. 3. x.

Aquam pluuiam ad capita papaueris.

Aqua quidem pluuiæ additur, quo minus putredini obnoxium sit pharmacum: habet enim & astringens quippiam in se hæc aqua.

DIACODION Criterion.

Capita papaueris agrestis octingenta.

Aquæ sextarios. lxxx.

Coquito ad tertias, atq; expressis addito mellis lib. x.

Si uero uariam efficere uelis, adde,

Croci,

Myrrhæ,

Succi hypocythidis,

Thuris. 3. vi.

Acaciæ. 3. xii.

} singulorum. 3. xii.

DIACODION Herz.

Capita papaueris uiridia. cxx.

In uas conicito, & affusæ aquæ pluuiæ sextariis tribus, ad triduum mactescere sinito: deinde ad tertias coquito, & ablata ab igne exprimito, ac colato, admixtoq; mellis sextario in duplici uale coquito, atq; ubi spissari coeperit adicio.

Acaciæ rufæ. 3. i.

Succi hypocythidis. 3. i.

Cæterum cum ipsa capita coxeris in aqua, croci. 3. i. linteolo illigatam simul coqui permittito. Quidam etiam myrrhæ. 3. i. addunt, ipsaq; cum modico passo terunt, & aque ita indunt, ac simul coquunt, donec aliquantulum fuerit confectio inspissata. Quod si tamen non medicamentariam confessionem facere uelis, cū capitibus decocto ad tertias redacto mel coques, reliquis non adiectis.

DIACODION Damocratis.

Papaueris quod nominant ipsi Agricola

Agrestis, nam spontaneum est nec conferitur,

Capitū uirentia, & recentia, integra,

Semen rubens nondum nigrum gerentia,

Centena, bisq; dena, magnitudinis

Medioeris, in nouam ollulam auri amplam indito:

Insunde tres pluuiæ de aqua sextarios:

Macerato in his totam diem noctem simul,

Dein coquito lento igne, ad diutiusculum, &

Omni liquorē expresse in ollam excipito.

Et mellis atici libras tres addito,

Rursusq; lenem ad flammulam decoquito,

Dum mellis haud fiat bona compages,

Mox frige facta in uitreum uas condito,

Sic nos quidem. At Themison primus qui prodidit

Vsum, addidit myrrham, acaciā, & rubens crocum, &

Hypocythidis succum: at ea obsoleta iam,

Simplex enim parata commodissima est,

Tuenda ualde lenis atq; uiribus.

Ex hac datur mystri minuti quantitas,

In noctem aliquando plus, minus rursus diem,

Ut tempore pauco in ore quæ hanc sic detineat,

Iustus liquentem censum ita post ut deuoret.

Quod si uoles alium morandi gratia, &

Sistatur ut pulmonis, & stomachi fluor,

Eruptioq; languinis septum supra

Facere, Eupatoricæ aut tu potius hinc Ponticæ

Addes Rhœis succi simul drachmas duas,

Tantumdem & acaciæ bonæ, non ueteris, &

Auferre iam uolens ab igne pharmacum,

Diluta passo ambo hæc simul confundito

Paulatim, adhuc feruentibus in ollula,

Quo seruat parum simul, mox uasculo

Refrigerata indantur inde uitreo.

DIACODION Sorani.

Capitum papaueris numero cl.

Aquæ sextarios uiginti.

In lebetem nouum coniecta ad dimidias coquito, & recetis capitibus mellis sextarium unum addito, postea uero.

Myrrhæ,

Croci,

Succi, Hypocistidis,

Acaciz,

} singulorum. 3. i.

Linteolo illigato, & in ollam siue lebetem suspendito, quo simul cum melle coquantur: postquam uero crassescere inciperet, fasci culum colligatum tollito, & in mortarium coniectu cū pasci cyathis trib. terito, indeq; in lebetē coiectum, lente simul, donec spissetur, coquito. Verū mitior est cōfectio, quæ ex solo melle, & capitum papaueris cremore cōstat. Efficacior autē redditur, si in falciculū linteoli, pro adstringentibus, melilotum, & radicē dulcem adideris.

DIACODION GALENI.

Simplex pharmacum ex papaueris capitibus, ut ego facere sum solitus, sola capita habet in aqua coniecta: atque ubi flaccida reddita fuerint, ipsa quidē proiciimus, aquam uero ipsorū ad solū mel atticum admiscemus, usq; ad cōpagem deling bilis pharmaci factā coctura, quo modo sane ego apparare cōsueui. Verū circa huius cōpositionem uete ribus indisereta discordia fuit: quidam. n. ex ipsīs ad capita papaueris. cxx. aquæ sextarios. xx. infundendos censent, ut quilibet sextarii mensura, sex papaueris capita recipiat. Quidam uero in. lxxx. sextarios, octingēta papaueris capita iniiciūt ut singuli sextarii, capita decē accipiant: quidam ita cōperauerunt ut sextario uno. viii. capita tribuerent: quidā autē, haud scio quā rōe, in aquæ sextarios tres, capita papaueris. lxxx. coniciūt: itali capita. cxx. in ossē tres sextarios addūt: uerū mihi uide ualde pauca aqua esse, ad tātam cōpiam capitum. Ceterum uelut ego compono cōfectionē ex papaueris capitibus, ita ea utendū cōfeco. Etenim quum de prædictis cōfectionibus experimētū fumpserim, præstātor ea uisā est, in qua ad unū aquæ sextarii, capita. x. iniiciuntur quædamodū Crito scripsit: quo sane mō ego præparo non apponēs neq; crocū, neq; myrrham, neq; aliud quicquam, optima. n. est simplicissima. Aut ad duos sextarios. xv. capita, uelut Soranus. In medio autē horū amborū terminorū est. ubi. viii. aut. ix. capita in unū sextarii coniciamus. Præ macero autē ea non ad triuū, uelut Heras, fed neq; itatim ablatas coquo, sed si quidē humidior, & molliora fuerint ad unum diem. Accipienda est autem in omniū. huiusmodi sermonibus. etiam nox, quædamodū etiā annū dierum. ccclxv. esse, solemus dicere. Si uero duriora, & sicciora sint etiam longiori tempore ipsa macero, præstat autē accipere nondū indurata. Manifestū uero quod etiā ualde mollia abiicienda sint: sicciora enim modicū succū habet, humidiora uero crassum quidē, sed crudum adhuc, & aquosum ea debile quapropter ex humidis, ac palustribus locis accepta fugienda sunt. At uero numerū quem dixi iniici oportere iuxta proportionem aquæ, de mediocribus intelligere oportet: quū enim quædam maiora moderatis, quædam minora existant, quædam uero inter hæc media, quædamodū ut plurimū esse solent, ex his prædictum numerum ad sextarii conicere oportet. Terminus autē cocturæ fit nō ut tertius, aut quartus, aut aliqua talis pars aquæ fiat reliqua, uerū ubi primum in totum flaccida fuerint facta: succum enim ipsorum exprime uolumus, hoc uero sufficienter continget, ipsis flaccidis factis: super uacū igitur diutius coquere. Ceterum mel lis dimidia mensurā huius succo admiscendam censeo, & coquendo simul ad lentū ignē ad cōpagem atq; attici mellis. Verum in aqua pluuia quidā capitū cocturā fecerunt, ne uide licet ipsam ad altā putredinofam qualitatē tranfmittetur: ubi uero etiam fontana sufficit, pluuia non præsentē. Satis est & ipsam mundā esse, & ois mixture exorte: ob quā re ea quæ per plūbeos canales deriuat fugienda erit, limus enim quidā ex plumbo in ea continetur: unde etiam qui aquæ eiusmodi fecem combibunt, dynterici euadunt. Hæc Gal.

LXXXI.

DIACARYON, uulgo cōfectio de succis nucum.

¶ Succi exteriorum corticū nucū in diebus canicularibus

lib. iiii. decoq; ipsum bullitione una: deinde adde ei mellis li. ii. & decoq; donec impinguetur, & fiat sicut mel, & post illud nobis occurrent intēones quatuor. Nam pro pueris & mulieribus & humidis natura sufficit medicamen sic factū, & qñ morbus ē in principio aliquid de stypticitatē habentibus miseri oportet, sicut sunt rosæ, & balastia: & qñ in statu ægritudo, crocus & myrrha miscēda sunt: in declinatione uero baurach & sal armoniacus & similia. Est enim medicamen subtile & expertum.

COMMENTA. MANLI.

Hæc cōfectio de succis nucum secundū intentionē Mes. quæ a Græcis uocat diacaryo, apud nos est in usu Mat. Syl. dicit: Diacareos dicitur, eo quod de succo corticum nucū recentium sit diacareos, secundū Simonē fit de succo corticum nucum recentium. Alexander describit in cap. de quinantia. Carpopareos autē est cortex nucis regalīs, sed carpopareos est semen ferulæ, secundum Nicolaum.

Nux secundum Isido. in cap. de propriis nominibus arborum, appellata est, quod umbra uel stillicidiū foliorū eius proximis arboribus noceat, hanc alio nomine latini iuglādem uocant, quasi Iouis glandem. Est. n. hæc arbor cōsecrata Ioui. Petrus de crescentiis dicit: Nux a nocēdo dicta est eo quod eius umbra noceat aliis arboribus. Dios. dicit. Carrea basilia. i. nux Alexandrina, quam muli Persicā dicunt. Vbi sciendū quod nucis multæ sunt species, sed quando simpliciter ponitur, de usuali intelligitur.

Dies caniculares sunt quadrages. Nā reperit apud Dio. ca. de origano ubi ait: Coques in sole diebus canicularibus p dies quadragina. Sera. in eodē loco ex uerbo Dio. dicit: ponit in sole quadragina diebus. f. in canicularibus. Matt. Syl. dicit: Canicula ē stella quæ dominat diebus. xl. Secūdu Gal. in li. de cibis ca. i. de fructibus horariis. Sapiēs uero dixerūt q dies caniculares sunt uiginti Iulii, & uiginti Augusti: in illis diebus est maior calor quā in aliis diebus.

Baurach est apud Græcos aphronitrum, & est puma nitri. Sera. in cap. de baurach inquit sic ex auctoritate Gal. Si cōsideras autē sermonē Gale. in quarto de nitro & aphronitro, & comparas ipsum cū sermone suo in xi. de baurach africæ quod est ipsum os & baurach similiter & aggregas operationes eorū scies pro certo quod intellexit per baurach africæ, nitri, & per baurach aphronitri puma nitri, & dixit quod aphronitrum est puma nitri, & est baurach armenum. Sumitur ergo per hoc quod baurach secundū Gal. est baurach siue sal armenum.

Sal armoniacus secundū Plin. inuenitur iuxta pleusū. Pro lomæus rex cum castra faceret: quo exemplo, postea inter Aegyptum & Arabiā, & squalenta loca inceptit inuenire detractis arenis. Secundū autē. Circa instans dicitur sal armoniacus, quia in Armenia reperit. Sera. ex auctoritate Isaac eben amara. in ca. de sale armoniaci ait: Est sal albus & rubens & extrahitur a lapidib. duris claris: & est salus mordicans, multum deservit ex Rasceni, & sunt ex eo multi colores, sed melior ē ille qui est sicut crystallus. Mat. Syl. in ca. de salamonica. i. herba quā Auic. in. 2. can. rhean salamonica dicitur, quia existant q ex eo fit sal armoniacum: aurifices utitur ipsum sale etiā separatim idem est Liber qui dicitur Albuschais in fine tertii tractatus, docet modū faciendi salē armoniaci, & dicit quod fit ex lapidibus qui reperiuntur in sterquilinis balnearum; qui inceduntur cum igne fordiciæ illius loci, & sunt lapides nigri qui coagulantur ex uirtute faldēis quæ est in illa fordiciæ: etiam uide ibi.

A P P E N D I X.

Cum dicitur ad v. & nucibus nepe, proprium sit GALENI inuentum, eius compositionem e. vi. Medicamētorum per Loca, ad uerbum hic subscribam, sic namq; studiosi rem clariū assequuntur.

DIACARYON, Galeni inuentum.

Pharmacum ex succo nucum niriū preparatum, nullo doctore usus, neq; aliquid præscriptum secutus cuius uim expertus sum multū aliorū stomacico rū facultatē excedentem. Quando enim primum ex Alexandria in patriā redi agrū petrañsui, & inueni quendam hortulanū ad uua, &

Cap. i.

SECTIO PRIMA

tenfills, ac glandibus fere suffocatum: urebatur autem col-
lutione aque melle rosas in ipsa decoctis. Quum igitur ui-
dissim fructum nucum in uigore esse, iussi detractum ab
eis externum corticem, quo etiam rinctores uideram uten-
tis, istam in mortario contundi, & succum eius per linteu
excolari, nondum sciens quo modo iuxta crassitrem, aut
tenuitatem haberet. Quum uero reperissem aquosum, &
compag tenuē, gargarillare eum iussi ipsum horrulanum.
Postquam uero ualde tenuis apparebat, præcoxi: & mel
commensurata, uelut in eo q̄ Moris sit, fieri sciebam,
admiscui, atq; ubi iam ad compagem mellis redactum esset.
Horrulanum utendum reliqui. Porro cum uiderem cellerim-
mam utilitatem ipsi inde odoriri, præstabile ratus sum in
multis experiri, atq; ex hoc sufficenter experimēto accepto
de facultate eius pharmaci, semper ipso utor, uelut nolitis.
Merito itaq; mirandum nullum ex prioribus Medicis ali-
quid de hoc pharmaco mente concepsisse, ut tum parabili,
tum generoso hoc succo uteretur, maxime cum uiderint
quo modo etiam manus inficiantur eorum, qui uirides nuc-
ces decorticant. Ex his enim apparer qualis sit earū succus,
& q̄ ægre elui possit ipsarum altringendi uis, adeo ut neq;
per fortissimā exterioria elui queat. Amplius autem adhuc
miratur sum de medicis, q̄ non cogitauerint fortem esse
ipsarum uim: quum etiam tinctores uideant eiusmodi nucū
corticibus uti. Nisi enim in profundum manuum descen-
deret, & nisi per oēm substantiam lanarum penetraret, non
certe ægre eluibilis esset: quā uero descendat, indicat planē
substantiam succi tenuium partium esse. Rationi autem cō-
sentaneū est altringendi uim maximē proficere, ubi in eius-
modi substantia continetur. Etenim quæ ex altringētib; cras-
sas partes habent, per attritionē cogunt, & condensant su-
perficem corporū quibus adhibentur, & a progressu in al-
tū ipsorum corporum fese impediunt. Quibus enim etiā
alias ob substantia crassitudinem impossibile erat progre-
di in altū, his sane amplius impossibile fuerit desatō corpore
luari, id q̄ totū est inflammatum. Oprimū itaq; esse
nucum succum persusius, ut qui etiam coctum cum melle
gustarim nihil insulse habentem, eum in quatuor partes di-
uido, & ad primam statim aliquid ex altringentibus initio
ad secundam ex croco, & myrrha: ad tertiam sulfuris quid-
dam, ac nicti addo; quartam uero solā sincerā seruo, pueris
uicē futura ob dulcorem, immo etiam uirīs ob delicias mē-
te fractis, & mulierculis. Ego quidem igitur a ratione indu-
ctus inueni, quemadmodum neruū si fauciatiorum curatio-
nem, ita etiam hoc pharmacum quod omnibus præstat.

E PRÆCTICA MESVE

LXXXII.

DE STOECADOS, in cap. de phlegma-
tica scotomia, & uertigine.

*. i. spiritū
hieræ Ga-
leuī.

*. Hieræ picræ 3. x.
Agarici,
Epithymi,

Chebulorum,
Myrobala-Indorum,
norum, Emblicorum,
Bellericorum,

Stoecados,
Salis Indi 3 ii.

Confice cum fecaniabini. i. oxymelle.

COMMEN. MANLI.

Hæc confectio non est in usu.

Stoecās. i. sticas Arabicum, ur dicit Mes. est Planta folio-
rum subtilium oblongorum habens stiprem subtilem cine-
ritium, cuius eleuatio super terram est in mēsurā cubiti &
haber flores asimilantes spicis filiginis, sed sunt breuiiores,
sine femine. Similiter ait Auī. quod est sine femine. Miror
tamen quod Dios. & Sera. dicant quod haber semen minu-
tum, quia hoc non consonat dictis Mes. nec Auī. Stoecās ue-
ro quod moderni utuntur, habet semen minutū, sed non est
uerum sticas, de quo intellexit Mesues ac Auic.

LXXXIII.

TRYPHERAE DE EPITHYMO
in cap. de cura Maniz, & Melancho-
lic sanguine.

Chebulorum,
Embloricum,
Bellericorum,
Indorum,

Epithymi sublimis, partes. ii.

Hieræ picræ, partem. i.

Confice cum melle emblicorum, & chebulorum.

COMMEN. MANLI.

Hæc confectio in Papiā non est ualde in usu, sed in Me-
diolano utuntur ipsa magis. Epithymum secundum Isid. in
cap. de herbis aromaticis fise communibus inquit. Epithy-
mum Græcum nomen est, quod Latine dicitur flos thymi.
Nam flos Græce thymum uocatur. Est autem flos timbræ
id est faruregiē filialis.

Mel emblicorū. De modo ipsius apparebit infra in trac-
tatis, in fine electuārii lætificantis, si Deus uoluerit.

LXXXIII.

AD EPILEPSIAM, in cap. de epilepsia.

*. Pyrethri,
† Sileleos,
Stoecados,
Agarici, * 3. v.
† Cordumeni,
Alisæ,
Aristolochiz rotundæ,

ana. 3. x.
Asphodilli,
Liquiritiz,
Carpobalsami,
Pzoniz, ana. 3. ii.

Et accipe expressionis squille, & Mellis partes æquales:
quibus coctis ad spissitudinem, quantum sufficiat ad aggre-
gandum ea, accipe: deinde reconde in uase uitreo.

COMMENTA. MANLI.

Hæc confectio apud nos non est ualde in usu: in Medio-
lano uero utuntur magis. Verū est q̄ Rafis in .9. Almanfor.
describit unam aliam descriptionem, quæ uidetur esse eadē
non differunt nisi quod Mesues adiungit in sua descriptio-
ne liquiritiz, carpobalsamum, & pzoniam, in reliquis ue-
ro idem sunt, & sic multū secundum descriptionem Rafis fa-
ciunt, cuius infra apparebit descriptio.

Epilepsia autem est morbus caducus, & uocatur mater
infantium.

Assæ. s. assa foetide. In quodam libro Mes. est scriptum hanc
i. rhymus, sed uere debet dicere assæ. i. assæ foetidæ. Rafis
habet assæ optime: quod idem est, cum in ista materia ma-
gis conueniat assa foetida quam thymus.

Asphodillus secundū Dios. est herba omnibus nota, folia
habens sicut porrum, uirgam lzuem, quam multi ablutium
i. alera dicit. Secundū Circa instans asphodillus est quæ dā
herba quæ uocat Centū capita, cuius radix uice medicinz
cōpetit: hic textus est falsus. Nam asphodillus nō est centū
capita, ut uidet per Sera. ca. de altaraticō, & in cap. de alta-
raticō, & in cap. de iringo. Asphodillus uero dicitur apud
herbaricos herba porraria, propter similitudinem foliorum.

Pzonia secundū q̄ dicit Auē. in .v. col. est rosa asinorū.

Macer in cap. de pzonia inquit:

Radix illius pueris suspensa caducis,

Non modicum prodest: Galenus ut asserit auctor.

Quendam se puerum narrat uidisse caducum,

Actas cuius erat annorum circiter octo.

Pzoniz puer hic radicem ferre solebat,

Appensam collo: quadam uice decidit illa.

Moxq; puer cecidit, solito quo more ligata

Pronus euasit. Galenus uero probare

Rem plene cupiens, radicem de nouo dempsit

De collo pueri, cecidit: surgitq; resumpta.

Cognata uis herbe fuit huius sic manifeste.

Ipsē Dioscoridēs cunctis ait esse caducis

Aptam, si bibitur uel si suspenditur illa.

Seminis illius ter quinq; rubentia grana &c.

Papias ait: Pzonia Græce, q̄ significatius Latine dicitur

cadauer, ab eo quod cadat per mortem. Pzoniz hanc rubea

†. i. filium
montauit.
* al. i. i.
†. i. canis
agressus
seu leuissi-
ci.

est, & coloris & rubei herba.

LXXXV.

LXXXVII.

ANACARDINVM, secundum filium

Zacharie, id est Rafim, in cap. de ægri-
tudinibus nervorum.

DE PYRETHRO, in cap. de Epilepsia,

¶.i. Ery-
gii. Secacul, lib. i.

Nucis moschatæ,

Pyrethri humidi, aut hu-

Cubebæ, ana. 3. iiii.

meitati. 3. vi.

Cinnamomi. 3. v.

Mellis despumati, lib. v.

& in alio,

Pinearū purgatarum. li. i. s.

Pyrethri,

¶.acori. condies cum,

1 Hueg,

Zingiberis,

Zingiberis,

Pyrethri, ana. 3. i.

Aut humidorum,

Garyophyllorum,

aut humectarum, ana. 3. iiii.

Expertum bonum, alii addunt moschi. 3. i.

R. Zingiberis,

Costi,

Pyrethri,

Nigellæ,

Piperis,

Macropiperis,

* Hueg, ana. 3. x.

Myrrhæ,

Mellis anacardi. 3. v. & tertiam.

Florum rutæ,

Afixæ,

Gentianæ,

Aristolochiæ

Baccarum lauri,

Castorei,

Thapsiæ,

Sinapis, ana. 3. v.

¶.i. acori.

COMMEN. MANLII.

Hæc confectio non est in usu.

Pyrethrum uel pyrethron, ut græce dicitur a pyr, quod est ignis, eo q igneam uirtutē habeat. Pl. ait: Pyrethro uo-
cant quod nunquā floret, Aui. in. 2. can. duo capitula facit:
unū quod incipit pyrethru, aliud quod dicitur tarcon. Etiā
tarcon aliquando capitur pro quodam pisce: de quo recitat
Ioan. Anglicus in ca. paralyfis, qui sic ait: Ligatura tactus
cuiusdā piscis qui uocat tarcon, & dicit piscis ille merguri
& fm Aui. cap. de stupore uocat perile hæc radix est satis
nosta dolorib. dertium medetur. Pyrethru apud Auer. in. 5.
coll. uocat halacarthaa. Papias dicit: Pyrethrum herba den-
taria, ignea: unde & pyron dicitur. Halyab. autem in secun-
do practice uocat ipsum harchacharach.

Hueg, uel huegi, uel oegi ē acorus. Gal. in. 7. simp. dicit:
Oegi. i. acorus, & ex hac planta nō utitur nisi radice eius.

LXXXVI.

CONFECTIO CONDITI I, ad ægri-
tines nervorum frigidas mirabilis, in cap.
de ægri-tudinibus nervorum.

R. Secacul,

Pinearum mundatarum,

} ana. lib. i. s.

Radicum acori,

Sinx secacul, & acorus elixata, & expressa, & misce cū eis,
præter pineas, mellis despumati lib. x. & decoque læto igne
usque dum spissitudinem acquirat: deinde deponatur ab igne
& prouocantur super ipsum pineæ, & misceantur ad
inuicem, post hoc pulueriza super ea.

Piperis nigri. 3. i.

Macis, ana. 3. iiii.

Piperis longi,

Nucis moschatæ,

Garyophyllorum,

Galangæ,

Zingiberis,

Cardamomi, ana. 3. iiii.

Mifce, & fac.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio apud nos nō est multū in usu sūo illo no-
mine. Cōfectionis condite: sed facimus & utimur sub nomi-
ne confectionis diacori. Vnde Nicolaus Floren. in lib. 3. in
cap. de cura ægri-tudinum nuchæ, & nervorum in generali
inquit: Confectio secundum Mesuē conditi ad ægri-tudines
ne uorum frigidas, & est diacorus: & sic est.

Secacul. i. sigillū sanctæ Mariz, & nō est sigillū Salomonis
in tra. 2. ubi docet formam desiccandi radices ait: Secacul. i.
sigillum Salomonis: q non est bene expostum, quia Matth.
Sylu. in cap. de daphnoides dicit, quod chamædaphne uel
daphnides Alexandriz est sigillum Salomonis: & hoc est
certum, de quo Sera. in ca. de lauro describit formam. Sigil-
lum autem sanctæ Mariz, sine secacul est radix similis zingi-
beris, dicta a modernis uulgo zenogero, & granum eius se-
cundum Serap. uocatur granum culcul.

Acorus est radix satis nota. Secundum Aui. est radix plā-
tæ, quæ est sicut papyrus: non autem intelligi debet de papy-
ro in qua scribimus, quæ de pannis lineis h: sed quando
reperitur apud Aui. uel in aliis libris in medicinis desicca-
tiuis, papyrus intelligitur quædam herbā quæ in aquis nasci-
tur, & est iuncus, uel species eius.

Inuoluantur omnia cum oleo nucum, & confice cū mel-
le apum, & da ex eo in modum grani lauri.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio in Papia non est ualde in usu: sed in Me-
diolano magis, secundum intentionem Mes. ex autoritate
filii Zachariæ sue Rafis. Et sic est secundum ueritatē, quod
Rafis composuit ipsam, & describit eam in nomo Almanf.
in cap. de paralyfis, idem in lib. diuifionum in eodem ca. uel
delicet paralyfis, ait: confectio anacardi, quæ est theriaca
paralyfis, & illa idem est in omnibus ut illa. Supra etiam po-
fita fuit una alia descriptio, quæ potest uocari confectio fa-
pientum, & illa apud nos est magis in usu, & est illa quæ de-
bet intelligi, quando absolure profertur.

Hueg. i. acorus sicut dictum est, aliquando dicitur oegi, ut
dicit Simon. Rafis loco hueg, habet ogi, quod idem est: &
est certum, quia ipse Rafis in lib. diuifionum in eadem con-
fectione, loco ogi habet acorus.

Afixæ. i. afixæ feritæ, non autem debet dicere alasse, ut qui-
dam apothecariorum dicunt. Vide Silanum super nono Al-
manf. qui in prædicta confectioe habet afix feritæ, & idē
est: & sic afix feritæ magis conuenit in ista ægri-tudine quā
alasse. i. thymus.

Aristolochia simpliciter de rotunda intelligitur, sicut dī
cit Circa instans.

Tapfia secundū Diof. nominatur, eo q primo in Tapfo
insula inuēta fuit. Arabes uero nō potētes dicere tapfia, di-
cunt thexia, de qua Aui. in. 2. can. cap. facit, & dicit quod
est gumma rutæ agrestis. idē. in. 4. can. in Fen. 6. inquit de
thexia, & eius cura hæc est: gumma rutæ montanæ, & quan-
doq sentitur in sapore eius sicut apud albedarungi. i. ozimi
fluuiatis, siue citrati. i. mellissæ. Gentilis super. 5. Aui. ex-
ponit, quod tapfia est casia lignea. Rafis in prædicta confec-
tione loco tapfiæ habet sehtarungi, tu uero uide quod
Mes. habet tapfiæ. i. gummi rutæ agrestis, ut dicit Aui. & se-
cundū. Simonem Ianuē. tapfia ex autoritate Halyabbatis
est ruta syluestris siue decur, & Raf. hēt seitaragi. i. lepidium
siue hypericinos, q idem est secundū Circa instans: Tapfia
uiui medicinz competit, & per tres annos pōt seruari. Plu.
inquit: Tapfia ex genere ferulæ, & foliis fœniculi, inani cau-
le, nec excedente baculi longitudine: semen quasi ferulæ
radix cādida quæ incisa lac emittit, & cōfuso succo cū corti-
ce &c. Secundū Sera. tapfia siue tassia est inanimum: siue giu-
giō: ergo est lepidiū fm Diof. Meo tēpore in prædicta cōfec-
tione uidi ponere loco tapfiæ rutam syluestrem: quæ uir-
tutem habet in subito desiccando. Illa uero descriptio quæ
reperitur apud eundem Rafim, in libro diuifionum habet
tapfiæ ut hēt Mel. & fm intentionē ipforum nō est differē-
tia inter seitaragi & tapfia: sed siue sit differētia siue non,
ruta syluestris conuenit, aut lepidium, aut casia lignea.

Sinapis. s. uulgis siue nigrum colorē habet Circa instans
dicit: Sinapis semen ponitur in medicinis, & per duos an-
nos potest seruari.

Mel anacardinū fit ex quodam fructu cuiusdam arboris
quæ pediculus elephantis apud quosdam uocatur. De modo
faciendi mel anacardinum reperitur apud Bulch. sim: sed
fm ipsum apud nos non potest fieri, quia oportet habere
anacardos recentes. Sed quia anacardos recentes habere
nō possumus in nostris partibus, hic ostendā facere, ut do-
cet Guliel. Placencius in capitulo. 6. de confectioe nabu-
lumi. Ma. D

ipse sic ait: Mel anacardinum quod intrat in elacuatio de anacardis. Et in aliis confectio nibus sic fit: tere anacardos, & pone eos in aceto: & dimitte sic diebus. 8. & coque eos lento igne: & renoua acetum ad duas partes, quæ colatæ cum linco, pone faciem in medicina loco anacardi, & cum aceto pone tantundem mellis, & coque hæc simul usque ad spissitudinem, & hoc erit mel anacardinum: & sic fit.

Mel auim. i. uale. Diof. in ca. de meliphyllos. i. mel lista dicit. Melliphylon, dicitur quia apes ipsam diligunt, quasi apum amor. Mesues dicit, quod prædicta confectio datur in modum grani lauri. Granum uero lauri apud Aui. est granum ademest, & est sicut auellana parua, & cortex eius ad nigredinem tendit, sicut est notum omnibus.

LXXXVIII.
DIAHIRVNDINIS, in cap. de squi-
nantia gutturis.

℞. Anisi,
Seminis apii,
Amos,
Florum squinanti,
Lilii coelestis,
Cinnamomi,
Amomi,
Aristolochiz lon.
Aluminis † iameni,
* Armel,
Myrrhæ,
Cassia lignæ,
Conifice cum melle, & fiat confectio.

† i. scissi.
* i. rutæ
sylicistris.

COMMEN. MANLII.

Hæc confectio apud nos non est ualde in usu, tamen reperitur apud apothecarios. Descriptio uero ipsius reperi apud multos alios autores. Io. Sera. in suo antidotario hæc unam descriptionem quæ similis est huic Aui. in. 5. can. habet unam aliam quæ eadē est. Haly. aut in 10. Practicæ inquit: Cathartici medicaminis assignatio, quod gutturis prodest dolorib. & est idem cum confectioe diahirundinis. Alexan der medicus in ca. de squinantia habet unā aliā, quæ eadem est: & sic postq̃ ego aggregaui prædictā confectioem apud autores nominatos cū una confectioe, quæ describit Gal. in trac. 6. meimr, quæ uocatur diabissaf: uidi quod idem est.

Lilium coeleste. i. ieros. ut reperitur apud Aui. in. 2. can. in cap. de ieros Radix ipsius competit usui medicinæ. Gal. in prædicta confectioe, loco lilii celestis habet ieros illiri cæ quod idem est. Haly. habet ieros.

Amomum semen est, minus, quod ab Oriente defer tur. Isido. in ca. de arboribus aromaticis dicit: Amomum uocatur quod ueluti odorem cinnamomi referat.

Aluminis fm Diof. species sunt multæ, sed medicinz tres necessaria: rotundum, scissum, & liquidum. Rotundum ue ro dicitur zuchcharinum, ob eius similitudinem: scissum. i. ia menum dictum uulgo de pluma: liquidum siue humidum, est illud quod dicit de roca, seu lipparini. Vide ergo quod Mes. habet aluminis iameni. Gal. hæc aluminis scissi. Auic. aluminis iameni, quod idem est, & est alumen de pluma di ctum a uulgo. Dinus Florentinus in l. 2. in ca. de cura scrofu larum dicit: quod alumen iamenum est alumen scissum.

Armel fm Mac. Syl. est tertium genus rutæ, & in fine ca. ait: q̃ harmel scripti per h est cicuta: sed harmel scripti per a, est illud genus rutæ, quod non est credendum. Nam uide quod Mes. habet hic harmel scriptum cum a Auic. habet har mel cum h. Halyabbas idem habet. Gale. habet bisafa & ibi ait: Quod quidam harmel uocant. Et idem Gal. in. 7. simp. in quirit: Moly quidam hanc rutā syluestrem nominant, quidam aut armolan: Suriani uero bisaffam sicut cappadocii moli, eo quod in radice, & molliori. i. nigrum, florem uero habet lacteum. Simon Ianuē dicit: Bilaria in antidotario Orisaffi in confectioe diahirundinis, quā uocat diatiniras inquit: Bisare quā uocat armollam uocant: alii rutam agrestem &c.

Sine dubio opinio mea est, quod harmel scriptum cū h. & si ne h sit tertiu genus rutæ: cuius in descriptione pilularū ag gregatiarum apparebit forma uera: & ibi uidebis quod harmel scriptum cum h. non erit cicuta, ut dicit Mac. Sylua. Troch. croci magnetis: descriptio ipsius reperiatur apud om nes autores: qui scriperunt confectioē diahirundinis. Scias quod Nicol. in suo antidotario, habet trochiscos croci mag netis: sed ponendi non sunt in ista confectioe: sed descriptio quæ debet administrari est ista. ℞. Cinnamomi, & croci ana 3. ii. rosarum. f. rubearum, amomi, costi, ana. 3. i. myrrhæ 3. iiii. radicū liquiritiæ, folii fidi. i. malabatri, pone loco eius spicæ, aut macis, an. 3. iis. aggrega cum uino, & fac trochi scos, & exiccentur in umbra: ait Auic.

Rosa. f. semen ipsius quod a multis modernis antera uo catur: de qua Ioan. Anglicus siue rosa anglica in cap. de flu xu uentris in febre inquit: Antera. i. semen rosarū. Prætere a uide eundem in cap. de cura fluxus sanguinis qui dicit: Ro sa & antera. i. semen eius. Et sic communiter uentur ante ra pro femine rosarum, cuius fructus apud Aui. uocatur ru bus. Eriam Sera. in ca. de rubo de iplo loquitur, & hic fru ctus apud Diof. uocatur cynosbatus.

Hirudo uero est auis fatis nota. Diof. in ca. de lapide che lido nio dicit: Lapis chelidonius inuenitur in uentribus hi rundinum, cuius genera sunt duo. f. nigrum & rufum, qui tolluntur capitis pullis hirundinum ex nido, & scissis eorū uentribus &c. Modum comburendi hirundines Mes. in fi. eiusdē confectiois docet: qui talis est. Oportet eas hirūdes primo decollari, ut sanguis earum fluat super alas ipsarum deinde puluerizetur super eas sal, deinde mitratur in olla uitrea stricti orificii, & cooperiatur, & sigilletur cū luto fa pientia. i. luto unde fit forma campæ, ut exponit Nicol. in suis synonymis & ponatur in furno uelquodam aduratur, & conseruetur cinis earum, & utere cū necesse fuerit. Gal. habet etiam de modo comburendi in cap. allegato, ubi est prædicta confectio. Similiter habet Ioan. Serap.

Amylum. i. amydu secundum Diof. appellatum est ab eo, quod Græci mylos molam uocāt. i. quod sine mola fiat. Est autem uile: amyllum quod extrinico sicamo fit & creti co aut Aegyptiaco &c.

Gallarum. f. gallarum asinarum quæ sunt non perforatæ Diof. dicit: Cecidos. i. galla semen est cendryos. i. arboris quercus, cuius uili genus omphacitis dicitur. & Ser. ca. de galla dicit: Est ex ea quæ accipitur ex arbore sua reccens, im matura, parua rotunda, nodosa, non perforata, & grauis: & est alia quæ est leuis, perforata: sed melior est nō matura, & non perforata parua, quæ primo dicta est.

APPENDIX.

Præclare admodum apud GALENUM sexto Medicamē torum per Locæ, ex hirundinibus habetur Antidotum, par tim una cum besafa, uel planius cum rutæ syluestris femine, Andromachi, atq; Hera: partim absq; besafa, præsertim ul tra Andromachum, Aesclepiadē aut cum Mesues ex Io. Sera. Andromachi compositionem belle refert, ex Gal. tantum non ab re Andromachum sequemur, indeq; (ne simplicissi mum quoq; ex hirundinibus medicamentum haud quanguā lateret) Aesclepiadem.

Ex hirundinibus una cum besafa
antidotum, Andromachi.

Anisi,	Aristolochiz lon
Sem. Apii,	ge,
Amii,	Cassig,
Floris iunci odorati ro	Rosarum siccarum,
tundi,	Crocomagmati,
Aluminis scissi,	singulorum. 3. i.
Iridis illyricæ,	Costi,
Besafa quod aliqui harmala	Cineris hirundinum re
uocant,	centis, utriusque qua
Cinnamomi,	drantem, idest,
Myrrhæ troglodi	unci. iiii.
tiæ,	

Croci,

Crocis, & squinuciam. i. §. i. s. Amomi, utriusq. §. s.
Nardi indicæ, Gallas. viii.

Tritis cum melle utere: uerum usus tempore tandem, mel adde. Hoc ipsum pharmacum etiam. Heras scripsit, ut parum abito quo minus penitus idem sit: solas enim rosas uariat: & nō ipsas coniciit, sed florem ipsarū, & ad finem addit: Quidā etiam casisæ fuluæ §. i. De hirundinibus autē ambobus oscure tradiderūt, quāquā alii clare scripserint, nisi quod inter ipsos non conuenit. Alii. n. nidi uerere iubent, ex ltercoribus hirūdini maximē compositū. Alii ipsas hirūdines. Alii ipsarū pullos. Hi uero obcurius scripserunt, & Andromachus quidē cineris hirundinum recentis: oportebat autē ipsum apponere, uisurum: tale enim quiddam cineris uox significat, nisi nudum ipsum terere ac leuigare iubet. Heras autē hirundinum recentem, non apponēs, uisurū: forte igit neuter uult cōburi debere hirūdini recentem, quē admodum alii. In quibusdam tñ exemplariis sic scriptum est: Hirundinum tenerarum. §. i. quemadmodum in aliis, hirundinum a trabibus. Palam est autem acre, & discussorium hoc pharmacum esse ex hirundinum excrementis constans, quemadmodum etiam alia omnia omnium animalium stercorea: aliqua magis, aliqua minus, uelut etiam ipsorum aialium uisurum cinis. Dīctum est et nobis de besalia in simplicium pharmacorū tractatu quod tertii fē ordinis calcaciencium & nunc sane ut eiusmodi admixtum est etiam predicto medicamento, quod plurima discussoria faculatis in se habet, quemadmodum aliqua ex aliis ftoaticis adstringentis, & repulsoribus: etenim iam relata Pharmacā ualde discussoria sunt, & ad hac amplius cinnamomum super omnia uim tenuium partium & discussoria habens: quin & senina anisi apii, & ammi discussoria sunt, & iris, & aristolochia ex discussoriis sunt, uelut etiam Myrrha. Mixta autem facultatis ex discussoria: & adstringente est casia, & crocus, & nardus, & amomū, & costus, precelit autē in ipsis calfactoria & discussoria, & maxime in colossimixta facultatis est & iū ci rotundi odorati flos, sed utraq; imbecilli rū adstringente, tum calfaciente. Gallæ uero, (clarum est autē q; de omphacicidē genere loquor) ex adstringentibus multum sunt pharmacis, uelut est alume scissum. Rose autē rursum debilissimā hñt adstringēdi uim. Ex cōtrariis igit facultatibus participariū pharmacorum, hoc medicamentū propositū iā cōstat: & nō solū contrariis sed et utriusq; fortibus, atq; uelut dixi anea, multo fortioribus discussoriis quā adstringentibus.

EX HYRUNDINIBVS absq; besalia

Antidotum, Asclepiadæ.

Hirundinum syluestrium uisurum cineris. §. iiiii.

Crocī,

Nardi indicæ,

§. ana. §. i.

Melle excipe. Mixture fit cū iā sub manibus sunt affectio nes. Hirundines porro urunt hoc modo. Pullos sale confersos una cū pennis in fistile cōiicimus, obturatūq; prunis imponimus. Gratia habēda est Asclepiadē ob id q; tam diligenter describit, quo mō hirundinum pullos uri iubeat: & q; ipsa animalia, & non eorum crementa, in pharmaci compositionem preparāda censent. Huicq; Galenus.

LXXXIX.

DE GENTIANA, in cap. de Althmate.

Capillorum ueneris, * §. x.

Amigdalorum amararum. §. v.

* aliū. §. v.

Ireos §. iiiii.

Corticum radicū cap-

parorum,

Orobi,

Seminis,

Apī,

Feniculi, an. §. ii.

Gentianæ,

Aristolochiæ rotundæ

* alii addunt,

Psalliarum enucleatarum,

Carnium iuiubarum,

ana. §. x.

§. ana. §. v.

Confice cum melle despumato.

COMMEN. MANLII.

Hoc medicamē de gentiana nō est in usu. Aui. in. §. can.

habet artem medicinæ de gentiana: sed non concordat cū illa Mes. Nic. Floren. in lib. §. in cap. de debilitate hepatis, habet electuariū de gentiana: sed nulla istarum cōcordat simul.

Capparus uel Kapanus secundum Circa instans radices, folia, flores competunt uel medicinx.

Orobis. i. erulia. Diosco. in cap. de oro inquit: Eruum siue ut alii orobum uascur in lēticula, seruitur etiam: cuius aliud est pallidum, aliud subferrugine, & aliud album. Nicol. in suis synonymis dicit: Erulia, idest orobum. Infra apparereb electuariū de orobo, & ibi melius declarabo, si Deus uoluerit.

Gentiana est radix amara satis nota. Plin. ait. Hanc innē nit Gēnius illyricorū rex, ubiq; nascēē, illyrico tñ prāstantissimā folia fraxini, sed magnitudine lactuca tenere, pollicis grossitudine cauo & inani ex interuallis foliato triū aliq; cubitorum, radice lenta subnigra, sine odore aquosa montibus sub alpinis plurima, usus in radice & succo. Aui. in. §. can. ca. de gentiana ait: quod non nominatur gentiana nisi quia primus qui eam agnouit fuit Gentinus rex, & ipsa quidem crescit in montibus alis: & eius radix fescen. lū Circa instans seruatur per tres annos in multa efficacia.

X C.

DE OROBO, in cap. de tufis humida.

Re. Spicæ nardi,

Crocī, ana. §. i.

Hyssopi siccz,

Prasii, ana. §. iii.

Myrrhæ,

Ireos, ana. §. ii.

Forinæ orobi. §. vii.

Confice cum loch de caulibus.

Piperis nigri. §. i. s.

Chesnes,

Carnium dactylorum,

Ficum pinguium,

Pinearum mundatarum.

ana. §. vi.

* alii inter ponunt fa barum ana. §. vii.

COMMENTA. MANLII.

Itud electuariū non est in usu. Scias q; Mes. in cap. nominato, nō dicit electuariū de orobis: sed ipse in ca. quod incipit, Sermo in qua cicerum ait: Et huius etiam interionis & loch de caulibus, loch de squilla, & electuariū de orobo, quæ nos scripsimus in ca. de althmate & tufi. In capit. uero de althmate nullū reperitur electuariū, in quo ingreditur orobum, sed uide in cap. de tufis humida. Nam habet per ordinem loch de caulibus, & loch de squilla, & postea sequitur electuariū de orobo, & descriptio huius illa est. Præterea uide quod in predicto electuariū ingreditur plus farinæ orobi, quam aliarum rerum.

Orobū apud Diosco. uocatur eruum. Aui. in. §. can. de ipso duo ca. facit, unum de eru, aliud de heria Iudaica, quod idem est. Iisd. in ca. de leguminibus dicit: Eruum a Græco trahit uocabulum: hoc enim illi orobum dicunt, quod dum fit quibusdam pecoribus infestum, tauros tamen pingues efficit. Synonyma Nicolai exponit, quod est erulia, & species eius tres sunt, unum triagulacum, aliud album, & aliud rubrum: nō est autem uirtus, ut quidam apothecarii dicūt. Apud Auer. in. §. col. orobus uocatur alcharfena. Papias ait orobum Græcum uerbum est, est autem genus leguminis quod eruū dicitur.

Chesnes aliquando alchernes, & sunt psallia sine ossib. Sera. in ca. de uirtutibus & eius speciebus, & quæ ex eis sunt: inquit Philophus: Alchernes, ita nominat in lingua fereffis sunt psallia sine granis, ponuntur in sole uirides & pascunt ibi sine grano, & sunt dulces, habitantes quidem in Oriente, diligunt eas cum zucharo, & nucibus, & amygdalis, & auellanis & cætera. Chermes uero scriptum cum r. est granum tinctorum, quo tinguntur panni, ut dictum fuit in eadem confectioe. Descriptio enim loch de caulibus describit ipsa Mes. in ca. ubi est predictum electuariū, de quo infra in tractatu de loch erit sermo.

X C I.

PHILONII PERSICI

in capitulo de fluxu san-

guinis ab ore.

Re. * Piperis albi,

Hyosciami, ana. §. xx.

Opii,

Terræ sigillatæ, ana. §. x.

Lani. Ma.

D 2

* al. papa. ueris ab ore.

SECTIO PRIMA

† Lapis
hemati-
tes.

† Sedene-
gri, Croci, ana. 3. v.
Castorei,
Spice nardi,
Enphorbii,
Pyrethri,

Margaritarum non per-
Conficē cum melle rosato colato, quantum sufficit.

foratarum,
Charabz,
Zedoariz,
Doronici,
Kamich, ana. 3. i.
Camphora scrop. i.

Sardonii, Auri, } limatorū. ana. 3. ii. s.
Saphirorum, Argenti, }
Granatorum, ana. 3. i. Ambrz.
Margaritarum albarum. 3. iii. Camphoraz, ana. scrop. v.
Moschi 3. i.

Fiat electuarium cum zucchero, arte, & ingenio laudabile.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium apud nos est in usu: nomen uero suum est deriuatum a compositore qui fuit inuentor, qui uocat Conciliator seu Petr. de Abano. Hoc apud quosdam medicos appellatur electuarium laticians Conciliatoris, quia cor laticifacit & confortat ipsum. Est aliud electuarium laticifians, quod ex autoritate domini Rasis, sicut infra apparebitur Deus uoluerit.

Poma secundum Istdo. in cap. de arboribus dicta ab opimo. i. a copia uel ab vertebrate, inter alia poma parafana sunt magis laudata quam alia poma: & si habere non poteris habereas poma dicta redolentia, quae etiam sunt laudata in ista aegritudine.

Rosa rubra secundum Mes. est melior quam alba, & dicitur quod uirtus faciens ruborem eius plus imprescit quam amaritudinem faciens propter quod in absfisione amaritudinis ipsius, quae remouetur per solam exiccationem eius non resoluitur species: in absfisione uero rubedinis non plus est rosa, quam homo mortuus est homo.

Corallus. rubrus est nobilior albo, & nigro: eligendus est autem corallus rubrus, grossus, & planus, & clarus, & quanto plus accedit ad rubedinem, tanto melior est: & qui nulla foramina habet aut pauca.

Limatura eboris. i. rasura, & dens elephantis.

Os uero de corde cerui est medicina mirabilis in ista aegritudine, ut est notū. Circa instans in ca. de offe cordis cerui ait: In corde cerui reperit quoddam os in parte sinistras, in qua est quaedam cōcauitas ad quam splen habet recepraculum, & emittit superfluitatem, quae propriam siccitatē cordis imitatur in offuosa substantia. Os illud est quasi cartilago, & habet de carne: est aut subruffum de sanguine cordis & discernit a cartilagine, quae reperit in pectore caprarū, quae apothecarii utuntur: quia non habet ita carnē, non est ita subruffum, sed album, & mollius. Per. 3. annos seruatur sed debet primo aliquantulum desiccari ad solem.

Basilicon. Item eius, quod appellatur ozimum garyophyllatum. Vnde circa instans. Ozimum alio nomine basilicon appellatur. Mat. Syl. in cap. de berengemisch. i. ozimo garyophyllato, dicit quod ozimum in Latino uocatur basilicon garyophyllatum, & de semine ipsius intelligitur, & maxime in electuariis: sed in emplastris herba.

Myrtus secundum Circa instans sunt myrtilli, cuius precipue in medicina ponuntur. Myrti autem secundum modernorū opinionē sunt duae species. scilicet albi & nigri albi uero sunt cubebe, & nigri sunt myrtilli qui satis sunt noti. Auer. in. 5. coll. dicit: Hes idest myrtilla.

Melissa apud Sera. est bederangie. i. turong. & dicitur marmacor. i. melissa. Secundum Simonē Ianuen. Turong est ozimum citratum, quod idem est. Dio. uero uocat ipsam mellyphyllos, nos uero nominamus citrariā a uulgo, eo quod folia ipsius odorem citri habent.

Coriandrum siue coliadrum. Gal. in. 6. Simplicius dicit: Corianum uel corium, uel coriandrum, uel qualitercunque nominare uoluerit. Semē uero ipsius admittitur in medicinis preparatū, & maxime in istis aegritudinibus: & modus preparandi est, quod tu accipias de semine ipsius quantitatē quā uolueris, & superasperga uinū cytoniorū & acetū fortissimum, sicut est notum: deinde excutetur & utat ubi oportet. Si uero ponat semē coriandrum in medicinis ante preparationem est uenenosum. De quo uide Auer. in. 4. can. qui in numero uenenosarum medicinarū enumerat. Ser. in. ca. de coriandro, ait in libro uenenosorum. Quando bibitur de succo ipsius recentis drachm. quatuor: occidit eius planta dum est recens habet odorem foetidum.

Omnes myrobalani sunt quinque ad numerū, secundū Mes. & sūt, pprigē citriui uidelicet quorū color sit citrinus. Indi. i. nigri

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio istius Philonii apud nos est in usu. Existi mauerunt quidam quod dicitur Philonium persicum, quia inuentum fuit in Persia, de quo Ioannes Cocoregius in ca. de uigilia & sahara inquit: Duæ famosæ descriptiones ponuntur ab autoribus medicinæ de philonio, quod uilubet generaliter secundum illas preparatur, & habetur in usu. Vna ipsarū ponitur a Nicolao in suo antidotario, quam ipse uocat Philoniū Romanum, & ponit id autoritate Aui. quod infra ego describam. Et est alia famosa descriptio Philonii, quæ multū habetur in usu, & ubiq: preparatur, quæ ponitur a Mes. in suo de appropriatis capitulo de sputo sanguinis a pectore, & uocat ipsū philonium persicum, quia adinuentum est in Persia, & istud philoniū persicū est multum efficax. Io. Sera. in suo antidotario habet unam descriptionem: sed non est eadē. Aui. in. 5. cano. habet philoniū Romanum, & philonium persicū, sed non finit idem: tamen descriptio Mes. ac Aui. ambz. ueniunt in usum.

Terra sigillata dicitur esse rubei coloris, ut patet per Aui. Sera. & per Dios. cap. de lemnias. Auer. in. 5. coll. ait: Thitiuacrum idest terra sigillata.

Sedene- i. lapis hæmatitis: sed Lumen tenebrosū ex ponit in prædicta confectio, quæ sedene- gii sed semen canabis cuius falsa est opinio: quia omnes codices Mes. habent in prædicta confectioe sedene- gii fine h. & ipse Lumē scrip sit hedenegii cū h. quod est semē canabis. Et sic meo tēpo re uidi multos apothecarios in hac confectioe ponere semen canabis, quod in hac non conuenit. Sed sedene- gii uerū est lapis hæmatitis: & qui mihi non credit quod sedene- gii fine h. sit lapis hæmatitis, & schedenegii cū h. sit semen canabis, uideat Ser. qui de utroq: cap. facit. & in cap. de canabe dicit: Schedenegii cum litera h. est semen canabis: in ca. uero de lapide hæmatitis habet sedene- gii. lapis hæmatitis. Et quando reperitur schedenegii cum h: tunc est semen canabis. Etia uide Auer. in. 5. coll. quod habet sedene- gii. lapis hæmatitis siue sanguinaris: & dicitur sanguinaris, eo quod trita & cōficata sanguinis colorem repræsentat, quæ fluxui cuique apta est, quacumq: horum nomen accepisse potest, & sic iste lapis in ista aegritudine multum conuenit.

E CONCIATORE.

XCII.

LAETIFICANS CONCIATORIS,

in. CXCVI. Differentia.

R. Succ. pomorum dulcium
despumatorum secundum artem } ana. 3. v.
Succi buglossæ despumati,
Doronici,
Corticum citri,
Florum boraginis,
Rosarum rubearum,
Been Albi,
Rubei,
Coralli,
Limaturæ eboris,
ana. 3. iii.
Spodii,
Macis,
Galliz moschatz,
Charabz,
Osis de dorde cerui,
Sandalorum rubeorum,
ana. 3. ii.

Seminis basiliconis,
Folii myrtillorum,
Melissæ,
Coriandri,
Cinnamomi,
Galangæ,
Zedoariz,
Spice nardi,
Ligni aloes minutim incisii,
ac combusti,
Croci medicum, ana. 3. ii.
Myrobalanorum omnium,
ana. 3. iii.
Berillorum,
Smaragdorū,
Hyacinthorum,

nigri. Chebuli debent esse grossi, & quanto grossiores tanto meliores. Emblici & bellerici. Itz sunt quinq; species myrobalanorum, qui debent intelligi per omnes myrobalanos et omnes quinq; sunt noti. Poterit aliquis dicere quod per omnes myrobalanos intelliguntur omnes species myrobalanorum, quz sunt ad numerum sex; & pro hoc Sera in ca. de emblicis de duobus generibus loquitur in c. uero de myrobalanis, de quatuor loquitur. Ipse addidit, seni, quod non reperitur apud dominum Mesuem: nec sunt noti.

Berillus scilicet lapis, & hic est de genere crystalli: sed est obscurior, & ego uidi & habui, defertur aut a Venetis ad nos. Ipsi in c. de uiridioribus gemmis inquit Berillus in India gignitur, gentis sue linguz nomen habet: uiriditate simul smaragdo: sed cum pallore. Ponit aut ibi andis in sexa gulas formas, ut hebetudo coloris repercussione angulari excitetur: aliter polius non habet fulgorem. Genera eius nouem sunt, chrysoberillus dictus, eo quod pallida eius uiriditas in aureum colorem respicendat, et hunc India mittit. Alia ipsius genera uide ibi.

Smaragdus est lapis, cuius color est uiridis: & quanto uiridior tanto melior. Hic conciliator habet smaragdi, hyacinthi, sardou, saphirorum, & granatorum, quz possumus nominare quinq; fragmēta cordialia, de quibus Mes. in eleuario de gemmis dicit. Fragmētorum, & ibi habet quinq; lapides preciosos, ut habet Conciliator.

Aurum & argentum est notū. Conciliator uero dicit: Auri & argenti limaturū modū dā nobis liber qui dicit Albu chasim, in fine primi libri, ubi sic ait: Modus limaturz auri & argenti, quib. utimur in medicinis cordis. R. ergo de bono auro & puro fustum, & habes coram te parapsidem cū aqua munda ac dulci, & habes pannum de lino asperum mundum: cuius unum caput teneas in manu tua, aliud stet mixtum fundo parapsidis, in qua tunc frica aurum uel argē cum in panno, semper madafaciendū pannum cum aqua, & limatura descendet in fundo uasis subtilis. Fac ergo candiu quod limetur de auro illo quantū uolueris: deinde dimitte per horam, & proice aquam cum facilitate, & abluet ter & sicca & serua: eodem modo fac de argento. Et sunt qui limant cum lima subtili, & sic utuntur, uerum ille est modus limandi ipsius sed apud modernos non est multum in usu: sed hodierni apothecarii ponunt aurum ac argētum in isto electuario istc. mō cōtutum. Accipiamus ergo foliorū auri ac argenti finissimi quātum uolueris, & habes paratū unū lapide marmoreum latum, album ab omnibus sordibus, & ibidem habes paratū parū aquz rosatz, & super ipsū lapidē de predicta aqua aspergatur: deinde ponant supra folia auri aut argenti, & cū uno alio lapide facto ex porphido terantur, ut faciant pictores zē, ut efficiat sicut liniturū: de inde accipiat illud, & utere dum necesse est et isto modo uidi Apothecarios Hispanos facere, & apud Neapolitanos sic fit. Auic. in. 5. can. in confectioe de hyacinto docet liqueturi auri & argentum per alium modū, ut ibi uidetur.

E FRANCISCO DEPEDEMONTIVM.

XCII.

DIACASSIAE FISTULAE, secundum Franciscū

Pedemontanum, in cap. de cura malz complexio-
nis hepatis simplicis, & compositz.

R. Mellis calsz fistule lib. ii.

Penidiōrum 3. iiii.

Succi uiolazum 3. iiii.

Candi rosati 3. iiii.

Tamarindorum 3. iiii.

Syrupi uiolati 3. s.

Fiat cum decoctione herbarum frigidarū, & quatuor fenum usualium, & prunorū quātum lufficet, & rheubarbari 3. i. & sunt qui addunt mādnz 3. iiii. & fiat electuarium.

COMMEN. MANLII.

Hzc confectio diacassiaz fistulaz apud nos non est in usu secundū istam descriptionē: sed illa descriptio qua utuntur est magistralis, sed uere ista Francisca est nobilior illa, & cre-

do q; in partibus Pataniis faciunt diacassiam, secundū illā descriptionē. Petr. de Tusi signa in ca. paralytis, tremoris torturz, & ipsam, & repletionis, habet unā aliā descriptionē: sed non est similis huic, tamē parū differt ab ea. Ioan. Cocoregius describit unam aliam de qua infra.

Mel calsz fistulaz est medulla ipsius. Mes. in cap. de cassia fistula dicit, quod sunt medicinz in quibus est fiducia iuuamētorum, & sunt sine documento, carentes acuitate & mordicatione & omni excessu legēte: super eius exhibitionem pręsumitur in omni ætate: etia quod & pueris, & pregnātib. Electio eius cōstat ut fit arundo eius grossa, plena, splendēs & multi ponderis, & fit pulpa eius splendens & pinguis & haulta ex arundine consuetata in uasis pigritur.

Candium rosatum. i. zuecharū cādium duratum in fundo uasis iulep rosati: & sic quando reperit candium uiolatz similiter intelligitur de illo zuecharo candido in fundo uasis iulep uiolati indurato.

Syrupus uiolatus. i. ille qui fit per infusionem uiolarum, ut docet Mesues, de quo infra habebimus sermonem.

Decoctio. i. apocema. Nam apocema est decoctio diuersarū medicinarū. i. aqua in qua coquunt. Franciscus dicit. Cū decoctione herbarum frigidarū, quz est proprie, endiuiz, scariolaz, lactucz, & portulacz, & hzc quatuor sunt quz in telligi debēt secundū sententiā modernorū. Quatuor uero semina usualia sunt quatuor semina maiora frigida, & sunt mellis, citrulli, cucumeris, & cucurbitz q; satis nota sunt.

Manna est ros cadens de celo super lapides, quz ponit in diacassia fistula, quz fit magistraliter. Non autem dico cassiam fistulam quz fit pro clysteris, quam non ingreditur manna: sed Franciscus & Petrus de Tusi signa, & Ioānes Cocoregius laudant ipsam, & sic sapientes dixerunt, quod manna in diacassia poni debet.

XCIII.

DE SPICA ROMANA, secundum eundem

in cap. de opilatione hepatis.

R. Spicz Romanz 3. iiii.

Abfinchi 3. i.

Terantur & cribellentur, & confice cum melle despumato, & administretur.

COMMENTA. MANLII.

Hzc confectio non est in usu apud nos.

Hæc Romana secundum Serap. in cap. de spica, est spica celtica. Auic. in. 2. can. dicit. Neridē, dicitur in capitulo de spica, & ipsa est spica Romana. In capitulo uero de spica dicitur quod dux sunt species, quarum una est spica aromatica, & est spica auzim altera est Neridē, & est spica Romana. Macer inquit.

Est nardi species, quz celtica spica uocatur.

Celtarum tantum quod nascitur in regione.

Omnia quz nardus ualeat indica, dicitur illa.

Poste, licet uires uideatur habere mioris.

EX NICOLAO.

XCIV.

AVREA ALEXANDRINA.

R. Afari,

* Carpopalsami.

Seminis hyoscyami,

Garyophyllorum,

Opii,

Myrrhz,

Cyperis ana 3. ii.

† Balsami,

Cinnamomi,

Folii,

Zedoairz,

Colti,

Coralli,

Albi,

Rubri,

Cassiz lignez,

Euphorbi,

} ana 3. iiii.

* Draganti,

Thuris,

* Syracis calamitz,

Spicz celticz,

† Meu,

Cardamomi,

Seceles,

* Napi,

Saxifragiz,

Anisi,

Anethi ana 3. i.

Ligni aloes,

Rheubarbari,

Lumi. Ma.

* i. fen-

nis balsam.

* i. traga-

ganchi.

* i. opo-

balsami.

* i. liquoris

balsami.

* i. ferri-

culi erati-

* i. sūa-

pis.

* i. sūa-

pis.

* i. sūa-

pis.

* i. sūa-

pis.

* i. sūa-

pis.

* i. sūa-

pis.

* i. sūa-

pis.

Radix ipsius solum in medicina competit .
Alipta mufcata . i . mixtura mufcata , quia recipit mufcum .
Simon Ianuendicet Alienta est quedā confectio in antidoto
Nicolaï , & quia mufcū recipit mufcata dicitur . Lumē
male lucens in prædicta confectioe debere dicere alipte
mufcataz , & dicit galliz mufcataz , q̄ non est idem : quia com
pofitor ponit ambas defcriptiones , ficut infra apparet .
Eryngium , aut iryngus , aut nux agreſis , ut dicit Dioſc .
ab aliis chardopanis dicitur : & ſpecies centū capitum , ut
apparet apud Sera . Nā Sera ait : Altitaricon iſtud centum
capita , eſt coeleſtis coloris : inferius dicit iryngi . Sed centū
capita alba eſt ſpēs ſpinæ : & ſic eſt , & non eſt ſecalum , ut quē
dam ſynonyma dicit . Opinant aliter quod iryngus ſit ſecal-
cū , q̄ falſum eſt , ſicut patet per ſequi . quod de utroq̄ diuerſa
facit capitula iryngus . Aut ſecundū ſententiam modernorū
eſt planta ſpinofa , quod in uis ac pratis naſcitur .
Ariſtolochia longa dicitur , quia radicem habet longam
altera rotunda ſimiliter appellata : quia radicem habet rotun-
dam . Nicolaus compoſitor uult quod in iſta confectioe in
grediantur ariſtolochia : eſt Lumē male lucens habet ariſto-
lochia rotundam , quod non eſt credendum .

Cardamomi, Corticis mandragoræ,
Trifl.

Trisaginis,
Phu,
Baccharum lauri,
Ammis,
* Lupbiz compositus,
Dauci,
Piperis longi,
Ligni balsami,
Seminis petroselinii,
Seminis libyfici,
Rutæ,
Hyssopi,
Succini,
Mel autem tacet actuarius, ac anethum rosas, leucopip,
carumq; omittit loco insuper myrrhæ, saxifragis, pulegii,
ac seminis sinonis, baccas myrti, saxiphagum, halicacabum,
ac hyssopum habet: ad hæc electrum, aut succinum malu-
mus addit.

XCVI.

HADRIANVM.

Re. Opii thebaici 3. iiii.
Xlocasie, } an
Hyocyami albi, } a. 3. ii. 3. iii. s.
Leucopiperis, } an. 3. ii. gr. vi. & tertia parte grani unius.
Euphorbii, } alias. 3. vii. gr. vi.
Sceleos,
Seminis apii,
ana. 3. i. 3. s. gr. ii.
Folii,
Origani,
* Dragantæ,
ana. 3. i. alias. 3. i. 3. i.
Opobalsami,
Styracis calamitæ,
Zingiberis,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Macis,
Cyperii,
Petroselinii Macedonici,
ana. 3. i. minis gr. ii.
Marachii. 3. ii. * gr. ii.
Calami aromatici. 3. iii.
gr. ii. alias. 3. ii. gr. ii.
Spicæ,
Cinnamomi,
Croci,
Costi,
Rheupontici,
Pyrethri,
Acori,
Dauci cretici,
Anisi, ana. 3. s. gr. vi.
Cassorei. 3. s. alias. 3. i. s.
Sagapeni,
Myrrhæ,
Rosarum,
Cardamomi,
Amomi,
Seminis rutæ agrestis,
Ameos, ana. 3. i. gr. iiii.
Cassia fistula. 3. i.
† Lil. fragi alii addiderunt,
drachi.
Mellis quod sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Hadrianum dictum ab Hadriano Romanorum imperatore, qui illud composuit, non est in usu: sed simplicia que sunt declaranda declarabo.

Opii thebaici. i. illius regionis, & sic ex tractu papaveris nigri. Reperit in multis aliis cœctionibus ubi dicitur opii thebaici & hoc est, quia est nobilissimis aliis, & in illa regione non fit aliud opium, nisi de papauere nigro. Idiorus a regibus Aegypti dicit thebaicus, sed a Thebis Cadmi dicit thebanus, & istud est foris narcoticum. Vnde quando simpliciter ponitur narcoticum forte vel aliud opium debet intelligi. Rheuponticum fm Mart. Sylua. est barba sistræ, & est radix pontica, multum similis rheubarbaro: interius habet uenas distinctas & rheubarbari, sed non tingit ut rheubarbarum: & dicitur rheuponticum, eo quod in ponto insula reperitur, uel quia ponticum habet saporem, & rheu tantum est dicere, quantum radix.

Daucus creticus secundum Simonem est semen baucæ, id est, pastinacæ horæ sciss. Mart. Sylua. in cap. lezar. i. daucus dicit, quod quando reperitur daucus simpliciter intelligitur pastinaca syluestris. i. daucus alpinus.

Lilifagus. i. salua. Mart. Syl. in fine cap. de elifago dicit, dicit magis, de salua q; ex ipsa putrefacta sub humo, generatur anni quadam habens caudam serpentinam & albam merule similis, de cuius cinere si ponatur in lampâ de appareat quod domus sit plena serpentibus.

XCVII.

ACHARISTVM.

Re. Costi,
Galbani,
Opii,
† Phanicæ indi,
Hyssopi,
Seminis lini,
ana. 3. i. alias. 3. vi.
Spicæ nardi,
Croci,
Corallii,
Xylobalsami,
Cassia fistula,
Xylocassia,
Calami arom.
Rheupontici,
Myrrhæ,
Storacis calamitæ,
Opoponacis,
Bdellii,
Armoniaci,
Olibani,
* Cecidos,
Spicæ celticæ,
Abrotani,
Acori,
Alari,
† Brathyis,
† Roris syriaci,
Squillæ,
† Daphnidis,
Pyrethri,
Anisi,
Amomi,
Pysyllii,
Ozimi,
Dauci cretici,
Leuistici,
Marathri,
† Miconis,
† Melanopiperis,
Macropiperis,
Leucopiperis,
Floris syriaci,
ana. 3. i. alias. 3. iiii.
† Elenii. 3. i. s. alias. 3. iiii.
Ellebori nigri,
Zingiberis,
ana. 3. i. alias. 3. ii.

† Pinacou
dulce.
† i. lauri.
† i. sabinæ.
† sumach
Arabibus.

† Meconia
succus est
papaueris
crudi ex-
pressus.

* i. gallæ.
† i. enule
campanæ.

Mellis quantum sufficit.
COMMEN. MANLII.

Acharistum sine munere interpretatur, & non est in usu sed simplicia que sunt declaranda declarabo.

Olibanum secundum compositorem est thus masculum.

Cecidon, uel cecidos, uel Kikidos græce est galla. Et sic reperitur apud Dioscoridæ cecidos. Galen. 7. simp. dicit Cecis. i. galla, que quidem omphacina nominatur.

Abrotanum secundum Dioscoridæ multi eradiam dicunt, aut glutiati, & sunt duæ species. s. & masculum & feminam. Arabes uocant ipsum Kalsum, sed non kelsim, quia kelsim est lousiticum hoc apud Aulian. 2. cano. uocatur bereugef sed non recte.

Brathyos. i. fauina, de qua Serap. in cap. de iunipero dicit. Sed fauina est illa que dicitur brathyos & sic est. Plin. inquit. Sauina herba est fabina brathy appellata a Græcis: quorum generum est, altera tamarisci similis folio est, altera capresso, quam quidam creticam cupressum dixerunt. Galen. & simplic. inquit. Abhe. i. fauina.

Ros syriacus fm compositorem est flos benedicti rosiriacus est fumach. Nam Diosc. in cap. de origano inquit: Si cū oleo cepullas & rosiriacus. Sera. uero in eodem ex uerbo Diosc. habet fumach & sic est. Verum est quod reperitur herba syriaca, & fm Mart. Syl. & compositorem est malua.

Micon. i. semen papaueris secundum Galen. 7. simp. Diosc. de miconio, cap. facit, & est idem.

Elenium, secundum compositorem est enula. Apud Diosc. uocatur hellenium.

XCVIII.

ATHANASIA, id est immortalis.

Re. Cinnamomi 2 ana. 3. iiii. gr. viii.

Cassia fistula, 3 alias. x. 3. ii.

Croci,
Squinanti,
Styracis calamitæ,
Phu,
Sileris,
Betonici,
Hyocyami,
Apii,
Anisi,
Dauci,
Opii, ana. 3. i. s. gr. iiii.
alias. 3. ix. 3. ii.
Spicæ,
Folii,
Cassorei,
Myrrhæ,
Lapidis hæmatitis,
Sanguinis draconis,
Corallorum rubeorum,
Costi,
Mumiz,
Boli armeni,
Symplici,
Lemnyti,
Alari,
Acori,
Mandragoræ,
Polii,

Baccarum lauri,
Mcu,
Macropiperis,
Leucopiperis,
Petrocelini,
ana 3. i. alias. 3. iiii.

Mellis quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Athanasia fit, inquit Nicolaus interpretatur immortalis, thanatos. n. Græce mors, & a. i. fine, quasi sine morte, hoc est quod sepius liberat hominem ab extremis mortis. Supra posita fuit alia descriptio, quæ est de mente Mesi, quæ uocatur athanasia magna, & sic gualter in illam descriptionem faciunt. Etiam ista descriptio fit in aliquib. partibus, sicut dicitur fuit. Et sunt multi qui errauerunt in lenias, credentes quod esset aurum pigmentum, quod non est, quod infra, Gulielm. Placent. habet unâ aliam descriptionem, in qua aliqua simplicia mutat, & aliqua dimittit. Athanasia ueritatem est quædam planta amara, quæ a quibusdâ athanasia uocatur: & hæc uidetur secundum intentionem Nicolai esse species arthemisia.

Lapis hæmatis fit Sera. id est feedenege sine h. & est lapis sanguineus, cuius color est sicut color sanguinis: & melior est ille qui cito frangitur: cõparatione alicuius lapidis, qui non est feedenege. Hoc lapide pictores utuntur.

Sanguis draconis est succus plantæ: apud Ser. describitur auctoritate Dioscori, qui uocatur syderis, & istud nomen multis plantis attribuitur, sicut patet apud Dioscor. de syderiti Auic. dicitur sanguinis draconis, & est fecit, & est succus rubus & notus.

Mumia fit Sera. sepulchrorum aloes & myrrha, & quod admiscetur eis ex humiditate corporis humani, & descendit de terris quæ dicuntur Acolonia. Auic. in 3. cano. dicit: Mumia de ipsa est in uirtute picis & asphaltici nunciet etiam mumia in sepulchris balsamorum, in quibus humor mortui cum aloes & myrrha resoluuntur: quibus ipsa corpora condiebantur, uidelicet ungebantur. Solebant enim antiquitus corpora balsamo, myrrha, & aloes cõgredi uel inungi: & adhuc fit apud paganos & saracenos circa Babyloniam, ubi est copia balsami.

Bolus armenus est terra rubea, quæ de Armenia uenit: apud Auic. uocatur lutum armenum: & hoc est notum.

Symphum secundum Dioscor. id est consolida maior, aut a gallicum. Auic. uero ignorat quid esset, sicut si legis cap. de symphyro apud Dioscor. cum cap. de succo apud Auic. Videbis quod idem sunt. Si uero scierit quid est symphyrum, mirum quod Auic. inquit, quod est feniperuina, & dicit quod est species seminis mandragoræ: quod male tradidit est textus eius. Nā succum in arabico est symphyrum id est, consolida: hoc apud nostros rusticos dicitur ancelco.

Lemnius fit quædam synonyma est aurum pigmentum rubrum: sed falsa est opinio eorum, quia secundum ueritatem est terra sigillata: & sic dictum fuit mihi, quod fuerunt quidam facientes prædictam confessionem, qui posuerunt aurum pigmentum rubeum: quod non conuenit si bene consideres uirtutem eius & ipsius operationem. Dioscor. ait: Lenias sphaera terra est: hæc est quæ Auic. uocat lutum sigillatam. terra sigillata. Simon Ianuæ. dicit. Lenias quidam falso exposuerunt auripigmentum rubeum: & sic multi posuerunt in confessione athanasia scriptæ in antidotario uniuersali: sed lemnius est terra sigillata: & illa est quæ in dicta confessione debet poni. Et Gulielmus loco lemnius habet auripigmentum: quod non conuenit, ut dictum est supra.

XCIX.

ANGELOCALON, uulgo ALCANCA.

lon, id est Nuncium bonum.

* corticum my
robalarum, } Citrinorum,
Chebulorum, } ana. 3. vii.
Indorum, }

* Schoenanthus,
Portulaca,
Sem. Violarum, ana. 3. s.
Bellericorum,
Embrico. ana. 3. i. gr. vii.
Malticis. 3. ii. 3. i.

Tamarindorum 3. iiii.
Floris 1. nymphae,
Berberis,
Been rubei,
Rheubarbari,
ana. 3. i. gr. iiii.
Medullæ calsæ fistulæ. 3. iiii.

Conficetur fit. In. ii. lib. aquæ pone syrapi uiolati. 3. i. s. & bulliant donec aliquid tantum aqua coloretur, postea ab igne deponatur, & coletur, & de eadæ aqua accipiat quod sufficiat ad ablundum calsam fistulæ ac tamarindos, colando & caciatis: & in reliqua parte aquæ ponat lib. i. s. zuchari, & bulliant usque ad aquæ consumptionem postea addatur lotura calsæ fistulæ & tamarindorum, & bulliant iterum ad ipsam frigiditatem. Si uis probare si coctum sit, ponatur super marmor, & si adhæreat quasi mel, coctum est, & tunc ab igne deponatur, & aliquid tantum infrigidari permittatur: deinde supradictarum specierum puluis superaspargatur, & cum spatula agitur donec incorporetur.

COMMEN. MANLII.

Alcanehalon. i. nuncium bonum, non est in usu: sed simplicia quæ sunt declaranda declarabo.

Nymphae. 3. filis apud Dioscor. id est nympha: & apud aliquos est ueneris, papauer palustre, sicut ut Latini alga palustris: & nensar apud Sera. Et nepita secundum compositionem est calamethum montanum, de quo dictum est supra in dialcamentum descriptione Mesi.

C.

ANTIMORON, uulgo ANTIMARON.

id est contra mortem.

R. Aloes. 3. v. s. gr. vi.
Calsæ fistulæ. 3. i. gr. vi. s.
Marathi,
Malticis. ana. 3. ii. gr. v.
Croci. 3. s.
Asari. 3. ii. gr. v.
Xylobalsami. 3. i. gr. ii. s.
Cinnamomi. 3. ii. gr. v.
Ireos. 3. i.
Aaron,
Dragontez,
ana. 3. i. gr. ii. s.

Agarici,
Colocyndidos,
Nitri,
Euphorbii,
Castorei, ana. 3. ii. gr. v.
* Alexandri,
Apii,
Petroselini ana. 3. scrop. ii. gr. v.
Ellebori nigri 3. v.
Coccognidi,
Diagridi, ana. 3. ii. gr. v.
Mellis quantum sufficit.

* Olusatri uocatur.

† illi 3. s.

COMMENTA. MANLII.

Antimaron. i. contra mortem, non est in usu: declarabo tamen simplicia, quæ declaranda sunt.

Aaron. i. pes utiuli, siue dragontea minor. In ista confessione amba ingrediuntur. Imaior & minor. Pet. de Cresscentis dicit: Iarus qui alio nomine dicitur barba. aaro uel pes utiuli: & sic est.

Dragontea secundum Dioscor. id est colubrina uel uiperina: sed secundum Mes. est siue serpentina maior, siue collii draconum: amba radices ipsius medicinae competunt, & amba in hortis nascuntur.

Nitrum secundum compositionem id est sal indus: sed secundum Sera. in cap. de baurach, nitrum est aphronitrum siue apuma nitri. Dioscor. de nitro cap. facit, & dicit. Ellegendum est leue, & colorem rubeum habens aut album, & cætera, & baurach armenum sicut dictum est.

Alexandrium. i. holularum, siue apium Macedonicum, siue synonym. ut dicit Math. Syl. in cap. de apio: & est imator quod illud cap. de smyr. non apud Dioscor. fit cap. de apio. Maces dicitur, siue sit Alexandrium, quod notum est.

Coccognidium. i. semen chamæleæ, ut dicit Dioscor. in cap. de chamæleæ, Alexander cap. de hydropisi ait: Chamæleæ unde coccognidium colligitur, & est lacticinii folii oliuæ habens similitudinem: & sic est secundum ueritatem, quod coccognidium folia habet sicut folium oliuæ &c. Infra in aera logodion de ipso iterum ostendat.

CL.

HAEMAGOGON, id est sanguinem mentis.

stralem ducens.

R. Asari,
Acori,
Amomi,
Seminis atriplicis,
* Marathi. ana. 3. gr. vi.
Anisi. 3. ii.
Aristolochiz lon.
Arthemisia,

Calsæ fistulæ
ana. 3. ii. gr. xiii.
Centauræ minoris,
3. ii. gr. vii.
Centauræ maioris,
† Dauci cretica. ana. 3. ii.
Ellebori nigri. 3. i.
Polijorum lauri. 3. i. s.

* i. seminis feniculi.
† i. seminis pastinacæ hemonensis.

* Prius de siderabat.
† Nensar uulgo.

* Liquiritie uulgo.
† Nigella uulgo.
* Apii macedonici.
† Erucae dicunt.
* Adami nigram.
* Erucae.
† Gerch ab alitiuoe uehemetissima, alume uocatur.

grani.iii.
Glycyrrhizæ.3.i.Æi.
Lupini.3.ii.
† Mel anthii.ii.
Myrrhæ.Æ.ii.gr.xiii.
* Macedonici.Æ.i.
† Orobi.Æ.i.
* Sypteris.Æ.ii.
Pyrethri.Æ.ii.gr.xiii.
Piperis nigri.3.ii.Æi.
gra.vii.
Pulegii.Æ.ii.gr.xiii.
Pæoniæ.Æ.i.gr.vii.
Cyperi.Æ.i.

Seminis rutæ.Æ.ii.
gr.xiii.
Spicæ nardi.Æ.ii.gr.xiii.
Betonicæ.Æ.ii.
Squinanti.Æ.i.gr.xiii.
Apii.
Sainz,ana.Æ.i.
Xylbalsami,scrop.i.
gr.xiii.
Zingiberis,scrop.ii.gr.xiii.
Garyophyllorum scrop.ii.
Radicum capparis.
Cymini,ana.3.i.
Mellis quantum sufficit.

COMMEN. MANLII.

Antidotū. i. contradatum, hæmagogū. i. menstrualem sanguinem educens. Matth. Sylua. in litera emac inquit: Emac in terpretatur sanguis. unde hæmagogū quasi sanguinem educens: ab emac quod est sanguis & gois quod est fluxus: & ob hoc dicitur hæmorragia uel hæmorragia &c. Hoc antidotū apud nos non est in usu: ualde tamen reperitur apud apothecarios Papias dicit: Antidotū Græce dicitur ex contrario datum, contraria enim contrariis curantur.

Afarus. i. afara baccara Dios. facit unū cap. de afaro scripto solum cum una litera s. & est afara baccara. aliud ca. facit de affaro scriptum cum duobus. Et illud apud quosdam, est herba dicta prouinga a uulgo.

Atreples. i. semen ipsius, quod apud Dios. uocatur andraphasis Auic. de ipso duo contraia: unū quod dicitur chrysolachana: aliud quod dicitur cataf. Secundū intentionē Dio. andraxax: xilos ex genere duplici, scilicet hortiuū, & agreste, elixa sic comeduntur. Sine dubio apud modernos computat ipsum de genere oleosis. Solus iam nūm quod est blitis: nam hæc planta in hortis reperitur: cuius longitudo est duorum brachiorum aut plus: semen eius est admodum pastinacæ, & dum est recens manducatur sicut alia olera. Hortulani Papientes atriplicem uocant, & ab aliquibus dicitur blea alba: & idem est.

Arthemisia fm Circa instans est marer herbarum, cuius folia magis competunt usui medicinz quam radix. Quidam experientatores dixerunt: Siquis iter faciens eam secum portauerit, non sentiet itineris laborē: fugat etiā dæmonia in domo posita: prohibet etiā mala medicamēta, & auertit oculos malorum. Hæc est fatis nota.

Cassia fistula. i. cassia lignea, ut dicit cōpositor. Scias q̄ in tempore antiquo uocabant cassiam ligneam, cassiam fistulam, ut reperio apud Simonem Ianuensem: & sic in ista confectiōe pro cassia fistula, intelligitur cassia lignea.

Centaurea minor est quam alii, fcl terræ uocant. Ifid. in cæde herbis aromaticis siue cōbuis inquit: Centaureā græci uocant, quæ a Chirone centauro fertur. Et reperitur ipsa in limosis, quia in locis humidis nascitur: & ideo dicitur fel terræ propter amaritudinem eius.

Lupinus apud Aui. est granū cōpressæ figuræ, amari saporis, paulum in medio, & est faba ægyptiaca: hic uero textus Aui. male traductus est. Nam Gale. in lib. de alim. dicit q̄ faba ægyptiaca nō est lupinus, ut putauerunt aliqui: & ibi fecit alud. de lupinis. Faba ægyptiaca accipit aliqui pro pondere: lupinus uero est semen norum omnib. & saporis amari: ut Virgilius in georgicis: Tristefq; lupini. i. amari.

Melanthium. i. gith siue melanchion. Dio. de melanthio c. facit, sed apud Sera. est nigella, & si conferas cap. de melanthio apud Dios. cum cap. de nigella apud Serap. uidebis q̄ idē sunt. Species uero nigellæ fm modernos sunt due, una habēs semen citrū cū odore iocunde, & ista est notata: altera hēt semen nigriū cū odore priore, sed forma est ut est semen porri: & ista est illa quæ dēt poni in ista confectiōe.

Macedonicum secundum Nicolaum est semen Alexandis siue apium Macedonicum, siue olustrum.

Sypteris. i. alumen, sed non dicit quale alumen sit. Spēs uero aluminis fm Dios. sunt multæ: sed species sunt tres quæ necessariæ sunt in medicina, & sunt proprie alumen

iamenū. i. scissum, q̄ alumen de pluma a uulgo dicit: & est rotundū, quod zuccharinum uocatur: & est liquidum, quod dicitur alumē de rocha siue lippariū. Neq; per id cognoui quale sit illud quod intelli debet: sed secundum Mat. Syl. in telligitur de alumine scisso. i. iamenum.

Bethonica secundum Sera. est hæstaran, & id quod plurimum accipitur de ea sunt folia: infra in syrupo de bethonica mellius ostendam.

CII.

BLANCA.

R. Terebinthinæ,
Opopanax,
Galbani,
Astræ foetidæ,
Sagapeni,
Castorei,
Ammoniacy,
Sulphuris,
Bdellii,
Asphalti,
Antimonii,
Styracis liquidæ,
Carnis leonis,
* Diagridii,
Euphorbii,
Agarici,
Interioris colloquintidæ,
Hellebori nigri,
Polypodii,
Taphæ,
Pyrethri,
Squinanti,
Peucedani,
Afaris,
Cyperi,
Pæoniæ,
Betonicæ,
Camædryos,
Polii,
Amomi,
Leuistici,
Seminis rutæ,
Sanguinis draconis,
ana. 3. i. alias. 3. ix. scrop. i.
Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Macis,
Ainsi,
Cardamomi,
Marathri,
Balsami, an. i. scrop. i. al. 3. i. s.
Ambræ, gr. v. alias. scrop. ii.

* Syapū
d'vov
appellant.

† al. scrop.
id.

Mellis quod sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Blāca, dicta est, quia albos humores. s. phlegmaticos purgat nō est in usu, sed simplicia q̄ sunt declarāda declarabo.

Terebinthina, seu terbenitina uera est resina terebinthi arboris, q̄ apud Arabes uocat glūtē albotin siue glutem alimbar. Auic. in. 2. can. uocat semen eius granū uiride, & arbor dicitur nominari albotin. Hæc a multis dicitur largatū.

Antimonii fm Aui. est substantia plumbi mortui & eius uirtus est similis uirtuti plumbi adusti. Antimonium uero est uena terræ similis plumbo: uerū est q̄ antimonium terit & non funditur: plumbum uero funditur & non teritur, & habet in fracturis suis claritatem quando fragitur: & illud est melius q̄ in fracturis nō hēt aliquid ex terra nec fordīs.

Alphatum secundum Dioscori. est bitumen Iudaicum, aliud est aridum, aliud liquidum. Aui. uocat ipsum bitumē Iudaicum, stercus dæmonis napta, & bitumen Iudaicum u-nius generis aiunt.

Peucedanum fm Mart. Syl. est cauda porcinæ: sed cauda porcina secundum Simonem uocatur a quibusdā milium solis. Gal. in. 8. simpl. pharmacorū dicit, q̄ administratur ex hac planta est radix.

Fœniculus algal secundum Mat. Syl. est peucedanū: qui dam fœniculum agrestē uocant. Pet. de Cresc. inquit: Peucedanū est herba, q̄ alio noīe dicitur fœniculus porcinus.

CIII.

BENEDICTA SIMPLEX.

R. Turbith,
Efulæ,
Zucchari, ana. 3. x.
Diagridii,
Hermodactyli,
Rosarum, ana. 3. v.
Garyophyllorum,
Spicæ,
Zingiberis,
Croci,
Saxifragiæ,
Macropiperis,
Amomi,
Cardamomi,
* Selini spermati,
Salis gemmæ,
Galangæ,
Macis,
Carui,
Fœniculi fm
Asparagi,
† Brulci,
Lithospermaton,
Polypodii,
Malticis,
Ameos,
Lapidis lyncis, ana. 3. i.
Mellis quantum sufficit.

* i. semi-
nis apii.

† Rutcum
Dioscori.
nocat.

SECTIO PRIMA

COMMENTA. MANLI.

Benedicta dicitur quia ab omnibus a quib. sumitur bene dicitur. Giliber. de Anglia in ca. de cura arthritice secundum magistros habet unam aliam descriptionem quæ eadem est. Hæc apud nos est multum in usu, sed uere ego uidi de hac multas descriptiones quæ differunt inter se, & hoc aduenit errore translatoris: sed hæc est optima de prædictis. Ex speciebus benedictæ simplicibus sunt pilula quæ dicuntur de benedicta, de quibus infra in tractatu de pilulis.

Esula sive Circa infans cortex radicis eius medicinx cõpetit apud Mes. vocat alcebræ, et dicit qd est species lactici niorum, & est solutiuu rusticorum. Reperitur alia herbaq multum sibi assimilatur, sed non habet lac ut habet esula, & dicitur uersus: Esula lactescit sine lacte linaria crescit.

Diagrydium secundum uelum modernorum, est scammonæ præparata in pomo cytonio.

Hermodaçylus est dictus græce, hermetis digitus. Aui. in. 2. can. dicit: Digitus hermetis est flos hermodaçyli, radix eius usus medicinx competet.

Selini spermatidis secundum compositorem est semen apii Nam selinum Græce est apium, & sic ponere debes.

Salgemma sive Meslin c. de speciebus salis, est sal sicut cry stallus scindibilis, sal cappadocius idem est.

Bruscus omnibus est notus. Mar. Syl. ex autoritate Pauli. dicit qd folia eius sunt fissia foliis myrti, cū extremitatibus spinosis faciētib. plures stipites cū fructu rubeo, sicut fructus cerasi: fructus & radix ipsius usus medicinx cõpetunt.

Lithospermaton. i. milium foliis, ut dicit Simon Ian. in c. de lithospermaton. Græce est dicta lapideum semen, eo qd fit durum ut lapis. Giliber. de Anglia loco eius habet granū folis, quod idem est. Aui. in. 2. can. dicit: Calab non est saxi fragia, ut quidam dicunt. Error uero in hoc est, quod reperitur in aliquibus descriptionibus istius cõfectionis in qua ingreditur saxifragia lithospermaton & milium folis: quod non est credendum, quia lithospermaton est milium folis. Bartholomæus Montagnana in suis consiliis, in consilio de cura per medicinalia, iniquitatem sublimationis lithospermaton est milium folis & sic est.

Lapis lyncis secundum Nicolaum est lapis qui fit de uri na lupi cerucri. Sunt autem alique descriptiones, in quibus ingreditur lapis lyncis, & aliquæ in quibus non: quod forsitan potuit contingere errore scribentium.

CIII.

ALIPTAE MOSCHATAE.

1. Laudani purissimi 3. iiii.
Styracis calamitæ optimæ 3. i. s.
Styracis rubæ 3. i.
Ligni aloes optimi 3. ii.
Ambræ 3. i.
Camphoræ 3. s.
Moschi 3. s.

Aquæ rosæ quod sufficit. Consciant sic. In diebus caniculis laribus ponat storac calamitæ, & storac rubæ, & laudanum in catino ad solem coopto cum subtilissimo panno, ne puluis possit attingere: & cū mollificata fuerit ad solem, pone in mortario æneo & concalcata, sistr cū pistello suo ferreo calescā fortiter semel cõterantur, donec ad nigrū deueniat colorem, & postea puluerem adde ligni aloes, & simul fortiter tere, & caphoram similiter: postea contere multum in tribus 3. aquæ rosæ: & de hac aqua madafec aliquantulum marmor prius bene ablutum & calefactum ad solem & accipe 3. i. cum tabula planissima de eadem aqua madafacta super marmore diu agitetur donec ad subtilitatem unci deueniat: & hoc modo facias semper madafaciendo marmor & tabulā, & de eadem aqua supradictā. Et cum reposeris super asperge de illa aqua ualeat. n. ut superius diximus: accipe tabulam planissimam similiter ablutam & de siccatā ad solem & humectā marmor & tabulā de aqua rosā in qua resolutus est mulsus, & interpone supradictā tandiu agitando donec ad subtilitatem unci deueniat, ne semper adhaereant cum supradicta aqua marmor, & tabulam madafaciendo i. demum tuos funiculos similiter torque, & prædictam aquam in uap

se mundissimo, & bene obturato usui reserua.

COMMEN. MANLI.

Confectio aliptæ muscatæ. i. muscorum muschatæ dicitur quia recipit muscum, apud nos est in usu: tamen non multum.

Laudanum dictum est ab ea herba, unde colligitur, quā in Cypro Ladā uocant. Secundū Sera. ex autoritate Dio. Laudanum colligitur ex una specie cusi. i. hedera, & fortius ex laudano est illud quod est boni odoris, coloris uergentis ad uireorem sub molli tactu: & quando malaxat adhæret manibus, & non est in eo fabulum, & non assimilatur res sine pini, & fit in terris Arabum. Auc. laudat illud quod est pingue, ponderosum, & scabrosi boni odoris, quod ad citri nitatem delectat.

Storac rubæ secundum compositorem est cõfita rubæ. Et cõfita rubæ apud eundem est cozumbrum siue thus Iudeorum: & sic est. Cozumbrum uel storac rubæ est timiama, & est sex storacis liquide non est storac calamitæ, ut dicit quidam. In hac possumus certifiari qd idem non sunt quia Nicolaus in prædicta cõfectione habet storac calamitæ, & storacem rubeam: & dicit Nicolaus qd storac liquida rubæ & calamitæ sunt gumme cuiusdam arboris.

Dies canicularis sunt quadraginta, sicut ostensum fuit supra in cõfectione diacaryonis.

Aeneus uel mortarium, est uas uel mortarium factum de aramo uel are. Mar. Syl. in c. de are inquit: Faciunt ex ere uasa ad comedendum uel bibendum, & nocet eis multū, & maxime illis qui assueuerunt hoc diu. Nā parati sunt tales incurrere elephantiam & cancrum & dolorem hepatis & splenis, & maxime comedentes in eis res acres & bidentes in illis uina dulciora: & quando comedit cibum qui stetit in eis die una & nocte, & est peius multū, & qd possit uas æneum super pisces assatos calidos, sic uenenum mortiferum &c.

C.V.

CVMINATAE ALEXANDRINAE.

R. Cinnamomi,	Macis,
Cardamomi,	Piperis longi, ana. 3. i.
Galangæ, ana. 3. iiii.	Cymini 3. iiii.
Garyophyllorum,	Spicæ aliquantulum.
Folli,	

Conficce cum zucchero, & fiat.

COMMENTA. MANLI.

In partibus Mediolani est multum in usu.

CVI.

DIAMARGARITON.

R. Garyophyllorum,	Margari Perforatarum,
Cinnamomi,	tarum, Integrarum,
Spicæ,	Zingiberis,
Galangæ,	Osis de corde cerui,
Ligni aloes,	Rasuræ eburis,
* Liquiritiz,	† Blatæ byzantiz,
Diarrhodon,	ana. 3. s.
Troch. * Diaion,	Molchi,
ana. 3. i. s.	Ambræ,
Nucis moschatæ,	Cardamomi,
Macis,	Leuitici,
Aliptæ moschatæ,	† Seminis basiliconis,
Zedoariæ,	ana. 3. i. minus gr. iiii.
Rheubarbari,	Camphoræ, gr. vi.
Styracis calamitæ,	Mellis rotati quantum sufficit.
ana. 3. i.	

COMMEN. MANLI.

Diamargariton dicitur a duobus generibus margaritarum perforatarum & non perforatarū. Aui. in. 3. can. habet unā aliam descriptionē, quæ eadem non sunt. Verū sunt qui faciunt secundum descriptionem Nicolaï, & quidam faciunt secundum descriptionem Aui. sicut est intentio medicorū. Descriptio Aui. apparebit inferius.

Trochiscorū diarrhodon. i. de rosis. Descriptio ipsius reperit in antidotario Mes. sed ponere non debes in ista cõfectione, quia ipse Nico. describit unam aliam descriptionē, quæ dēt administrari in prædicta cõfectione, ut dicit ipse.

Trochiscorum diaion. i. de uiolis albis, ut dicit Nico. in

* Glycyrrizam de-
cunt.
† i. uiolis
† i. Blat
byzanti
† i. Ozini
garyophylli
lati.

fra apparebit descriptio sua.

Margarita. flapis thic. Nicolaus in ista confessione hęc margaritarum perforatarum & integrarum i. non perforatarum: quia secundum Matt. Syl. sunt artificiosę perforatę & non naturales. Quidam uero mercator dixit mihi quod margarite perforatę sunt naturales, & reperit in ostreis & sic tam perforatę quam non perforatę usui medicinę cōpetunt: & sunt proprie albę & clarę. Obscurę uero nō sunt ponendę in medicina. Stephanus autem scripsit iulua pro iulo, & est margarita.

Blatthę bizantizę sunt coopertoria ostracorum marinarum similibus lymacis, & sunt similes unguis, & propter id uocatur ungula aromatica: alba odoriferę sunt meliores Dios. uocat purpuram marinam, & dicit: Alii blattam bizantiam appellant eo q̄ in bizantium primum est inuenta: quę ideo blatta appellatur, eo q̄ quasi blacula sanguinis. Quidā ungulam aromaticam uocant.

CVII.

DIACAMERON.

* i. Gario phylli gros si.	Rx. * Antophali,	} ana. ʒ. i. gr. xvi.
	Zingiberis,	} alias. ʒ. lvi.
	Cinnamomi,	
	Garyophyllorum,	} ana. ʒ. iiii. ʒ. i. gr. xvi.
	† Carnium dactylorum,	} alias. ʒ. xlv. ʒ. ii.
† Nicola ² al signat pondus. ʒ. xxvi.	Galangę,	
	Spicz nardi,	
	Zedoarię,	
	Costi,	
	Pyrethri,	
	Albi,	
	Coralli, Rubei,	
* i. femi- nis iunipe ri.	Dragaganti,	
	Rheupontici,	
	Melanopiperis,	
	Leucopiperis,	
	Macropiperis,	
	Limaturę, Auri,	
	Argentı,	
	Osis de corde cerui,	
	Rasurę eburis,	
	Mofchi,	
	Ambr ʒ. i. alias. ʒ. iiii.	

Mellis quantum sufficit.

COMMEN. MANLII.

Diacameron dicit quia hōiem de morte ad uitā restituit, non est in usu: sed simplicia quę sunt declaranda declarabo.

Saliunca fm̄ compositorem est spica celtica, & sic reperi tur apud Matt. Syl. in litera saliuca, sed secundū Dio. & Pli. aliud est saliuca. Dios. dicit: Saliuca genus herbę est quę radicales, & folia subrusta habet, flores similes violę. Spica celtica habet florem citrinum, quī non conuenit cū colo re violę. uerū sicut dictū fuit loco Saliunce, celtica ponat.

Antophali. i. garyophylli grosi.

Ami fructus fm̄ Nico. est semē iuniperi seu fructus. Aui. in. 2. cā. dicit: Abel est fructus iuniperi similis zaru. hic tex tus Aui. est corruptus. Nam fructus iuniperi dicitur halha- har, & Abel est fauina, sicut patet apud Serapio. in cap. pro prio de fauina. Nam Sera. maiorem auctoritatem habet in simplicibus quam Aui.

CVIII.

DIANTHOS.

*. Florum rorisma- ri, ʒ. i.	Cinnamomi,
Rosarij,	Zingiberis,
Violarum,	Zedoarię,
Liquiriticę, ana. ʒ. vi.	Macis,
Garyophyllorum,	Ligni aloes,
Spicz,	Cardamomi,
Nucis moschatę,	Anisi,
Galangę,	Anethi, ana. ʒ. iiii.
	Mellis quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Hoc antidotum apud nos est in usu. Dicit autē dianthos,

quia fit ex floribus rorismarini, quī libanotides nuncupant. Nā anthos apud Gręcos ē flos, inde alofanthos. i. salis flos. Papias inquit anthos gręce flos. Gilib. de Angl. in li. 6. in ca. de dysenteria hepatis calidę, siue frigide & humide, inquit: Dianthos bezonis, sed non est idem. ibi idem iterū inquit: Dianthos usualis, sed nō est idē nec in usu fuit. Anthos uero est flos rorismarini, quī alio noīe flos alchilli dicit: node zuc. alchilli. d. de floribus rorismarini. Et hęc apud Dio. liba notides, q̄ Romani uocant rorem marini, & est planta quā multi ponūt feris ut coronis: hęc uirgas multas nō gros- sas, flexibiles, humidās, super quas sunt folia multa, indensa subtilia, lōga, quorū color interius est albus & exterius uiri- dis, habentia odorē fortem cū grauedine quadā. Circa in- stans in cap. de rore marino ait: Flores & folia competunt usui medicinę. Ros autē dicitur anthos, unde fit electuariū quod dicit dianthos. Cum autē reperitur. ʒ. anthos uli roris- marini, debent poni flores, unde folia & flores collecta ali- quantulum exiccata ad solem per annum seruantur. Hęc 2- pud nos dicitur corona mortis seu montana.

APPENDIX.

Ad uerbum hęc eadem Acturius perscribit. DIANTHON, e floribus nescit antidotum explicans, uerum pondera nō nihil immutata, accipit nanq; florum. ʒ. xl. & ubi in precedē ti cōpositione sunt. ʒ. iiii. ipse, ʒ. iiii. ponit. Mel uult atticū ad pondus lib. ii. s. in aliis ad unguem probe conuenit, prę- terquam quod macis pręterit.

CIX.

DIASATYRION.

Rx. Satyrionum testiculorum	Zingiberis,
viridium,	Anisi,
Baucię,	Lingū auis,
Secacul,	Seminis erucę, ana. ʒ. v.
Nucis indicę,	Cinnamomi,
Pistacearum,	Caudarum ʒ. stincorum
Pinearum mundatarum,	recentium,
ana. ʒ. xii.	Seminis bulbi, ana. ʒ. i. s.
Garyophyllorum,	Mofchi, gr. vii.

Conifice sic. In tantum mellis depumati, q̄ sufficit, ponā- tur satyrionis testiculi & baucię unaquaq; per se bene pri² contrita, & cum spatula bene misceantur & bulliant aliqū- tulum: deinde apponantur pineę, & pistacę similiter bene tritę: & cum aliquātulum bullierint ab igne deponatur, & pulsus supradictarum specierum ibi ponendo amiscuantur: ad ultimum uero mufcum cum aqua rosata apponatur, & usui referuetur.

COMMENTA. MANLII.

Diasatyron autē dīr a satyrionis testiculis: nam satyriasis Gręce, Latine dicit erectio uirge. Giliber. de Anglia in c. de Gonorrhoea habet unā aliam descriptionē, & idem est. Supra est nescit cōfectio testiculorū uulpis siue satyrionis & cōfectio alia testiculorum uulpis, & hęc est diasatyron quo nōs utimur magis quā isto. Verum est. q̄ sunt ex homin-ibus qui faciunt secundū illam suprapositā: & quidam faciunt secundum istam Nic. Satyrion autem sunt testiculi uulpis, qui satis noti sunt: supra de ipsīs melius ostendi.

Baucia. i. pastinaca maxime domestica. Gal. in 6. simp. inquit: Lezar. i. pastinaca que oritur in campis: & minus ista pastinaca comeditur quā illa que seminat in hortis, sed est fortior quam hortulana in omnibus rebus: sed hortula- na comeditur plus, sed est debilior quam syluestris. idem in octauo inquit: Staphilinus. i. pastinaca domestica.

Secacul. i. sigillum sanctę Marię, ut dictum fuit in conse- ctione diasatyron descriptione Mesue.

Pistacia. i. pistici secundum compositorem. Isti fructus se- runtur de Damasco. Iſido. Pistacia dicuntur, quia habent odorem nardi pistici.

Lingua auis idest, semen fraxini, & non est lingua pas- terina, ut quidam crediderūt. Supra in alia descriptione de ipsa melius ostendi.

Eruca semen est herbę quę nota est. Diosco. de ipsa facis duo ca. unū de domestica ubi inquit: Eruca multū comesta uentre stimulat. Aliud de eruca agrestis: cuius semine mul-

et pro synapi utuntur. Pli. ait. Erucæ in cōdiendis obsoniis .i. salamentis in quibus carnes & pisces intinguntur, tanta suauitas est, ut Græci cūzomom appellauerint: idem in uno alio loco: Tertiu erucæ semen optimum Aegyptium, Atheniensē napi, appellauerunt; alii rapson, alii laurion.

Scincus uel stincus est animal satis notum apud Aui. me lius quod est in ipso est illud quod in parte renom.

Bulbus secundum compositorem est coepe. Mesloceus habet fucci coepe humida. Bulbi recentis. Verum pot dicitur: omnis radix rotunda uocatur coepe. Apud uero Pli. sæpe omnis radix rotunda similis coepe uocatur bulbus, nec per nomina scio quid sit prope bulbus.

CX.

DIAPRVNORVM.

Recipe prunorum Damascenorum uiridiū numero centum, ponantur in stano in tantū aquæ quæ bene cooperiantur: & bulliant donec dissolui uideant, tunc ab igne deponant, cūq; aliquatū tepel facta fuerint ab aqua extrahantur & cribro super cacumen posito ram diu in ipso cribro fricetur quod nihil pter ossa, & cortices ibi remaneat. In illa aqua in qua pruna decocta fuerint ponatur .s. uiolarum, & iterum bullire permittatur, & fiat syrupus cum duabus li. zuc. in quo syrupo li. i. de pulpa prunorum ponatur, & ad spissitudinem decoquatur, & incipiente quidem inspissari addatur .s. i. tam aridorum, & .s. i. medulle casie dissolutæ & colata: cum supradicta decoctione prunorum: Memento tamen quod in aqua prunorum bulliat .s. uiolarum, ut supra dictum est, cum aqua ad spissitudinem decoctionis peruenit cum spatula semper agitando, harum specierum puluere superasperge, quod recipit.

Santal, Albi, Rubei,

Spodii, Rhenobarbari, Cinnamomi, ana. 3. iiii.

Rolarum, Violarum,

Sem. portulacæ,

Sem. Scariolæ,

Berberis,

Succi liquiritiæ,

Dragaganti, ana. 3. ii.

Seminum Citrulli,

mundato Melonis,

rum, Cucurbitæ,

ana. 3. i.

Detur in hora diei sine diagrydio ad modū castaneæ cū aqua frigida: & si laxatiuū facere uolueris, ponat pro qua libet li. 3. vii. de diagrydio prius quam ab igne deponatur.

COMMENT. MANLI.

Diaprunis aut uel diamascenō a prunis Damascenis dicitur & ipsum potes cōponere solutiuum & non solutiuum: & utrūq; est in usu. Gilib. de Anglia in cap. de cura arthriticæ per magistrō inquit: Diaprunis, sed nō est idem. Pruna uero apud Dios. uocatur cicimella, dicens quod est arbor quam Latini prunam uocant: nota est oibus cuius fructus iocundus est & molliens uentrem, sed caco stomachus: est uerum illius qui in Syria Damasco nascitur est aptior. Pet. de cretens. Prunus est arbor nota, & eius quidē diuersitates sunt quia quædā est domestica, quædā est syluestris: & domestice quædam faciunt pruna alba, quædam nigra, quædam rubea.

Scariola sūm compositorem est endiuia uel lactuca agrestis: infra apparet syrupus de cicoria, & ibi de gñibus ipsius faciam mentionem. Nic. inquit: Detur omnia hora diei sine diagrydio ad modū castaneæ cum aqua frigida, hoc est de diapruni nō solutiuum. Nam hoc antidotum potest cōponi cum diagrydio, & sine diagrydio, ut supra dictum est.

CXI.

DIAPRASSIUM.

R. Prassii mundi uiridis. 3. v. s. alias. 3. c.

Dragaganti, Nucis moschatæ, Pincærum mundatarum, Macis, Amygdalarum, Ligni aloes, Pistacearum, Galangæ, Carnium dactylorum, Zedoariæ,

† Ficuum pinguium, Passularum, ana. 3. iiii. s. alias. 3. lxxii.

Cinnamomi, Gargophylloium,

Zingiberis, Spicæ,

Liquiritiæ, Rheupontici,

Anacardi,

Styracis calamitæ

Malthicis,

Myrrhæ,

Galbani,

Terebenthinæ,

Ireos,

Aristolochiæ rotun.

Radici caparris,

Gentianæ,

Melanopiperis,

Anisi,

Fœniculi,

Anethi,

Seminis apii Macedoni,

Saxifragiæ, ana. 3. i. s.

gr. li. s. alias. 3. xxxvi.

Hermodyctylorum,

Origani,

Peucedani,

Squinanti,

Cardamomi,

Leucopiperis,

Carui,

Leustici,

Vincetoxici,

ana. 3. i. s. alias. 3. xxxviii.

Melle sufficienti conficiat sic. In lib. iiii. mellis despumati pone prassium uiride aliquantulum contulim, & quartam partem pineæ recentis cū resina sua, & de uino uetustissimo optimo .s. iiii. & bulliant simul lēto igne usq; ad cōsumptionem carum, sicum pinguiū bene purgatorum intus & extra, & de dactylis eodem mō purgatis & passis sine granulis suis. i. passularum quæ nominantur alchemes, sine aris. i. sine granis, & pineæ, & amygdalæ & pistaciæ: ista oia bene mundata pistentur tantum unumquodq; per se, & postea simul miscantur in mortario, & addat ibi terbintina, & simul pistentur, & cum prædicto melle calido in eodem mortario paulatim posito distemperentur, & postea addatur puluis supradictarum specierum & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Diaprasium aut sūm intentionem compositoris, dicitur a prasio uiridi, quod ibi ponitur plus quam de aliis. Gilib. de anglia in ca. de stricture thoracis. i. pectoris, habet unam aliam descriptionem eque eadem est.

Prassium uero uiride secundum compositorem est flos æris, seu uiride æris. Non aut dicitur diaprasii a marrubio albo, sed dicit diaprasii a prasio uiridi, quod est flos æris.

Hoc antidotum non est ualde in usu.

Vincetoxicum. i. antipharmaçū, & est quædā plāta quæ multum iuxta elleborū inuenitur, quare putatur sibi contraria. Appellatur aut vincetoxicum, eo quod contra toxicū est, cuius radix usui medicinæ cōpetit. Nic. Flo. in lib. 7. in cap. de antracæ, siue althoin inquit: Et ex dictis est consolida dicta quibusdam vincetoxicum, & a nobis morella, & a quibusdam dicitur herba uentri uel herba sancti Laurentii: neque per id Nicolaus cognouit ipsum.

Diptamū. i. pullegiū indum. Apud Aui. in 2. can. uocatur mesfretremelcir. Sera. aut de ipso loquitur in cap. de origano. Antonius Musa inquit: Herba diptami a Græcis dicitur arthemideocreticon, alii bubulcus, alii ephemerō, alii eleacectoros, alii dorcarior: alii ebulliō: Itali russella rustica, siue emenipie, alii dipasos: Romani labrū ueneris. Nascitur aut in insula Cretæ, in mōte Ida. Secundū intentionē Antonii labrum ueneris apud Romanos est diptamum, sed apud Pli. labrum ueneris est cimbaria, seu umbilicus ueneris.

Saturegia est herba quæ apud nos nascit in hortis, cuius folia sunt similia thymo: & quando est recens manducatur. Pli. ait: Thymbra uero quæ sit cunila hæc apud nos habet uocabulum, & aliud a saturigia dicta in cōdimentario genere: feritur mense Februarii &c.

Petroselinū agreste secundū compositorem est sinonū. Circa insitans inquit: Petroselinum est duplex. i. de mestica

* Oxyac
ta Diosc.
eognomi
natur.

† Caricæ,
seu Ficus
aride ap
pellantur.

* Lib.

cuna

cum & sylvestre: & sylvestre dicitur finonum, cuius semen usui medicinx competit.

CXII.

DIALIBANV, Vulgo DIAOLIBANVM.

Castorei,	ana. 3.iiii.
Opii,	alias. 3.xix.
Hyoicyami,	
Cassiz futilz. 3.ii. 3.ii. alias. 3.xvi.	
* Folii,	ana. 3.i.s.
Croci,	alias. 3.xii.
Thuris masculi,	
Rheupontici,	ana. 3.i. 3.ii.
Amoni,	alias. 3.x.
Myrrhaz. 3.i. alias. 3.ix.	
† Spicz,	
Pyrethri,	ana. 3.ii.s.
Euphorbi,	alias. 3.v.
Leucopiperis,	
Pzoniz,	
Seyracis calamitz,	ana. 3.i.
Macropiperis,	alias. 3.vi.

Mellis quantum sufficit.

COMMEN. MALII.

Diaolibanum autem dicitur ab olibano quod ibi ponit: hoc apud nos non est ualde in usu. Rasis in lib. diuisionum cap. de medicinis stomachi, habet unam aliam descriptionem, sed non est eadem.

Olibanum autem est thus masculum. Diosc. inquit: Thus lachryma est arboris, quod Græce libanus dicitur. Quod autem de Arabia deferunt candidum est, quod uero de India subrufum, sed dicitur; masculum dicitur. Et est tertium genus minutum ualde & utrumque, de quo maxime fit. Est ergo optimum thus quod masculum dicitur subalbidum, & rotundum, & pingue, naturaliter leue & fragile, & quod ab igne cito accenditur odore suauem copiose emittens. Mæcer ait: Incenso siue thure hoc satis est notum. Gal. in 7. simp. ait: Libanothus. i. thus.

CXIII.

DIARRHODON ABBATIS.

* Sandali,	Albi,	Basiliconis,
	Rubeci,	Berberis,
ana. 3.ii.s.		Scariolæ,
Dragaganthi,		Portulacæ,
Gummi arabici,		Maluz,
Spodii, ana. 3.ii.		Sem. Lactucæ,
Asari,		Papaueris albi,
Spicz,		Cydoniorum,
Malticis,		Citrulli,
Cardamomi,		Melonis,
Croci,		Cucumeris,
Xylozloes,		Cucurbitæ. ana. 3.i.
Garyophyllorum,		Margaritarum,
Galliz moschatæ,		Osis de corde cerui,
Anisi,		ana. 3.s.
Fœniculi,		Zuchari candi,
Cinnamomi,		Rosarum, ana. 3.i. 3.iii.
Succi liquiritiz,		Camphoræ, gr. vii.
Rheubarbari,		Molchi, gr. iii.s.

Syrupifaciti de aqua rosarum quantum sufficit.

COMMENTA. MALII.

Diarrhodon autem dicitur a rosis quæ recipiuntur ibi plus quam de aliis speciebus. Abbatz dicitur ab abbate: qui abbas de curia cum composuit. Supra posita fuit una alia descriptio, quæ uocatur diarrhodō descriptione communi, & ambæ sunt in usu. Sed quando doctor simpliciter ordinat diarrhodon Abbatis, de hoc intelligitur.

Gallia muschata est quedam coactio quæ fit in trochiscis & eius descriptiones sunt diuersæ fœ diuersos autores: nam Mes. in tractatu de trochiscis de gallia loquitur, & ibi ponit qualiter debet ipsa fieri: sed illa non debet administrari in receptis Nicolai: immo debet poni in suis receptis. Nico. compositor idem describit: & hæc est illa quæ debet poni in suis receptis.

CXIII. DIAPENIDION.

R. Penidiarum. 3. xvi. alias lib. i.

Pinearum,		ana. 3.iii.s. 3.i.
Amygdalarum mundatarum,		alias. 3.xx.
Seminis papaueris albi,		
Cinnamomi,	Amidi,	
Garyophyllorum,	Citrulli,	
Zingiberis,	Seminum Cucumeris,	
Succi liquiritiz,	purgatorum, Melonis,	
Dragaganti,	Cucurbitæ,	
Gummi arabici,	ana. 3.i.s. alias. 3.x.	
Camphoræ, tertiam partem unius. 3. alias. 3.iii.		

Syrupi uiolati quod sufficit conficitur sic. In una li. aquæ bulliati. 3. iii. uoliarum, donec aqua aliquantulum inficiatur. i. tingatur: postea coletur, & colatur addatur lib. i. zuchari, & bulliant donec incipiat inspissari: tunc addatur pineæ & amygdalæ, & semina, unaquæque per se bene contrusa cū spatula semper mouēdo: addantur & penidiz subtiliter puluerizata, & cum liquefactæ fuerint: illud quod supernatauerit grossum cum cacia colando in mortario, iterū bene retatur: deinde camphora admiscatur: ad ultimum pulvis supradictarum specierum cum supradictō syrupo, semper agitādo in mortario moueatur, donec incorporetur, & postea usui referuetur.

COMMEN. MANLII.

Diapenidiō autem dicitur a penidiis, quæ ibi intrant plus quàm de aliis speciebus. Hoc antidotum apud nos non est ualde in usu. Scias ergo quod quando doctor ordinat diapenidion, de hoc intelligitur: quādo uero ordinat penidiōs, intelligitur de illis quæ sunt ex zucharo dissoluto in aqua: aliquando sunt ex zucharo dissoluto in decoctione hordei, & tunc illi penidiis, dicuntur penidiis fihari, & illi debet poni in coctione diapheniconis, de quo supra.

APPENDIX.

Actuarius hoc Diapenidion Antidotum non inepte pingit, quanquam paululum mendose, quem locum a studiosis ex Nicolao restituendum censemus.

CXV.

DIACYMINVM.

R. Cymini per diem in aceto infusi, & exiccati. 3. viii.	Ameos,
3. i. alias. 3. c.	Leuistici, ana. 3. i. gr. xviii.
Cinnamomi,	alias. 3. xv.s.
Garyophyllorum,	Macropiperis. 3. i.
ana. 3. i. s. alias. 3. xxx.	alias. 3. xii.
Zingiberis,	Spicz nardi,
Melanopiperis, *	Nucis moschatæ,
Galangæ,	† Anisi, ana. 3. iii.s.
† Saturegiæ,	alias. 3. x.
Calamentis, * ana. 3. i. 3. ii.	Mellis quantum sufficit.

COMMEN. MANLII.

Diacyminum autem dicitur eo quod ibi plus ponitur de cymino quam de aliis speciebus. Gilibert de Anglia in cap. de strictura thoracis. i. pectoris, habet tres descriptiones: quarum prima est eadem huic altera dicitur diacyminum, sed non est idem: altera dicitur diacyminum preciosum, sed idem non est. Rasis in 9. Almanso in cap. de his quæ confortant stomachum, & ciborum perficiunt digestionem, habet unā aliam descriptionem, sed non est eadem in partibus uero non stris sunt ex hominibus quæ faciunt hoc antidotum fœ Nicolai, & sunt ex hominibus quæ faciunt fœ descriptionē Mes. quod intulit autem diacyminum bonum.

Saturgia herba est satis nota. Gilibertus loco eius habet Thymbreæ, quod idem est. Nam saturgia apud Græcos dicitur Thymbra unde Mæcer: Thymbra folia Græce dicitur saturgia latine. & hæc apud Lombardos segrezola uocatur.

CXVI.

DIADRAGAGANTVM FRIGIDVM.

R. Dragaganti albi. 3. ii.	Amyliis. 3. iii.
Gummi arab. 3. i. 3. ii.	Glycyrrh. 2x. 3. ii.
	L. m. Mz. E

* Maci-
li fide-
rent.

† spicam
& pyre-
thri, Nic.
ponit. 3.
vi. habere
perfectio.

* Nic. Ni-
col. ponit
3. xvi.
† Nicola.
omittit.
‡ Saturgia
uocatur.
† Nic. 3.
xx.

SECTIO PRIMA

COMMEN. MANLII.

Sem. Citruli,

Melonis,

* Nic-non
habet. Sem. Cucumeris,

Syrupi Gal. quod sufficit, & fiat.

Cucurbitæ. ana. 3. ii.

Penidiarum. 3. iii.

Camphoræ. 3. s.

COMMEN. MANLII.

Diadragantum autē dicitur a draganto, quod recipit. Hoc antidotum apud nos est multū in usu sub nomine diadragati frigidi, ad differētiā descriptionis quæ uocatur dia dragantum calidū, & hoc in Nicolao non reperitur: sed dicitur in cap. de stricturna thoracis, habet diadragan tum frigidum, quod idem est. Idē habet diadragantum cali dum, de quo infra erit sermo. Nico. & Gliber. habent dra gati albi 3. ii. Lumen male lucens habet diadraganti, gum mi arabici, an. 3. ii. & 3. ii. quod falsum est, ut non debet cō poni secundum ipsum. Idem errauit in dosi camphoræ.

Dragantum uero est gummi quod apud Dioleo. uocatur tragagantha & melius. Dragantum est album, & tenuē, limpidum, & lucidum, & leue, & mundum. Plī. Tragagan tum est spinæ albæ, radice multum: planta apud Medos, & Caucasum nascitur. Gal. in. 8. Simpl. ait: Tragagantū. i. dra gantum: & hoc satis est notum. Apud nos fit antidotum in morfellis apud Venetos fit quasi in modum trochisci.

Syrupus albus Gal. id est iulep, qui solum fit ex aqua & zuchcharo. Gliber. loco eius habet syrapi iulep quātum suf ficit, quod idem est. Ioan. Anglicus in ca. de passionibus sto machi in quodam antidoto ait: Fiat electuarium cum syrupo albo, qui uocatur iulep.

DXVI. DIACASTOREVM.

Re. Castorei,

Myrobalanorum citrinorum.

Aloes. 3. i. s.

Folli,

Antimonii,

Pyrethri,

Glycyrrhizæ,

Dragaganti,

Calami aromatici,

Nitri,

Galbani,

Squinantii,

Spicæ,

Croci,

Cassie lignæ,

Albi,

Piperis, Nigri,

Longi.

Carpobalsami,

Xylobalsami,

† Coloquintidæ,

Opopanax,

Rheupontici,

Sagapeni,

Syracis calamitæ,

Zingiberis,

Cinnamomi. ana. 3. i.

Garyophyllorum,

Affæ foetidæ,

Myrrhæ,

Euphorbii. ana. 3. i. gr. xvii.

Staphilagrizæ,

Dauci,

Marathri,

Apii,

Sileris,

* Daphnococci,

Sinoni,

† Petrofelini,

Syracis rubeæ,

Petrolei,

Sanguinis draconis,

ana. 3. iii. minus,

gr. xv.

Cardamomi

Maiores,

Minoris,

Thuris,

Agarici,

Mastiches,

Salis armoniaci,

Zedoariæ,

Anisi. ana. 3. i. gr. ix.

Satureiæ,

Hysopii,

Chamadryos,

Pulegii,

Origani,

† Balsamitæ,

Ozimi garyophyllati,

Brancæ uriniæ,

* Diptami,

Seminis rutæ,

Aristolochiæ,

Longæ,

Rotundæ,

Aaron,

† Mambathematicon,

Alari,

Saluiz,

Rosarum,

Bdellii. ana. gr. xvii.

Epithymi,

Polypodii,

Opobalsami, an. gr. xix.

* Alipiados,

Capparis. ana. gr. xi.

Anacardi,

Gentianæ,

Corticis mandragoræ,

Sauinæ. ana. gr. xi.

Abfinthii,

Pucedaniani. ana. gr. vii.

Ireos, gra. iii. & tertiam par-

tem unius grani.

Mellis, quod sufficit.

Diacastoreum autē dicitur a castoreo quod recipit. Hoc an tidotum apud nos non est in usu. Gili. de Anglia in c. de pa ralyti habet unam aliam descriptionem quæ eadem est. Cas toreum est quoddam aial quod castor appellatur, & istud animal uiuit extra aquam & in aqua, & nutritur ex piscib. & cancri. Eligendi sunt autem ex his testiculū gemini pen dentes ex una radice, interior habet sicut mel, & ipsi sunt similes ceræ in colore sanguinis coagulati, & qui sunt in pelliculis suis grauis odoris pingues, & quando separantur debent mundari ab ipsis pelliculis, & sic poni in medicinis Guli. Placen. inquit: Castoreum est testiculus animalis mari ni quod bauerā appellatur, adulteratur cum opio.

Daphnococci fm compositorem sunt bacæ lauri. i. semen ipsius. Circa instans inquit: Lauri folia, & semina ului medi cinę competunt. Au. in. 3. can. de ipso facit tria ca. unum q incipit demel, aliud granis lauri, aliud de lauro. i. gar. qd satis est notum.

Petroleum fm Modernorum sententiā est inter spēs bi tuminis. Iudaici seu alphaltici. Au. in. 2. can. inquit: Petrolēū album notæ speciei est, & nigrum est calamethū picis Ba bylonicę & reliquarum. Bartholomęus Môtagna in suis cō silijs, in consilio de medicinis habentibus commune iua mentum ad nocumenta stomachi, usus, & auditus inquit. Est autem oleum de napa oleum de peris factum. i. oleum petrolēū. Nos uero generaliter pro petroleo, intelligimus oleum petroleum, quod satis notum.

Aaron. i. barba Aaron. Diof. de Aaron facit ca. & inquit Aaron quā syriaticā uocant, folia habet dragonetę similia, sed maiora & non uaria: uim gar habens duorum palmori, & colore purpureum atq; semē crocei coloris: habet radi cem albam similem dragonetę, quę cruda & cocta manduca ri potest, quia non est ualde caustica: folia eius composita in sale māducantur & c. hęc est quā moderni serpentariā mi norem uocāt, seu dragonetam minorem, seu pedē uitruli.

Mambathematicon fm compositi. est succus cauliculi agre stis. Quidam mambathematicon uocant, quod idem est. Cir ca instās ait: Struthium. i. cauliculus agrestis: sed hic textus est corruptus. Nam struthium apud Diof. sunt radices rotun de & oblongę quibus lanari utuntur ad fumigandum lanas quod fumigium limpidat lanam. Secundum eundē caulicu lus agrestis nascitur in locis maritimis, & desertis, albidior & longior domestico & amarior.

Opobalsamum. i. lachryma balsami, cōponitur ab opo s q; est succus & lachryma. Diof. in cap. de balsamo inquit: Est. n. arbor tenera & asperior & oblonga, tipitem hūs simi lem iunco. Arbor dī balsamus, lignum xylobalsamū: semen carpobalsamū, succus opobalsamum. Balsamus autē si purus fuerit tātam uim habet, ut si sol incanderit, sustineri in ma nu non possit. & hic succus apud nos non inuenitur: sed in fra apparebunt olea quæ loco eius possunt administrari.

Alipiados fm cōpo. est mezereō, & semē ipsius cocogni dum uocat, & nō est laurcola, ut quida extimauerūt. Hęc plata apud Diof. uocat chamelæa aut cocognidum. Idem in ca. de oleo catholico inquit: Tolle herbę catholice. i. alipia dos. Nā sine dubio aliapiados apud Gręcos est herba catho lica, seu chamelæa. Verū sapiētēs dixerūt: qū inueniūt in quo dā antidoto, ubi ingrediat aliapiados, & cocognidū, debet intelligi laurcola, & semē mezereō. Hęc apud herbatos dicitur herba oliuella, propter similitudinem foliorū eius.

CXVIII. DIACATHOLICON.

Re. Folliculū sene,

Pulpe casie fistule,

Tamarindorum,

ana. 3. ii. alias. 3. iii.

Rheubarbari,

Violarum,

Polypodii. ana. 3. i.

Fiat decoctio cū 3. vi. seminis feniculi, & 3. iii. s. polypo dii recētis. Di. sēperetur cassia, & tamarindū coquatur lēto igne ad ipsius tinē: tunc & pulueres harū rerum & fiat ele

Liquiritiæ rasę,

Penidiarum,

Candi,

Quatuor seminum commu-

nium frigidorum mundato-

rum. ana. 3. ii. alias. 3. i.

Zuchchari. lib. ii.

ctuarium,

† i. men-
the aqua-
tice.
* i. didam
ni.
† Colo-
cynthis ap
pellatur.
† i. femi-
nis cauli-
culi agre-
stis.

* Mezereō
Arabibus
thymelæa
Diof. uoci-
tatur.
* Bacæ
lauri nomi-
natur.
† i. seminis
petrolei
nisi dome-
stici.

Quarum, cuius dosis est ab .j. s. usq; ad .j. i. cum aqua calida.
COMMENTA. MANLI.

Istud electuarium apud nostros doctores est multum in usu, maxime secundum istam descriptionem. Dicitur autem catholicum ab inuentore. Descriptio uero quam scribit Lu men male lucens, nō debet fieri, quia hodierni doctores nō laudat ipsam. Ild. in li. 10. inquit: Catholicus i. uniuersalis, græcum enim nomen est charis Græcum nomen est sicut & charitas: unde & eucharistia sacrificium. i. bona gratia: hoc potest accipi per diuersa nomina.

CXX.

DIACOSTVM.

R. Anisi, Croci,
Apii, Aristolo- Longæ,
Alari, ana. 3. ii. 3. ii. chiz, Rotundæ,
alias. 3. xxxiii. ana. 3. i. 3. ii.
Squinanti, Costi. i. s. alias. 3. xviii.
Melanopiperis, Cinnamomi,
Myrrhæ, ana. 3. ii. s. Calsie lignæ, ana. 3. i. 3. ii.
alias. 3. xx. alias. 3. xv. 3. ii.
Rheubarbari, Mellis quantum sufficit.

COMMENTA. MANLI.

Diacostū autem dicitur a costo, quod recipit. Supra posita fuit alia descriptio, quæ est de menthæ Mef. quæ quasi eadem est, tamen differt: & sic sunt ex hominibus qui componunt ipsum secundum istam descriptionem, alii fecerunt illam. Costum autem est radix amara quæ satis est nota.

APPENDIX.

Nihil diacostu, e costo sane antidotum Astuarii iam exposito euariat, quāq; loco anisi, anethum substituit, costūq; (in Ruelli uersione) omittit, quem a studiosis resistentium celsens, alioquin petenda esset aliunde antidoti inscriptio.

CXX.

DIAIRIDOS, Vulgo Diariris, de melle.

R. Ireos. 3. i. Piperis, ana. 3. iii.
Pulegii, Caricæ,
Hyllopi, Carnium dactylorum,
Glycyrrhizæ, ana. 3. vi. Passulorum enucleatarum,
Draganti, ana. 3. iii. s.
Amygdalarum amararum, Styra- Rubæ,
Pinearum, cis Calamitæ,
Cinnamomi, ana. 3. ii. 3. i.
Zingiberis, Mellis quantum sufficit.

COMMENTA. MANLI.

Diariris ita dicitur a radice illa quæ ireos appellat. Gilib. de Anglia in cap. de strictura thoracis habet unam aliā descriptionem, quæ eadem est. Item Aui. in .5. can. in trac. vi. de uentre inferiore, & debilitate stomachi inquit: Medicamē quod dicitur diareos, sed idem nō est. Descriptio uero Luminis apothecariorum seu Luminis male lucētis est falsa. Nam quædam simplicia subtraxit. Dicitur diariris de melle ad differentiam descriptionis quæ fit de zucharo: & eius modus est quod accipiat zucharam depuratum ac clarificatum & costum ad debitam cocturam, & quando infrigidatum fuerit addatur put. radicū ireos, quantitas debita & fiat coctio in morisillis, & id uocat diariris de zucharo, quod magis in usu uenit quam diariris de melle. Ireos uero secundum modernorum opinionem est radix lilii cœlestis.

Caricæ sū compositiores sunt ficus pingues siccæ, idem habet Gilibertus: sed Lumen male lucens detrahit caricæ, carnes dactylorum, passulas, & alia multa.

Storax rubea. i. cozumbarum apud modernos est thymia male seu flex thoracis liquida. Storax calamitæ est satis nota. Inuenit quædam descriptio ubi non ingreditur nisi storax rubea, & in aliquibus ingreditur storax rubea & calamitæ in descriptio Giliberti nō habetur nisi storax rubea. i. cozumbrum: sed secundum quosdam ambo debent poni.

CXXI.

DIACALAMINTÆS, Vulgo,

Diacalamentum.

R. Calamenti, Pulegii,

Melanopiperis,
Petroselini,
Sesele, ana. 3. iii. 3. ii.
alias. 3. liiii.
Leuistici. 3. i. 3. i. al. 3. xviii.
Sem. Apii. 3. i. alias. 3. iii.

* Ameos,
Thymi,
Anethi, ana. 3. i.
Cinnamomi,
Zingiberis, ana. 1. 3. ii.
Sem. Apii. 3. i. alias. 3. iii.

* Singulis tribuit Ni co. pōdus unc. i.

Tali. sra. ii.

COMMENTA. MANLI.

Diacalamentum dicitur a calamentho quod recipit. Supra posita fuit una alia descriptio, quæ est de menthæ Mef. & secundum illam descriptionem a multis fit, & apud quosdā fit secundum istam descriptionem, & hoc est secundum uoluntatem medicorum, ac apothecariorum.

CXXII.

DIACODION.

R. Capita papauerum nigrorum nō nimis uiridium, nec nimis siccorum 1 numero. xlii. alias cl.
Rosarū. 3. ii. s. alias. 3. xxviii. Myrryllorum. 3. i.
Glycyrrhizæ, Coralli
Acaciz, Albi,
Croci. ana. 3. i. alias. 3. ix. Rubei,
* Boli armeni. 3. s. Sumach,
Cinnamomi, Sanguinis draconis,
Symphyti, Laccæ,
Hypocisthidos, Roris syriaci, ana. 3. ii.
Balautizæ, ana. 3. i. Seminis portulacæ. 3. s.

Talis numeros. xlii.

Hæc Nic. omittit.

Consciantur siccapita papauerū ponantur in tū aquæ pluuialis q̄ bene cooperiantur, & per tres dies ibi dimittantur & in ipsa aqua ad tertiā partē bulliat & postea coletur, & in colatura l. i. s. mellis myrtini, addat in cali melle supra dicta admiscet. Coctio mellis myrtini talis est, in duab' libris mellis depurati, ponat l. i. s. succi myrtini, & coquantur ad succi cōsumptionē, et postea colet, et hoc erit mel myrtinum.

COMMENTA. MANLI.

Diacodiō dicitur a codia, quod papauer nigrum interpretatur, quod ibi intrat. hoc apud nos non est in usu. Illa uero descriptio qua nos utimur est de mēte Mef. quā ipse uocat coctioē de iacur, & ipse docet ipsum fieri diuersimode: nam qnq; fit simplex, qnq; compositum, qnq; fit cum melle, quandoq; fit cum rob, quandoq; fit cum penidid, & sic de singulis, & sic uide supra, quod ostendi ipsum componere separatim secundum diuersitates compositionum.

Symphytum. i. cōsolida maior seu anagalicum. de quo supra in cōfectione dicta athanasia.

Roslyriacus sū compositi. est flos orni. Secundum uero Simonem Ianuen. Roslyriacus est flos ueni, unde mirandū est, quod Nicolaus in isto antidoto habet sumach & rosē siccā. Ergo idem non sunt. Veritas autem est q̄ roslyriacus est sumach, sed iste textus est corruptus: debet enim dicere herbæ syriacæ, quæ est malua. Coctio mellis myrtini eiusmodi est, sicut docet Nico. in isto antidoto.

CXXIII.

DIAPAPAVER.

R. Succi liquiritiæ, Sem. Portulacæ, ana. 3. ii. s.
Draganti, Citruli,
Gummi arabici, Cucurbitæ,
Penididi, ana. 3. x. Melonis,
Amygdalarum dulcium Sem. Cucumeris,
mundatarum. 3. v. Lactucæ,
Amidi, Maluæ. ana. 3. i. s.
Sem. Cydoniorum,

Fac puluerem, & tempera cum syrupo uiolato, uel cum sapa. Decur ante prandium uel post.

COMMENTA. MANLI.

Diapapauer autē dicitur a papauere, alio quod recipit. Gil de Anglia in ca. de causis uisus, habet unā descriptionē, q̄ eadē est Mesues indistincte de loch inquit: Loch de papauere & est diapapaueris ad apud apothecarios modernos, aliud est loch de papauere, aliud est diapapauer: & sic fit loch de papauere de mente Mef. & diapapauer de mente Nicolai.

Sapa. i. mustum coctum usq; ad cōsumptionem diuinarum partium: & propterea dicitur triplicatū seu d. l. cor, aliquādo carenum. Ildo. in cap. de potu inquit: Carenum dicitur

Lumi. Ma. E 2

eo q̄ feruendo parte careat: tertia enim parte multi amissa quod remaneret carenum est: cui contraria sapa est quæ feruendo ad tertiam redacta descendit.

CXXIII.
DIASENAE.

R̄. Senz. 5. iiii. Ligni aloes,
Cinnamomi, Piperis longi,
Folii, Zingiberis,
Cardamomi, Zedoariz,
Galangæ, Spicæ nardi,
Macis, Nucis moschatæ,
Garyophyllorum, ana. 3. iiii.
Boragin-um, adde & cætera, quæ Melan-
Calamentum, 5. liam purgant.
Auellananum, affatarum, Lapidis armeni. 3. i.
numero. l. Lapidis Lazuli. 3. iiii.
Setæ combustæ. 3. ii. Zuchari. 5. v.

Mellis despumati quantum sufficit.
COMMEN. MANLI.

Diasenz dicitur a senz quod ibi ponitur plus quā de aliis speciebus. Gilib. de Angliā in ca. de uitis splenis habet eandem descriptionem. Hoc antidotū apud nos est in usu: sed ego nō certior si ista descriptio sit illa qua urimus, aut nō quia ultra istam descriptionem, etiam uidi aliquos cōponētes secundum aliam descriptionem, de qua infra erit sermo: & credo quod utraq; sit de mente Nicolai.

Senz uero secundum Mes. est folliculus plantæ, quam uocant Perles ahalzemer, & eius ortus est fm semitam orobii: & inuenitur ex eo domesticū & syluestre. Electio, melior pars plantæ eius est folliculus deinde folia, sed tamē in eis est uirtus debilis ualde. Hic uero possumus certificari, q̄ introitus Mes. est q̄ senz sit folliculus plantæ: & melior pars plantæ eius est folliculus, & in foliis eius est debilitas & propter id dico, q̄ per senz intelligitur folliculus, & non folia eius, ut faciunt quidam.

Borago est herba facis nota. Compositor inquit: Boraginem & calamentum addunt quantum &c. quæ melancholiā purgant. In hoc sapientes intellexerunt, q̄ hæc duo & cætera addūt in hoc antidoto: propter malitiā quæ inuenitur in lapide armeno & lazuli, quia in eo loci non ponitur: immo hodierni doctores laudant q̄ ambo debeant lauari, & eius lotionis modum ostendi supra.

CXXV.
DIASENAE.

R̄. Senz. 5. iiii. Piperis,
Auellananum affatarum, Spicæ,
numero. l. *Ozimi,
Sericis combustis. 3. ii. Zingiberis,
Lapi Armeni. 3. i. Folii,
dum Lazuli. 3. iiii. Cardamomi,
Zuchari. 5. vi. Croci,
Cinnamomi, 5. i. Zedoariz,
Garyophyllorum, Floris rosamarinii,
Galangæ, Macropiperis. ana. 3. ii.

Mellis quod sufficit.

Confititur sic, cum melle auellane bene puluerizata de spumatum mel ad ignem decoquitur: deinde pulvis specie rum admisceatur, & fiat electuarium in bona forma.

COMMEN. MANLI.

Diasenz, ut dictum fuit, dicit a senz, quia plus de senz ponitur quā de aliis speciebus. Hoc antidotū dupliciter conficitur, nam sunt ex hominibus qui faciunt ipsum fm primam descriptionem, & sunt ex hominib. qui faciūt ipsum secundū istam descriptionem, secundum diuersitates prouinciarum.

Senz autem est folliculus plantæ, ut dictum fuit: & melior folliculus est cuius color trahit ad uiriditatem, et subnigredinem quandam, & in quo est de amaritudine res modica cum stypticitate, & qui est magis completus, & in quo sunt semina ampla compressa. Subalbidus autem nō est bonus, & incompletus similiter, & meliora folia sunt uiridia subalbida, & tenuia non bona, & antiquatum ex eo est sine spiritu, & stipites eius sunt inutiles.

R̄. Aliptæ moschatæ,

Myrrhæ,
Zuchari,
Foliorum rutæ,
Seminis apii,
Chamaedrys,
Foenigraci,

Limaturæ eboris,
* Pigami,
† Elcliphaci,
Balauftiz,
* Golenz,

Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Capparis,
Pulegii,
† Xyloaloes,
Spicæ,
Zedoariz,
Lacæ,
Rosarum,
Abrotoni,
Melanopiperis,
Petroselinii,
Osium dactylorum,

ana. 3. ii. s. gr. iiii.
alias. 3. xxxvi.
Galangæ,
Zingiberis,
Croci hortensis,
Anacardi,
Lithodemonis,
Mandragoræ,
Acori,
Pzoniz,
Thynni,
Hyslopi,
† Koris syriaci,
Basiliconis,
Dauci,

Seminum Foeniculi,
Althææ,
† Oliuarum ossa,
Vini ueteris optimi,
ana. 3. s. 5. gr. i.
alias. 3. xxvii.

Balsami,
Croci orientalis,
Folii,
Costi,
Galliz,
Cassiz fistulæ,
Myrobalanorum omnium,
Nardi celticæ,
* Xylobalsami,
Calami aromatici,
Dragaganti,
Coralli, Albi,
Rubei,
† Confitæ rubææ,
Castorei,
Opoponacis,
Bdelli,
Galbani,
Aphalti,
Terebentinz,
Theriacis,
Masticis,

ana. 1. 3. i. 3. i. gt. i.

ana. 3. i. gr. vii. s.
alias. 3. xlv.

* Splenis pultri,
Ventre merguli,
Rheupontici,
Kristolochiz lon.
Alari,
Hermodactylorum,
Meu,
Iridos,
Pyrethri,
Peucedani,
Gentianæ,
Epithymi,
Volarum,
Arthemisiz,
Cimoleæ,
Foliorum citri,
Laureolæ,

Menthæ,
Malabahræ,
Quinquæ folii,
Carpobalsami,
Anisi,
Amomi,
Cymini,
Ozimi,
Platocymini,
† Meconis,

Sem. Rutæ hortensis,
Baccarum lauri,
Sanguinis draconis,
Lapi. Magnetis,
dum Agapis,
Osis de corde cerui,
Muscellini,
Petrolei. ana. 3. i. & tertiam partem alterius. alias. 3. xviii.

Camphoræ,
† Ambræ,
Marga. Perforatarum,
riturum Non perforatarum,
Blactæ bifantiz,
Sambuci,
Seyracis calamitæ,
Sagapthi,
† Sulphuris uini,
Ammoniæ,
Antimonii,
Acaciz,
Betonizæ,
Caballi marini,
Hipopocistidos,
Macis,
† Licii,
† Schoenanthus,
† Herba syriacæ,

† alias. 1. liii. Pōræ nanque sic ad finem man. gitudinis aucta, Nico. pr. scripto la bentur. * i. seminis regni, & tanq. poganon ruta agrestis Gale, viii Simp. † Liliag. uulgo i. saluar. * alias Go lenz. i. origani. † xylobalsami, inepce prius legebat.

† Sumach uulgo.

† Osium dactylorum mendose iā impressis habet.

† Ambar, ac fuscina orientale rectiori bus uocatur.

* Xyloaloes prius legebat quæ præter tim nō pōderum rōnem adnotauimus, aliquos nulli momentū fieri simpliciū transpō.

† Cōstæ fex fliz. cis liq. th. iudzo rum uulgo appellat.

* Alii de polithro. † Scutian tu uulgo.

† Altra-
dis, in-
no: t
uor ab
olichio
dona,
naroni
uig.
* curat
spiculis
† di fac-
cauiss
apribi.
† cau-
bus di-
ant.

Floris oleandri,
Phu,
Marrubii,
Sulfuracæ,
Abinthii,
† Alexandri,
Euphorbii,
Cardamomi,
Carthami,
Seminis anethi,
Ameos,
Git,
Leuistici,
Seminis citri,
Leucopiperis,

Macropiperis,
Nigella,
† Vxifur,
* Corticum neræ,
† Mabathematico,
Aque uitis, ana. ʒ. s. gr. ii.
alias. ʒ. ix.
Lithargyri,
Amyli,
Opil,
Radici iunci,
Calamintha,
Hyofcyma, ana gr. vii.
alias. ʒ. iiii. s.
Mellis quod sufficit.

COMMENTA. MANLI.

Esdra autem dicitur, quia Esdra propheta inuenit eam, ut dicitur in Babylonia. Gili. de Anglia in ca. de uariolis & morbilis, habet unam aliam descriptionem quæ eadem est. Hoc antidotum uis esse ad modum theriacæ & sine dubio potest ipsum dici Theriaca. Nam Aui. in 5. can. inquit: Theriaca Eledre in cuius descriptione ingrediuntur multa simplicia, quæ ingrediuntur hæc descriptione: uerum in hac multa ingrediuntur. Hoc antidotum apud nos in uero non est: uerum, quædam simplicia, si Deus uoluerit, breuiter declarabo.

Alipha mulsca uel mixtura, i. confectio, quæ in modum trochisci reducitur, cuius descriptio superscripta fuit.

Limaturæ eboris. i. limatura ossis uel dentis elephantis. Isido. in cap. de bestis inquit: elephante Græci magnitudinem corporis uocant putant, quæ formam motus præferat. Græce enim mons Elephas dicitur: apud Indos autem a uoce barro uocatur, unde & uox eius barritus dicitur: & dentes eius ebur. Inde ebur, id est, ides Elephas: limaturæ eboris, id est, rasura dentis elephantis.

Peganon uulgo piganum secundum compositorem est ruta agrion. i. agrestis. Gal. in 8. simp. inquit: Peganon. i. ruta sylvestris Macer in cap. de ruta describit diapiganum. i. eletharium de ruta. Et Diof. in eodem cap. describit diaspolicum, quod idem est, quod infra.

Lilipaga, id est, falua.

Golenz fm Circa intas est origanum quod exiecatissimum fuit cum floribus abiectis stipitibus in medicinis ponitur. Pet. de Crescen. Origano alio nomine dicitur gollena, cuius duplex est maneries. i. origanum agreste quod latiora habet folia, & fortius operatur, & est domesticum quod in hortis reperitur, & minora habet folia, & operatur suauiter quod in medicinis ponitur. Colligitur autem in tempore productionis florum, in umbra suspenditur & siccat. Folia cum floribus debent in medicinis poni abiectis stipitibus: per annum feruntur. Hoc apud Lombardos cornabolia uulgo dicitur.

Petrofelinum domesticum quod notum est. Isido. in ca. de oleis inquit: Petrofelinum uocatur quod sit simile apio. Nascitur in petris montibus, quæ præruptæ, quod nos petrapium dicere possumus.

Crocus hortensis. i. hortulanus seu infectiuus, eo quod de ipso tingitur ferici, & est flos carthami, cuius semen gineo dicitur. Ginzus. Hoc apud Diof. uocatur cnicum, & de eo dictum est supra.

Lithodæmonis fm compositorem est lapis niger, qui de India uenit. Quidam uocant ipsum lapidem dæmonis, & hic est lapis qui inuenitur prore alphalum, & quidam putant uerum esse idem, sed non recte. Nicolaus Floren. in sermo. 7. in cap. de curatione herie sue ramis habet glutinis lithodæmonum, & inquit: Lithodæmonum. i. cum quo lapides, & urcei conglutinantur.

Ros syriacus secundum compositorem est flos ornithidis, quod abunde supra diximus.

Nardus, id est, spica nardis, seu aromatica. Apud Aui. dicitur spica auium.

Celsia, id est, neride, seu spica romana: & ambæ debent hic poni.

Cosia rubra secundum compositorem est flos rubra secundum quoddam est laudanum, non est autem flos theriacæ calamitæ, ut

quidam dixerunt. Nam infra iterum ponitur flos theriacæ calamitæ. Moderni uero opinantur esse cozumum. i. flos theriacæ quidæ, & est thus Iudæorum: quoniam Iudæi utuntur ad fumigandum in synagogis suis. Hæc thymiamam dicere possumus.

Theriaca dicitur a tyro serpente. Quidam dicunt quod est theriaca Gal. alii dicunt quod per theriacam intelligitur uinum rubeum coctum cum castoreo.

Splen pultri. Nō determinat ab autoribus cuius complexionis sit splen pultri, tñ effectus eius manifestat quod sit de mafa sanguinea. Alii dicunt quod est splen, sed non recte: sed nostri doctores opinantur quod sit quædam splufuitas cerebri pulli equi, neque in tpe sue natiuitatis per motum suum per nares emit titur, & nisi statim ab aliquo recipiatur mater pulli eam ab sorbet. Soli exponitur & siccat & referatur, & quanto magis exiccatur tanto est melior. Aui. in theriaca Eledre loco eius hæt hepatis almelichis, quod reperio apud Gentile esse hepar pulli equi. Idem in 3. can. in fen. xv. in ca. de curationibus splenis inquit: Sumat splen asini syluestris, & splen eg. Simon Ianu. in ca. de quebenomolet, inquit: Quebenomolet uel quebelemet. in. 10. practi. alia i. cōfectio Eledre quam azere uocat eo loco apud Aui. est almelichis: & in pātechni est hepar pulli equi, sed in antidotario illi splen pulli equi habetur. Stephanus, & sic est quod hepar almelichis & splen pultri & hepar pulli equi idem sunt.

Mergulus secundum multos est aqua que uulgariter nominatur mergonius in aquis habitat, & eius color uergit ad nigredinem, & omnibus fatis est nota. Rasis in li. aphor. in li. 4. in ca. de dictis medicinis & cibariis inquit: Altriar. i. merlus aus, nescio autem an sit idem, tñ considera.

Cimolea secundum compositorem est terra farda sine Hispania, quædam terræ argætiarum compositum. Gili. ibid. ait: Cimolea. i. terra alba. Io. Sera. in ca. de mulieribus qualiter significetur quod ipse sine pñantes inquit: Cimolea est marmor inuentum in luto uiridi. Idem in suis simplicibus in cap. de cimolea, inquit, quod sunt eius duæ spēs, una est alba solida, alia est purpurea uelut unctiua, quæ quæ tangitur adhæret digitis, & est melior aliis. Hæc apud Diof. uocatur gicimolia, cuius alia est alba, atque densa, alia purpurea, & quasi pinguis. Apud Aui. uocatur lutum cimoleæ. Quidam falso putauerunt esse terram sigillatam, quod non creditur.

Laureola, secundum Circa intas est cocognidii semine eius, hic textus est falsus. Nam laureola apud Sera. inter species lauri describitur, & cocognidium apud Diof. uocatur chamælea quæ alio nomine dicitur mezerion: unde per hoc di eo quod laureola non est semen cocognidii: immo cocognidii est semen chamæleæ, seu mamereon.

Platocyminum secundum compositorem est siler: ergo est siler montanum Nam platocyminum est dictum latum cyminum, quod est sileos. Præterea Gili. ibid. ait: Platocymini. i. sileris montani.

Lapis magnes secundum Dio. gignitur, atque inuenitur circa litus Oceani, apud Ragodicas & in India, ab inuēto re sic uocatus: est autem colore ferrugineus, magnas habet uirtutes, & uelut spiritum in attrahendo ferrum. Hunc lapidem quidam probandi causa auioris uirorum. Papias ait: Magnes lapis indicus ab inuēto eiusdem nominis dictus, cui tanta uis est, ut ferrum ad se trahat, quod si iuxta eum adammas positus fuerit mox remittit.

Lapis agapis secundum compositorem est lapis agarista: quidam falso putauerunt esse lapidem Iudicum. Secundum Diof. est lapis potentias habens maximas. Sed qui colorem habet similem pelli leonis ualer ad morsum scorpionis.

Muscelinum. i. oleum muscelinum, quod ex musco, & aliis speciebus fit, cuius descriptio infra apparebit. Quidam falso oleum balaninum putauerunt, sed non recte. Nam muscelinum dicitur a musco & balaninum, a granis bene.

Petroleum. i. oleum petroleum, quod a Modernis dicitur naphra, seu spēs, & ab aliquibus dicitur stercus dæmonis. Mel. in distinctione de oleis in collectione olei philosopho rū inquit. Est autem eius aliud quod fit a natura, & profert illud mineræ aliud mare, & est locus manationis eius in insulis & scopulis maris, & uocat naphra, cuius res tunc sunt. Est

S E C T I O P R I M A

enim quoddam subalbidum, & quodam subrubrum tenue, & aliud grossum subnigrum: subalbidum uero est melius aliud subrubrum est post illud, aliud uero postea.

Caballi marini s̄m compositorem sunt pisces habentes collum & caput & rostrum ad modum equi, caudā ad modum lacertæ reuolutam super dorsum, & isti sunt pisces qui in mari inueniuntur dicti uulgarī nomine Caballini, eo q̄ caput habent simile caballi capiti, & pedes simili modo. Lycium secundum eundem est succus de floribus caprifolii uel oculus lucidus. Ergo est succus matris illius, quæ apud nos iuxta hortos inuenitur. Infra in pilulis lucis minorib. ostendunt melius.

Herba syriaca s̄m eundem, & Matt. Syl. est malua. Giliber. ibidem ait: Herba syriaca. i. malua. Si uero diceret roris syriaci nō esset idem. Nā rorsyriacus est sumach, & herba syriaca est malua: & ambo recipiuntur in hac compōne.

Flos oleandri. i. nerion, seu rosyndendron, & est plāta uel nenofa, cuius folia sunt familia amygdalæ, sed maiora & pin guiora, & flores rhodon. i. rose amplex: semen est patēs sicut cornu ueluti lanā de intus hīs simile hyacintho. herba est illi oblonga, & angusta fallā: nascitur locis aquis, & maxime in maritimis. Hæc apud quosdā lādum uocatur Diofco.

Sulphuraca s̄m quoddam est herba quæ odore habet sulphuris, & dicitur q̄ est species trifolii. Simō Ianuē. ait Dēs equinus a quibūsdam uocatur sulphuraca planta iuxta fluuios nascens. Secundum uero Mat. Syl. Dens caballinus uel dēs equinus est casilago, siue iusquiamus. Nam sine dubio dēs equinus dicitur a multis iniquiamus, & est planta quæ nascitur multum iuxta fluuios, & in sterquilinis locis, & est quā Papientes herbam pinulam uocant.

Cardamus. i. nasturtium, & est nomen Græcum. Giliber. ibidem ait. Cardamus. i. nasturtium. s̄m semen. Miror q̄ Gal. in. 7. simp. dicat. Cardamus. i. crocus hortulanus: & est ex herbis pinosifol. quod falsum est. Nā cardamus est nasturtium. Præterea idem in. 7. dicit. Cardamus. i. nasturtium: credo tamē quod hoc acciderit errore scriptoris. Nā debet de cere cardamus. i. crocus hortulanus. Diof. de cardamo duo facit c. nam eius species sunt multæ. Est enim cardamus do mesticus dictum nasturtium, & est cardamus aquaticus dictus fenecion, seu chrysonum, & sic de singulis.

Gith. i. melathium, siue melachio: & apud Modernos est nigella nigra, quæ apud Diof. uocatur melathium. Multi falsi apothecarij loco gith utunt illo femine, quod in bladis inuenitur, quod a multis gitono uulgariter dī: sed non recte. Nam gith quæ in medicina efficacia habet, est semen minutum simile femini porri, cum odore iocundo, hoc semē inuētum fuit ab hodiernis. Et apud nos ultra padum in terra no minata Pinarola inuenitur, & uocat rochetā: antiquo uero tempore utebatur nigella, quæ colorem citrinum habebat ac triangulatam cum odore priori. Vnde sapientes uolunt, q̄ per gith intelligatur nigella nigra, & per nigellam intelligatur nigella citrina, quæ hodie ambæ notæ sunt.

Uxifur s̄m Giliber. ibidem est minium, sed potius falsum: nec sinopodia, ut quidam dicit: imo uxifur uerum est cinabrium. Simon Ianuen. inquit: Uxifur siue uxifur, quodcūq; dicas corruptum est, nam Arabice zengibur dicunt, & est cinabrium. Bulehahim in trac. i. inquit. Modus faciendi zenxi fur, & est cinabrium. Ergo uxifur est cinabrium, & non minium, nec est sanguis draconis, ut quidam crediderunt.

Cortex nere s̄m cōpositorem est cortex cerasi agrestis, & eius semen a multis modernis mechaleb dī. Io. Arculanus in ca. de signis lapidis renem inquit. Nere. i. cerasorū syluestrium, sed Platearius inquit: est arbor, in Apulia inuenitur, producens fructum ad modū baccarū lauri, quæ utuntur Saraceni ad faciendū tincturam: si sic est, cerasa agrestia nō sunt nere, & pro certo idem non est: quia Mat. Syl. in ca. de machaleb inquit: Machaleb est medulla fructus cerasi domestici uel syluestris: & est in ueritate medulla cerasi syluestris cuiusdam, quæ mulieres Arabum utuntur in oleo quō ungunt capillos suos, & alio nomine uocatur nere, & est arbor cerasi syluestris. Apud nos defertur machaleb ex Ianua cuius magnitudo non est, ut dicit Platearius.

Mabathematicon secundum cōpositorem est succus caulium agrestium, & sic credo esse uerum. Secundum Circa instans est struthium, quod non est. Vide de ipso supra, quia melius ostensum fuit.

A P P E N D I X.

Elsdra, a Nicolai præscripto, apud Græcorū recentiores uarie admodum conficitur. Actuarius enim in lib. de cōposi. medic. Compōnem, ac parandi modum una quā breuissimè exponit. Aegineta autē cui a multiplici nempe usu *αἰγιόγετος* belle uocata ē, simplicissime li. vii. ca. xi. rē p̄strin git. Actus uero li. xiii. ca. i. r. i. habet longe uagatur. Verū iis nec ex iisdem, nec pondere eodem omnino componitur.

C X X V I I.

D V C I S.

℞. Anisi, .j. ii. gr. xv.	Leuistici,	℥i.
Liquiritiæ,	Alexandri,	
Malticis, ana. ʒ. ii. gr. v.	Iniperi,	
Chamædyos,	Sileris montani,	
Zingiberis,	Pentaphyllon,	
Cinnamomi,	Semin. asparagi,	
Galangæ,	Rheubarbari,	
* Marathi,	Vrticæ,	
Carui, ana. ʒ. i. gr. xv.	Rheupontici,	
Calamenthi,	Nucis myristicæ,	
Pyrethri,	Ligni aloes,	
Piperis,	Albi,	
Longi,	Basiliconis,	
Cyperi,	Mili foliis,	
Squinantis,	Saxifragiæ,	
Dauci,	Citri,	
Irei,	Ameos,	
Amomi,	Radici asparagi,	
Folii,	Citrulli,	
Asari, ana. ʒ. i.	Mellonis,	
Spicæ,	Cucumeris,	
Croci,	Sem. Cucurbitæ,	
Gummi arabici,	Scariolæ,	
Dragaganti,	Petroselini,	
Seminis anethi,	Albi,	
Calami aromatici,	Rubei,	
Cubezæ,	Syracis calamitæ,	
Cardamomi,	ana. gr. xv.	
Carpobalsami,	Penidiorum. ʒ. s. .ii. s.	
	Mellis quod sufficit.	

C O M M E N. M A N L I I.

Istud electuarium non est in usu. Secundum intentionē cōpositoris dicitur ducis ab Abbate de curia, qui illud cōposuit ad opus Rogerii ducis filij Roberti Guiscardi.

C X X V I I I.

P L I R I S A R C O T I C O N.

℞. Cinnamomi,	Sampluci,	
Garyophyllorum,	ʒ Balsamitæ,	
Ligni aloes,	Basiliconis,	
Galangæ,	Cardamomi,	
Spicæ,	Macropiperis,	
Nucis moschatæ,	Myrrillorum,	
Zingiberis,	Corticum citri,	
Spodii,	ana. ʒ. i. gr. v. alias. ʒ. vi.	
* Schœnantlus,	Gemmarum,	
Cyperi,	Albi,	
Rolarum,	Been. Rubei,	
Violarum, ana. ʒ. i. gr. xv.	Coralii Albi,	
alias. ʒ. x.	Rubei,	
Folii,	Setæ combustæ,	
Glycyrrhizæ,	an. ʒ. i. ii. s. alias. ʒ. iii.	
Maltiches,	ʒ Moschi, gr. vii. s.	
Syracis calamitæ,	ʒ Camphoræ, gr. v. alias. ʒ. ii.	
Syrupi rosacei quantum sufficit.		

C O M M E N. M A N L I I.

Istud electuariū est in usu. dī ut pluris. i. completa medi cina: arcticō principiū interpretatur, ualeat tristibus & melancholicis. Gilib. de Anglia in ca. de dysenteria intestinali uel hepatica, habet unā aliā descriptionē q̄ eadem est huic.

Samplucis

† Mentis aquatica uulgo

* Squinum tū offici nis.

† Apud Nipola Regiū uerisio desideratur.

Samplicus fm Dioſc. a Siculis amaracus nominatur. Idē apud eundem: centaurea minor ab aliquibus amaracus uocatur, quod falſum eſt. Nam amaracus ſi eſt ſamplicus, non eſt centaurea. Præterea ſecundū Modernorū opinionē generaliter tenetur quod amaracus ſi alacō ſiue uechuen. Nā Aui. in. 5. can. in deſcriptione tertia troch. alimdaracō ingrediēdū in theriaca magna inquit: Amaracus. i. alacoen alba. Ergo amaracus eſt matricaria, quæ apud Aui. in. 2. can. uocatur uechuen: & eſt herba quæ apud Lombardos criſpula uocatur, ſed ſamplicus eſt uera maior aqua.

Balfamita fm compoſitorem eſt mentha aquatica, q̄ alio nomine ſilymbrium uocat. Verum ſilymbrium apud Aui. in. 2. can. uocatur nemeſ, nō recte: quia nemeſ eſt ſerpilum, balfamita uero eſt mentha, quæ odorem parum balfami reddit, & eſt herba quæ apud nos iuxta aqua inuenitur.

Gemmæ ſecundum noſtrorum doctōrum ſententiā ſunt lapides precioſi, quas Meſ. in electuario de gemmis deſcribit. nā electuarium de gemmis dicitur propter lapides precioſos, q̄ in ipſo ingrediuntur, & uocatur a multis fragmēta cordialia, & ſunt proprie zaphyri, hyacinthi, ſardini, granatæ, & ſmaragdi, & iſtos quinq; lapides meo tempore uidi in ipſo electuario ponere. Quidam dicūt quod per gemmas intelligantur extremitates becn albi, & rubei, ſed prima opinio eſt melior. Conſtantinus in uaticō in cap. de la chrymis oculorum inquit: Gemmarum non perforatarum, ego exiſtimo quod ſecundum ipſum debent eſſe margaritæ ſiue perle. Verum eſt q̄ margaritæ ſunt laudate in iſto electuario, ſed magis laudantur iſti lapides precioſi.

Syrupus roſatus ſit ex aqua inſuſionis roſarum & zuc. ut docet compoſitor. Idem docet Meſ. Oportet aut ſi hanc cō ſectionem facere uolueris ſecūdū intētiōē cōpoſitoris, q̄ accipiatuſ inſuſio roſarū, de qua ſit ſyrupus roſatus. Et hæc inſuſio clarificetur & coquantur zuccharū ſecundū artem: & quando coctum fuerit, addē ſpecies ſupradictarum rerū, & fiat electuarium in morſellinſque fatis eſt notum.

CXXIX.

DE SVCCO ROSARVM.

* Zuccharam uocant.	R. * Sacchari,	Albi,
† i. maha zani, apud Mauritanos.	Succi roſarum, anali-	Sandali, Rubei,
* i. scammoni ſuc cum,	bram. i. 3. iiii.	† Citrini, ana. 3. vi.
	Spodii. 3. iiii.	Camphoræ. 3. i.
	* Diagridii. 3. xii.	

Tempera ad modum electuarii cum ſyrupo facto de prædicto zuc. & ſucco roſarum, & fiat electuarium.

COMMENTA. MANLII.

Iſtud electuarium eſt in uſu. Dicitur autem electuarium de ſucco roſarum ab eodē ſucco, quod recipit. Gilib. de Anglia in cap. de cura arthritice. Secundum Modernos habet unam aliam deſcriptionem quæ idem eſt. Petr. de Creſcentiis in ca. de roſaria, habet mel roſatum, electuarium de ſucco roſarum, ſyrupum roſatum, & oleum roſatum, quæ omnia ſunt ex authoritate Nicolai. Supra eſt poſitum electuarium roſatum, quod etiam eſt in uſu ſub nomine electuarii roſati Meſ. & iſtud eſt in uſu ſub nomine electuarii de ſucco roſarum, quod fatis, eſt notum.

CXXX.

DIAHYSSOPV.

† Tragacanthos ca rizarū loco apud Regium habetur.	R. Hyſſopi,	Carnium dactylorum,
* i. glyco- niſi offici- nis.	Iridos,	† Caricarum pinguium,
† i. maha zani, apud Mauritanos.	Melanopiperis,	Paſſularum enucleatarum,
	Thymi, ana. 3. xx.	Marathi, ana. 3. x.
	* Gleeonis,	Zingiberis,
	Thymbræ,	Aniſi,
	† Pigami,	Carui,
	Cymini, ana. 3. xx.	Leuſiſti, ana. 3. v.

Mellis, quod ſufficit.

COMMENTA. MANLII.

Iſtud electuarium non eſt multū in uſu. Gilib. de Anglia in ca. de cauſis tuſſis, habet unā aliam deſcriptionē quæ eadem eſt. Hyſſopus aut herba ſatis nota. & hæc eſt hyſſopus ſicca. hyſſopus uero humida eſt pinguedine ſue ſordicis lanarum otium. Aui. in. 2. can. de utraq; cap. facit. Circa in-

flans inquit: Hyſſopus herba eſt ſatis cōis, uirtutem habent folia & flores, nō autem radix. In æſtate cum flores producit colligitur, in umbroſo loco non fumoſo ſuſpenditur & deſiccatur: in medicinis folia & flores abiectis ſtipitib. ponuntur: per annum ſeruat, ſingulis annis renouatur.

Gliconium ſecundum compoſitorem eſt pulegium. Gil. & in ſua deſcriptione poſuit gliconium quod ſecundū quodam eſt mentaſtrum. Alii dicūt quod eſt calamēthum mō tantū, ſed opinio modernorum eſt ſi intētiō compoſitoris eſt quod ipſum ſit pulegium, nos poſſumus ipſum ſequi.

Thymbræ. ſaturægia, ſecundum Macrum: idem inuenitur apud Serap. in cap. de ſaturægia: & hæc eſt herba quæ in hortis inuenitur. Circa inſtās aut ſat: Saturægia cum flores producit colligitur, & in umbra deſiccetur.

Peganon ſeu pigamum eſt ruta agreſtis ſecundum Gal. in 8. de ſimpl. Item inuenitur diapiagam. i. electuariū de ruta: cuius deſcriptio infra apparebit.

CXXXI.

AD REVSTAVRATIONEM humiditatis.

R. Glycyrrhizæ,	Cinnamomi. 3. i.	* alii raſe nō adraſa legunt ut ſit glycyrrhizæ raſe, q̄ magis arri det.
* Roſæ,	Styracis calamitæ,	
Sacchari, ana. 3. ii.	Zingiberis, ana. 3. ii.	
Dragaganti,	Pendii. 3. ii.	
Gummi arabici, ana. 3. i.	(Citulli,	
San. Albi,	Melonis,	
dali, Citrini, ana. 3. vi.	Sem. Cucumeris,	
Papaueris albi. 3. i. s.	(Cucurbitæ. ana. 3. s.	
Succi glycyrrhizæ,	Seminis cydoniorum. 3. iiii.	
Amidi,	Amygdalarum,	
Portulacæ,	Pinearum,	
Scariolæ, ana. 3. s.	Berberis,	
Garyophyllorum,	† Sebeſten,	† Mixa,
Florum uuarum agreſtium,	Seminis malux,	ſeu mixa
Spodii, ana. 3. iiii.	Violarum, ana. 3. i.	Adu- zio.

Syrupi alii quod ſufficit.

COMMENT. MANLII.

Iſtud electuarium non eſt in uſu. Vua agreſtis ſecundum cōpoſitorem eſt lambruſca. Dioſc. in ca. de euanthio inquit: Euanthium ſos eſt uitis agreſtis, quæ cū cepit florere colligendi ſunt flores ipſi & deſiccandi, & in teſta reponendi melius naſcitur in Syria & Sicilia. Pl. ænanthium ſos eſt uitis agreſtis, quæ lambruſca dicitur. Item alibi. ænanthiū uitis lambruſcæ: uua colligitur cum flore, & deſiccatur in umbra & c. componitur autem ab ænos quod eſt uinū Græce, & anthos quod eſt ſos.

CXXXII.

CONTRA LVMBRICOS.

R. * Santonici, lib. i.	Carui,	* Herba de monte peſſilano
Cornu cerui uſti. 3. iiii.	Baccarum lauri, ana. 3. i.	
Semin. canabis. 3. ii.	Thymi,	
Cinnamomi 3. ii.	Zingiberis,	
Abrotani,	† Githi,	
Abſinthii,	Lupinorum, ana. 3. ii.	† Melon- thium, ſeu nigella ap peſſilatur.
Origani,	Cardamomi. 3. i.	

Mellis decocti cum gramine quod ſufficit.

COMMENT. MANLII.

Iſtud electuariū non eſt in uſu. Rainaldus de uilla Noua in lib. 2. in cap. de lumbricis, & aſcaridibus, ponit electuarium ad lumbricos necandos expertum, & illud electuariū uidetur in aliquibus rebus eſſe idem. Verum Nicolaus in ſua deſcriptione plura ſimplicia habet.

Santonicum fm cōpoſitorem, eſt herba quæ inuenitur in monte Peſſilano. Rainaldus loco eius habet cetonice quæ alio nomine herba Babylonica appellatur: & vſe eſſe ſpecies abſinthii. Quod apud Sera. Schea uocatur, quod fm eundē eſt abſinthium marinum, & ſic eſt ſine dubio. Hoc apud modernos eſt abſinthium marinum, & eſt illud quod hodie grana uocatur, aut herba marina, aut ſomēzina. Deſertur de Ianna ad nos, & ſunt qui uocant ipſam herbam zenuinam, & ab aliquibus dicitur ſemen ſanctum. Nico. Floren. in lib. 6. in ca. de uermibus uentris, & cura inquit: Dixit Iudeus q̄ ſemē bran. alias beatū datum in ſcūtitate. 3. v. emitti facit

SECTIO PRIAM

nidum uermiū, qui appellātur cucurbitini penitus, & ego existimo quod sic semē sanctum, quod uocatur semen uermium. Idē intra ibidem in uno electuario ait: Seminis uermium, quod dicitur sanctum: a quibudam dicit semē fantonici, quod idem est secundum Modernorum sententiam.

Ceruus aīal est fati notum. Os qui inuenitur in corde ip sius, & cornu eius adustum, & alia partes ipsius multa iu uamenta habent in medicina: sicut est notum practicantibus. Modus autē adulationis cornu eius est quod accipiatur cor nu cerui, & incidatur minutim, & ponatur in olla in fornace, & ibi dimittatur die ac nocte deinde extrahatur. & si est album signum est quod est combultum, sin autem non taci as iterum tātum, quod fit bene album: deinde referuetur.

CXXXIII.

PHILANTHROPVM MAGNUM.

* Squinā cum noui nant.	R. Folii, * Schoenanthus, Cyperii, Alari, Euphorbii, Thymi, † Petroleini Macedoni. Anethi, Milii folii, Lapidis lycnis, ana. ʒ. iiii. s. alias. ʒ. x. Cinnamomi, Calami aromatici, Polypodi, * Phyalidos, Melanopiperis, Sem. Petroselinii, * Vrticæ, Leuistici, Citri, Lithu spermatis, Bardane, Baccarum hedere, ana. ʒ. ii. alias. ʒ. viii. Galangæ, † Nardi, Zedoariæ, Betonice, Phu, Meu,	Alparagi, Cardamomi, Apii, Marathri, Eruce, Sinapi, Orobi, Albi, Rubei, ana. ʒ. s. alias. ʒ. vi. Garryophyllorum, Zingiberis, Costi, Cassie lignæ, Pyrethri, * Celtice, Rorobalani, Myrticorum olibani, Leucopiperis, Caroballami, Carui, Cymini, Baccarum lauri, Sileris, ana. ʒ. i. alias. ʒ. iiii. Nardi, Pulegi, Oleorum, * Sambacini, † Musceli: ana. gr. xv. alias. ʒ. iiii. Mellis quod sufficit.
-------------------------------	---	--

COMMENTA. MANLI.

Philanthropos amicus hoīs uel misericors interpretat. Hoc antidotū apud nos est in usu, sed eius descriptiones sunt di uersæ fm diuersitatem locorū. Nam sunt ex hominibus qui faciēdo ipsum errant, sicut ostēdam. Glibertus de Anglia in cap. de signis discretionis lapidis renum, & uesicæ habet philanthropum maius & minus, quæ fere idē sunt. Licet quē dam simplicia mutauerit, quædam & omiserit.

Philanthropos etiam aliquando inuenitur pro quadam herba, quæ est species lappagi. unde Dios. in ca. de aparine inquit: Aparinē quam Græci philanthropon, uocant latine purpurea, uel lappago dicitur herba eius: cuius formam ibi docet quæ apud nos circa hortos nascitur, & muros. Plini. inquit: Aparinē aliqui omphacocarpon, alii philanthropon uocant: rosam foliis hysutam quinis sensue in orbem ramo rum foliis, per interualla: semen rotundum durum, & cōca- uum subdole, nascitur in frumentario agro, aut hortis, pra tisse asperitate uestium tenaci.

Folium .i. malabathrum sunt ex hominibus qui loco eius ponunt iolia garyophyl. sed hodierni doctores magis laudant spicam, aut macem quam folia garyophyl. & sic meo tē pore in isto antidoto macem uidi ponere.

Alari. i. asfarabaccara, cuius radix uul medicinæ compe tit. Vnde Gal. in 6. simplicium. Alarou. i. asfarabaccara. Iu uamentum, quod est in hac planta sunt radices eius.

Petroselinum Macedonicum fm copositorem est Ale xandum, uel olustatrum: cuius semen est nigrum, quod fa-

tis est notum. Sunt ex hominibus qui componūt in isto an tidoto semen petrosellini & Macedonicū, sed errant: Nā fa pientes uolunt intelligi solum petroselinum Macedonicū, quod est Alexandrum, & hoc est uerum. Nam paulo infe rius in descriptione huius antidoti recipit semen petroselli ni. i. petrosellini usualis.

Lapis lycnis fm copositorem est lapis qui fit ex urina lupi ceruari coagulata in montibus. Enax in suo lapidario in c. de lapide lycnis: xit, qd fit de urina lupi ceruari mi cta, & in montibus coagulata, quæ in domo seruata gene rat optimos fungos. Dios. facit cap. de lotio lycnis. i. urina lycnis, quæ multi ligurum uocant.

Phyalidos fm copositorem est filipendula. Dant mihi admirationem uerba Simo. Ianuē qui dicit: Phyalidos, ue fichago, alchechengi, cacabum: idem spēs est solatri secun dū. n. intentionē suā phyalidos est alchechengi, quod Moder ni non approbat. Ipse ēt met supra in cap. de filipendula la inquit: Filipendula in antidotario Nicolai in confectioe philanthropos, sed manifestū est legentibus Nico. in prædi cto antidoto, nō expresse filipendulā, nisi sub noīe phyalido s. Aut igitur textus eius est deprauatus, aut sub noīe phy falidos intellexit filipendulā, & sic: ibi ipsi contradicū dū dicit quod est alchechengi. Veritas autē est quod filipendula ibi ponitur sub nomine phyalidos. Mat. Syl. in ca. de filipē dula inquit: Filipendula phyalidos patricia idem. Itē cir ca instans: Filipendula phyalidos alio nomine appellat in maritimis partibus, & in Apulia, & in motuosis locis repe ritur. Radix eius pēpue medicinæ cōpetit: per decē annos in multa efficacia seruatur, in fine autūni colligitur. Idē in fine ait: Valet electuarium hoc quod fit ex ea. s. philanthro pos ad eadem: apud nos ēt nascitur, cuius folia sunt similia petroselinis, sed plana & non expausa: cum capitulo simile anetho habente florem album: radicem habet faciā ut pzo nia, sed minorem. Hæc apud nos in pratis inuenitur.

Lithospermatis secundum copositorem est milium solis. Sed Glib. ibidē habet milium solis & lithospermatis, & di xit quod est saxifraga, quod credo ēē fallum: sicut apparet apud Simo. Ianuē in multis locis, ut in cap. de calib. & in cap. de lithospermatis, & sic meo tempore concordati sue rūt doctores ponere i isto antidoto p lithospermate miliū solis, sunt ex hominibus qui ponunt selinum spermatis pro lithospermate, sed non recte: quia ibi habet feminis apii.

Bardana. i. lappago maior: quidam personam iuuacue runt alii lappam uocant. Quidam sapientes dixerunt quod bardana, siue lippa ingreditur in isto antidoto, & quia philo authropos pro herba idem est. Vnde Isidorus: Lappa dicta quod habeat caulem ingentem per terram dispositum: hæc a Græcis philanthropos uocatur, quod uestibus hominum inhæreat ob asperitatem sui.

Orobus albus. i. erulia alba. Orobis rubeus. i. erulia ru bea. De qua Dios. in cap. de eruo dixit: Eruum siue (ut alii) orobū nascitur in lenticula. ferit ēt, cuius aliud pallidum, aliud subruissum, & aliud album. Ab Aui. in .i. can. eodē no mine uocatur: sed miros, quod ipse in synonymis i quē sibi at tribuitur dicat eruum. i. orobus, & est ameliatarde quæ est aurū Romanū, & achiroa, cuius gummi dicit charabe, quod aurū. Nam eruum est orobū, sed non charabe. Sūt qui ponunt uitam pro orobos, sed errant, & miratus fui de quo dam apothecario qui ponebat loco orobi uitam. Secundū autem Guliel. Placen. Eruum est robila, seu cicercula.

APPENDIX.

Haud mirandum nos longius, quam olim suo lumine no strū hoc luminare, prospice Classe MAGNUM inscriptioni huius compositionis addentes. Cum non ab re faciū studiosi com perirent, tū ex non obscura Rhegini Calabri interpretatione, tum ad minoris consimilis inscriptionis, differentiam: inq̃ a Nicolao Philanthropum. Minus inibi perpulchre habet, ad omnia quæ Magum, non inuicem. Hæc accipiens.

Schoenanthus, † Macedonici,
Alari, Opi, ana. ʒ. ix.
Euphorbii, Alii addunt,
Petrosellini,

† Sic legit
Rheginus
ego autē
epitheton
petroselli
nō dicerē,
sic petro
selini Ma
cedonici.

* Granorum folis,
Saxifragiæ,

Polypodii, ana. 3. ix.
Mellis, quod fufficit.

CXXXIII.

GALLIA MVSCATA quæ intrat in præ-
ciosis medicinis & electuariis sic fit.

R. Mastice, 3. ii. gummi arabi. 3. i. camphore. 3. i. hæc autem
bene terantur & cribellentur, & trochisci informantur cū
aqua rosata, & siccant in umbra, & postq̃ fuerint deficcæ
terantur subtilissime, & misceantur cum 3. iii. olei sambuci-
ni colati, etiam bulliti ad medietatem cū spēsbus istis bene
critis. R. cinnamomi, garyophyllorum, nucis muscatæ, ana.
3. s. ex omnibus istis bene manibus malaxatis fiant trochis-
ci in medio concaui, & cum sigillo sigillati ad pondus. 3. i. s. &
postea ungantur aqua rosata mixta, cum musco.

COMMENTA. MANLII.

Gallia autem muscata secundum compositorem, sunt tro-
chisci facti cū musco & aliis spēsbus, quidā dixerūt quod dr-
galla, quia a primo in Gallia puincia fuit reperta. Circa in-
stant dicit: Gallia muscata quidā dicit quod fructus est sed
falsum: sed est quædam confectio ex spēsbus aromaticis &
musco. Mef. d. distinctio de trochiscis posuit aliā descrip-
tionem, quæ non concordat cum ista, & pp hoc volunt medici
quod quādo inuenit in receptis Nicolai gallia muscata, in-
telligit de illa quæ fit secundum hoc. Idē intelligere de-
bemus in receptis Mef. Apud Arabes lūch est gallia: infra
apparebit descriptio Mef. in tractatu de trochiscis.

Oleum sambucinum i. oleum quod fit ex floribus sambach,
seu zambach, seu ut vulgo geseminum, cuius modus infra
apparebit. Hanc confectioem oportet conficere cum
bona diligentia, & isti trochisci debent sigillari cum sigillo
facto, ut docet Albuchasim.

Aqua rosata mixta cum musco, sic debet fieri. R. aquæ ro-
satæ bonæ & electæ lib. ii. moschi boni odoris, non falsifica-
ti aur. i. x. & pone in boccia de uitro & distilla, cum lento
igne paulatim, quousque tota distilletur, postea reponē eā
in uase uitreo & stringe os ejus, & utere in istis trochiscis,
& ubi oportet.

CXXXV.
IVSTINVM.

R. Cinnamomi,
Folii,
Costi,
Spicæ nardi,
Cassie lignæ,
Aristolo- Rotundæ,
chizæ Longæ,
Elenii,
Hyssopti,
Pulegii,
Artemisæ,
* Pentaphylli,
Leucopiperis,
Orobi,
Petroselini,
Leuistici,

† Macedonici,
Seminis urticæ,
Seminis grani folis,
Citri,
Saxifragiæ,
Iuniperi,
Seminis asparagi,
Sileris,
Apii,
Anerthi,
* Pegani,
Foeniculi,
Anisi,
Baccarum lauri,
ana. 3. i. s. alias. 3. ix.
Mellis quod fufficit.

COMMENTA. MANLII.

Iustinum ætæ Iustino imperatore compositum seu inue-
tum dicitur. Gili. de Anglia in ca. de signis discretionis lapi-
dis renum & uesciæ, habet unam aliam descriptionem quæ
conuenit cum ista. Hoc antidotum est multum in usu.

Elenii. i. enulæ, cuius radix usui medicinæ cōpetit. Circa
instant ait: Enulæ duplex est maneries. hortulana, & cani-
pestrus quæ maioris est efficaciz, radix eius in medicinis de-
bet poni non folia, & colligitur radix in principio ætatis, &
soli exsiccat, ne humiditate putrefeat: per duos annos
seruatur uel per tres.

Artemisia. i. mater herbarum seu berengefis. Plin. inquit:
De Artemisia mulieres hanc gloriam affectuere, in quib.
Artemisia uxor Mausæoli regis adoptata herba hoc nomi-
ne uocatur, quæ ante parthenis uocabatur. Sunt qui ab Ar-
temide quæ est Diana, artemiam cognominatam putant,
quoniam priuatim medicatur feminarum malis.

CXXXVI.
CATARTICVM IMPERIALE.

R. Diagrydii,
* Myrobal. citrinorum,
* Hermodactylorum,
Zucchari,
ana. 3. iii. s. alias. 3. viii.
Cinnamomi,
Saxifragiæ,
Polypodii,
Nardi, ana. 3. ii. alias. 3. iiiii.
Cardamomi,
Zingiberis,
Celticæ,
Melanopiperis,
Macropiperis,
Garyophyllorum,
† Amomi,
ana. 3. i. s. alias. 3. iii.
Mellis quod fufficit.

COMMENTA. MANLII.

Catharticum autem imperiale. i. laxatiuum pro Impera-
toribus uel pro aliis delicatis hominibus interpretatur. Gi-
libertus de Anglia in cap. de signis descriptionis lapidis re-
num & uesciæ habet hanc eandem descriptionem.

CXXXVII.

LITHONTRIPON MAGNUM.

R. Nardi,
Zingiberis,
Xylobalfami,
Acori,
Cinnamomi,
Peucedani,
Meu,
Melanopiperis,
Leucopiperis,
Macropiperis,
Saxifragiæ,
ana. 3. ii. s. alias. 3. xx.
Carpo balsami,
Garyophyllorum,
Costi,
Rheupontici,
Liquiritizæ,
Dragaganti,
Alexandri,
Chamædryos,
Apii,
Asparagi,
Sem. Basiliconis,
Vrticæ,
Citri,
* Cyperi,
* Amei,
ana. 3. i. gr. xv. alias. 3. x.
Folii,
Croci,
Squinantii,
Cassie lignæ,
Bdellii,
Mastiches,
Iridos,
Amomi,
Leuistici,
† Granorum folis,
Petroselini,
Sinoni,
* Sileris,
Cardamomi,
Anerthi,
Euphorbii,
Lapidis lycnis,
Olei Nardini,
† Mucellini,
ana. 3. i. minis. gr. iiii.
alias. 3. v.
Mellis quod fufficit.

* Miropa-
lani, ac
hermoda-
ctili apud
Rhegiū
& Nicol.
considera-
tur.
† Nicolaus
habet.

* Nico. po-
nit.

† opobal-
fami ha-
bet. al. he-
gurus in
sua uersio-
ne.
Nico. ha-
bet.

COMMENTA. MANLII.

Lithontripon. i. conterēs & frangens lapidem inter-
pretatur. Gilibertus de Anglia in c. de signis descriptionis lapi-
dis renum & uesciæ, ponit hanc eandem descriptionem.

Nardi. i. spicæ nardi. An. in libello de uiribus cordis enu-
merans simplicia cordialia promittit se dicturum de cyperi
& mace in cap. de spica nardi: & tamen de ea ibi nullum
reperitur fecisse cap. quod ex defectu translatoris accidisse
suspiciandum est.

Peucedanū secundū cōpositōrē est foeniculus porcinus.
& apud Serap. in proprio ca. est herbarum. Circa instant
ait: Peucedanū herba est, quæ alio nomine foeniculus porci-
niscus dicitur. Cū autem inuenitur in receptis medicinz ra-
di x poni debet, quia plus habet efficaciz radix collecta, per
duos annos seruatur, sed melius est ut singulis annis renouet.

Melanopiper. i. piper nigrum, leucopiper. i. album, macro-
piper. i. longum, & hæc tria inueniuntur aliquando in rece-
ptis sub nomine trium piperum, quod idem. Sunt ex homi-
nibus qui non ponunt in isto antidoto nisi piper nigrum &
album, sed secundum plures tria debent ingredi.

Carpo balsami. i. seminis balsami. Sunt ex hominibus qui
dicunt quod debet dicere opobalsa. & est succus emanans
ab arbore balsami, Deus scit.

Rheupoticū est radix similis rheubarbaro, & dicit a rheu-
p. est radix, & ponticum, quia inuenitur in insula. Pōticū
est pōticum a sapore. Circa instant inquit: Rheuponticum,
per decem annos pōt seruari: est aut simile rheubarbaro &
eligendum est quod grauius est in suo genere, & amarū sa-
pis, cōtinuum, habens uenulas sicut rheubarbarū distinctas,

† i. i. piga-
mi offici-
nis, pro ru-
ta agre-
stis.
* Quinq;
foliū uo-
cant.

SECTIO PRIAM

non tingit sicut id, aliquantulum est amarum, & ponticum habet sptorem.

Basilicon. i. ozimū garyophyllatum, ut dictum fuit. Aui. in libello de uiribus colitis testatus est, quod ozimum est basilicon.

CXXXVIII. MITRIDATVM MAGNVM.

† Pondus apud Nic. addit. nempe. 3. xxxvi.
* ali. oro- boni leri- cę. i. Lac- cę. x. Ni- cola.
* i. pati- nacę agre- tis.
† Nico. ad didit.
* Pondus apopuit Nicolaus. fance. xxvii.
* Gummi hederę, exponunt

† alii amo- ni.
† i. lappe- minis.
† i. rasure- cernu ceru uini.
* i. floris- agni, nem- pe casti.
* Thus no- minant.
* Nico. po- nit.
* i. lusi.
† Epithy- mū, Nico. habet.
* Nic. ad- didit.
† i. Alii agretis.
* Nico. ad- didit.
† i. idest ra- phani.

† uel ut a- lii anagali- da idest fu- mach.
* aquatici- nempe.
† Carta- muni uul- go.
* i. semi- nis sinapi.

† Bę. Styracis calamitę,
Garyophyllorum,
Nardi,
Xylobalami,
* Orobı,
Lentifici,
Laccę,
Dragaganti,
Masticę,
Galbani,
Gummi iuniperi,
Alphalti,
Castorei,
* Oseei,
Edellii,
Terrę sigillatę,
Melliloti,
Laudani,
Opoponacis,
† Armoniaci,
Opıi,
Sulphuris uiui,
Glycyrrhizę,
Nitri,
Hypocisthidos,
Acacię,
Rosarum,
Chamędrys,
Hyperici,
Abrotani,
Pzonie,
Hyssopi,
Origani,
Elenii,

Rami, Cedri,
* Daphnidię,
Aristolochiõlon.
† Cyperi,
Peucedani,
* Centaureę,
Roris marini,
Radicum cryngii,
Ralaustorum,
Cimarum myrti,
Pũdiz,
Seminis † Romei,
Scyllę,
Carpoballami,
Anisi,
Githi,
Hyofycami,
Cymini,
Fœniculi,
Cardamomi,
Scfeleos,
* Thesapii,

Seminis rutę,
Simoni,
Męconis,
Apii,
* Dauci,
Leuistici,
Seminis rapę,
Macropiperis,
Seminis urticę,
† Amei,
* Amomi,
ana. 3. ii. alias. 3. xxvii.
Acori,
† Illapheos,
* Callami,
† Cathariacę,
* Zucozarię,
ana. 3. ii. alias. 3. xviii.
Ballami,
Cinnamomi,
Croci,
Costi,
Squinanti,
Zingiberis,
Malabathri,
Myrrę,
Terebinthinę,
† Olıbani,
Calsiã liguezę,
Agarici,
Spicz celticę,
Rheupontici,
Iridos,
* Alari,
Diptami,
Prasii,
Colocynthidos,
Storacidos,
Artemisizę,
Calaminthę,
† Scordion,
† Silphii,
Chamępithyos,
Piperis Albi,
Nigri,
Ozimi,
Sem. Petroselinı,
† Anagadomı,
* Foliı,
† Cardami,
† Pentaphylli,
ana. 3. i. alias. 3. ix.
Baccarum lauri. 3. s.
Alias. 3. iii.
Vini uestitissimi. 3. i.
alias sextarium. i.

Mellis quantum sufficit.

COMMEN. MANLII.

Mithridatum aut scđm intentionē compositoris est mater omnium antidotorum. Gilib. de Anglia in ca. de dysen- teria intestinali, uel hepatica dixit: Mithridatū. i. mater om- nium antidotorū, uel a mithridate rege dictū. Sine dubio Mithridatum est cōfectio magna, sicut theriaca a Mithrida- te rege ponti inuentore dicta. Nam cū Mithridates rex pō

ti in Bosphoro urbe a Pompeio ac Romanis obsessus esset, iam de seipso desperans uenenum uxoribus, pellicibus, ac filiis potandum dedit, quod cum & ipse nouissimo sumpsis- set beneficio medicaminum, quibus uitalia sua pręmunie- rat, nequaquam mori poterat: proinde tandem gallo cuiusdā militi, qui iam muro desefo intrauerat urbem iugulū prę- buit, sicque finiuit uitam. Aui. in. 5. can. habet unam aliam descriptionem, quam dicit esse descriptionem communem sed non est eadem: uerum est quod fuit ex hominibus qui faciunt ipsum Mithridatum secundum Nicolaum: & sunt ex hominibus qui faciunt ipsum secundum Aui. & propter id ambas descriptiones annotabo.

Orobis lentifici secundum compositorem est laccę, sed secundum sapientes ille textus est falsus, quia debet dicere orobi & leuistici, & sic credo esse uerum: quia Gilib. ibidē dixit: Orobı & leuistici: ex quo patet quod per orobum in- telligitur erum, & per lentifici intelligitur leuistici, quod alio nomine cheisin appellatur: & sic meo tempore concor- dati fuerunt doctores Papienses esse tenendum.

Gummi iuniperi fm Mat. Syl. est uernix, ut apparet in c. de uernice, ubi sic ait ex autoritate Pauli: Vernix est gū- mi cuiusdam arboris quę in Chriftianorum partibus nascit- ur, quę arbor iuniperus uocatur: ergo pro gūmi iuniperi intelligitur sandaracę, seu uernix: uerum aliqui in ista de- scriptione loco gummi iuniperi ponunt gummi cedri, ut Gilibertus. Itā autem gūmi cedri ponere uolueris, infra in litera de ramis cedri dicam quid sit.

Offei secundum composito. est gummi hederę. Idē expo- nit Gilib. ibidem, & hoc est gummi fatis notum, uocatur ab aliquibus opocissi. Nam cissos apud Diosc. est hederę.

Nitrum apud Aui. in. 2. can. est baurach armenum. Io. Sera. in suo breuiario in cap. de ægritudinibus, quę generā- tur, in auribus dixit, quod nitrum est baurach rubeum. Idē Ser. in lib. de simplicibus in ca. de baurach ait: Aphronitū & baurach. i. nitrum & spuma nitri species baurach, & mi- nerę ipsius sunt sicut minerę salis. Nam ex eo est ad modū aquę fluens, deinde petrificatur, & ex eo est quod est in mi- nera fusa sicut lapis, & ex eo est rubeum, & ex eo est album, & puluerulentum & multorum colorum. Et nitrum, quā- uis sit ex speciebus baurach, habet tamen operationes alias a baurach: & ibi Serap. de eo multum loquitur in hoc anti- doto. Sicut ex hominibus qui ponunt pro eo sal panis: sunt etiam qui ponunt sal nitrum: quę utuntur bombardarii: & sunt qui ponunt sal rubeum ut eis placeat.

Rami cedri fm composito. sunt rami iuniperi: sed ignoro, uerum est quod unum pro alio potest poni. Kami autem se- cundum Isido. in cap. de arboribus dixit: quod sunt qui de trunco manant sicut a ramusculis cetera: sed cedrus non est iuniperus: uerum est eius species. Diosc. de utraq; c. facit, & inquit: Cedrus est arbor, unde fit pix cedria quę est parua atq; spinosa: & sunt eius duę species, una earum quę gerit fructum similem cupressi sed est minor eo multum, & alia gerit fructum sicut granum myrti. Et hæc est arbor quāpud Aui. in. 2. can. uocatur serbin, & ipse computat eam arbore inter genera arboris pini. Eius lignum nominatur lignum mortuorū, quia cōseruat corpora mortua a putrefactione & custodit corpora mortuorum, & destruit quod est in eis de humiditate. Postq̄ dixi de arbore ipsius: nunc uolo nar- rare de gummi ipsius, quia inuenitur aliquando in isto anti- doto loco gummi iuniperi scribi gūmi cedri sicut supra p- mifi. Dico ergo quod gummi cedri: est quā Aui. in. 2. can. uocat chitran, & dixit quod est arbor quę nominatur al- fcerbin, & uirtus fumi eius est sicut uirtus fumi picis, & sit ex eo oleum: cuius separatio est cū lana, sicut separatur ex pice. Idem in cap. de pice de ipsa loquitur idem in c. de fer- bin ait: Serbin est arbor alchitran: nos quidem iam locuti sumus de alchitran. Sera. in cap. de chitran dixit: Est oleū quod egreditur ex ferbin, & ferbin sunt duę species, de qui- bus idem narrat: quod narrat etiā Diosc. de cedro. Melius autem alchitran est illud quod est spissum, clarum, & habet fortem odorem cum hōribilitate, & quādo in tingitur di- g- tus in eo non cito huius ex digito, propter suam spissitudinē:

& qñ stilla eius cadit in loco remanet collecta, & non expanditur. Hæc a multis dicitur pix liquida, & ab aliquibus uocatur picula, & ab aliis gummi cedri, quod idem est.

Daphnides fm composito. est laurus. s. folia ipsius arboris & non semen, ut quidam crediderunt: quia infra iterum habet baccarum lauri, quæ sunt fructus eius arboris Gal. in. 6. simp. inquit: Gar. i. laurus, folia huius arboris, & fructus eius sunt bacce lauri. Est alia species lauri nominata nomine lauri, & est planta parua quæ nominatur laurus Alexandrina.

Eryngii seu iringus fm Dios. est nux agrestis, & est herba spinosa: cuius folia in initio comeduntur, & in sale componuntur: hæc apud Sera. est species cuiusdam herbæ uocatæ centum capita alba, quæ apud nos dicitur a multis cardo panis, & eius ortus est in pratis, & in locis fabulosis: nõ est autem fecacul ut quidam crediderunt. Auer. in. 5. col. dixit: Elgarzaria, quod Hispani uocant panical, & in Arabico alchartama, & alii fecacul, & in latino iringi dicuntur. Bartholomæus Montagnana in suis consiliis, in consilio de sterilitate dixit, q iringus est fecacul, quod est falsum, quia Scrap. de utraq; separata facit ca. & hoc falsus est notum apud sapientes, quod iringus non est fecacul.

Phidiz. i. cortex mali granati secundum compositorem. si autem reperitur phigiz intelligitur storax liquida.

Romey secundum eundem est semel raphani. Idem Giberus dixit: Romey. i. raphani, & sic meo tempore uidi semen raphani ponere.

Gith. i. melanthium. Aui. in sua descriptione habet melachion, & est opium, quod falsum est. Nam infra in eadẽ cõfessione habet opium, quod non est consoum, de quo infra.

Gith aut fm Carin insans herba est, quæ inter frumentum nascitur, & semen habet nigrum triangulatum, quod cũ in medicina reperitur, poni debet, non herba, aliquantulum habet amaritudinem. Vnde per hæc uerba uñ hic author denotat illud quod inuenitur in bladis, & comeditur cum frumento, sed non recte, quia illud in medicina nullam aut paucam habet efficaciam, sed gith quod debemus intelligere est semel nigrum simile seminum porri, cum odore iocrodo, & est nigella nigra, cuius capitulum inuenies apud Dios. sub nomine melanthium. Item Plin. Gith est Græcis melanthium, alii melaspermõ uocant. Ille qui de nouo scripsit intitulatus Lumen male lucens dicit: Napeos. i. semen gith. i. lappa, quod falsum est, nam infra habet illaphæos, quod est bardana.

Cardamus fm Gal. in. 7. simp. est nasturtium. Item dixit Glib. in eodẽ loco. secundum uero illud Lumen quod uocatur male lucens est cardamomum, quod falsum est: aliud. n. est cardamus, & aliud est cardamomum: sicut est notum sapientibus. Testis scdm compositore est semen sinapis usua-

lis, & non semen sinapis albe, ut dicit Lumen male lucens. Micon secundum compositorem est semen papaueris albi, secundum Lumen male lucens est semel papaueris nigri, quod falsum est. Nam micon est papauer, & quando inuenitur papauer, simpliciter de papauere albo intelligitur.

Leuiticum apud Aui. in. 2. can. uocatur cheism, & scdm quosdam est quam Dios. significum uocat. Supra in isto antidoto dictum fuit, quod inueniuntur multæ descriptiones in quibus non ingreditur leuiticum: sed in loco ubi dixit orobi lentifici, debet dicere orobi & leuitici, quod melius est.

Illaphæos idem bardana, sive lappago maior, seu personatia, quod idem est.

Cassius scdm compositorem est panis porcini. Glib. dicit: Ciclamini. i. cassii, & sic est. Nam cassius. i. panis porcini, & ciclamen idem sunt: hoc a Mesue uocatur Antartia, & ab aliquibus uocatur malum terræ, & ab aliis buthomariem, apud Romanos dicitur tuber terræ: eius radix usui medicinæ competit.

Cathariace id est rasura cornu cerui scdm compositore. Glib. dicit: Cathariace, uel canarhi. i. cornu cerui, & uero reseda præfatus author, & est flos agni casti. Circa insans aut: Agnus castus frutex est, siue arbor: cuius folia cõpetunt usui medicinæ, & eius flores, non autem radices: hos aut appellat agnus castus, a uulgaribus autem quibusdam falices maris uocantur. Herba etiam uocatur agnus castus,

& ubiq; in receptis simpliciter agnum castum inuenies, intelligas flores. Agnus castus in omni tempore reperitur in aquosis locis, flos in uere, & in autumno colligitur per annum & non plus in multa efficacia seruantur: utridus agnus castus maioris efficacie est quam exiccatus.

Balsamum est liquor emanans ab arbore balsami. Secundum Aui. in. 2. can. Balsamum est arbor quæ nascitur in Aegypto, in loco ubi dicitur oculus solis. Secundum autem Dios. nascitur solummodo in Iudæa in curtibz, uel in locis humidis & sunt ex hominibus qui sophisticant ipsum: sed potest probari multis exemplis: primo ex eo quod uidemus adhærere labiis uulnerum eius ligni a quo emanat balsamum, etiam in aqua dissoluitur. Et propterea dicunt auctores qd facile de panno eo infesto lauitur. Dios. aut dicit in aqua iniectum primo petit fundi, postmodum dissoluitur, & totam aquam albã facit, & propterea uocat ipsum lachrymũ & Græce dicitur opobalsamum. Nam opos est lachrymus uelut lac: & similibus opofici uocatur lac ficulneæ ab ipso. Sed quia in partibus nostris uerum balsamum non inuenitur, composuerunt auctores quædam olea quæ possunt administrari in omnibus locis, ubiq; ingreditur balsamum, de quibus infra in tractatu de oleis dicitur.

Malabathrum. i. folium indum, & non sunt folia garyophyllorum, ut quidam credunt. Gal. aut in. 7. simpli. inquit: Malabathrum folium. i. folium indianũ simile flos est fm uirtutem Dios. autem de ipso duo cap. facit: unum qd incipit: Folium uel folia sunt herbæ quæ in India nascuntur in locis humidis & paludosis: colligitur autem hæc folia in aqua superna ianctia. Est autem optimum folium, quod est leue, & albidum, & uiscidum, & si uolueris oleum in modum ipsius cultum nardi referens. Est aliud ca. facit de malabathro, & ibi dicit: Malabathrum putauerunt multi esse nardi indicium folium, sed falluntur. & C. Circa insans ait: Malabathrum. i. folium paradisi, uel folium album: multum est carum, sed illo caremus: cuius loco ponimus folia garyophylli, & nelsipicam nardi. Aui. in. 2. can. in cap. de folio in fine dixit: Loco eius ponitur pondus de mace, aut etiam de spica, & sic hodierni nudo folii indi ponunt spicam nardi aut maceem.

Anagadam fm composit. est sumach, idem exponit Glib. ibidem: Sumach autem apud aliquos rossyriacus uocatur. Folium aquaticum, apud auctores non reperio cap. sub illo nomine: uerum fm q. osdam folium aquaticum est folium agrellæ, & sic est, Dios. de ipso facit c. sub nomine folii agrellis, cuius duo sunt genera, masculus & foemina, & quæ saxosus nascitur in locis sicut bryõ. i. herba hepatica, uel alia herba nascens super lapides, sed uiridiora folia habet sicut oliuæ & uirgam teneram, & breuem, & radicem tenuẽ, & florem album, & minutũ sicut miconiit. i. papaueris: & ego uidi in partibus nostris folium aquaticum natans super aqua, cuius folia sunt maiora foliis oliuæ, quod est notum.

CXXXIX.

MVSA ENNEA.

Rx. Piperis albigra. xvii. alias. l.

Euphorbi,

Aristo. Rotundæ,

lochizæ, Longæ,

* Mandragoræ,

Thuris masculi,

Myrrhæ,

Gentianæ,

Hyoscyami.

Opii. 3. iiii. alias. xii.

Croci. 3. iiii. minus. gr. vii. alias. 3. viii. 3. ii.

Mellis quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Musa Ennea autem dicitur peritissimo philosopho. Musa inueta, pprie datur quartanariis, ante horam accessus: omnis in modum euellæ, cum uino clido. Gliber. de Anglia in cap. de cura artitricæ fm magistros, habet hanc descriptionem. Hoc antidotum apud nos est in usu, maxime secundum istam descriptionem: quia Nicolaus habet uiam aliam descriptionem, quæ uocatur Musa magna, quæ in usu non est.

* Additur a nonnullis ultra scriptio: neni compositio: nis, nam Musa Ennea uocatur, a Musa primo (ut aiunt) inuentore, mox ab Ennea, i. a nouem quæ ipsam componunt (ut aiunt) ingredientibus medicinis.

SECTIO PRIAM

Reperitur etiam quidam fructus uocatus musa, & iste est fructus in quo peccauit primus parens.

CXL. MICLETA, uulgo MICLEATA.

* Nicol. addidit.

R. Mirolalanorum, mundatorum, & affa-
torum } ana. 3. ii. s.
Indorum, }
Chebulorum, } ana. 3. ii.
Bellericorum,
Embllicorum,

† Hucuf- que Nico- singule. 3. ii. acci- pit. * Nicol. o- mittit.

Nasturtii. 3. ii. s.†
Cymini, } ana. 3. i. s.
Anisi, } alias fefquidrachmam.
* Marathri,
Amcos,
Carui,

Infula in aceto die & nocte dimittantur, & affata pulue-
rizenrur, tunc adde.

Spodii, }
Balaustiorum, } ana. 3. i. gr. xv.
Masticis,
Sumach,
Gummi arab.

Fricentur omnia cum oleo rosaceo, & teniperentur cū
flucco myrrino.

COMMENTA. MANLII.

Miscleata autem dicitur experta: pprie ualeat ad hamor-
rhoidas, & ad uentris torsionem, & alia multa. Giliber. de
Anglia in cap. de diaria habet unam aliam descriptionem,
quæ similis est huic. Idem Aui. in 5. can. habet unam aliam
sed non est similis, nec in usum uenit.

Myrobalani indi. i. nigri, qui sine ossibus inueniunt: che-
buli ac aliz species sunt noræ, & modum assationis docet li-
ber, qui dicitur Bulchafim in lib. 2. de præparatione medici-
narū, qui modus iste ē oportet quod imbibas myrobalanos
indos uel chebulos, uel cirinos, uel bellericos, uel embli-
cos, in aqua citoniorum. i. in succo citoniorum aut granato-
rum acetosorum, aut in succo uinæ acerbæ deinde sicca eos
bene, & madesac in oleo rosato, uel in oleo de lentisco aut
oleo masticino, uel butyro, uel oleo oliuæ: deinde affa super
parellam ferream, uel textam calefactam primo, & caue ne
adurantur, ita ut destruat uirtus eorum.

CXLI.

ROSATA NOVELLA.

R. Rosarum, } ana. 3. i. 3. ii. s.
Glycyrrhizæ, } alias. 3. xxiii.
Zucchari,
Cinnamomi. 3. ii. 3. ii. gr. ii.

* i. Spice nardi.

Garyophyllorum,
* Nardi,
Zingiberis,
Galangæ,
Nucis moschatæ,
Zedoariæ,
Styracis calamitz,
Cardamomi,
Apii, ana. 3. i. gr. ix.
uel. viii. alias. 3. i.

Mellis despumati quod sufficit.

COMMENT. MANLII.

Rosata autem secundum compositorem dicitur a rosis,
& nouella respectu ueteris, quæ recipiebatur abar. i. sulphur
uium: tamen miror quia in ea sulphur uiuum non ingredi-
tur. Gulielmus Placentinus in suo antidotario habet hanc
eandem descriptionem.

Apium herba est facis nota. Secundū Circa instans quan-
do simpliciter ponitur in receptis, semen debet poni. Colu-
mella in suo lib. de cultu hortorum inquit:
Nunc apio uiridi crispetur florida tellus.
Nunc capitis porri longo resolura capillo.

CXLII.

RVBEA CROCOMAGMATICA.

uulgo Trochiscata.

* Liquiritizæ,
Cinnamomi, } ana. 3. iii. 3. ii. gr. v.
Papaueris albi, } alias. 3. xxvii.

Croci,
Rosarum,
Hyofcyami,
Sem. apii,

} ana. 3. iii. gr. xv.
alias. 3. xviii.

Nardi,
† Violarum,

} ana. 3. i. gr. vii. s.
alias. 3. ix.

Garyophyllorum,
Styracis,
Opii thebaici,
* Crocomagmatis,
† Hedychoi,
Myrrhæ,
Anisi,
* Mellis quantum sufficit.

} ana. 3. s.
alias. 3. iiiii.

} ana. gr. xv.
alias. 3. ii.

† Florum nempe.

* Medo- prius leg- batur, tra, croci ma- gnetis ob- ditionis compo- sitione for- sici dece- ptus.

† Hidiocri uulgo ine pre scribi- cur.

* al. Rho- domelites ex Nic.

Rubea autem dicitur ab ipso colore: trochiscata, quia in
ea trochisci ingrediuntur. Gil. de Anglia in cap. de cura ar-
thriticæ secundum Magistros habet hanc descriptionem. idē
habet Gulielmus Placentinus in suo antidotario.

Viola apud Dios. uocatur hion, & est flos herbæ quæ fa-
tis est nota. Columella in lib. de cultu hortorum inquit: Po-
natur uiola & nimium rosa plena pudoris.

CXLIII.

THERIACA, uulgo TYRIACA.

Magna Galeni.

R. Trochisc. seillicitorum. 3. ii. 3. ii. alias. 3. xlviii.
Piperis longi. 3. ii. alias. 3. xxxvi.

Trochiscorum Tyri, } ana. 3. i. 3. i.
Diacorallii, } alias. 3. xxiii.

Xylobalami. 3. ii. gr. vii. alias. 3. xliii.

Opii,
Iridis,
Agarici,
Rosarum,
† Scordei,
Semin. rapæ syluestris,
Cinnamomi,
Opobalsami,
ana. 3. i. gr. xliii. alias. 3. x.
Rheubarbari,
Crocii,
Spizæ,
Costi,
* Schoenanthus,
Zingiberis,
Calsiz lignæ,
Styracis calamitz,
Myrrhæ,
Terebinthinæ,
Turis masculi,
Calaminthæ,
Diptami,
Stœcados,
Polii,
Radiciis pentaphylli,
Petroselinii,
Piperis † albi,
ana. 3. i. gr. vii. alias. 3. viii.
Folii,
Gummi arabici,
Acori,
Chalcanthi usti,
* Serapini,
Terzæ sigillatæ,
Hypocisthidos,
* Celticæ,
† Chamædryos,
Gentianæ,
Meu,
Carpobalsami,
Anomi,
Apii,
Marathri,
Carui syluestris,
Seseleos,
Anerthi,
† Nasturtii,
* Hyperici,
ana. 3. i. alias. 3. vi.

* Sagape- num uo- mant.

† Scordei uulgo li- Alii agri- stis.

* spica as- mana uul- go.

† Quel cho- mæpyren

† Squiset- um dicti

† Nicol. b- bet.

* Herbas- di lo. ut- go.

† Apium- dose prii- legebat

Mumig,
Calorei,
Opopanaxi,
Alphaltri,
Galbani,
Centauræ min.
Longæ,
Aristolochiæ,
Rotundæ,
Dauci syluestris,
ana. 3. i. alias. 3. ii.

Quæ terenda sunt tere, & gummi in uino liquefacta, cum
puluerē, & melle sufficiēter comisce.

COMMENT. MANLII.

Theriaca autem magna Gal. ēno intentionem Nicolai, dicitur
theriaca esse domina medicinarum, quæ composita fuit
a Gal. & sic est quod Gal. composuit unam descriptionem
sicut apparet apud ipsum in tractatu suo theriacalium, sed
non ut esse eadem cum ista. Sit autem quocūq; ab hodiernis
practicantibus magis est laudata descriptio Andromachi,
quam Aui. in 5. can. ex autoritate Andromachi scripsit, &
hæc Gal. Andromachus fuit primus inuentor tyri, ac alia-
rum rerum quæ iuuatiuæ sunt super omnia uenena. Nam si-
cut

cut narrat Aui.in.5.cau.in confectioe mithridati dicit, q̃ Mithridates erat Rex p̃oti, & noiauit eā suo noie, & cōpō-
fuit ipsā. Et infra ait: Fuit ergo theriaca magna in multitudine
ne iuuamenti: deinde postquam accidit Andromacho illud
quod expertus fuit ipsū super iuuamenti carnium serpē-
tum, & aliorum, addidit in eo trochiscos de uiperis, & alte-
ratum est parē per additionē & diminutionem &c. Si autē
queratur quare dicitur theriacadico q̃ theriaca, maxime
illa quæ sit em istam descriptionem dicitur a tyro serpente.
Dico autē quod theriaca potest primo modo dici quasi tyrie
caro: qm̃ in ipso ponitur caro tyrie. i. serpētis fœmēg tali-
ter notat, quæ etiā uipera & echidna ab authoribus nunc
patur: propter quam præcipue carnem theriaca ponitur ua-
lere contra, uenenā, præsertim aialium uenenofoꝝ. Secūdo
mō pōt dici theriaca, a tyros Græce Latine fortis. est nāq̃
fortis, & ualidissima medicina: præsertim contra uenenā.

Haly. aut. 1. o. præticæ cap. de theriacæ utilitatibus, & pro-
batione eius in atrahēdo ait: Trahit etenim theriaca ad se
uenerā: aliz autē theriacæ in quibus non ingrediū caro tyri
dñr esse medicina q̃ ualet contra uenenum, ut lapis bezaard
qui est medicina liberatua a ueneno. Aui. aut. in. 1. can. c. 4.
de operationibus medicinarū singularium inquit. Albeazar
ait & theriaca sunt oēs medicinæ, quorum proprietates est ut
conferunt sanitatē & uirtutem in spiritu, ut eis expellat
nocuentem uenenā a se: & quasi nomen theriacæ artificia-
libus dignis conuenit, & uomen albeazar singularis cadēti-
bus fm̃ naturam dignius: & ut quod uegetabilia, & minera-
lia ex artificialibus dignis nomen theriacæ sumant miera-
le nomen albeazar, & uidetur etiam quod non sit inter ea
magna dñā. Postquam dixi de bezaard ex autoritate Aui.
idem uolo dicere ex autoritate Nic. Flo. qui in li. 4. in ca.
de medicinis bezaardalibus a uenenis liberantibus in gene-
rali, quid in fine ca. inquit. Et quia istæ etiam aliquando be-
zaar siue theriaca tripliciter possunt sumi, ut innotuit Ser. in
simplicibus ca. de lapide bezaard. uno modo largissime pro
omni medicina principaliter, uel secundario faciente ad li-
berationem a uenenis. Alio mō large pro medicinis bezaar-
dalibus supradictis. Et tertio mō stricte. v. g. theriaca pro
tyriaca ipsa q̃ est una confectio dicta theriaca magna, uel li-
berans, & dicitur theriaca Gal. & est illa in qua ingrediū ca-
ro tyri, & non propterea ut multi credūt uocata est theria-
ca: immo propter suæ uirtutis theriacalis excellentiam no-
men generis sortita est, & suo noie meruit appellari, & est
de qua intelligit cū absolute profertur. Et si finitler bezaar
stricte sumptus, dicitur de quodā lapide, qui per excellentiā
suæ bezaardialis uirtutis noie gñis consimiliter est uocatus
de quo lapide hic asserū quæ de ipso scriperunt sapientes.
Dixit Sera. Bezaard est nomen Persicum, & eius expositio
est cōtra uenenum, uel expellens ueneni &c. De lapide be-
zaard lapsu loquitur: sed uō notificat in quo loco generē
istellapūs: sed infra in alia descriptione theriacæ ostendat, si
Deus uoluerit. Si cēt quærat quomodo faciebāt antiqui me-
dici, medicari illis qui a moribus uenenatis fuerant cōtami-
nati anteq̃ habuissent noticiā theriacæ: declarat Petrus de
Abano Cōsiliator in tra. suo de uenenis, qui sic inquit:
Septē sunt herbe habentes proprietatē liberandi a ueneno
si cibis, & potibus, & conferentibus moribus & uulnerib.
uenenatis. Quorū prima est hypericū dicta herba scilicet Io.
quæ alio nomine dicitur perforata: quam Achilles oraculo
Apollinis in exercitu Troianorum dicē inuenisse. Secūda
est uincetoxicū. Tertia est enula. Quarta raphanus. Quinta
diprampus. Sexta aristolochia longa & rotunda. Septima la-
stucella: quarū unaquæq̃ dicitur expellere theriacæ: ita
ut uulneribus uenenosis, succus alicuius prædictarū datus
in potu uulnera ueneno infecta purget & saluet. Et per istū
modū oēs antiqui talia curabant uulnera, antequam theria-
cæ habuerint noticiā. Item quilibet prædictarū curat mor-
bus uenenosus loco theriacæ superposita.

Trochiscus squilliticus. i. de squilla idē habet Aui. Squil-
la autē uocatur cepe muris, & eo q̃ muris interficitur: eius ue-
ro descriptio infra apparebit.

Trochiscus tyrii. de tyro serpente. Aui. hēt trochiscos ui-

perarū quod idē est, de quo infra. Tyrus autē est serpens di-
ctus a multis curzoni. Sera. in ca. de lapide smaragdi ait ex
authoritate Rasis: Et dixit ille in libro de proprietatibus
si cadat aspectus tyri super lapidem smaragdi, dissoluntur
oculi tyri, & liquefunt.

Trochiscus dicorallii. i. de corallo Aui. loco eorum ha-
bet trochiscos alindaracōn, qui sunt trochilici Andromachi
de quo infra.

Rapa syluestris fm̃ Nico. est rapistrum uel napus sylue-
stris Aui. loco eius hēt feminis napi syluestris rotūdi, quōd
apud multos idē est. Et sic est q̃ rapa syluestris sit napus
syluestris: ergo est rapistrum q̃ a Romanis amorachia no-
catur. tñ quia non est aliqua authoritas firma hic describam
formam rapæ syluestris ex autoritate Ser. qui sic inquit, de
menthe Diof. Rapa agrestis est planta habens multos ramu-
los, quorū longitudo est unius brachii: nascitur in locis sic-
cis, & hēt summitates leues, & folia mollia, quorū laritudo
est unius pollicis aut amplius parū: & habet semen in uagi-
nis, & est semē nigri paruum, quod cum frangitur est albu
interius, & hæc a multis rapilla uocatur.

Terebintina, uel terebentina est resina, seu lachryma te-
rebinthi arboris, quæ a uulgo largatum solet uocari. Aui. lo-
co eius habet gummi albu, quod idem est.

Diptamū secundum Pet. de Crescē. dicitur alio nomine
fraxinella, quia frondes habet ad modum fraxini. Serap. de
ipso loquitur in c. de origano. Aui. loco eius habet pulegiū
indum, quod idem est.

Acorus fm̃ Diof. est herba ueneria, uel aphrodīsa, uel pi-
per apum, quod satis est notum. Sera. in ca. de acoro inquit:
Hueg. i. acorus, & noiauit iparella. Idē infra ait: Succus ra-
dicis eius abstergit obsecritatē uisus, & radix quidem acori
ingreditur in confectioibus theriacarum. & aliorum an-
tidotorum.

Meu apud Aui. in. 2. can. uocatū mu. & id q̃ de ipsa planta
administrat in medicina est radix. Ille qui de nouo scripsit
quæ in pluribus locis uocauit lumen malucē, in eadem cō-
fessione loco meū habet silitrā. i. ualerianā, quod fallum est
quia fil Nicolaus uult quod ponamus meū, quare illud Lu-
men malucē uult ponere ualerianā, quæ idem non est?

Amomi semen est minutū, quod ab oriente defertur. Pa-
pias inquit: Amomum dictum, quod cinnamomi odore ha-
beat: frutex botruosus, semen redolens sibi connexum, flo-
re albo, hominum somnos suauificat. Sera. in ca. de amomo
inquit: Ameme. i. pes colūbi, & est amomum. Idem infra ait
ex autoritate Humayn filii Isaac in theriaca: Amomum
est ex rebus quæ inebriant: est enim in proprietate eius q̃
inebriet, & faciat dormire.

Carui syluestris. s. semen ipsius. Aui. loco eius hēt cordu-
meni, quod idē est: & p carui agreste nō intelligit ciminel-
la, ut quidā crediderunt: immo intelligit filer creticum siue
cheisim capellæ: quod alio noie leuisticum hortulanū uo-
cat. Sed Lumē malucēus intellexit per carui syluestre ca-
rui uulsaue, quia uō cognouit dñm quæ est inter carui sylue-
stre, & inter carui domesticum. Si autē queratur qualiter ip-
sa theriaca debeat confici, infra ostendā in alia descriptione
& ibi dabo modum ipsam regulariter componendi.

Mel. s. mel apū. Gal. ait habet mellis attici. i. mellis Arhe-
nienis. Nā uide quod Diof. in cap. de melle ait, quod eius
grā sunt duo, unū quod cupilliones apes colligūt, quæ sunt
oblongæ: aliud quod sub terra inuenitur, & atticum dicit.
Idem infra ait: Mel autē atticum, quod elmaticum appellat
& illud quod appellatur hypoleon bonum est, & dulce, &
odoratum, & rufum. Item Plin. Mellis attici summa laus to-
to orbe existimat, sed thymum nagis laudat. Quare in ali-
quibus antiquis antidotis mel atticum, mel thymū exponit
& sine dubio mel attici, ut dictum fuit mihi, dicit ab attica
.i. Atheniensis regione ubi optimū mel colligit. Nā regio at-
tica est regio in qua abstant ipse apes. Notandū q̃ mel
ponendū in cōstructione theriacæ nō debet decoqui, sed tan-
tū ad ignē ponī quousq̃ eleuauerit fumū, & tūc illico sine
mora colari: aliter etenim cōstrui theriaca nō posset cū quā-
titate sola mellis in ipsius descriptione posita. Andromach^o

SECTIO PRIMA

loco eius habet mellis alhaffe de quo infra.

Vinum. f. vinum odoriferum ufulale. Gal. aut habet uini falernum. i. illius regionis, unde Papias, Neapolis oppidū, prope Falernum ubi optima uina nascuntur. Diosc. inquit: Vinum Italicum quod falernum dicitur utilius est, maxime uetus. Idem infra: Vinum albanum fortius falerno, & gustu subdulse &c. & sic per unum falernum, intelligitur unum quod fit in illa regione, & uocatur uix falernz, quia de eis est copia in regione Falerni.

APPENDIX.

Quāquam plura hic desiderentur, aliunde studiosi petāt, nostram TERIACES FABRICAM, breui ædificāā probe consolescentes, cum inibi uiderint rem abunde complexā.

CXLIII.

TRYPHERA MAGNA.

R. Opii. 3. ii. gr. xv. alias. 3. ii.

† Spice nempe.

Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Galangæ,
Spicæ nardi,
Zingiberis,
Colti,
Styracis calamitæ,
Calami aromatici,
Cyperi,
Iridos,
Peucedani,
Acori,
Mandragoræ,

† Celticæ,
Rofarum,
Piperis,
Anisi,
Apii,
Petrofelini,
Fœniculi,
* Macedonici,
Danci,
Hyoſcyami,
Seminis ozimi, ana. 3. i.
alias. 3. i.
Mellis quod sufficit.

COMMEN. MANLII.

Tryphera aut magna dicitur, quia fructum magnum con fert multioribus & proprie matricis earū, dando quando do lorem matricis patiūtur cum uino decoctionis altitæ. i. ma tris herbarum, quæ alio nomine artemisia uocatur. Gilib. de Anglia in primo li. habet unam descriptionē, quæ idem non est: euerum idem in cap. de retentione mēstruorum hā bet unam aliam, quæ est similis huic. Hoc autem antidotum potest cōfici per duos modos, uidelicet quod ipsum potest componi cū opio, & sine opio, & illa in qua ponitur appellatur tryphera magna cum opio: & quando non ponitur opium, tunc appellatur tryphera sine opio: & quando fit sine opio non subtrahatur, nisi solum opium: & illa in qua ponitur opium, non administretur si non transierint sex menses sit est notum.

Peucedanum fm Sera. est herbaturum, & apud herbatos dicitur fœniculus porcinus: cuius radix ac semen uſui medicinz competunt: Verum qñ simpliciter inuenit peuce danum radix debet intelligi: & qñ inuenitur in una recepta cheiſim, & cordumeni, intelligit per cheiſim leuisticum, & per cordumeni intelligit semen cheiſim mōtani, q est semē peucedani: & hoc apud ſapientes eſt ex ſecretis ſimpliciū.

Mandragora apud Aui. in. 2. can. uocatur Iabrol, cuius ra dix (ut dicit) habet formam hominis, quod nō creditur. Co lumbella in libro de cultu horrorum, inquit: Mandragorę pa riat flores mortitāq; cicutam.

CXLV.

TRIOPHYLLON.

* i. radices enalæ.
R. Piperis albi. 3. s.
Piperis nigri. 3. ii.
Cimini alſi. 3. s.
Zingiberis,
Nitri,
Pyrethri, ana. 3. ii.
Piperis longi. 3. s.
Petroſelinii,
Ameos,
Danci,
Aniſi,

* Elenii,
Spicæ,
Cyperi,
Apii,
† Seſeleos,
Coſti, ana. 3. s.
Garyophyl. 3. i. gra. vii. s.
Daſtyllorum, nu. xii.
* Foliorum rutæ uiridis. 3. i. s.
Mellis quod ſufficit:

COMMEN. MANLII.

Triophyllum autem ſecundum compoſitorem dicitur a ui ridibus foliis rutz, quæ in ea ponuntur.

Ruta aut eſt herba ſatis nota. Columella in libro de cultu horrorum ait: Ruta atq; palladia: baccæ uictura ſopore.

CXLVI.

TRIASANDALI.

R. San dāli,
Albi, Rubei, Citrini,
† Rofarum,
* Zucchari, ana. ſolidos. ii. alias. iii.
Rheubarbari,
Spodii,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis portulacę, ana ſoli ana ſolidum. i. alias. ii. Camphorę. 3. i. alias. 3. i.

Syrupi roſati quod ſufficit.

COMMEN. MANLII.

Trialandali aut dicitur a tribus gñibus ſandalorum quæ ibi inſcrant: & ſunt proprie albi diſti leuci, rubei, roſacei, cit rini diſti mahazari, & oēs ſunt noti. Hoc antidotū eſt mul tum in uſu. Solidus ſecundum compoſitorem in tra. de pon deribus eſt exagium, & exagium apud eum eſt. 3. i. cū dimi dia & ſic moderni pro ſolido. 3. i. s. ponere ſolent.

CXLVII.

THEODORETOS ANACARDINA. vulgo Theodoricon Anacardinum.

R. Aloes hepatici. 3. i. s. Zingiberis,
alias. xii. Anacardi,
Iridi, Carpopallami,
Calticæ lignę, ana. 3. iiii. s. alias. 3. iiii.
ana. 3. vii. minus gr. xvi. Folii,
alias. 3. vi. Spicæ,
Garyophyllorum, Myrobalanorum omnium,
Reupontici, Meu,
Maſtiche, Epithymi,
Squinanti, ana. 3. iiii. 3. iiii. s. alias. 3. iiii.
ana. 3. iiii. gr. iiii. s. alias. 3. i.

Mellis quod ſufficit. Conſcituſ ſic.

Accipe corticum radicis fœniculi bene abluī cōtriti i. i. & pone in duobus libris aceti, & ſter ibi per ſeptem die: & poſtea tere ipſas radices, & in eodē aceto coq; uſq; ad ter tiam partē, & cum omni diligētia cola per pannum, & po ne in duabus libris mellis deſpumati, & bulliat uſq; ad aceti conſumptionem, ſicq; cum tali melle conſice. Supradictę radices colligantur in Maio uel Iulio, quia ante hoc tēpus humide ſunt, & poſt hoc ſiccæ.

COMMNETA. MANLII.

Theodoricon autē anacardinum, dicitur ab anacardi quæ ibi recipiuntur. Aui. in. 5. can. habet theodoricon magnum & multa alia, ſed non ſunt idem.

Anacardus aut fm compoſitorem, eſt fructus cuiuſdā ar boris, quæ pediculus elephantis uocatur. Idem dicit Simō Iauuenſis ſecundum Circa inſtans hoc eſt falſum.

Fœniculus eſt herba ſatis nota: eius ſemen apud Græcos marathrum uocatur. Nicolaus aut inquit: Accipe corticē radicis fœniculi bene abluī. i. loti. Et ſic generaliter apo thecarij debēt ſcire, quod omnes radices, cortices, folia, & rami non debent poni in medicinis, nec debent deſicari, ſi abluz non ſint a terra & ſordibus eorum: & deſiccetur in loco ubi non ſit humiditas.

CXLVIII.

VOMITVS: valens tertianariis & quartanariis, ſed ma xime competit quotidianariis.

R. Tapſiæ. 3. iiii. Vincetoxici,
Aſari. 3. i. * Croci hortulani,
Cinnamomi, Semin.
Menthæ, Atriplicis, ana. 3. i.

Mellis quod ſufficit.

COMMEN. MANLII.

Tapſia eſt herba de qua Raynaldus de uilla noua in li. 2. in ca. de ſcabie & pruritu ait: Erſcias q tapſia q in hoc un guētō intracē facta in mediū laſulatz, huc mēthæ Romę, & uo-

† Alii po dus roſa. ut ſcri. Nico. * Alii xz charz. i. pſylli, cū magis pre poſito pſi lium qua. direct. † Amyllā dicunt. * Apud Nj co. deſide. ratur.

* Cartha. num uul. go.

Theriaces fabrica Nicolai Mōtani.

* Apium Mōcanum uolunt.

* i. radices enalæ.

† i. fileris montani.

* Florum ſeptē pri legabatur.

& uocat piperia: & loco piperis ponitur in falsa, & in foro Iulii, & in campo ferici tantum iuxta murū reperitur: & habet acuitatem sicut piper: & est facta ad modum lapacii acutissime lafulata. Alia nero de tapfia uide ibi. De tapfia etiam uide supra in confectioe anacardina.

Atriplex apud Dios. uocatur atraphaxis. Auic. in. 2. can. duo ca. facit de eorum sub nomine catafalud de chrysolachana, & ibi ait quod est triplex quæ plurimum inuenitur in Seni. Columella in lib. de cultu hortorum inquit: Et grauis atriplici cōsurgit lōga fafules & hęc est herba quæ apud hortulanos Papienses bleta alba uocatur: cuius semen usui medicinz competit.

CXLIX.

HIERA PICRA, uulgo inepte

Hiera picra magna.

℞. Cinnamomi, Violarum,
Spicz, Abinthii,
Croci, Epithymi,
Squinanti, † Agarici,
Alari, Rosarum,
Xylacasiz, Colocynthidos,
Xylobalfami, Maltiches,
Carpoballami, Turbich, ana. ʒ. iii. alias. ʒ. ix.
Aloes ad pondus omnium specierum.
Mellis colati ac desumpti, quod sufficit.

COMMENT. MANLII.

Hiera aut. i. sacra, picra. i. amara: inde hierapicra. i. sacra amara. Vocat aut hierapicra magna ad dñam alterius, quæ dicitur simplex: magna dicitur, quia in ea plura & fortiora simplicia ingrediuntur, & utraq; possunt confici. Nā primo ex speciebus hieræ magnæ fit confectio cum melle, quæ ap pellatur hierapicra pro clysteriis. Item de prædictis speciebus cum melle rosato conficiuntur pilulæ, quæ dicuntur de hiera magna, seu de hiera maiori, quod satis est notum. De speciebus aut hieræ simplicis fit hiera picra cum melle quæ uocatur hiera Gal. & hæc comeditur. Item de prædictis speciebus sunt cum melle rosato pilulæ, quæ dicuntur de hiera simplici, aut de hiera Gal. ut dictum est.

CL.

HIEROLOGODION EMPODISTON,

uulgo mendose, Hieralogodion Mesitum.

℞. Colocynthidos interioris, Aloes,
Polypodi. ana. ʒ. ii. * Comarum thymi,
alias. ʒ. xx. Casiz,
Euphorbii, Chamædryos,
Polii, Bdelii,
Coccognidi, ana. ʒ. i. s. Prassii, ana. ʒ. i. gr. xiii.
gr. vi. alias. ʒ. xvii. alias. ʒ. xi.
Abinthii, Cinnamomi,
Myrrhæ, an. ʒ. i. gr. xii. alias. ʒ. x. Opoponacis,
Castorei,
Aristolochiæ lon. *
Centauræz, Albi,
Agarici, Piperis Nigri,
Armoniæ, Longi,
Thymiamatis, † Sagapeni,
Folii, Petroselinii,
Spicz, Croci, ana. ʒ. s. alias. ʒ. v.
Scyllæ, Ellebori Albi,
Diagrydii, ana. ʒ. i. Nigri,
alias. ʒ. x. ana. gr. vi. alias. ʒ. i.

Mellis optimi quod sufficit.

COMMENT. MANLII.

Hiera autem. i. sacra, logos. i. sermo, mesitum. i. impedimentum. Glib. de Anglia in cap. de digerenda materia & euacuanda, habet hanc descriptionem. Ioannes Cocoregius in cap. de epilepsia inquit: Electuarium solutium, quod dicitur hieralogodion, cuius descriptio ponitur a Nicolao: & sic apud omnes hæc est illa quæ debet ferri.

Polium. i. polii montanum. Circa instans: Polii diuersa sunt gñæ quæ nota sunt ex parte, sed præcipue polium montanum competit usui medicinz. Vnde cū simpliciter inueni-

tur. polium montanum, debet intelligi & poni cū floribus: per annum seruatur.

Coccognidium. i. semē mezereon. Circa instans in. ca. de laureola dicit: Laureola frutex est, cuius semen uel fructus usui medicinz cōpetit, & appellat coccognidiū: hic textus est falsus. Nā coccognidiū non est semen laureolæ, sicut apparet apud Dios. in proprio cap. ubi inquit: Enim chamelea aut coccognidion, ergo est mezereon. Nam chamelea est mezereō fer herba dicta apud herbatos oliuella propter similitudinem foliorum.

Thymiamatis sū compositorum est thus Iudzorum. Giliber. dicit: Thymiamatis. i. cozumbrigo: est fœx thoracis liquidæ, quæ alio nomine a multis modernis thorax rubea appellatur. Isido. in cap. de odoribus & unguentis, inquit: Odor uocatus ab ære, thymiamia lingua Græca uocatur, quod sit odorabile. Nam thymus dicitur flos, qui odorem refert: de quo Virg. Redolente; thymo fragrantia mella, Itē Papias: Thymiamia græce dicitur quod sit odorabile. Nam thymus dicitur flos, quoniam odorem refert thymiamia incensum. i. confectio odoris aromatum.

Thymicomarinum. i. cima thymi. Sed sunt ex hoibus qui dicunt quod thymicomarinū nō debet in isto electuario in gredi, sed non recte, quia Gilibertus idem habet. Præterea Mat. Syl. in litera t, inquit: Thymicomarinū. i. cimathyū, ut in antidotario in confectioe hieralogodion.

EX ANTIDOTARIO IOAN. SERAPIONE.

CLI.

DE LACVNA, liberans ex uenenis perniciosis.

℞. Luti de lacuna, } ana. aur. ii.
* Artiatidis, }
Coaguli Gazel, aur. viii.
Coaguli Leporis, aur. iiii.
Gentianæ, }
Baccarum lauri, } ana. aur. i.
Aristolochiæ rotundæ, }
Seminis rutæ sylue Itris, }
Myrrhæ, }

Terantur & cribellentur, & conficiantur cum melle de spumato, & detur in potu, cuius fit quantitas ut faba.

COMMENT. MANLII.

Istud electuariū non est in usu, secundum uero intentionē Ioan. Serap. est optimum contra uenenum. Dicitur aut electuariū de lacuna a luto de lacuna, q̄ est terra sigillata. un de electuariū de lacuna. i. electuariū de terra sigillata. Gal. in suis experimentis in c. de medicinis Zenonis hęc electuariū luti, quod est lutū sigillatum, sed non est idem. Circa instans dixit terra sigillata, terra argentea, & faracena idem est. Ego credo qd̄ textus sit falsus, quia terra argentea est cimolia, & nō ē terra sigillata: nā terra sigillata est rubei coloris: cimolia uero est alba, & quæ purpurea: uerum est quod secundum quosdam, terra sigillata alba est cimolia.

Artiatidis secundum compositorum est granum iuniperi. Granum autem iuniperi apud Aui. in. 2. cā. uocatur abel, sed male. Nam abel non est fructus iuniperi: immo est bracteos folia sua.

Gazel est aial quod in nostris partibus non inuenitur. Aui. in. 2. can. in cap. de musco, inquit: Muscus est folliculus aialis sicut Gazel, & hęc duos dentes albos flexos ad interiora sicut duo cornua. Serap. in lib. de simp. in cap. de musco, inquit: Ex uerbo almascad, in lib. auri & minerarum & margaritarū, terræ in quib. sunt gazele, musci, & sunt regiones Tūbaci, & Seni sunt terræ confines. Verum muscus regionis Tūbaci est melior musco Seni: ga gazele de Tumba ci comedant spicam nardi, & alias species odoriferas: gazele uero de Seni comedūt alias herbas &c. O quanta diuersa sunt inuenitur in isto animali. Nam Aui. ault quod sit fœcus animal quod facit muscum, ideo discordant: sed uere sicut dictum fuit mihi gazel non est animal, quod facit muscum: uerum habet similitudinem, sed idem non est.

SECTIO PRIMA

CLII.

ALTALISAFAR, confers ad frigiditatem stomachi, & uentositates accidentes in hepate, & in stomacho.

R. Talisafar. 3.v.
Zingiberis. 3.xx.
Macropiperis. 3.xii.
Zucchari quantum est pondus omnium medicinarum.

Terantur & cribellentur, & coſce cum melle, & detur.

COMMEN. MANLII.

Iſtud electuarium non eſt in uſuſed ego ſolum ſcripi, ut innot eſcat, nūquid talisafar ſit macis, ut quædam ſynonyma dicunt. Aui. in. 5. can. habet unam aliam deſcriptionem quæ eadem eſt.

Altaliſafar & talisafar apud Aui. in. 2. can. ſunt cortices Indiarum quibus eſt ſtipicitas, & acuitas, & odoris boni parū &c. Math. Syl. in litera t, dicit: Talisafar. i. nux muſcata uel abor. Poſtea inquit: Talisafar idem eſt, quod falſum, ſi cuter oſtendam. Sera. in cap. de mace talisafar loquitur, & credo quod ſecundum ſuam opinionem talisafar ſit macis, uel ei proximū in uirtute, ſed idem non ſunt: & ob hoc poſſumus diſtinguere q̄ talisafar non ſit macis, ut dicit Math. Syl. & alii. Nam Ioan. Ser. in ſuo antidotario ponit electuarium de talisafar, & electuarium de mace, quod non faceret ſi idem eſſent. Franciſcus de pedemontium in cap. de fluxu uētris omnium mororum & curis eius ait: Quod talisafar eſt cortex citri. quod non creditur.

CLIII.

DE MACE, quod confert ad frigiditatem stomachi, & uentositates ex malitia digeſtionis.

R. Macis,
Zingiberis,
Garyophyllorum,
† Cinnamini,
Heil,
Cinnamomi,
Zucchari. 3.xl.

Terantur, & fiat electuarium.

COMMEN. MANLII.

Iſtud electuarium non eſt in uſuſed in ipſo reperitur diſſerentiā, maxime in mace. Nam macis apud Aui. in. 2. can. ex autoritate filij Meſangue, eſt cortex nucis muſcate. Secundum uero Circa inſtantiam macis non eſt cortex nucis muſcate. Aui. in. 4. coll. inquit. Beſeſe. i. macis dicitur, quod ſit cortex cuiuſdam fructus qui portatur de India. Guliel. Placen. inquit: Macis eſt cortex nucis muſcate declinās ad rubedinem & citrinitatem. Dio. uocat eam machir, & dicit quod eſt corium ligni ueniētis de Barbarico, coloris ruſſi, cum rubore ſolido &c. Simon Ianuen. non negat nec affirmat, an macis ſit cortex nucis muſcate, aut non. Multi mercores tenent quod macis ſit cortex uel ſlos nucis muſcate, ſed ſit quomodo cūq̄, macis nota eſt.

Heil. i. Cardamomi maius, & ſecundum Bartholomeum Monaganam eſt niſelega, & ſic hodie tenetur.

Cinnami i. cinnamomi groſſi: non eſt ergo cyminum, ut dicitur quidā, nec eſt cinnamomum finū: quia ipſe Ser. in prædicto electuario inferius hēt cinnamomi. i. fini. Nicolaus in ſuis ſynonymis dicit: Cinnamum. i. cinnamomum ſubtile & optimum. Sed apud Sera. eſt cōtrariū, ut apparet apud ipſum in cap. de cinnamomo, ubi dicit, inueni alia ſpes cinnamomi, quæ dicitur uſor & cinnamum: & eſt groſſa: plantæ nō habens fortem odorem, & eſt debilis uirtutis, & hoc eſt darſeni. i. cinnamomum groſſum dictum ſauzon.

CLIIII.

DE HEIL, confers ad frigiditatem stomachi,

R. Heil,
Zingiberis. 3.x.
Neremſch,
Cinnamini,
Zucchari libi.
Macropiperis. ana. 3.v.

Mellis quantum neceſſe eſt.

COMMEN. MANLII.

Iſtud electuarium in uſu non eſt, & electuarium de cardamomo maiore, quod hodie granum prædicti uocamus.

Neremſch ſecundum Matt. Sylua. eſt roſa alſini. Infra in

confectione electuarii lztificantis Rafis, oſtendam quid ſit neremſch.

CLV.

DE VSNEA.

R. Cinnami,
Vſneæ,
Calami aromatici,
Spice Romanæ,
Maſtiche,
Cafſiæ lignæ. ana. 3.i.
Florum ſquinanti,
Coſti,
Croci,
Myrrhæ. ana. 3.iii.
Heil,
Nucis moſchatæ,
† Macis,
Xyluoaloes,
Moſchi. ana. 3.s.

¶ Celſio appellat
† Maſti-
mendo-
prium.

Terantur medicis ſiccæ, & inſundantur myrrha & crocus cum aliquo potum conuenientium, & conſanciantur cum melle & adminiſtrentur.

COMMEN. MANLII.

Hæc conſectio non eſt in uſu apud nos: tñ pro declaratione uſneæ, aduerte quod uſneæ eſt muſcus quercus, & dſ canianus. Sera. ex autoritate Dioſcoridi: Vſneæ eſt res quæ reperitur naſcens ſuper arborem ſerbin. i. cedri, & nucis & glandium, & melius ex eo eſt quod reperitur ſuper ſerbin montana: & poſt illud quod reperitur ſuper arborem nucis & melius horum eſt, quod magis odoriferū, & albiors coloris: nigrum uero eſt malū. Ser. aliud c. facit de uſneæ quod eſt herba Kali naſcens in mari ſimilis uermiculari, & illa eſt de qua ſit ſalſchali. Leonardus de Preda palea in ca. de cura indimix inquit: Vſneæ eſt quedam ſuperfluas oriens in truncis arborū, ſed alij dicunt quod ſunt flores auellana rum: & dicitur uulgarī ſermone gazzeli.

CLVI.

TYRIACAE, contra ſcorpionum morſus.

R. Calamēthi fluuiſiſ. i. aquatici, quod alio noſe mentaſtrum appellat: calamēthi mōtani. i. nep etc. ana. 3. vii. gentianæ. 3. viii. piperis. opopanacis. ana. 3.v. coſce cum melle quantum neceſſe eſt, & detur. 3. i. cum uino pōtico. i. forti.

COMMENTA. MANLII.

Hæc conſectio non eſt in uſu ſed ſecundum intentionem Ioan. Serap. ualet contra morſum ſcorpionum mirabiliter. Dicitur autem illa conſectio tyriaca, quod uſor ipſam ingreditur tyrius: ſed ſolūmodo dicitur tyriaca a tyron, quia eſt contra uenenum.

Scorpiones ſicut inqt Aui. in. 4. can. in Fen. 6. in tra. 5. in ca. de punctura paruorū uenenoloſorum & morſu eorum, loquens de ſpeciebus ſcorpionis ſylueſtris. Dixerunt quidā q̄ ſcorpio ſcœmina maior eſt maſculo: maſculus. n. extenuatus eſt, & minor, & ſcœmina pinguis, magna: & aculeus ſcœminæ eſt ſubtilis, & maſculi aculeus eſt groſſus. Idem inferius ait: Aſſtimauerunt quidā quod ſcorpiones ſunt nouē colorū. ſ. albi, citrini, rubei, & cineritii, ferradi, & uirides, & de eis ſūt aurei hñtes nigras caudas & extremitates caudarū, & de eis ſunt uinoſi coloris: in quorū percuffione ſentitur punctura acūs & dolor nociuus, & de eis ſunt fumofi, & accidunt de morſu eorum riſus, & permixtio rationis &c.

De proprietate quæ reperitur in radice colloquintidæ cōtra morſum ſcorpionis ait Sera. in cap. de colloquintidæ ex autoritate Rafis dicens: Dixit mihi quidā quod radix colloquintidæ eſt melior medicina, quæ eē poſſit pūcture ſcorpionis: & Arabes habent ipſam pro cōi & manifeſta medicina ad hoc: & dixit mihi Arabs quod ſcorpio pupigerat filiū ſuum in quatuor locis corporis, & dedit ſibi in potu. 3. i. de radice colloquintidæ, & ſedata ſunt ſtatim omnia quæ patie batur. Etiam Aui. in cap. de cura ſcorpionum ſupradictorum ſimiliter ait.

EX RASI AD ALMANSOREM.

CLVII.

AD SCABIEM, ET PRVRITVM VA-
lens in tract. 5. Almanſoris in cap. de pruritu, & ſcabie, & magnis puſtulis.

R. Myrobalanorum citrinorum, partē unā ſenæ, ſumiteræ, ana partem mediā: ſucci abſinthii quantū ad eorū ſufficit cōſperſione (aliquoties aūt additur mihi medicina abſinthii quæ

* i. cardamomi, maius.

† Cinnamomum groſſum uocant.

* Granum Paradifi uulgo.

quantum quarta pars myrobalanorum) & conficiantur omnia cum melle, & fumatur ex ea quotidie quantum est auellanae magnitudo.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium non est in usu, sed generaliter loco huius electuarii utitur unguento quodam pro scabie, cuius composio nota est aromataris.

Auellana aliquando sumit pro fructu, aliquando pro pōdere, ut apud Aui. in distinctione de ponderibus, & est pondus auri unius, ergo est 3. i. & semis unius drachmæ, ut dicit Simon Ian. Auellana uero pro fructu fm Isid. dicitur ab Auellano Capaniz oppido ibi abundare, & hæc a Græcis pontice appellantur, eo quod circa ponticum mare abundant. Rasis dicit, qd de prædicto electuario datur quantum est auellanae magnitudo. Magnitudo auellanae apud Aui. est sicut granum lauri, ut dicitur in suo cap.

CLVIII.

DE NVCLEIS FRVCTVVM, in tracta. 5.

Almanforis in cap. de his quæ augent sperma, & quæ valent ad erectionem virgæ.

R. Amygdalarum, Grani uiridis, ana partes æquales,
Auellanarum, ana partes æquales,
Nucis indicæ, Zingiberis,
Pinearum enucleatarum, Piperis longi,
Granorum chilchil, Seminis Pæoniz,
Granorum zeilem, ana tertiam partem.
Penith ex zucchero tantum quod temperari possint. Sumatur ex eo in mane quotidie ad oui magnitudinē, & in sero tantundem.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium non est in usu, sive n. Rasis appellauit istud electuarium de nucleis fructuum. Sed secundum intentionem meam uideatur esse idem cam illo, quod reperitur apud Aui. in 3. can. quod nominatur confectio de medullis & sine dubio idem sunt sed differunt solum in re nua, & hoc est qd Rasis habet auellanarū. Aui. loco eius hæt silticorum. Verum ut certior reddaris infra ponam descriptionem do. Aui. & uidebis in quo cap. ipse describit eam. Simplicia uero quæ sunt declaranda declarabo.

Nux indica fm Sera. est neregil, & sic credo esse bene expositum. Nam Aui. in cap. de nucē indica, in 2. cano. dicit quod nux indica est neregil. Præterea Aui. in eadē confectioe habet neregil, quod idem est, sicut infra ostendam.

Grana alchichil, uel chilchil sunt femina granati syluestris, ut reperio apud Ioan. Serap. in ca. de fluxu menstruum, quibus inquit: Sumantur grana syluestria, & sunt grana alchichil. Etiam uide apud eundem in cap. de ægritudinibus gingiuarum qd similiter dicit. Item Aui. in 2. can. in ca. de grano alchichil sic ait: Granum alchichil est sicut piper albi maius cartilago, noui puri rotundum, & frangitur a medulla uetusa boni saporis &c. postea statim ibi dicit: Quidā autem dixerunt quod est semē granati syluestris & dixerūt isti eius radice est almagat, & sic est quod granum chilchil est femē granati syluestris.

Granum alzelem fm Aui. est piper nigrum, & sic dicit Math. Syllē ambo errant, falsū piperem reuerentia. Nā Ser. de grano azelem ca. facit, dicens: quod est granum pingue in magnitudine piperis citrini, & habet bonum saporē. Defertur ex terris Barbariz, & nominatur piper nigro-rum. post statim ait: Verum secundum ueritatem piper nigro-rum est aliud, & sic est secundum opinionem Simonis. Ianuen. Bartho. Montagnana in suis consiliis, in consilio de sterilitate ait: Granum alzelem fuit radicū parua, cōtor-ta, nodosa, subcitrina, in sapore notabiliter dulces, substantia uiscosa, quas incolat Veronenfes suttasum uocant: loco eis ponuntur testiculi uulpi.

Grana uiride apud Aui. est fructus arboris terebinthinae: & arbor ipsius apud Arabes dicitur botin. Sera. ca. de terebinthina dicit, quod fuit duarum specierū, domestica, & syluestris: domestica uero est botin fm ueritatem, & fructus eius est granum uiride, & syluestris est lentiscus, & ambæ habent gummi. Secundum Isid. gummi lentiscus est malix.

Pæoniz. semen, & satis est notū. Aui. loco pæoniz habet neremifich, quod idē est. Antonius Musa inquit: nomen herbæ pæoniz a Græcis dicitur penithorobon, alii hichiodan: alii aglaofotis, Itali pæoniam uocant.

Penith ex zucchero sunt penidiz. Aui. loco penith habet penidiorum, nam idem est.

CLIX.

DE SEMINIBVS in 5. Almanforis, in cap.

de his quæ augent sperma, & quæ valent ad erectionem virgæ.

R. Seminis *baucig, Lingue aui, f Secacul,
Seminis naporum, f Secacul,
Ceparum, Been, Albi,
Raphani, Rubei,
Asparagi, *Satyrionis,
Seminis alphafasa, Costifrudis,
Erucæ, Zingiberis,
Granorum *chilchil, Macropiperis,
Granorum zeilem, Nasturtii,
Tuderi, ana partes æquales,
Terantur, & cum melle conficiantur.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium apud nos non est in usu. Mef. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem, sed noui est similis huic. Secundum uero Nicolaum Florentinum: Electuarium de seminibus est diaphmaton, & sicut ostensum fuit. Simplicia quæ sunt declaranda declarabo.

Alfafa secundum Sera. est chaodab, sed secundum Aui. est cor: & ibi dicit qd est alifitac, & noiant alfafaz. Aliud ea. facit de ipso in litera r, quod dicitur ratuba, hæc in Hispania nascit & est spēs trifoli, ut apparet apud Simonē Ian. in cap. de ratha Dios. uocat ipsam medicam. Isidorus uero medicam inter legumina scripsit.

Tuderi sic est nominatum apud Aui. in 2. can. sed apud Dios. est horuinon, de quo supra in tryphera Galeni.

CLX.

TYRIACAE, de terra sigillata, in 8. Almanforis

in cap. de uenenis & uenenosorum moribus & eorum curatione & cautela.

R. Terræ sigillatæ, baccharum lauri, utriusq; partes æquales, & terantur, & cum butyro uaccino inungantur, & cum melle conficiantur, & recondantur, est enim nobile.

COMMENTA. MANLII.

Descriptio istius tyriacæ apud nos non est ualde in usu, tñ reperitur apud apothecarios, maxime Mediolanenses. Guliel. Placē in suo antidota. describit unam descriptionē quæ eadē est, & illa descriptio est ex autoritate Ras. Aui. in Fen. 6. quartū can. in cap. de canone curationis eius quib; in potu sumpsit uenenum, habet unam aliam descriptionē, sed non est similis huic: tñ differunt parum inter se. Nam Aui. in sua descriptione hæt ireos, Ras. uero non Aui. etiā dicit. conficiant cum oleo Rasis uero dicit qd melle. In reliquis uero non differūt, tñ illa Rasis est nobilior quā illa Ian.

Terra sigillata est terra rubea quæ obus nota ē. Apud Aui. cen. uocatur lucū sigillatū. Sera. ex autoritate Dios. inquit. Terra sigillata est sigillum marinum, & est sigillum lacce, & est una ex terris almarim, & multi ex latris assimilantur illi, & sigillatur, & color eius est similis coloris magræ, id est sinopodig.

CLXI.

TYRIACAE ad morsum rutellæ utilis, & fuit approbata in octauo Almanforis in cap. de moribus rutellæ & sibth, & aranei.

R. Nigellæ 3. x. Baccharum lauri,
Dauci, Aristolochiglon.
Cymini, ana 3. s. Carpal am,
Seminis habel, Cinnamomi,
Gallarum cypersis, Gentianæ,
ana 3. iiii. Seminis anda hoche,
Spicæ indig, Seminis apii, ana 3. ii.
Conice cum melle, & detur: ex eis ad nus magnitudinem cum uino ueteri.

*Dauci re-
ctius i. pa-
stinate syl-
uestris.
†Sigillum
sanctæ ma-
rie uulgo.
*i. testicu-
lorum uul-
pis officini-
nis.
†i. Arabi-
ci.
*i. Gra-
eci sylue-
stris.

SECTIO PRIMA

COMMEN. MANLI.

Hæc cōfectio apud nos non est in usu, sed quia Raf. dicit quod est utilis & aprobata, scripti illam. Nic. Flo. in lib. 4. in cap. de punctura aranei & rutellæ describit unam descriptionem, quæ est ex autoritate Rafis & est eadem huic.

Rutella autem fm Rafim est animal paruo araneo alsimilatum, quod uocatur phibit, multas uenari solitū. Aui. in 4. can. in Ven. 6. in ca. de specie araneorum, & alscibein, & rutellam dicit: Rutella est animal simile araneæ quæ natiatur alscibed, & est uenatrix muscarū & species eius sunt plures; & secundū quod dicit Gal. sunt duodecim spēs & c. ibi Auicē. de omnibus speciebus loquitur, & describit for mas ipsarum.

Habel secundum Sera. est fauina, & sic exponit Simon Ianuen. sed apud Aui. est fructus iuniperi, quod credo fit erre translatis. Nic. uero Floren. in prædicta confectio- ne loco habel habet feminis iuniperi, quod non est bene expositum. Nam certum est, quod Sera. & Simon Ianuen. ha- bent maiorem autoritatem in simplicibus quam Auicē. ac Nicolaus: scias autem quod expositio falsā Nicolai est ex autoritate Auicē.

Galla cupressi. i. nux cupressi. Aui. in 2. dicit: Cupressus nominatur in Syria arbor altæ, & Romanæ cupressus. Hæc arbor satis est nota.

Andachocha fecundum Aui. alia est syluestris, & alia est domestica, & alia ægyptiaca, & fit ex semine eius panis: est autem trifolium uel species eius, sicut apparet apud Serap. in cap. de andachocha. Nam ipse Sera. fine dubio uult quod andachocha fit trifolium, & sic est. Etiam Nicolaus in prædicta confectioe loco andachochæ habet feminis trifolii, quod idem est.

CLXII.

LAE TIFICANS, in nono Almanforis
in cap. de Melancholia.

Re. Melissæ,	Neremisch,
Corticum citri,	Been, Albi,
Garyophyllorum,	Been, Rubei,
Gallie moschatæ,	Zedoariz,
Masticæ,	Doronici,
Croci orientalis,	Seminis ozimi maioris,
Cinnamomi,	Seminis ozimi garyo-
Nucis moschatæ,	phyllati,
Cardamomi,	ana partes æquales.

Musci quātū est decima pars unius: deinde fumant chebu li. xx. & emblici. xx. terantur, in trib. libris aque, & decoquā- tur donec ad unam redeant: & colētur, in colatura neto mit- tatut mellis lib. i. deinde bulliant donec aqua cōsumpta sit: post hoc ex melle conficiantur prædictæ species, quod tamē in pondere sit triplum ad species, de quo c. necesse fuerit, ad magnitudinem auellanae fumendum est.

COMMEN. MANLI.

Istud electuariū est illud quo nos utimur. Mesues in suo aneido. habet unā descriptionem, quæ notatur electuariū farboteg, sed nō est similis huic: sed in alia descriptio quæ reperitur apud eundem in ca. de mania & melancholia sangui- nea uidetur quasi esse eadem cū ista. Bartholinæus Mō- tagna. in suo antidota. habet unam aliam descriptionem, & est ex autoritate Rafis, sed nobilior oīum est ista. Scias ēt quod Rafis in lib. diuisionum in loco ubi ait: Melancholia & timor, habet unam aliam descriptionem: sed non est eadem, nec fit secundum illam descriptionem.

Crocus orientalis. i. crocus communis seu usualis: alter uero crocus dicitur hortulanus, & insectuosus, eo quod ex ipso sericum tingitur, & est flos chartami cuius semē appel- latur gincos, & Dioscorat ipsum cinicum.

Neremisch, apud Aui. in 2. can. est flos, & cortex, & capi- ta simulant maci, sed est minus rubeus ad citrinitatē decli- nans, & est aromaticus & c. neq. per id cognoui quid sit. Si- mon Ian. inquit: Neremisch, sed in Arabico neremisch est, ut Aui. describit, sed nec Simo. u. cognouisse q. d. esset. Mar. Syl. dicit, quod neremisch est semē rosæ asini uel flos ipsius Aui. in suis simplicibus in fine antidotarii ait: Neremisch:

i. musaha, & est flos pæoniæ nel pæonia, & sic credo esse be- ne expositū. Nam sicut dictū ē, Mar. Syl. dicit q. neremisch ē flos rosæ asini. Auer. uero in 5. coll. dicit: Pæonia. i. rosa asi- norū. Præterea uide apud Io. Arculanum in ca. de melācho- lia, quæ describit prædictū electuariū ex autoritate Rafis, & ibi inquit: Neremisch. i. semen pæoniæ. Bartho. Monta- gna habet loco neremisch pæoniā, quæ idem est. Gētilis uero sup. 5. c. Aui. ignorauit quid ēēt neremisch. Dicit. n. ibi q. Conciliator dicit falsum in cap. de cholica dum dicit, q. neremisch est semen pæoniæ: & sic ego reperi apud Con- ciliatorem dria ducentimanona, quæ est penultima om- nium suarū dñiarum. Dicit. n. ibi neremisch. i. pæonia, & sic ex meo iudicio. Conciliator & alii bene dixerunt: sed Gen- tilis non bene dicit, sicut ostendi supra per supradictos aucto- res, q. uerum neremisch est flos pæoniæ uel semē ipsius. Præterea uide etiam quod Raf. in electuario de nucleis fru- ctuum habet feminis pæoniæ: & Aui. in eadem confectioe habet neremisch, quod idem est.

Ozimum maius, de ipso nescio quid dicā, quia de ipso in- ter doctores reperio varias opiniones. Secundum Gentile dicitur ozimū maius, quia maiora folia habet aliis specie- bus ozimi, quod non creditur. Mes. in sua practica in ca. de mania & melancholia sanguinea in quodam antidoto inquit Sccefabrā. i. ozimi maioris. Sera. uero de ipso speciale ca. fa- cit sub noie ozimi carmeni, & ibi dicit: Sccefabrā. i. ozimū carmenū. Etiam Aui. in 2. can. de ipso cap. facit sub nomine hoalmarā, & dicit quod est sccefabram. Neq. per id cognoui quid sit. Mar. uero Syl. in ca. de fenatione dicit, quod scce- fabram. i. nasurtium aquaticum sive chrysoum: & sic credo esse bene expositū, qui mihi non credit uideat primū quod Mes. uult, quod sccefabrā sit ozimū maius. Et apud Se- rap. est ozimum carmenū, & apud Aui. est hoalmaram, & apud Mar. Syl. est fenatio: si uero legis ca. de ozimo carne- no. i. maiore apud Ser. cum c. de hoalmaram apud Aui. & cum ca. de fenatione apud Mar. Syl. uidebis quod in rei uo- ritate uere idem sunt. Quidam putabant quod esset sccebrā. i. scela, sed nō est consonum quia Aui. in 3. can. in c. de me- dicinis cordialibus habet alscibeam & semen eius: & ta- men ibi elula non conuenit. Postquam ostendi de ozimo maiori secundum auctores supradictos, & feci uidere quod uolunt q. sit fenatio, sed secundum compositorem aliud est, ut reperitur apud ipsum Rafim in li. 2. Aphor. de experimē- tis & confidentiis in quodam emplastro inquit: Seminibus ba- siliconis garyophyllati, feminis basiliconis maioris quod nocatut burungi. i. cubebe: secundum Marth. Sylua. tu uero considera.

Ozimum garyophyllatū, apud Sera. est berengemisch eo quod odorem habet similem garyophyllis Rafis, in electua- rio tres species ozimi ponit. i. melissam. i. ozimum citratū: ozimum maius & garyophyllatum. Duæ alie species ozimi reperiuntur, & sunt proprie amechin, & bedarog, id est ozi- mum non garyophyllatum.

Emblici uero sunt myrobalani emblici. Rafis inquit: su- mant chebuli, & emblici, & terantur, & in tribus li. aque de- coquantur donec ad unā redeant, & colētur: in colatura ue- ro mictat mellis li. i. deinde bulliant donec aqua cōsumpta sit. Et hoc mel apud modernos appellatur mel emblicorum & sic apud oēs est certum q. Raf. uult quod iste fit modus fa- ciendi mel emblicorum: de quo uide Io. Matheum Gradi- in c. de uermibus qui in uentre nascuntur, qui sciat: q. in- telligere debeamus per mel emblicorum, quod reperitur in fine capituli electuarii, quod uocat leiscians. Ibi enim ip- se Rafis docet cōficere mel emblicorum hoc modo.

Myrobalanorum emblicorum recentium no. xx. terant, & in tribus libris aque coquātur, donec ad unam libram re- deant: deinde fortiter exprimantur, & in illa colatura adda- tur mellis desumpti lib. i. & simul coquantur donec aqua cōsumpta fuerit: tunc deponatur ab igne, & illud erit mel emblicorum, quod ingreditur in electuario de gemmis, & in tryphera de epithymo, & in aliis confectioibus. Si autem mel chebulorum facere uolueris, facias sicut mel emblico- rum, apponendo chebulos loco emblicorum.

CLXIII.
AD OMNEM EPILEPSIAE SPECIEM,
in nono Almanforis ca. de Epilepsia.

R. Pyrethri,
Seseleos,
Stoeados, ana. 3. x.
Agarici,

* Cordumini,
† Assæ optimæ,
Aristolochiæ rotundæ,
ana. 3. i. s.

Deinde extrahatur succus ex squilla, & mixtus cum pari quantitate mellis coquatur, & conficiatur ex eo species: & fiat electuarium, ex quo patiens quotidie sumat, & caueat sibi a grossis cibis.

COMMENT. MANLII.

Istud electuarium apud nos non est valde in usu, sed Mediolanenses eo magis utuntur: & maxime secundum istam descriptionem. Supra in trac. Mef. scripsit unam aliam, sed non est similis huic sicut ostendi. Rasis uero in libro diuisionum in eodem c. scribit unam aliam, sed non est eadem, sed illa uidetur magis concordare cum illa Mef. quam ista.

Epilepsia uel epilēsia. i. morbus caducus, eo q. cadat patiens cum ea capite. Porcicon a pueris, quibus facilius & sepius accidit. Nam pater Græce puer. Rasis ibi ait: Cū aliquis cadit in terram, torquet, & commouet, & intellectus amittitur, dicimus ipsum epilepticū esse: quod si spūma exit per os aut fe commingit, aut spēma egreditur, aut egestio, palsio tunc est prauior & uehementior. Experimentum mirabile ad epilepsiam quod allegat Sera. in ca. de lapide smaragdo dicens. Et qui desert in anulō smaragdū, præferuat illum ab epilepsia, quādo induit eū in suo digito anteq̃ superueniat ei epilepsia. Et propter hanc causam docent regenes, q. suspēdant smaragdos ad colla suorum filiorum statim quando nascuntur: ne superueniat eis epilepsia.

Seseleos. i. fileris montani. Miror q. ipse Rasis in libro diuisionis in prædicta cōfectione dicit, q. seseleos ē anūdē Romanū. Etia Aui. in. 2. can. ait: Seseleos est alaniudē romanū: sed hi uiri non bene senserunt, aut q. eorū litera est corrupta non. n. seseleos est anūdē, ut isti dixerūt, quā alaniudē apud Sera. in proprio ca. dicitur q. est foliū arboris assæ foetidae. Præterea uide apud eundem in ca. de agarico qui inquit: ex autoritate Dioscorici ē simile radici alaniudem. i. arboris assæ. assæ foetidae: & sic ē. Itē Stephanus scripsit hardelū pro alaniudem, q. est silphium. Infra apparebit electuarium de alaniudem, & ibi melius ostendā, si Deus uoluerit.

Assæ optimæ. i. assæ foetidae, in descriptione Mef. reperitur aliquando scriptum hancq. q. est thymus: sed debet dicere assæ uel assæ, id est assæ foetida.

CLXIII.
DIAMVSCVM PRECIOSVM,
in. 9. Alman. in cap. de tremore cordis.

* Citrariū
uulgo no-
minant.
R. Mastiches,
Cinnamomi,
Seminis ozimi maioris.
Seminis ozimi garyophyl-
lati,

* Seminis melissæ,
Seminis silybrii,
Seminis lampucci,
Macropiperis,
ana. partes æquales.

Ex quibus omnibus puluerizatis. 3. x. fumantur, margaritarum minutarum, coralli rubei, charabæ, setæ crudæ, beccaballi & rubei, foliū, oīm. an. 3. x. musci, tubaci, corconii puri, ana. 3. s. Conficiantur cum melle de myrobalanis chebulis. Hoc enim electuarium ad frigiditatem stomachi & digesti uel ægritudinem optimum existit.

COMMENT. MANLII.

Istud electuarium diamusci preciosi apud nos non est in usu, sed illa descriptio quoque nos utimur ex autoritate Mef. & secundum illam potest fieri dulce & amarum, sicut apparet supra. In isto uero Rasis ingrediuntur quædam simplicia quæ declarabo.

Silymbrium. i. mentha aquatica siue balsamita: ut dictum est supra in cōfectione de xyloaloe.

Samplicus. i. maiorana, siue perla quæ satis est nota.

Musci tubaci. i. illius regionis. Nam reperitur apud Serapionem de musco: Muscus regibus tubaci est melior musco Seniadubus de causis: una est q. gazelle Tubaci comedit spicā nardi, & alias spēs odoriteras. Gazelle uero de

Seni comedit aī herbas ab istis quas diximus odoriferas,
CLXV.

DE SCORIA FERRI, in nono Almanforis
in cap. de hæmorrhoidibus, & fistulis
rhagadiis quæ in ano sunt.

R. Spicæ,
Squamanī,
Cyperi,
Zingiberis,
Piperis,

Ameos,
† Thuris, ana. 3. ii.
Myro-
balano-
rum
Bellericorum,
Embloricum,
Nigrorum, ana. 3. s.

† Oliban-
dū uulgo.

Scorie infusæ in aceto p. hebdomadā unā, & postea torrefactæ. 3. i. s. Cōficiant oīa cū melle desumpto q. fuerit coctum cū apozemate emblicorū, sicut in ca. de melancholia noīauimus: de quo quotidie ad nucis magnitudinē sumat.

COMMENTA. MANLII.

Hæc cōfectio apud nos est in usu, & maxime secundum istā descriptionē. Ipse uero Rasis in. 9. Almanforis in ca. de his quæ confortant stomachū, & ciborū perficiunt digestiōnem, habet unam aliā descriptionē, sed non est eadem, nec fit Item apud eundem in li. diuisionum ca. de medicinis itoma chi habentur tres descriptiones: quarum una ualeat ad belitatem stomachi, & hæc conficitur cum melle, alia cum lacte acetofo, alia cum uino, sed non sunt in usu. Mesues in c. de ulceribus aurium, habet cōfectionem de scorīa ferri, sed illa adoperatur cum lycinio, quod non fit.

Scoria ferri de ipsa dictū est, & similiter de præparatione & de torrefactione. Rasis uero inq. ista cōfectio debet confici cū melle desumpto, q. fuit coctum cum apozemate emblicorum, sicut in cap. de melancholia nominamus: ibi uero non reperitur apozema emblicorum, uerum est q. ipse in cap. nominato de melancholia, habet decoctionem de epithymo, & si facere uolueris prædictā cōfectionem: oportet facias prædictam decoctionem sicut infra ostendā: ut ipse Rasis describit.

CLXVI.
DE BACCIS LAURI, in nono Alman-
foris in cap. de cholica.

R. Foliorum rutæ siccorum, 3. x.

Ameos,
Cymini,
Nigellæ,
* Cheisim,
Alexandri,
Origani,
Carui,
Amygdalarum,
amararum.

Melanopiperis,
Macropiperis,
Mentastri,
Dauci,
Acori,
Baccarum lauri,
Castorei, ana. 3. ii.
Sagapeni. 3. iiij.
Opanacis. 3. iiij.

*. i. Leui-
stici.

Confice cum melle desumpto eiudem ponderis.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium apud nos est multum in usu. Idem Rasis in lib. diuisionum cap. de medicinis cholice, habet unam aliam descriptionē, sed non est eadē, nec fit secundū illā. Etia Gulielmus Placentinus in suo tractatu de cōfectionibus, habet unam aliam descriptionem quæ est eadem, & est ex autoritate Rasis, qui fuit primus inuentor.

Alexandrinū. s. semen eius, quod a modernis Macedonicum uocatur, siue petrofolium Macedonicū, & est quoddam semē nigrum, quod apud omnes satis est notū. Ille uero qui scripsit librum intitulatū Lumen apothecariorum, sed est Lumen malelucens, in prædicta cōfectione non posuit semen Alexandrinū, cum in ea rationabiliter debeat poni. Nico. Flo. in trac. 7. quinti libri in cap. de præseruatione a generatione lapidis, inquit: Maceronis id est Alexandrinū, in alijs habet macedonicū. i. alexandrinum.

Opanax est gūmi satis notū. Arabes uocant iansur uel iansir, de quo dixerūt mihi quidam sapientes q. illud uocabulum, quod reperitur apud Aui. in. 3. can. in fen. xxi. in ca. de cura præfocatis matricis, ubi ait: Allosir uero cū ex eo in potu sumit, est in eo sanitas, est corruptū. Nam debet dicere iansir. i. opananax, & sic uide q. ipse in. 2. c. de opoponaco, quod mirabiliter laudat illū in illa materia. Quidam exultant uel q. esset zedoaria, sed ignoro, quia ipse Auic. in

SECTIO PRIMAM

cap. de aedoria de ipso non loquitur in illa materia, sicut facit de opopanace.

CLXVI.

DE ENULA, in libro diuisionum in cap. de medicinis hepatis.

Æ. Aristolochia rotunda. Seminis apii,
Zingiberis, Foeniculi,
Enula sicca, Anisi,
Istirgar, Ameos,
Erucæ, ana. partes æquales.

Terantur & aggregentur cum melle, & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Hæc confectio apud nos non est in usu, tamen simplicia quæ sunt declaranda declarabo.

Enula apud Dioscorum vocatur helenium. Macer dicit: Enula quam vulgus enlam vocat, heleniumque dicitur a medicis, est forma cognita cunctis. Idem in cap. de oleib. dicit: Inula quæ rusticis alam vocant, Petrus de Crescen. dicit, Enula non feritur, quia semen non habet, sed plantatur. Corona eius tota vel maior pars eius in terra pingui, & alte fossa. Radix eius secundum Circa instans cõpetit usui medicinz Papias ait: Alan herba radice aromaticæ & est inula. Plin. inquit: Inula quoque ieiuniis commanducata dentes confir- mat, si ut eruta est terrâ non attingit: cõditâ tibi in emulid.

Istirgar secundum Mat. Syl. est falsa quæ fit ex aniuodem. hæc Aui. in. 2. vocatur alstirgar, & dicitur quod est propinqua aniuodem, id est plantæ cuius gummi est assa foetida, sed nõ affirmo quod inula istirgar fit aniuodem, sed loco eius ponitur gumi ipsius, quod est assa foetida.

CLXVII.

AD RVPTVRAM, vulgo ad crepatos, in libro diuisionum de medicinis urinz.

Æ. Acaciæ, Granorum lauri,
Nucis cypresii, Gallarum,
Sampluci, Muth, &
Ruta sicca, Gummi arabici, ana. 3. xx.

Terantur, & cribellentur, & eliquetur gluten piscium cum aceto, & aggregentur omnia cum eo, & fiat emplastrum.

COMMENTA. MANLI.

Confectio ad crepatos in libro diuisionum, capitulo de medicinis urinz, non est in usu. Simplicia uero quæ sunt de claranda declarabo.

Cypressus apud Auic. nominatur in Syria arbor alten, & Romane cypressus. Ras. dicit: Cypressi nucis, sed ego puto quod uult dicere nucis cypressi, quæ sunt notæ.

Sampluci. i. maiorana, sicut dictum est supra.

Mugat. i. radix granati syluestris. Aui. in. 2. de ipso speciale ca. tacit, sed ignorauit quid esset, & redarguit dicentes, quod esset radix granati syluestris. ipse etiam in ca. de grano alchib. i. granati syluestris dicit: Et dixit, isti eius radix est al- mugath. Vide etiã de mugath apud Simonem Ianuensem.

Gluten piscium. i. colla piscium quæ fit ex intestinis piscium. hæc apud Graecos ichtyocolla dicit. Nicolaus Flo. in lib. 7. in cap. de curatione herniæ siue rancicis ait: Gluti- nis scriptis. al. pistatorum. i. collæ de piscibus &c.

EX ANTIDOTARIO AVICENNAE IN QUINTO CANONIS.

CLXVIII.

THERIACA PRIMA AVICENNAE, & est descriptio Andromachi.

Æ. Trochiscorum squillæ, aur. xlviii.
Trochiscorum uiperæ, aur. xxiii.
Trochiscorum alindaracaron.

Piperis nigri,

Opri,

Cinnamomi, aur. xii. alias. xxiii.

Rosorum, aur. xii. alias. xxiii.

*Seminis napi syluestris ros Scordei,

tundi,

Radices lilii cœlestis,

Agarici,
Succi glycyrrhizæ,
Olei ballami, ana. aur. xii.

Myrrhæ,

Croci,

Zingiberis,

Rheubarbari,

† Pentaphylli,

Calamenti montani,

Prasii,

*Seminis Macedonici,

Stroacados,

Colti,

Piperis albi,

Macropiperis,

† Pulegii Iudi,

Olibani,

Floris squinanti,

Gummi albotin,

Calsiæ lineæ nigræ,

Spicæ,

Polii, ana. aur. vi.

Storacis liquidæ,

Seminis apii,

Selecæ,

Ameos,

Chamaedrys,

Vini antiqui odoriferi,

† lib. iii.

Campetyos,

Succi hyppocisthidos,
Spicæ celticæ,
Scheræ montanæ,

Folii,

Gentianæ,

Seminis fœniculi,

Terræ sigillatæ,

Cholchotar adusti,

Amomi,

Acori,

Nasturtii albi,

Carbassami,

Hypericon,

Phu,

Gummi arab.

Cordumeni,

Anisi,

Acaciæ,

Dauci,

† Bellii, ana. aur. iiii.

* Bezaard,

Alphatri,

Opopanacis,

Centauræ minoris,

Aristolochiæ rotundæ,

ana. aur. ii.

Calorei,

Seraphini,

ana. aur. ii. alias. iiii.

Mellis despumati, lib. x.

Liquefiat quæ de eis liquefuit, & infundatur quæ infunduntur, & terant sicca, & cribellent, & conficiantur cum melle, & ponant in uase uitreo, aut plûbeo, aut argenteo, & non impleat uas, immo sit in eo supspuitas ut respiret medicina & oēs medicinz præter mel & uinũ sunt. lxxiii. medicinz.

COMMEN. MANLI.

A tyro serpente dicitur tyriaca, & maxime si istam descri- ptionem quæ reperitur multæ alie tyriacæ quæ non di- cuntur a tyro, ut est tyriaca diazefaron. i. de quatuor rebus sicut dictũ fuit. Et est tyriaca rusticorũ, quod est allũ agre- ste: & est tyriaca de fusio. i. troch. alchaochion: & est tyria- ca de terra sigillata, & multæ alie tyriacæ reperiuntur, qua- rum descriptiones nõ ingreditur tyrus. Vñ per hoc moderni distinguunt quæ tyriaca dicitur medicina quæ ualet contra ue- nenum, ut bezaard, quod apud Arabes significat omnem me- dicinam liberantem a ueneno. Vide Aui. in. 2. can. primo c. de areolis uenenorũ, qui inquit: Tyriaca bezaard interficit uenenosa & expellit ueneni. Sera. dicit: Lapis bezaard. i. lapis liberat a uenis. Nã tyriaca albezaard est nomẽ Per- sicũ, & est expellens nocumẽtũ, & hoc nomẽ cadit super duos: unũ est quod cadit super omne medicinam conuenientem alicui ueneno, & quod restitit uirtuti eius, & expellit nocumẽ- tum ab eo per proprietatem quæ est in ea: & sũ est quod ca- dit super lapidem notũ quod cõuenit omnibus uenis: Ipse Ser. ibi nõ loquitur in quo iste lapis inueniatur: uerũ ipse docet discernere ab aliis lapidibus ei similitatibus. In fine uo- ro ait: Abdala anarach uidi lapidẽ bezaard filii Almirama murũ custoditionis legis Dei: & est uerum quod ipse emit la- pidem istum, & dedit pro præcio lapidis bezaard palatiũ Cor- duba in principio belli. Et iste lapis (ut dicit Enas in suo la- pidario) est quidã lapis multum charus legaleis, qui genera- tur in oculis ceruorum in orientem: qui cũ serpentes come- dunt deponentes senium ut fortiores fiant, intrat fumẽ ubi morantur immersi usque ad caput tan tu quousque sentiãt uir- tutem ueneni separantur: interea lachrymam emittunt quæ coagulata in oculis interdu usque ad magnitudinem nucis de- siccatur, donec cadat cum de flumine exierit, & sic inueni- tur, & hæc dicitur uenenorum tyriaca.

Hæc descriptio istius tyriacæ reperit in multis aliis locis. Nam Rasis in. 8. Almanfo. in ca. de moribus uiperarum habet unam descriptionem. Gulic. Placen. in suo antidotario habet unam aliam. Ioan. Serap. in suo antidotario habet

* drach-
mas prius
legebant:
nos autem
propriis
ponderũ
notas e no
ua ex Ara
bico Aui.
apud
IYNAS
impresio
ne patim
restituim⁹
* Al. nape
syluestris.

* Liqui
tũ uoca.

† Cœcia
reũ habet
Auicem
interp
* i. Pres
felini.

† melu
uel me
transit
Auicem
& est pat
gium ali
go ceru
ni appo
latũ Gra
corũ ne
pe dista
minum.
* Galbani
uocant.
† al. long
* Sagpe
nũ uoca.
* al. Kifli

nam aliam. Halyab. in decimo practicæ habet eandem. Ni colaus etiam in suo antidotario habet unam aliam, sed illa est ex auctoritate Galeni sicut dixit, & dicitur qd est domina medicinarum, & Galenus ipsam composuit, sed in ueritate sicut iquit Aui. Haly. & alii autores dicunt qd descriptio radicalis est Andromachi, & est melior aliis descriptionibus. Et uerum est quod fuerunt plures medicorum: sicut Gale. Democritus, & alii qui uoluerunt in ea addere uel minuere de ponderis, sed necessitas nō erat: quia Andromachus prædictam descriptionē composuit cum tanta diligentia qd nō erat necessitas, qd aliquis in ipsa adderet nec minueret aliquid. In tempore uero antiquo utebantur mithridatu loco tyriace ut dicit Aui. sed postquā accidit Andromacho illud quod expertum fuit super iuuamentū carnium serpentum & aliorū, addidit in eo trochiscos de uiperis. i. de tyronis reliquis uero non dimiuitur mithridatum a tyriaca nisi in re una, quod est uenenum serpentum. Et sic ista descriptio domini Aui. est descriptio radicalis Andromachi Ipse Aui. habet tres descriptiones, sed prima est nobilior aliis: & sic hodie nostri medici uolunt quod ista descriptio sit illa quæ uti debemus, sed in nostris partibus reperiri uarij apothecarii facientes ipsam, sed emittit a mercatoribus. Iam uero quæ nō hēt tātam uirtutem quantam dixerit autores eam habere, & hoc est (ut credo) quia non faciunt ipsam secundum intentionē Andromachi. Et scias pro certo qd allocutus fui illos qui faciunt ipsam: & scio quod decipiuntur in multis simplicibus. et nō cognoscunt certitudinem rerum: sed quomodo debeat experiri & probari bonitas tyriace statim declarabo.

Experientia tyriace, si erit bona aut mala, ut docet Andromachus. Aui. Io. Ser. Guiliel. Placentinus, & Haly. est talis. Dicunt. n. accipiatur gallus syluestris uel domesticus, sed syluestris est melior & existimatur quod sit falsianus quia ipse est ficioris complexionis quam domesticus & mittatur super ipsum animal uenenosum, ut ponatur de aliquo ueneno in uulnere paruo facto super alam sinistram prope coxam: & post hoc detur in potu cū uino de tyriaca, & ponatur de ea etiam in uulnere post uenenum specialiter cum animal incipit debilitari: tunc si animal uixerit, erit tyriaca bona & bona etiam si moritur, erit praua. Alia probatio, si detur tyriaca illi qui sumpsit opium uel iusquamum nigrum, uel corticem madragore: & si tyriaca destruxerit uirtutem alicuius iutorum uenenosum, erit bona. Alia probatio est, ut si homo sumat catharticum & consideretur, tūc si soluerit ut sumat in potu tyriacam, tunc si retinet eam, est recens & bona: & si non, est mala. Vide ergo si cognoscere uolueris tyriacam bonam a mala. Postquam ostendi de probatione ipsius, nunc uolo ostendere quanto tempore debet permanere ipsa tyriaca antequam dispendatur.

Sciendū est igit qd in Andromachū & Aui. debet stare p sex mēses aut quādiā ad minus. Vnde qñ est infans. san te sex mēses stupefacit. De qua Gentilis ait: Dicunt quidā sapientes qd tyriaca noua stupefacit per opium, quod natura separauit aliis, & mandat illud per partem dolentem.

Si quærat quor res ingrediuntur in ista tyriaca, dicatur qd computatis simplicibus & compositis ipsam ingredientibus: sunt ad numerum lxxiii. duobus liquoribus scilicet melle & uino exceptis.

Si etiam quærat in quo uase tyriaca melius conseruetur in hoc est regula, quia communiter cōseruant ipsam in uasis plumbeis, sed male, quia plumbum attrahit ad se ueneno sitatem. Nec debet esse de ferro, qñ pars uasis quæ uacua remaneret, posset fieri xruinosa, & illa xruigo propter permutationem tyriace opportuna, & ipsius tyriace ebullitioni communicare posset ipsi tyriacæ aliquid de ueneno sua natura sua. Nec debet esse de aurichalo, quoniam ipsam principaliter fit ex ære. Nec debet esse de cupro, qñ ipsam fit ex parte gris. Nec debet esse de peltro, quoniam ipsam cōponit ex parte plumbi: immo conseruetur aureo uel aurato, argenteo uel argenteo, sitineo uel līnato, utreuo uel uitreato uel marmoreo, seu de alabaistro uel bene polito &c.

Si etiam quærat quor annis durat tyriaca, dicat qd Aui. ibi de ipsa loquitur dicens. Et tyriacæ quidem adlonge infantia

& pubertas, & a dolescentia, & senectus, & mors. Et fit in fans post sex mēses: deinde incipit in pubertate & augeat ut usq; ad tempus in quo stat. per. x. annos in regionibus calidis, & xx. annos in regionibus frigidis: deinde stat aut. x. annis, aut. xx. deinde declinat, aut post. xx. annos, deinde post. xl. annos, deinde expoliatur uirtute tyriacæ, aut post. xl. annos, aut post. xl. & fit una cōfectio cum declinata a gustu tyriacæ: & oportet ut de in potu morfo de illa quæ est recens & fortis, & reliquis quibus in potu datur de illa quæ est debiliior, & fortasse est necesse ut in potu datur morfo recenti ex medio aureo usq; ad aur. i. & ex eis quibus distinguitur inter illam quæ est recens & fortis, & inter antiquā & debile & malam dictum est paulo superius, ubi diximus de eius experientia. Communiter aut tenet qd tyriaca duret in bonitate annis. xxx. aut. xl. post illud est debilis.

Notandum est qd melius tempus conseruendi tyriacam est tempus ueris & tempus æstatis, quia tyriaca iuxta auctoritatem sententiam lex mēsis permanet antequam perfectissime commisceatur: quod equidem Albucasis. iiii. particula azarauti, post descriptionem tyriacæ, & omnium troch. ipsam ingredientium expresse innuit dicens, qd post sex mēses completur tempus mentis tyriacæ, & fermentatio, & ad minus post sex menses ad ministrari potest, ut dictum fuit. Postquā dixi de probatione ipsius, & alia nunc uolo ostendere de modo cōficiendi ipsam, ut docent Andromachus & Rasis dicentes: Necessitas est ut sumamus opium, & myrrhā hypocythidos, & serapinum, succum liquiritiæ, & storacē liquidam, & acaciam, & opopanax, & omnia hæc in mortario posita cum pauco melle desputato moueatur donec mollescant: deinde ex uino infundantur, & per tres dies in uase uitreato manere permittantur: postea spica, & cinnaomum, & zingiber, & cassia lignea, & nalturiū atq; castoreū, & folium, & terra sigillata, & chcolchar & asphaltum, ac amomum. Nam hæc trita in mortario cōmisceantur & ex uino alpergādonec uniantur: deinde mel, & gummi arabicum, & terebinthina, & galbanum, & balsamum fumanū & in cazola posita donec mixta sint aggregetur: quæ taliter preparata aliis medicinis quæ in mortario sunt adiungantur, & cū oīa simul fuerint, terant, & agitent donec bene sint mixta: deinde quod ex eis sit in pixide argentea aut in uase plūbi, quæ medicamē hoc in duob. partibus sui capere possit reponatur. Vas autem in quo ponatur, nō oportet qd sit plēnū: cuius oī corio optime liget, quotidie tamen discooperiat ac per unam horā manere permittat. Ex hac quoque etiā medicina nō nisi post sex mēses aliquid sumatur & illo modo fiat: & scias qd in primo mense omni diebus, uidelicet mane & sero per mediam horā uel circa tyriaca ipsa est fortiter agitata & commiscēda, & semper postea suo cooperatorio obturanda & sic sigillanda. Secundo autē mense omni capite quatuor dierū semel tyriaca ipsa est per mediā horā similiter bene agitata, & commiscēda. In tertio uero mense omni capite septem dierum semel ipsa est cōfimitur commiscēda. Quarto autē mense omni capite decem dierum semel similiter per mediā horam est permiscēda. Quinto uero mense similiter quindecim dierum capite est commiscēda. In capite aut sexti mēsis similiter semel per mediā horā est permiscēda. Postmodum uero tanquā perfēcte cōmixta dimittēda est optime obturata: aliquid tamē in temporis processu cum opportuno uidere: præcipue propter ebullitionem ipsius tempore cauatissimā factam non cōuenit ipsam aliquid permiscere. Postquā ostendi cōficere ipsam, nunc uero intentio mea est declarare illa simplicia quæ magis difficilia sunt: & primo incipio a trochif. squillæ: quorū descriptio infra apparebit. Halyabbas habet troch. haufali: quod idem est. Nam haufal est squilla.

Trochif. de uiperis. i. de tyros. de femina. Est certum qd tyriaca dicitur a tyro serpente. Halyabbas habet trochiscos tyriacæ, & idem est infra in sua descriptione melius ostendā, si Deus uoluerit.

Troch. alindaracharon. i. Andromachi. Gal. loco troch. alindaracharon, habet troch. hac ora: i. de quibus infra.

Napus syluestris est rapiti a ille rapiti: ille uero qui de

nouo scriptis Lumen malucens habet semen finapis: quod nequaquam beneficium est, sicut ostendit. Gentilis autem ignorauit quid esset, sed ego aggregaui auctores qui scripserunt praedicta descriptione, & uidi intentione omnium: inter quos Andronachus habet rapistrum, Aui. habet napi syluestris, etiam Gulelmus Placen. habet napi syluestris, & ibi dicit, q. est rapistrum. Democritus uero habet rapistrum quod idem est. Halyabbas ait h. est seminis rapae syluestris, quod secundum quosdam est idem. Ergo finapis syluestris est rapistrum. Ego dico q. est raphanus agrestis: & hoc fit uerum uidet Simoné Ianuen. qui dicit, q. rapistrum haromochia, & raphanus agrestis idem est. Similiter ait Mat. Syl. Rafis in suis synonymis in fine dicit: Napi syluestris, i. rapistrum. Synonyma Nicolai aiunt: Napi syluestris, i. rapistrum, Pothea in litera ait: Rapa syluestris, i. rapistrum uel napi syluestris & sic fit bene consideret uidebis q. napus syluestris, & rapistrum & raphanus agrestis, quae alio nomine a Romanis aromachia dicit. Et sic meo tpe uidi ponere semen aromacii.

Postquam dixi de napo syluestri, nunc uero mea intentio est narrare unam aliam speciem napi, quae a multis uulgaribus nomine uocatur rampunculius, & nomen suum secundum plurimum medicorum modernorum opinionem est illud quod ab Aui. in 2. uocatur melha. sed non recte. Nam si legis bene illud ca. de melha: uidebis quod rampunculus non conuenit. Nam ipse Aui. ait, q. est sicut ramnus. Ramnus uero apud Serap. est haulegi. Et haulegi apud Aui. est rubus qui rampunculus non est: sed fit quomodo dicitur: rampunculus est. Species napidae quo Nicol. Floren. in li. 4. in trac. 4. in c. de prouisione cautelis, & custodia a uenis, & eorum nomenclis in generali ait: Semen napi parui, & existimant quidam quod fit rampunculus qui comeditur communiter. Bartholomaeus Montagnana in suis consiliis, in consilio reru praerantium ab opilationibus, & a tensione magna in stomacho inquit sic: Melius tibi salacium esset locusta, i. ramponzeli uo tempore. Reperitur autem quoddam animal nominatum locusta, & istud est grillus uisus, ut dicit Nicolaus.

Secundum secundum. Aui. & Circa instans, & Gulelmus Lombardus dicit, est allium agreste. Et secundum Circa instans solus folus comperit usui medicinae. Petrus de Cresce. dicit: Scordeon id est allium agreste, solus folus eius comperit medicinae, & est tyriaca rusticorum secundum Gal. Macer inquit: Scordeon argue sunt alia dicta lateo.

Lilium coeleste apud Aui. est ireos, cuius radix usui medicinae comperit.

Oleum balsami est quod ex ligno balsami manat Andromachus habet olei balsami: sed Rafis & Gulelmus habet balsami puri. Halyabbas uero habet olei balsami optimi: & idem habet. Io. Serap. sed pro certo auctores qui de ea loquuntur, non intelligunt oleum balsami factum artificialiter ex multis: uerum est q. balsamus apud nos raro reperit. Auctores moderni scripserunt olea, & alia quae possunt administrari in omni loco ubi ingreditur balsamus, prout infra apparebit.

Pentaphyllon, i. quinque folium. Id. in ca. de herbis aromaticis siue communibus dicit: Pentaphyllon a numero foliorum dicta: unde & eam latini quocumque folium uocant reperitur una alta planta quae multum sibi assimilatur, sed h. septem folia, & haec uocat heptaphyllon, ambe in pratis reperitur. Io. Sera. inquit: Albetaphyllon, & e quinque folii.

Prasium, i. marrubium, ut dictum fuit. Halyabbas ibidem dicit: Prasium, i. porrus montanus.

Macedonicum, i. apium montanum siue Alexandrum. Rafis loco eius habet holufstrum. Io. Sera. habet apium montanum, q. idem est, secundum Matth. Syl.

Pulegium indum, i. pulegium ceruinum. Na Rafis & Gulelmus habent pulegium ceruinum. Et Ioan. Sera. habet alchamum, & dicit q. est pulegium ceruinum: in tertia uero descriptione Aui. ait: Tuftaminis & est pulegium, & ipsum diptamum sine dubio est species pulegii, ut patet apud Ser. in ca. de organo ubi de dicto loquitur sine dubio ex meo iudicio credo quod uerum pulegium ceruinum fit diptamum. Na Id. in cap. de herbis aromaticis siue communibus ait, Diptamum herba nomen accepit propter quod apud Vir-

gilium: Ceraua uulnerata salus. Et ite Halya. loco pulegii in di. h. diptamum, quod idem est. Papias dicit: Pulegium matris diptamum est. Sed lumen malucens putat q. pulegium indum fit pulegium uidebis, sed non cognouit quid esset. Meo uero tempore pro pulegio indum diptamum uidi ponere.

Gummi albotin, i. terebinthina. Nam si consideret bene gummi albotin est terebinthina dictum largatum. Rafis loco eius habet terebinthinum. Aui. in 2. descriptione habet glutinis almbac, q. id est Halya. h. gummi borani, quod id est Fructus ipsius uocantur gena uiridia, & arbor botin.

Storax liquida, signa. Io. Sera. in praedicta descriptione dicit: Storacis liquidum, & est mel albuine, & in confectione cheferet inquit: Storacis humidum, & est mel storacis calamitae.

Hypocylthidos est succus ciuldam rei quae assimilatur fungo, quae nascit in radice rosae caninae, seu barbe hircinae. Aui. in cap. de barba hircina dicit, q. radix eius est fortioris stypticatis, & ponit in tyriaca, & sic est. Franciscus de pede motu in ca. de fluxu utrisque omnium modorum & curis eius ait: Barba hircina & flus eius, & succus qui est hypocylthidos.

Schea montana, non inuenitur sic apud alios: uerum est q. Haly. habet sichi montani, quod idem est. Tamen si intentio Andromachi est q. ponamus scheam, debemus eam ponere, & pro schea intelligit sandonichum reperitur apud Ser. in proprio ca. de schea, & dicit, q. est abinthium marinum: & sic est, & est illud quod hodie herbam lauinam dicimus aut somenzinam, aut semen sanctum. Deseruit de Ianua ad nos, & mirabiliter ualet ad uermes interficiendos.

Cholchotar uero apud Aui. in 2. can. cap. de atramento est utriolium citrinum. Io. Serap. habet calcadis. Gulelmus Lombardus dicit, q. utriolus adulu de quo fit encaultrum, uocatur cholchotar. Halyabbas uero habet utrii affati quod dammodo non ad perfectionem. Ego credo quod ista sententia est falsa, quia non est consonum dicere utrii affati: immo debet dici cere utrioli affati: & sic hodie loco cholchotar ponitur utriolus uiride aduatum. Andromachus dicit, q. aduatum ipsum non fit ultimata, sed adurat sem medietate ad hoc ut possit coeri. Oportet ergo accipere utriolum, & ponere ipsum in patella ad ignem donec igneat, & continue utriolum uoluerit: & tandum hoc facias q. eius color mutetur, & tunc deponatur, & usui referetur. Etiam Io. Sera. dicit, q. calcadis debet esse usum secundum medietatem suae adulationis.

Nasturtium album, de ipso nescio quid dicam, quia sapienter dixerunt q. nasturtium album est nasturtium Babylonium q. non conlonat quia Rafis & Gulelmus ambo habent in praedicta tyriaca, i. nasturtium albu & nasturtium Babylonium: ergo non sunt idem. Aui. in 2. descriptione tyriacae dicit: Alme & alseis, & est nasturtium album. Io. Sera. in eodem loco habet seminis a zufferre: nega per id cognouit quid sit. Mat. Syl. in litera aleis inquit: Aleis, i. nasturtium Babylonium, & est nasturtium orientale. Sed Ser. uero in ca. de nasturtio: formam nasturtii orientalis describit ex auctoritate Dios. sed apud Dios. non reperit sub nomine nasturtii orientalis, sed meo iudicio credo q. illud ca. de bryo herba apud Dios. fit idem cum nasturtio orientali apud Ser. Et sic sine dubio, si legis ca. de brion apud Dios. ca. de nasturtio orientali apud Ser. uidebis q. idem sunt. Sunt etiam qui loco eius ponunt nasturtium aquaticum, quod nasturtium uisuale. Haly. autem loco nasturtii albi, habet cardamum, quod est nasturtium uisuale.

Gummi, i. gummi arabici, & hoc reperitur super arborē, ex qua fit acacia sicut reperitur alix gumme, ut dicit Ser. Halyabbas in multis locis dicit: Gumma zabara, i. arabica.

Cordumen, i. carui agreste, ut dicit Io. Sera. in praedicta confectione: similiter ait. Gulelmus, & est Matth. Syl. est cordilium seu filer creticum, & est Democritus est cheimif campellre: ergo est leuisticum. Vide supra in confectione athanasia magna, ubi melius ostensum fuit.

Bezaard, i. galbanum, q. alii auctores loco eius habent galbanum. Praterea Sera. in ca. de galbano dicit, q. bezaard, est galbanum: similiter dicit in descriptione tyriacae. Etia uide q. Aui. in tertia descriptione in fine ait: Ad Itera bezaard, & est galbanum: & sic est. Alia uero simplicia satis declarata sunt. Liber q. de Bulchasis in tract. 2. docet formam extra-

hendi succum galbani, & inquit. Recipe bauciam syluestre
foecentem cum suis summitatibus, & incinde. uide ibi.

Mel. mel apum quod est notum. Aui. Rafis, Gulielmus
habent mel. sulfale. Andromachus autem hēt mellis alhafce,
& dicit, qd ē mel q. siquāt apes ex herba quæ dicitur alhafce
ergo debet esse mel quod apes colligunt ab alafce quod est
thymus. Io. Sera. ibi dicit: Mellis syluestris mūdū quod colligi
gūt apes ex alhafce. Haly. dicit: Mellis quod apes ex plātis
colligūt. Galī sua descriptiōe hēt mel atticū, de quo supra.
Notandū q. regula multorū modernorū est q. in ipsa tyria-
cæ cōstructione ponūt multo plus mellis quā debeat poni:
sed si uis q. tyriaca sit laudabilis, ponat pro qualibet li. mel-
lis. j. vii. specierum ad minus: & hoc fuit approbatum meo
tēpore. In aliis confectiōib. nō ingreditur tantū specierū.

Vinum antiquum odoriferum, & optimum, hoc est satis
notū. Auic. Andromachus, Rafis, Gulielmus, & Io. Ser. po-
nunt in suis descriptiōibus uinum odoriferū, & non expo-
nunt si debet esse coctum, aut nō: sed secundum opinionem
meā debet esse coctū: & istud uinum debet fieri ex uuis ele-
ctis albis factū & coctū usq. ad cōsumptionem unius tertie
partis eius uel plus quousque habeat præfati mellis colari
consistitū, & debet esse trium annorū, uel circā. Qd equi
dem uult expresse Albucaſis quarta particula azarauī cap-
rimo inquit debere sumi carenū uetus de tribus annis.
Et Haly. decimo præfate, ca. de tyriaca dicit: Semecarenū
ideſt uinum dulce coctum, quod appellatur muſtū uetus de
trib. annis. Gale. loco eius hēt uinū Falernū, de quo supra.

CLXX.

CONFECTIO MITRIDATIS,

ex descriptiōe communi omnium.

R. Myrrhæ,

Dauci,

Alleiſi,

Mellitoi,

Gentiane,

Olei balsami,

Carboliſami,

Trochiscorum cochion,

Bedelli, ana. 3. vii.

Rutæ. 3. ii.

Ammoniæ,

2 1/2 Spicæ romanæ,

Mastiche,

Gummi arabici,

Petroſellini,

3 1/2 Cordumeni,

Seminis feniculi, ana. 3. v.

alias. 3. iiii.

Aniſi,

Acori,

Meu,

Serapini,

Styracis,

Opopanaxi, ana. 3. viii.

Opīi. 3. v.

Caſiæ,

Leucopiperis,

Melanopiperis,

Hermodyllorum,

Polii,

Scordeon,

Vini odoriferi antiqui in quo infundatur ea quæ oportet
infundī mellis despumati, quod sufficiat: misceat & referue-
tur & adminiſtretur poſt ſex meſes: & ſi doſis ſicut auella
nam cum eo quod est conueniens de potionibus.

COMMENTA. MANLI.

Hæc confectio mithridati, ſicut inquit Aui. eſt confectio
q. ſecit Mithridates rex Pōri & noſauit ſuo noīe, & cōpo-
ſuit ipſam, & ex medicinis expertis ſuper uenenā propriæ
& ſuper agritudines alias, ut eſſet aggregatiuum iuamenti
uenenorum diuerſorū & egritudinum diuerſarū. Fuit ergo
ipſum tyriaca in illo tēpore: deinde poſtquā accidit Andro-
macho illud quod expetis fuit ipſum ſuper iuamentū car-
nium ſerpentū, & aliorum, addidit in eo trochiſcos de uipe

ris, & alteratū eſt parum per additionem & diminutionē.
Fuit ergo tyriaca magna in multitudine iuamenti: uerum
eſt tyriaca magna eſt magis iuuatiua ipſo in re una, quod eſt
uenenum ſerpentum, in reliquis uero non diminuitur mi-
thridatū tyriaca. Et propter id ego dico q. tyriaca magna
dicitur a tyro ſerpente: ut dictū eſt. Rafis in primo tra. octauū
Almanſori de uenenis & uenenoloſum morbiſus, & eorū
curatione & cautela, hēt unam deſcriptionem quæ eſt eadē
Guliel. Placent in ſuo tra. de conſectionibus habet unam
aliā quæ eadē eſt. Haly. in. 10. prætica habet eandē: ſed
uide ſupra ubi poſui unam aliā deſcriptionem, quæ eſt ex
authoritate Nicolai. Et dicit q. eſt mater oīum antidotorū,
ſed non eſt eadē. Generaliter autem cōfici ſecundū deſcripti-
onem Aui. iſtam, & maxime apud Mediolanenſes. Simplicita
quæ declaranda ſunt declarabo, ſi Deus uoluerit.

Alleiſi ſecundum intentionem Aui. eſt naſturtium Babilo-
nicum. Et ſecundum Mat. Syl. eſt naſturtium orientale. Ipſe
met in c. de cardamo. i. naſturtio inquit: Sed naſturtium cō-
mune notū eſt melius illud quod deſertur a Babilonia. Hic
intelligendum eſt q. naſturtium Babilonicum eſt commune,
ſed Babilonicum eſt nobiliſimum noſtrum. Dioſ. in ca. de car-
damo, ideſt naſturtio aui: Cardamus utilior eſſe dicitur Ba-
bilonicus omnibus: nos uero ponimus de noſtro quo uti-
mur & ſunt qui ponunt de aquatico.

Nebefcet uel terebſcet. i. glutē alimbat, & eſt terebinthi-
na. Nā Rafis Gulielmus, & Io. Sera. in eodem loco habent
terebinthum, & idem eſt Halyabbas autem loco eius ha-
bet ratingi ergo eſt colophonia, ut uidetur apud Auicē in
2. can. ſed in iſto antidoto terebinthina intelligitur.

Barbahirina eſt planta ſecūdam Aui. ex qua fit hypocy-
ſthidos & ſic credo, quia Halyabbas ibi dicit: Haſaphi. i. ſuc-
ci hypocyſthidos, idem eſt conſonum propter alios autho-
res, & nos uocamus ipſam roſam caninam: in cuius radice
diſtante a ſtipite plantæ eius naſcitur quedam res ad ſimili-
tudinem ſungis: cuius forma eſt ac ſi plures balauſias inſige
res unam aliam, & dicitur taraticū qui ſungus conſuſus & ex-
preſſus ſuccum emittit: deinde ad ipſitudinē coctus & ſicca-
tus hypocyſthidos efficitur.

Melachion ſecundum Auicē, eſt opium, ſed eſt textus cor-
ruptus. Nā ipſe in prædicto mithridato inferius habet opium
ergo melachion non eſt opium. Nicolaus in ſua deſcriptiōe
loco melachion habet githergo eſt nigella quæ uocatur
melanthium. Nā uide Plī. qui ait: Gith ex Græcis, alii mel-
anthiū, alii melanſpermon uocant, & nō eſt illud gith quod
reperitur in noſtris partib. in bladiſ: ſed gith eſt melachio,
& eſt nigella nigra, cuius ſemen eſt odoriferū cū odore io-
cundo, & eius ſemen habet ſimilitudinē feminis porri, hanc
ultra padum ruſſici uocant ſithetam.

Opium apud ipſum eſt ſuccus papaueris nigri quod Aegy-
ptii ſeminant. uide ergo ſi eſt conſonum, q. melachion ſit o-
pium: nam ſupra eſt poſitum melachio. i. nigella. ſed ipſe di-
cit quod eſt opium, quod credendum non eſt, inferius uero
iterum habet opium.

Oleum baſami, quod ex ligno baſami emanat. Deſcri-
ptio nigellæ reperitur apud Meſuē, ſed non poſſet fieri apud
nos, tamē infra apparebit oleum quod in omnibus locis po-
teſt adminiſtrari ſicut baſamus.

Trochiſcus cochion eſt tyriaca quæ uocatur de ſulſio.
Nam poſtquam aggregaui iſtos trochiſcos apud Auicē, cum
tyriacæ de ſulſio apud Rafim & Gulielmū uidi, q. idē ſunt.
Haly. habet trochiſcos meſtrinoſerion quod idem eſt.

Pulegium. pulegium indiū, ut habetur apud alios autho-
res, ſicut eſt Rafis & Gulielmus, & eſt pulegium matris ſi-
ue ceruinū. i. diptamum, ſicut dictū eſt in tyriaca. Præte-
rea. Io. Sera. loco eius habet meſcatrameſir, quod eſt uerū
diptamum, ut patet apud Gal. in 6. ſimplicium.

Phu, uel ſua. i. ualeriana, cuius radix uſui medicinz com-
petit. Raf. uero in ſua deſcriptione non habet ſu, ſed loco
eius poſuit fauſel. i. auellānum nam indicam.

Vmblici ſtinci. i. ſumen ſue nēter ſtinci, ut dicit Gētilis.
Raf. loco eius ponit inguina ſtinci. i. guaril. Io. Serap. habet
pinguedinis ſtinci. Halyabbas autem habet caudarium ſtinci.

al. alii
ſcutellari
naſturtium
Babiloni
ci tēpore
tantes uel
dicitur
communi
ac officiū
dicitur.
2 1/2 Celiciā
uolunt.
3 1/2 carui
apreſſi.
4 1/2 Terben-
thina uul-
go.
5 1/2 Nigelli
nonnulli
quasi mel-
anthium
dicunt
uocant. Aui
c. n. uero
interpret
exponit q.
quod opium
ſolū indi-
um tamē
alia littera
opium o-
mnitāt, ac
ſolū in la-
tine eſt
exponit.
uero ego
cum periti-
onibus
gith huius
mellitū
uel nigelli
posui
intellige-
rent.
6 1/2 Sincum
dicunt.
7 1/2 Mendo
ſe prius.
24. v.

S E C T I O P R I A M

Hypericō apud ipsū in .2. c. an. est uia dāmonis. Auer. in .5. col. ait: Heuftericon. i. hypericon nelfricō, & quidam appellant hanc herbam cordialem, eo quia assimilat cordi. Eius semen apud Plin. uocat caros, & est herba sancti Ioannis dicta fugadāmonium siue perforata, quz satis est nota.

CLXX.

PHILONUM ROMANVM

Tarfense.

<p>R. Lepociperis, Seminis hyoclyami albi, an. * aur. xx. Opilii, aur. x. Euphorbii, Spicz, Pyrethri, ana. aur. i. Mellis despumati quantum sufficit.</p>	<p>Castorei, Zedoariz, Doronici, Margaritarum non perforatarum, Sel, ana. 3. i. Croci, aur. v.</p>
---	--

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio in Papiā non est ualde in usu, sed in Mediolano magis. Aui. narrat philonium dicens, inquit Gal. in l. decem tractatū in quo narrat narrationem philonis, inquit. n. Gal. in persona Philonii. Ego sum de expositione Philonis medici Tarfensis, & metū quiddam iuuamentum ad eum cui dimissa est mors, est iuuamentum maximum, & reditū cō dolores antecederet in ægritudinibus pluribus &c. Io. Serap. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem, sed nō est eadem: tamen ibi Io. Sera. ait: Philoniū Tarfense, & dicitur Philonium Romanum. Io. Coccoregius in cap. de uigilia & sahara, inquit: De uirtute istius Philonii Romani, & dicit q̄ fuit inuentum a Philone medico Romano, propter quod appellatur est Philonium Romanum: ualeat autem ad somnum inducendum.

Sel apud Aui. in .2. est medicina iusta similis zingiberi: quid aut q̄ communiter ignoratur, sed Sera. de ipso etiam loquit, & in uno ca. confundit sermo de bel. sel. & phel, & dicit q̄ sunt medicinz indz, & dicit q̄ sel est citonium in dum. Mat. Syl. de citonio iudo ca. facit & ibi dicit: Bel uel sel est citoniū indum: & sic quidā sapientes dixerunt q̄ bel uel sel in uirtute sunt conuenientes, & existimant quidam esse idem. Ser. uero in ca. de darifalcha, id est arbore granati syluestris ait, q̄ fructus ipsius arboris est bel: ebero bel uel sel est arbore granati syluestris. Et dixit Gētilis quod bel est herba de qua fit lycium, & sic est q̄ moderni faciunt lycium de arbore mali granati. i. amiberberis. Quāda fallā synonyma exponunt q̄ sel est ambucus, quod non est credendum.

CLXXI.

PHILONVM PERSICVM.

R. Piperis albi, seminis iulquiami albi, an. 3. xx. opilii. terz. figillata, an. 3. x. croci. 3. v. euphorbii, spicz, pyrethri, an. 3. ii. castorei. 3. i. zedoariz, doronici, margaritarum non perforatarum, mulci, an. 3. s. camphoræ sextam & semis. 3. i. mellis despumati colati, quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio apud nos non est in usu, sed in Mediolano magis. Supra posita fuit una alia descriptio quz ualeat ad fluxum sanguinis narium, & ad multa alia. & istud ualeat ad fluxum menstruorum, & hæmorrhoidarū & ad alia uerū ge neraliter secundum descriptionem superius positam est in usu. Io. Sera. in suo antidotario habet unā aliā descriptionē sed non est eadem. Simplicia ingredientia declarata sunt.

CLXXII.

CONFECTIO de hyacintho Auicennæ.

R. Fracturam hyacinthi & propriæ rubæ granatæ, & ei similiū aur. i. quz ponatur in instrumēto terendi, & incipiat eius cōtrito cum facillitate subtiliter ut alerent: deinde ponat in tabula & pia paretur super ea ad terendum, & sumatur lapidis * aluminis. 3. i. t. halachic. 3. i. & auri liquefacti in craticulo suo linito cū lithargyro donec aurū fiat sicut utrū, & teratur pondus tertiz. 3. i. & argenti uitreati cū odore stanni pōdus sextz. 3. i. & fiat cū unoquoq̄ eorum de cōtritione & puluerizatione illud quod fit in hyacintho & deinde sumat summa corū & proiciat in tabulam uitrea tam, & inuoluatur in uino odorifero, & teratur donec exic

etur, & teratur donec fiat puluis subtilissimus: deinde situratur & reponatur, sit ergo summa pars. i. Deinde sumatur agarici epythymis, piperis nigri, zingiberis, garyophyllorū, samfuci, omniū an. p. s. & sumatur lapidis armeni lapidis azuli, salis naptici, zedoariz, doronici, beē albi & rubei, linguz bouis omniū an. tertiz partis. i. deinde sumatur spicz celticæ, & est neridem, amoma, acori, folii, cinnamonomi, origani, * hæc hyssopi, cymini, omniū an. quarta partis. i. deinde sumatur pulegi, petroselinī, lapidis iudaici, feminis apii, myrrhæ, olibani, croci, piperis albi, oīum an. sexta pris. i. & sumat oīū elaphātis tertiz partis. i. tere ergo oēs has medicinas, & proice sup has calcē lapidū, & tere, & cōfice cū melle emblicorum, quod fit pondus dupli eorum, & fiat.

COMMENT. MANLII.

Hæc confectio apud nos nō est in usu, tamen in Mediolano utuntur, & sic simplicia quz declaranda sunt declarabo.

Hyacinthus lapis est cuius secundum Serap. sunt tres, quarum una est coloris rubei. 2. est coloris citri. 3. est coloris chahali, & coloris antimonii: & melior eorū est rubeus sicut dictū est. Virtus aut hyacinthi est multum ulgata & honorata inter homines. Reperitur etiā quāda herba quz uocatur hyacinthus, quz flos purpureū habet, & radicē similē bulbo, unde. Ili. id. c. de herbis aromaticis siue communibus inquit. Hyacinthus herba est habēs flos purpureū. Traxit aut nomen a puero quodam nobili, qui in saltibus inter parpuros flores repertus ē interfectus, deditq̄ nomen herbæ puerilis funeris casus. Est aut radice & flore uiolæ similis pueros a pubertate retinens. Etiam Diosc. de ipsa loquitur, & uidet Quid. in lib. metamorpho.

Lapis aluminis est alumen fissum, ut inquit Gentilis, & est illud q̄ uulgo depluma uocatur. Alexander in cap. de collyris ad cicatrices in collyrio dicto diatari ait: Lithostion. i. lapis aluminis, & credo q̄ fissū apd grecos ē alumē.

Halachic uel salachil est lapis cū reperitur apud Sera. dictus lapis corneolus, species eius sunt multæ. defertur. n. ex terris Iamēni, & ex maritimis Romanorū, & melior ex eo est ille qui magis uergit ad rubedinem. Etiam Simon Ianenſis dicit: Halachil. i. lapis corneolus.

Aurum liquefactū cuius liquefaciendū modus alchymistis notus est aui. Donec aurum fiat sicut uitrum, uide licet taliter q̄ possit teri ut uitrum.

Argenti uitreati, secundum Gentilē. i. exiccati indurati taliter q̄ possit teri ut uitrum, & sic cum odore stanni secū dum quod alchymistz docent.

Lapis armenus fm Aui. in .2. est in ipso aliquantulū azuli coloris, nō tamē est in colore azuli, & nec in eius soliditate, sed in eo arenositas quædam: & quandoq̄ utuntur eo titiores & pictores loco azuli, & ē lenis tactus: nō possum dicere diuersitates quas uidet de hoc lapide, ita q̄ nō certifi cor de eē ipſi. Pictores sine dubio pingūt eū eo loco azuli.

Sal naphthicus secundū Mes. in ca. de speciebus salis, est niger habēs odorē naphthæ. Aui. in cap. de sale inquit: Sal naphthicus est niger, cuius nigredo est ex parte naphthicitis quæ est in ipso, qui cū tandiū suffumigatur donec ab eo naphthicitas remoueat, remanet sicut sal gemma.

Lingua bouis i. buglossa. Papias dicit: Arnoglossa lingua bouina herba est, siſte textus est corruptus. Nam arnoglossa apud Diosc. est plantago siue lingua arictis, ut apud Aui. & apud omnes habetur.

Hæc. i. thymus, sicut patet apud Ser. in ca. de thymo. Lapis iudaicus secundum Iſido. est lapis albus, ad modū glandis in quantitate scripturis quibuldam insertus: quas Græci grammæ uocant. Dicitur autem iudaicus, quia inuenitur in terris Iudeorum & in India.

Oſium elephantis. i. rasura eboris, ut inquit Gentilis: quidam uocant ebur, & est dens elephantis, & hæc medicina est apta in medicinis magnis odoriferis.

Mel emblicorum, de modo ipsius uide supra in tractatu Rafis in fine elactuarii lificantis.

CLXXIII.

DE GRANIS VIRIDIBVS.

R. Granorum uiridiū, mellis anacardi, sifami exhorticati,

* Drachmas prius

* al. Taspidis & rochims.
† al. alachic.
Cor-niola uulgo.

* Thymus uocatur quia apud Aui. c. 2. p. 1. al. Thymus, imprimis, affe. me. de leg. tur.

† An. sextaria. vi. † zucchatī tabarzeth, sextaria xxiii. myrobal. chebulorum, bellericorum, emblicorum, ablatīs nucleis, zingiberis, macropiperis, burungis, foliis indi, capſis. an. 3. iiii. piperis. † ſampſuci, an. 3. iiii. confice has medicinas cum melle deſpumato, & butyro uaccino, & utere poſt ſex meſes.

COMMENTA. MANLI.

Iſtud electuārium non eſt in uſu. Aui. habet tres deſcriptio-
declaraſſe declarabo.

Granum uiride apud Auicē. in. a. can. eſt fructus arboris
te rebinthi: unde terebinthina colligitur, ut patet in ſuo ca. & arbor ipſius uocatur botin. Serap. cap. de terebintho di-
cit. Botin id eſt arbor grani uitidis: & ſic eſt.

Mel anacardiū qualiter fiat uide ſupra in tractatu Meſ.
in confectione anacardina. Sextarium uero eſt pondus ſm
Götlem. 3. vi. An. in fine quinti can. in deſcriptione de pō-
deribus dicit: Sextarium eſt. 3. vi. & dauic. ii. aut aur. iiii. Si-
militer ait Io. Ser. moderni uero dixerunt q̄ sextarium me-
dicinæ eſt pondus duarum librarum cum dimidia, & ſic quā-
do reperitur in recepis sextarium nini, nel aquæ uel olei,
uel aceti, intelligitur duarum librarum cum dimidia: ſed q̄
reperitur sextarium cinnamomi, garyophyllorum, & ſic de
ſingulis intelligitur. 3. vi. tu uero conſidera.

Berungi, burungi, & dicit Gentilis q̄ eſt granum in ma-
gnitudine piperis, & ſunt qui uocāt myrtū albū, & ſcōm in
tentione Mar. Syl. eſt cubeæ, & ſic eſt opinio multorum
ſapientum de ipſo. uide in confectione anacardina.

Capſis. i. ſeitaragi, & eſt planta quā Dioſc. Lepidiū uocat,
& eſt tapſia ſm Gentilem. Ipſe Aui. in iſto canone in conſe-
ctione electuarii: Alſagus hebet tapſis ind. Io. Ser. in ſuo
antidotario in eodem loco habet ſeitaragi, quod iſdem eſt
& eſt agricardamum agreſſe ſuæ naſturtium aquaticū, ut di-
ctum eſt in tryphera ſaracenicā.

CLXXIII.

DE ANIUDEN.

† Seminis apii, piperis, an. 3. xii. aniudē nigri. 3. xiiii. petro-
ſelini, chelidonis, calamenthi, haſcæ, ſeſeleos, ana. 3. viii. †
cheiſm. 3. iiii. aggreg. has medicinas tritas & cicotrigoni
zaca, & confice cum melle deſpumato, & repone in uale &
utere cum neceſſe fuerit.

COMMENT. MANLI.

Iſtud electuārium in uſu non eſt, ſed ſcripſi ſolum ut cer-
tificeris q̄ aniudem non eſt ſeſeleos, ut ipſe Aui. dicit. Aniu-
den apud Aui. in ſecundo eſt planta cuius gummi eſt aſſa ta
mea in cap. de ſeſeleos dicit: q̄ ſeſeleos eſt alaniuden Ro-
manum, ſimiliter in tercio in ſen. xiiii. in ca. de cura aſcleſitis
dicit: Seſeleos eſt aniuden Romanū. Etiam Raſis in li. di-
uiſionum in confectione ad epileptiam dicit: Seſeleos q̄ eſt
aniudem Romanū. Sed q̄ hi tanti uiri, ſalua tō eorum pace,
nō bene ſuſceperint præteritis electuarij deſcriptio nobis ma-
niſeſta, in quo aniuden & ſeſeleos ingreditur, q̄ fieri in
his quæ indubie important non contingit. Præterea uide qd
Raſis indubie diuiſionum in ca. medicinarum ſtomachi in cō-
fectione de ſcoria ferri cū uino inquit: Aniudē. i. radix her-
bæ de qua ſit aſſa foetida. Idē Sera. de aniuden & aſſa ſimul
cap. facit, & inquit: Aniuden. i. ſolium arboris aſſæ. Poſtea
iterum in cap. de agarico dicit: eſt ſimile radici aniuden. i.
arboris aſſæ. Dioſ. dicit. Eſt ſimile fillo. i. lachrymo, laſar, &
eſt aſſa foetida ſecundum ueritatem. Vide Franciſcū de Pe-
demontium in cōde dolore humeri, & ſpatulæ, & medicinis
eius in ſpeciali qui inquit: Radix aligat. i. herbarum de qua
ſit aſſa, & eſt aniudē Gulielmū Plac. in ſuo tractatu de ſim-
plicibus dicit: Aniuden eſt de qua ſit aſſa.

Seſeleos. i. ſileris mōtani. uide ergo ſi poſſibile eſt q̄ aniu-
den ſit ſeſeleos, ut dicunt Aui. & Raſis in aliquibus locis.

CLXXV.

DE CAMPHORA.

† Capſoræ, croci, xyloaloes, cardamomi, girboe, cubeæ,
cheiſm, cinnami, garyophyl. uſneæ, pice, macis, ſandalī al-
bi, macropiperis, cinnamomi, capſis, ſeitaragi, † neremifch

† ſecacul, galange, iñcis muſcharæ, zingiberis, cyperis, fulſu
mine, omnium partes æquales, zucchari quantum eſt pōdus
medicinarum omnium.

COMMENTA. MANLI.

Iſtud electuārium non eſt in uſu. Aui. habet tres deſcriptio-
nes, & diſſerunt una ab altera, ſed in uſu non ſunt.

Camphora ſm Ser. & Aui. eſt gummi arboris neſcio me-
dicinam, in qua plura ſunt miracula. Nam cum in tercio gra-
du frigida iudicaretur, nihil odoratus eſt, igni, amicabiliſ
cito enim inſtatim & præclarā flammam per ſe emittit,
quæ niſi pſtylio obruatut euaneſcit. natra ſublimata, ſapo-
ris acuti cum amaritudine, & hoc eſt notum.

Girboe. i. elbue, ut inquit Gentilis. Aui. in. a. de elbue capi-
tulū facile, & dicit, q̄ ex uizbue: & eſt ſubtilior quā ca-
chula. i. cardamomum uſuale, uel cardamomi ſpecies. Nos lo-
co eius ponimus grana paradifi. i. melegreſtam.

Fulſumine apud ipſum in ſecundo eſt radix piperis. Ser.
de radice piperis ca. facit, & dicit: Eulſumine, id eſt radix pi-
peris, & ſic eſt.

CLXXVI.

DE STINCO.

† Sem. ſparagi, ſem. cepæ, ſem. alcotab, ſem. porri, ſem. bau-
cia, ſem. erucæ, ſem. utricæ, † granorum uiridū, lingūæ ui-
ſſami excorticati, ſeminis raphani, tuderī utriusq̄ amyda-
larum amararum, pinarū, granorū naſturtin. ana. 3. iiii. zing-
iberis, ſecacul, galange, macropiperis, an. 3. v. cinnamomi nu-
cis muſcharæ, been, nitriſq̄. ſalbi & rubei. an. 3. ii. † ſtinci. 3.
v. ſquille aſſate. 3. iiii. penaidiorum quantum pondus harum
omnium medicinarum, tere & cribella: & confice cū melle
deſpumato.

COMMENTA. MANLI.

Iſtud electuārium apud nos non eſt in uſu.

Alcotab ſem. rotab, idem eſt, & ſm Simonem Ianuē. ſunt
daſtyli, qui camor uocantur. Similiter ait Matth. Sylu. ſed
Raſis in. 3. Almanſoris in ca. de uirtutibus fructuum & po-
morum inquit: Rotab minus calidi ſunt quam daſtyli: ergo
rotab non eſt daſtylus. Sera. in ca. de daſtylis dicit: Rotab,
id eſt daſtyliſ, ſic generaliter habetur opinio.

Scincus eſt animal de quo Aui. duo c. facit, unum de gua-
rikalude de ſtenco, quod idē eſt, & melius q̄ eſt ipſo, eſt il-
lud q̄ eſt in parte rennū. Dioſ. ait: Scincus eſt quoddam ani-
mal quod in India inuenitur, quadruplex & ſimile lacertæ;
ſed multo maior, & longius, & utroſq̄, hoc eſt ſatis notū
etiam de ipſo dictum ſuit ſupra in diaſtationis.

CLXXVII.

TRYPHERA MAIOR.

† Myrobalanorum nigrorum, bellericorū, emblicorū, mac-
ropiperis, piperis nigri, ana. 3. iiii. zingiberis, † buzeidē, ſire
blēgi, † tapſis ind. xij. an. 3. i. tuderī albi & rubei, lingūæ
auris, ſeminis granati lyulietris, & granorū alchichis, daiſi
hāſſami, excorticati, zucchari tabarzeth, oium an. 3. ii. be-
albi & rubei, an. 3. s. tere, & ſicca per ſe, & ſiſami, per ſe, &
inuolue cū butyro, & coſſice cum melle deſpumato, & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Tryphera Græce eſt delicata, hic apud nos nō eſt in uſu
nec credo apud alios. ſed illæ deſcriptiones quibus nos uti-
mur ſunt ex autoritate Meſ. & Nicolai, ut appareat in ſuis
locis: ſed ſolum iſtam deſcriptionē ſcripſi propter quendam
ſimplicitatē.

Buzeidē ſm Gale. in libro ſecretorum in medicamine ad
ſciaticam exponit, q̄ eſt ſatyrio: & ſic meo iudicio eſt, buzei-
dē eſt ſatyrium ſm ipſes eius. Nam ca. ſuum reperies in Ser.
& ibi inquit: Buzeidē eſt ipſes ſatyronis, & ſunt radices du-
ræ, albæ ſimiles been, & ſi ſic eſt uerum. Ego exiſtimo q̄ plā-
ta ſit illa quæ a modernis palma Chriſti uocatur. Nam line
dubio palma Chriſti eſt ſpecies ſatyronis.

Sireblengi ſm Meſ. ſunt emblicis inſuſi in lacte. Nam ipſe
Meſ. in ca. proprio de emblicis dicit: Modus faciēdi ſerem
blac, inſunde emblicos i lacte dulci, & mutetur ſup eoſ lac
meus & ſero, & hoc per tridū, & exiccantur in uento &
in umbra, & recondantur. Serap. in cap. de emblicis quaſi
Lumi. Ma. G

† Signillum
ſancie Ma-
rie dicte.

* i. grano-
rum arbo-
ris albo-
rin.

† Scincum
uocant.

* Palma
Chriſti
uulgo.
† Macis in
alia licetā.

† Leuisti
cū appel-
lant.

* i. Roſe
aſſai.

S E C T I O P R I M A

in fine ait: Quidā me dici nomināt emblicos & firemblicos & hoc ideo quod qñ infunditur in lacte in terra in qua nascitur, nominatur firemblici. & ipsi ponunt in lacte.

Semen granati syluestris fm intentionem Aui. est aschedenegi, sed textus est corruptus. Nam aschedenegi est semē canabis, & granata syluestria sunt grana alchichil. postea ipse Aui. sequitur & dicit: Granorū alchichil & est perice daris faham. Vnde possibile non est qd semen granati syluestris sit aschedenegi, quia semina granata syluestris & granorum alchichil idem sunt. Præterea uide in septimo Ioan. Serap. in eadem cōfectione qui inquit: Bundach, & est fenum granorū syluestrium, & sunt grana alchichil, & est reperitur in multis aliis locis apud eundem.

Grana alchichil sicut dictū est sunt granata syluestria, ut patet apud Io. Ser. in c. de ægritudinibus gingiuarum, & in c. de fluxu mēstruorum. in c. de spuro sanguinis, qui inquit: Sumatur grana syluestria, & sunt grana alchichil. Aui. in n. de grano alchichil c. facit, & redarguit dicentes qd sit semen granati syluestris. uide ergo qd textus hic Aui. est corruptus nā ipse uult qd semina granatorū syluestriū sint aschedenegi. i. semen canabis, quod non est credendū, sicut ostēdi supra.

EX III. AC IIII. CAN. AVICENNAE.

CLXXVIII.

DE PASSVLIS, in fen. xiii. tertii, in cap.
de cura debilitatis hepatis.

℞. Passularum enucleatarum aur. xxv. croci aur. i. calami aromatici aur. ii. bdelli iudaici aur. ii. s. cinnamomi aur. i. casii medicatam aur. spicæ aromatici. aur. iiii. squinai aur. ii. s. myrrhæ aur. iiii. gummi albotin aur. iiii. daris fahā aur. ii. mellis aur. xvi. uinum quantum sufficit, & fiat.

COMMENT. MANLII.

Itud electuariū apud nostros medicos est multū in usu. Et secundum intentionem Aui. est ex medicinis laudabilibus prælati aliis. in fine descriptionis istius electuarii ait: Et existimat Gal. quod hoc medicamen compositum est ex medicinis cōuenientibus cū suis proprietatibus hepatis, & sic credo quod ualet ad ea qd dicit Aui. ex autoritate Gal. quia prædictum electuariū reperitur apud Gale. in 8. de meimr. de quo infra: sed ipse Gal. uocat ipsam cōfectionē chifodea, & si legis illam descriptionem de chifodea, apud Gal. cū electuario de passulis uel de uino apud Aui. uidebis quod idem est, sicut in uo tractatu ostendam.

Daris fahan scdm Serap. est arbor granati syluestris, quæ apud Dios. uocatur apsalum. uide Gale. qd loco daris fahan habet imaturā apalei, quod idem est, infra melius declarabo. Vinum notum est, hic uero oportet qd apothecarius in coquendo sit perfectus, quia prædictum electuariū oportet facere coquere ipsum cum lento igne sine fumo. alter nihil faceret propter uinum & passulas quæ ibi ingrediuntur & uocatur electuariū de passulis, uel de uino.

CLXXIX.

DE CINERIBVS, in Fen. xviii. in cap.
de medicinis cōuenientibus lapidi.

℞. Cinerum	Vitri, Scorpionum, Radicum caulium, nabati, Leporis, Lapidis spongie, Sanguinis hirci exicati contriti, Corticum ouorū de quo pullus egressus est.	Lapidis iudaici, Gummi nucis, Acori, ana. partes æquales. Petroselinī, Dauci, Pulegii, Gummi arab. Seminis altheth, Piperis, ana. partem. i. s.
------------	--	---

Conficiantur cum melle, & fiat. Dosis sit usq; ad aur. ii. &

supra cū aqua tribulorum decoctōrū cum cineribus nigis.

COMMENTA. MANLII.

Itud electuariū apud nos est in usu, & mirabiliter ualet ad ea quæ dicit Aboali, & oportet facere ipsum cum magna diligentia, & multi sunt qui faciunt, sed nihil faciūt præ dicta descriptio reperitur etiā apud Fraciscum de Pedemontium in c. de opilatione renum & uescæ ex lapide & medicinis eius: sed ē ex autoritate Aui. sive Aboali, ut dicit Fraciscus. Michael Sautonarola in c. de lapide renum habet eādem. Scias qd de prædictis cineribus, sunt trochisci de cineribus, sicut infra ostendam.

Cinis uitri fit cum magna diligentia, sicut ostendam: sed primo uolo narrare de uitro dices: quod uitrum secundum Aui. inter lapides est sicut stultus inter homines. Ser. ca. de uitro dicit, quod est ex eo lapidofosum, & ex eo arenofos: uita autem sunt multi coloris. Nam ex eis est album fortiter simile crystallo: & ex eo est rubeum, & est citrinum, & uiri de: & azulinum: & uitrum est lapis magnus stultus aliis lapidibus, & est inter lapides, sicut homo stultus inter homines. Crystallos etiam est species uitri, sed melius uitrum est album. Similiter ait. Aui. in isto ca. De modo uero conuertendi uitrum in cinerem, reperitur apud Bulchafam, sed nō potest fieri. Secundum illum modum etiam Lumē maluelens ponit modum comburendi, qui possibilibus non est, & sic multi credunt ipsum cōburere in illū modum, sed nihil faciūt. Cōburat aut uitrū, ut docet Bartholomæus Montagnana in suis consiliis, in consilio de instrumentis lapidis & arenarum, & tromborum conuincit, inquit: Modus uero adustiois uitri est talis. ℞. uitri albi & clari, igniatur usquequo rubeat in fornace accessā: inde submergatur in pinem, & toties fiat hoc, quoties erit facilis ipsum & in cinere conuerti. Alius modus nobilior, ut docet Auenzoar in cap. de lapide uescæ, ubi fit uir. Vitrum autem adustum, qd superius dixi, quod multi medicorum sic id credunt adure: ponunt n. ipsum ad ignem donec rubicundum efficitur, & extingunt in aquam frigidam: & hæc pluries sic faciunt, & cum credunt aliqua facere nihil faciunt. Cōburitur autē isto modo. Accipe uitrum & unge ipsum cū alchitrā. i. oleo quod egredit ex ferri, id est cedro, & est pix liqua, quæ nostro idiomate pecula uocatur subtili: & pone in ignem donec rubeum fiat, & postea cum tenaculis recipias eum, & extingue in aqua, & ablue eum ibi, & iterum inunge ex alchitrā & reponē in ignē, & extingue in aqua, & ablue eū postea in aqua, & sic lepietis facies, & erit combutum.

Cineris scorpionis, species aut scorpionis multæ sunt, ut dictū est. Iste illa quæ nobis usui ueniunt sunt illa quæ nō sunt omnibus de modo conuertendi ipsos in cinerē sunt difficiles. Ipse Aui. in proprio ca. docet de modo ipsius. Et in 5. can. in trac. 6. de uentre inferiore debilitati stomachi. Habet etiam liber qui dicitur Albuchafam, docet etiam Modus iste est: Accipiantur scorpiones uiui in quantitate quæ uolueris, & pone ipsos in olla noua munda, & liniatur olla ex massa tritici, siue cum pasta, siue cum luto sapientiar, deinde ponatur olla in furno panti calido, & dimittatur ibi die ac nocte: deinde extrahatur, et cinerem ipsorū habebis. Cineris radicum caulium nabati. idē illa regione: unde caules nabatii sunt caules orietales quæ iacent inter iudeā & Arabiam. Et sic Aui. uult qd per caules nabatii intelligamus de illis qui nascunt in illis regionibus. unde Ioan. Sera. in suo breuiario, in cap. de distillatione urinae & lapide inquit. In quodā medicamine, ut istud, & ibi habet caules nabatii uel armenis, & sic est quod per caules nabatii uel armenis intelligendum est de illis regionibus. Sed melius malucens putat qd sint caules nō transpirati, qd nō est credendū. Scias pro certo qd in tēpore antiquo prædicti caules nō reperiebantur in nostris partibus. sed moderni detulerūt ipsos ad nos, & sic hodie in partibus nostris reperiuntur. Fortiores sunt in illa materia quā nri, & forma ipsius est quod habent spiritū longum duorum brachiorum: aliquid autem minor secundum diuersa loca in quibus nascitur. In istipite ipsius nascitur quædam res ad similitudinem rapæ hortulanæ, nō tlemi nant & recolligitur. Modus cōuertendi ipsas radices in cinerem

nerem est, quod accipias radices ipsius, & munda ipsas a terra & fordidibus earum; deinde inciduntur minutim, & ponantur in olla, & cooperiatur olla coopertorio perforato, ita ut fumus possit exire, & ponatur olla in furno panis calido & dimittatur per diem, sero uero remoueat, & reperies quod dictæ radices fiēt ad similitudinem carbonū, post hoc prædictos carbones bene, & in alia olla parua reponē & cooperi ipsam totam; & iterum pone in furno & dimitte tantum quod prædicti carbones in cinerem album efficiantur & de illo cinere pone in prædicto electuario.

Cineris leporis. Leporis qui mādicator. Seruitor in tracta. 3. inquit: Forma comburendi leporē pro illo qui habet lapidem. R. ergo leporē & decolla, & pone in olla noua cum suo corio & aliis, & combure donec fiat cinis; deinde de tere cinerem & utere ubi oportet. Ioan. Anglicus in ca. de lapide renū inquit: Item lepus unius integer ponatur in olla in furno calido quousque assetur intantū quod possit puluerizari, & tunc de isto detur. 3. i. &c.

Lapis spongia adherens, non onnis qui in cauernis spongiæ inueniunt: sed propriæ cui naturaliter adhærebat in saxo diuineret, & est asper & durus ualde. Ser. ca. de spongia inquit: Et lapis inuentus in spongia habet uirtutem quæ desiccatur, & contingit ex uirtute eius quod frangit lapidem generatim in uicem, sicut dixerunt. Aui. de ipso cap. facit & dicit, quod est lapis inuentus in corpore spongiæ.

Sanguinis hirci exiccatur & etiam præparatur, ut ostendatur. Hircus uero secundum Isid. in ca. de pecoribus & iumentis inquit: Hircus lasciuum animal est petulcum & seruens semper ad coitum, cuius oculi ob libidinem in transuersum aspicuntur, unde & nomen traxit. Nam hirci sunt oculorum anguli, fm Suetoniū, ut Vir. in Bucolicis: Transuersa tuentibus hircis. Cuius natura adeo calidissima est ut adamante lapidem, quem nec ignis nec ferri domus ualet materia, solus hircus eruat dissoluat. Maiores hirci cinis dicitur, A. Hu uio Cinife in libia ubi grandes nascuntur. Quotum est magna uirtus sanguinis hirci in prædicta agritudine. Est tam magnificata, & in tanta nobilitate, quod apud Aui. nominatur manus Dei, propter suā nobilitatē, & est medicamē thesaurizatum de regimine ipsius potu, causa præparandi ipsum sanguinem, & exiccandi. Ipse uero Aui. in prædicto capit. docet modum exiccandi ipsum, sed de modo cibandi nō loquitur. Raynaldus de uilla noua in lib. 2. in cap. de uitio lapidis in renib. & uelica clare loquitur dicens: Sanguis hirci nutriti per .v. dies, uel .xxx. ex frondibus hederæ, uel faxifragie in diebus canicularibus intersecti exiccatur & puluerizatur. Postea iterum inquit: Sanguis hirci in diebus canicularibus intersecti prius per .xxx. dies, cum frondibus hederæ uel faxifragie nutriti, & sic faciūt quidam. Alio modo ut reperitur apud Gordoniū dictū lilium medicinæ in c. de dolore renū periodali: propter eorum oppilationem ubi ait: Vtroc. sanguinis hirci per se curat. igitur hircum antiquū, & nutritiur hordeo, sceniculo, petrocelino, pimpinella, faxifragia, milio solis, uerbena filipendula, & similibus diureticis: & post longum tempus huius acceptationis decollet, & primus sanguis & ultimus abiciatur, & medius referuetur, & fiant trochisci, & desiccetur in umbra in loco sicco non uentoso, & ungatur cum balsamo. Io. Arculanus in ca. de lapide renū inquit: Sanguis hirci præparatus secundum artem est fortis, & modus præparationis est, ut eligatur hircus quatuor annorum, aut circa, rubeus, & nutritur per mensem ex herbis & graminibus propriis in hoc cap. & sunt hæc, betonica, pentaphylon, capillus ueneris, grana solis, faxifragia, scolo pendia, hederæ, & ualeat petroselinum, apii, feniculus, & similia. In potu dabis unū albū bonum odoriferū, clarū, & subtile, & post inguleſ de mense Augusti, & extrahatur sanguis, cuius primus abiciatur, & postremus, medius uero referuetur, & fiat eius præparatio bona.

Nicolaus Flo. in lib. v. in cap. de quatuor lapidis per potionem inquit: Hircus quidē melior est quā sumit in hora in qua coloratur uia. de mense Augusti, quia tūc sanguis est acutior. Quare ergo ollam lapideam, quæ est melior, & hircus sit quatuor annorum: modum uero exiccandi quare ab aliis.

Cineris corticum ouorū, de quo pullus egressus, est hoc est quando filii sui nascuntur. Modus conuertendi ipsos in cinerē est difficilis: oportet enim quod accipiatur cortex ouorum a quo pullus egressus fuerit, & terat bene: deinde ponatur in olla noua, & obturetur os eius. & ponat in furno, & dimittat per diē unū si sint cineræ bene, bonum est, sin autem non, ponat iterum in furno, & ibi dimittat usque quod sint bene incineratæ, & quā fuerit ad suum terminum, quod color eorum sit albus extrahatur, & utere ubi oportet.

Lapis iudaicus dicitur, quia in terris Iudeorum inuenitur. Aui. in .2. can. dicit, quod est lapis sicut nux parua ad longitudinem paucam declinans proximum figuræ amygdalæ, aut datyli &c. Quanta uirtus est in isto lapide contra lapidē renū extrahit enim ipsum.

Gummi nero nucis secundum quosdam est fungus, qui reperitur super arbores diuersas: huius color est ad similitudinem spongiæ, sed non recte sentiūt, quia illa res uocatur narcotica nucis, gummi uero nucis secundum ueritatē est gummi, quod reperitur super arbores ferētes nuces: sed in partibus nostris non reperiuntur. Ego autem uidī prædictum gummi quod in colorem est similis colori myrrhæ grossæ, sed odorem non habet. Desertur de Apulia ad nos, & in illis partibus inuenitur. Aui. dicit, quod dosis istius electuarii sit usque ad aur. ii. 3. iii. & supra cum aqua tribulorum decoctorū. tribulorum marinorum quousque in secundo uocat hafsch, & sunt, qui nominant ipsos uulgo castaneos lacus.

CLXXX.

DE MARGARITIS in xxi. tertii in ca. de regimine uniuersali prægnantis.

R. Margaritarum non perforatarum, pyrethri, ana. 3. i. zingiberis, masticis, ana. 3. iiii. zedoariæ, doronici, feminis apii, tapizæ, cardamomi, nucis mulcatæ, macis, cinnamini, ana. 3. ii. been albi, & rubei, piperis, macro piperis, ana. 3. iiii. cinnamomi. 3. v. zuchchari subtilissimi quantum omnia, & fiat electuarium, cuius dosis sit colearium unum.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium apud nos est in usu, & ualet mirabiliter ad ea quæ dicit Aui. supra in tra. Nicolai. Est alia descriptio quæ dicitur a duobus gñibus margaritarū. f. perforatarū & nō perforatarū. Am. in sua descriptione non hēt nisi non perforatarū. Et sunt qui faciunt fm descriptionem Nicolai & sunt qui faciunt fm descriptionem Aui. fm uoluntatem medicorum, & ambæ descriptiones apud diuites apothecas reperiuntur. Io. Ser. in suo breuiario in c. de mulieribus, æqualiter significetur quod ipse sint prægnantes, habet unam aliam descriptionem quæ quasi eadem est.

Margarita lapis est. Isid. in ca. de lap. præciosius candidis dicit: Margarita prima candidarum gemmarum quam inde margaritam aiunt uocatam, quod in conchiliis marinis hoc genus lapidum inuenitur. Inest. n. in carne cochleæ calculus natus, sicut in carne ostreæ præciosissima margarita reperitur dicitur, uel sicut in cerebro pisces lapillus gignitur, & meliores sunt candidæ & albæ.

Tapia quam Arabes corruptæ dicunt testissā, ut dictum fuit in confectioe auacardina, quæ confert agritudinibus neruorum.

Cinnami. i. cinnamomi grossi, & alio nomine diarsani uocatur, ut dictum est, tñ propter ignorantiam aliqui apothecarii aliqui ponūt in isto electuario loco cinnami cymini, sed nō recte quia ipsi cinnamomi sunt multæ, ut patet p. Dioscori & Sarap. Nam Sera. ait: Inuenitur alia species cinnamomi quæ dicitur uosch, & est cinnamum, & est grosse plantæ nō habens fortem odorem, & est debilis uirtutis. Etiam Plin. inquit: cinnamomum & cinnamum nascitur in Aethiopia. Et consideretur bene quod cinnamum & cinno momum idē sunt. Rafis etiam in. 3. Alman. in fine cap. xvii. inquit. Cinnamum

Lumi. Ma.

C 2

SECTIO PRIMA

cinnamomo uicinum existit, licet eo sit debilius. Ignorantia uero apothecariorum est, quia in isto electuario ingreditur cinnamum & cinnamomum, ex quo uidentur diuersificari, uerum per primum intelligimus cinnamomum grossum, & per secundum cinnamomum finum.

Zuccharum sulmenum. i. illius regionis, ut dicit Gétilis non loco eius ponimus zuccharum tabaret. idest albū. Iodā. Sera. loco eius habet zuccharum mundum.

CLXXXI.

DE MEDVLIS, in xx. Tertii. cap. de medicinis singularibus ad coitum.

R. Amygdalarum exorticatorum, filicorū, neregil exorticatorum contritorum, amygdalarum, pini, * granorum alheichil, granorū azelē, granorū uiridiū, ana. partes aequales, neregilich, piperis longi, zingiberis, oium an. partes. x. & plus parum, terantur omnia, & conficiantur cum penidiis, de quo sumatur omni die quantum est ouum unum.

COMMENTA. MANLI.

Ista confectio non est in usu, sed ideo eam descripsi, ut ostēderem q̄ confectio de medullis, apud Aui. est eadē cum electuario de nucleis fructuū, apud Rasim, ut dictū est, nec differunt, nisi quia Aui. loco auellonarum posuit filiticos.

Neregil. i. nux indica, ut dicit Aui. in ca. de nucē indica, & sic esse credo, quia Rasī loco eius hēt nucē indicam.

Grana azelem secundum ipsum in secundo dicitur piper nigrū, sed nō intelligimus de uero pipere nigro, sed de alia re simili, de quo superius ostensum fuit clare quid sit.

Neregilich. i. rosa asinorum sive pronia. Rasī loco eius habet semen pronia, quod idem est: uide supra, quia diffusē declaratum est.

CLXXXII.

DE MARCHASITA, in. iiii. can. in fen. iiii.

cap. de cura eruptionis exituratum.

R. t. Lapidis marchasite, j. ii. armoniaci tantundem, farine fabarum, j. vi. misceantur cū rasina humida et liniatur super cutem, & ponatur super sanie donec cadat per se, & oportet ut administretur statim.

COMMEN. MANLI.

Istū medicamen reperitur etiam apud Franciscum de Pedemon. in cap. de appropriatis apostematum secundum diuersitatem membrorum in quibus fuit, sed est ex autoritate Aui. quia idem sunt.

Lapis marchasita apud Diosc. uocat̄ pyrites ex quo æramen fit, eligendus est colorē æraminis habens. & ibi Diosc. tradit modū cōburendi ipsum. Aui. ait: Vocatur marchasita, & dicitur q̄ sunt plurimū specierum: alia enim est aurea, & alia argētea, & alia aerea, & alia ferrea: & sunt quæ nominat eam lapidem luminis, propter inuamentum q̄ uisui affert. Pyrites uero dicit̄ a pyr q̄ est ignis, quia pulsus ferro ignē emittit. Mesues de ipsā loquitur in ca. de lapide stellato.

EX ANTONIO GVAINERIO PAPIEN.

CLXXXIII.

MIXTVRAE CORDIALIS, in cap. vi. de signis tantū prognosticis, quam demonstratiuis febris pestilentialis & eius cura.

Rosarum,

Buglossari,

R. Conferuaz. Boraginis, } ana. j. s.

Violati,

Florum * nenupharis. j. ii.

Manuschrifti cum perlis, lib. s.

Fragmentorum omnium præciosorum. j. ii.

Margaritarum subtiliter tritarum. j. s.

Foliorum auri, numero. xvi.

Fiat mixtura deaurata, de qua sepe comedat, & de ea bibat cum aqua zucchari si liberbit.

COMMEN. MANLI.

Hæc confectio apud nos non est in usu, secundū illam descriptionē. Illa uero quæ generaliter utimur, est magistralis & nō est eadem, sed pro nobilibus ista est nobilior illa, sicut infra apparebit.

Conferua rosata. i. ex rosīs, & uocatur zuccharum rosatū & fit ex tribus partibus zucchari, & una rosarum.

Buglossatum, siue diabuglossatū. i. conferua quæ fit ex floribus linguz bouinæ, & modus eius est sicut rosarum. Boraginatum: siue diaboraginatū. i. conferua quæ fit ex florib. boraginis, & modus ipsius fit sicut rosarum.

Violatum, siue zuccharum uiolatū. i. conferua uiolarum quod ex floribus fit, & modus eius est sicut rosarum.

Conferua florum nenupharis, idest ex floribus nenupharis, & uocatur zuccharum nenupharinum, & modus eius est sicut rosarum.

Fragmentorum omnium præciosorum. Secundum generalem regulam sciēdum est q̄ per fragmenta præciosa intelliguntur quinq; genera lapidum præciosorum, & sunt propriæ illa quæ Mesues in electuario de gemmis nominat, & sunt zaphyri, hyacinthi, sardinis, granatæ, feruzegi. s. smaragdi, & de omnibus istis ostensum fuit supra.

CLXXXIII.

MANVSCHRISTI CVM PER LIS,

in cap. iiii. de cura quartanæ a melancholia sanguinea prouenientis.

R. Margaritarum splendidarum tritarum subtilissime. j. s. Zucchari in aqua rosata dissoluti, lib. s.

Fiat decoctio in plata, & usui referetur.

COMMEN. MANLI.

Hæc descriptio istius confectiōis quæ uocatur manuschrifti cum perlis, est descriptio pro nobilibus, quia consuetudo apothecariorū est facere manuschrifti sine perlis, sed loco eius ponunt puluerē cordiale, aliquando figamētā secundum necessitatem, & possunt fieri cū aqua rol. tūc uocatur manuschrifti rosata, sunt etiam cum aqua uiolarum tūc uocant manuschrifti uiolatæ, sunt etiam cum aqua buglossæ, tunc uocant manuschrifti buglossatæ: aliquando uerū cū aqua capillorum ueneris secundum diuersas infirmitates, & eius forma est ad modum rotulæ, & idest satis notum.

APPENDIX.

Pharmaca MANVS DEORVM apud Herophilum ob quam plurima sanæ Inuamēta uocantur, præsertim si cōmode adhibeant, Galenū passim, tum maxime. vi. medicamentorū per loca non obcurē testatur. Quemadmodum & V I R T U S D e i apud Nicolaum Alexandrinum ac theod. yeip, idest manus Dei, apud Aetium libro. xi. ca. xii. Exemplo quorū hæc omnino sic inscriptam arbitror compositionem.

CLXXXV.

DIACORALLII, in cap. viii. de signis, & cura caufonidis.

Rec. Corallorum rubeorum. j. iii. zucchari li. s. dissolue zuccharū in aqua ros. in infusione steterit. j. i. sandalorū machazari. i. citrini, & gra. iiii. camphoræ, & istorum forti facta expressione in illa aqua zuccharum dissoluatur, & fiat confectio morellis.

COMMEN. MANLI.

Hæc confectio apud nos non est in usu. Nicolaus in suo antidotario describit trochisc. diacoralli, qui ingrediuntur in triaca Galen. sed non fuit idem, de quo infra.

Corallus rubeus est nobilior albo, & albus nigro. Rubeus autem confert omnibus ægritudinibus stomachi, si suspēndatur super ipsum directus. unde Gal. inquit: Ego expertus fui ipsum, & suspēdi ipsum in collo eius qui habebat dolore stomachi, ita ut eēt corallus super os stomachi, & remotus fuit dolor: cū ergo accepi ipsum rediit, scire expertus fui lignū crucis in habere epilepsiā, & qui suspēderit i collo suo in diebus sanitatis suæ corallū rubeū securus erit a dolore stomachi & p̄ hoc mulieres appetūt eū in collis pueriorū. Bufadū aut̄ scripsit Stephanus pro bafed. q̄ est corallus.

E ROSA ANGLICA IOAN. ANGLICI.

CLXXXVI.

DE CAULIBVS, in cap. de cura lepræ.

Reci. Succū caulium, lib. i. bulliat, & exprimat.

Croc.

* Grana-
ta sylue-
stria appel-
lant.

† Pyridē
uocant.

* Nympha-
am nomi-
nant.

Croci, 3. iiii.
Panis zuchari,
Mellis,

} ana. lib. s.

Fiat electuarium cum leui decoctione.

COMMENTA. MANLI II.

Istud electuarium apud nos non est ualde in usu: tamē re-
peritur apud aliquos apothecarios.

Caulis fm Aui. alius est domesticus, & alius syluestris,
& alius marinus, & alius caulis aquæ. Caulis uero apud
Dios. uocat brasica. unde Macer: Caulis Romanæ Græco-
rum brasica lingua. Agrestis apud quosdā putatur cōdili,
sed non est. Canabit etiam est species caulis: & est caulis di-
ctus capucius, uel caulis, capitatus, uel imperialis. Petrus
de cresciētis dicit: Gambusii sunt de natura caulium, & habēt
formam caulium, donec clausi fuerint: sed postquam clausa
sunt folia ipsorum sunt quasi alba & grossa, sicut tunica ce-
parum & crispa &c. Etiam Sera. in ca. de caule de canabit
loquitur: Simon Ianuen. dicit, q̄ Aui. de canabit singularē
facit ca. quod non reperitur. uerum est q̄ Aui. in ca. de cau-
le, de canabit loquitur. Io. Arculanus in cap. de epilepsia di-
cit: Canabit quē est caulis imperialis scilicet capuciū: car-
nebum scripsit Stephanus pro cornu, quod est caulis.

CLXXXVII.

DIAGARICI OPTIMI, in cap. de
ueruca in oculis.

Agari. boni, albi, leuiss, & puluerizabilis. s. turbith zin-
gib. an. 3. ii. nucis musca. uellanarum, an. 3. iiii. misce & cum
zucharo lib. s. fiat confectio.

COMMENT. MANLI II.

Hæc confectio apud nos non est in usu, sed uirtus agari-
ci est magnificata apud nostros aures.

Agaricus secundum Mesuem est ex medicinis magni iu-
uamenti, cuius ortus est secus arbores magnas, quibus iam
accidit corrosio & putrefactio, & eius generatio. est sicut
generatio fungorū, & propter id uocatur a multis fungus
abietis. Galenus in libro ad Partenianum inquit: Agaricus
ab arboribus excrecit prout tubera. i. fungus dictus tera-
tur apud Lombardos.

CLXXXVIII.

DIACVBEBE, in cap. de hydro-
pisi in cura generali.

Albi,
R. Santali Rubei,
Citriini,

} ana. 3. ii.

Spodii,
Rasuræ eboris,
Ozimi garophyllati,
Cubebarum,

} ana. 3. i. s.

} ana. 3. s. uel. 3. iiii.

Si fit caliditas multa, quatuor seminum frigidorū mūda-
torū, an. 3. ii. seminis endiuiz portulacæ, ana. 3. i. ligni aloes
nucis muschatæ. ana. 3. s. zuchari libram. i. & dissoluantur
cum decoctione endiuiz, uel cum aqua endiuiz & utatur
mane & est expertum.

COMMENTA. MANLI II.

Istud electuarium in Papiā non est in usu, sed in Medio-
lano utitur ipso, sed non faciunt ipsum secundum descri-
ptionem Ioan. Anglici, sed illa descriptio qua utuntur repe-
ritur apud thesaurum pauperum, sicut infra apparebit, ta-
men inter ipsas est parua differentia.

Cubebe siue cubebe, & non cubeze, quia cubeze apud
Aui. est malua uel spēs eius. Sera. in ca. de cubebis ait: Ego
postquam aggregaui Dios. & Gal. super omnem herbam in
ueni q̄ Gal. non memorauit myrtū agrestem, & Dios. non
memorauit cubebas, & uidi q̄ descriptio Dios. super myr-
tum agrestē, & descriptio Gal. apud cubebas idē sunt. Cube-
be Dios. myrta agria & est myrtus syluestris, siue myrtus al-
ba ut dicunt moderni, & fm Mat. Syl. est abrongi. Stephanus
uocat ipsum carpiō. Sed iam describā confectio alia.

Diacubebe, secundum thesaurum pauperum in ca. de hy-
dropis de frigida causa. R. omnium sandalorū an. 3. ii. spodii,
rasuræ eboris, an. 3. i. cubebz. 3. iiii. semini cōmuni frigido
rū, an. 3. i. seminis endiuiz & portulacæ, an. 3. i. zuch. li. i.

fiat cum decoctione endiuiz, & fiat electuarium.

Ista descriptio thesauri est illa qua utuntur Mediolanen-
ses tamē (ut dictum est) inter ipsas est parua differentia. Gili-
ber. de Anglia in c. de cura psecutorū hēt unam aliam descri-
ptionem, & ualet ad ea quæ dialacca, sed non est eadem.

CLXXIX.

DIANASTVRTIVM, in cap. de sterilitate.

R. Consolide maioris & minoris, an. m. i. coralli albi & ru-
bei, sandalorum alborū & rub. an. 3. i. rosarū. 3. iiii. spodii, ga-
ryophyllorū, margaritarū integrarū, an. 3. i. charabz. 3. ii. e-
minis nasturtii agrestis. 3. s. radicem sanguinariæ, pimpin. l
le parietariæ, an. 3. i. zuchari alexandri lib. ii. fiat electua-
rium: quia tū illud foret magnum de cōsolida ponatur. 3. s.
& de aliis proportionaliter diminuat, ita q̄ ad. 3. i. pulue-
ris ponatur li. i. zuchari uel mellis, & uoco illud dianastur-
tium quod ualet in omni fluxu sanguinis mentis uorū & hæ-
morrhoidarum & uentris, & est mihi ualde speciale.

COMMENT. MANLI II.

Istud antidotum apud nos non est in usu, secundum autē
compositorem ualet mirabiliter in illa materia.

Nasturtium autem herba est satis nota, maxime domesti-
cum. Hic Ioannes Anglicus seu compositor habet nastur-
tium agreste q̄ nasturtium domesticum non est: immo scdm
quosdam est nasturtium aquaticum, quod alio nomine fenat-
ion uocatur, & hoc apud multos est certum, uide autē de
eo apud Mat. Syl. in cap. de cardamo. i. nasturtio uisali, qui
sic ait: Cardamus agrestis quem multi fenation uel crissum
uocant, uel nasturtium aquaticum &c. Hoc apud Aui. in. 2.
can. uocatur pupilla oculi: & apud Dios. eius semen uoca-
tur lepidium, & herba apud eundem fenation, etiam apud
Sera. feitaragi, & apud Arabes dicitur scefecebram, & ab ali-
quibus dicitur faxabram, de qua nunquam inueni ullum ha-
bere certitudinem quid sit scefecebram: quidam credunt, sed
non recte q̄ esset efula, quod non est, quia Aui. in. 3. can. in
cap. de medicinis cordialibus, hēt in quodā antidoto scefe-
bram & semē eius: ergo efula ibi non cōuenit. Idē in. 4. can.
in fen. ii. in ca. de cura hectice scefecebrā laudat, & secundū
quosdam medicorum est granatū syluestre: quod nō credo:
nec Gentilis super illum passum cognouit certitudinem.
Scias quod in hoc sunt diuersæ opiniones, sed si hic Deus
uoluerit declarabo de ipso opinionem doctorum multorū.
Et primo dico quod postquā ego uidi in practica doct. Mes.
ca. de cura maniz & melancholiz sanguinez, in quodam an-
tidoto, q̄ incipit. Filius Zachariæ, modus confectiōnis con-
ferentis melancholiz &c. ibi habet ad litteram scefecebram,
id est ozimi maioris. Ozimum autem maius apud Ser. uoca-
tur ozimum carmenum, & ab Aui. in. 2. can. uocatur holma-
ram, & apud Mat. Syl. est fenation: & qui mihi non credit,
uideat Mes. in cap. allegato ubi ait: quod scefecebram est ozi-
mum maius, & ozimum maius apud Ser. est ozimum carme-
num, & apud Mat. Syl. est fenation, siue nasturtium aquati-
cum, & sic lege illud ca. de ozimo carmenno apud Ser. & ca.
de holmaram, apud Aui. cū ca. de harochalchai, apud Mat.
Syl. & uidebis quod idem sunt.

Notandū est quod hæc herba plura nomina habet. Nā se-
nation est lepidium, feitaragi indum, hiberiderios, agrica-
damum agreste, capsia scripta cum c. nasturtium, aquaticū,
ozimum maius, ozimum carmenum, pupilla oculi, scefece-
bram: eius radix medetur doloribus dēnum. Etiam de ipso
dictum fuit in electuario, quod dicitur Iustificans Almanfor-
is &c. & hoc apud me fuit secretum.

Sanguinariæ autem apud moder. est bursa pastoris: quæ
mirabiliter ualet contra fluxum sanguinis: uerū est q̄ inue-
nitur alia sanguinaria quæ uocatur corrigiola, seu uirga pas-
toris: sed hic Ioan. Anglicus per sanguinariā intelligit bur-
sam pastoris, & sit uerum, uide apud eundem in lib. primo,
in c. de accidentibus febribus, q̄ sic ait: Mō de empycis uidea
mus, uade ad locū ubi crescit sanguinaria. i. bursa pastoris,
& genibus flexis dicas ter Pater nī & Aue Maria, & nitum
uerificum. Te quæsumus Dñe famulus tuus liberuū, quos

Lumi. Ma.

G 3

S E C T I O P R I M A

EX ANTIDOTARIO BARTHOLO- MAEI MONTAGNANAË.

CXCIII. DE PISTICIS.

R. Pistecorum mundatorum, & tritorum \mathfrak{z} .iii. zuecha. albi lib. i. incorporent simul in mortario cum aqua rosata quantum sufficit; & coquantur super ignem, & fiat confectio cum speciebus triafandalorum aliquando, & aliquando cum cinnamomo, ponendo de quolibet istorum \mathfrak{z} . i. s. pro tota ista recepta. Potest etiam fieri solutiva ut scis, ualet enim in cō fortando hepar frigidum quando fit cum cinnamomo, & hepar calidum quando fit cum speciebus triafandalorum, & ipsius opilationes semper aperit.

COMMEN. MANLII.

Hæc confectio apud nos nō est in usu: sed credo q̄ in partibus Venetiarum utantur illa.

Pistici secundum Dios. sunt pistachiz quæ in Syria nascuntur familia strobilibus. i. pincis Rafis autem in l. aphorismorum in c. de fructibus ait: Et comedere cinnamomum cum oleo alfallari illud remouet alforat, idest fisticus est arbor cypresso similis.

Pistachiz secundum Nicola. sunt fructus qui ueniunt de Damasco qui satis sunt noti. Plin. Pistachia eisdem usus & effectus habent quos pinei nuclei, praterquam ad serpentum istus siue edantur, siue bibantur.

Triafandali dicuntur a tribus generibus sandalorum quæ ibi intrant descriptio ipsorum est posita supra, & est ex auctoritate Nicolai.

CXCIV.

DIAMVSCI MATRICALIS.

R. Specierum diamusci dulcis. \mathfrak{z} . i. diabræ. \mathfrak{z} . ii. linguæ auis, rasuræ eboris, nepitæ. an. \mathfrak{z} . s. zuechari albi. \mathfrak{z} . v. fiat confectio solida cum aqua matricariæ in rotulis.

COMMEN. MANLII.

Hæc confectio diamusci matricalis apud nos non est in usu illa uero descriptio qua nos utimur est diu Mef. qui docet facere diamuscum dulce & amarum, sicut ostensum fuit. Species uero diamusci dulcis, quæ ibi ingreditur sunt species diamusci Mef. & similiter species diabræ.

Nepita est herba dicta neuida, siue gattaria. & secundum Macrum est calamethum.

Matricaria est apud Auic. in. \mathfrak{z} . can. uocata uchuen, & est species artemisiz, & est illa quæ a Lombardis crispula uocatur. Sapientes dixerunt quod ista descriptio diamusci dicif matricalis, propter aquam matricariæ quæ ingreditur. Bartholomæus inquit, quod prædicta confectio debet fieri in rotulis sicut fuit manuscripti.

CXCVI.

CONFECTIO pro uermibus communis Apostolorum.

R. Seminis alexandri. \mathfrak{z} . ii. cornu cerui usti, corticū granatorum, an. \mathfrak{z} . i. diptami, garyophyllorum, rheubarbari, an. \mathfrak{z} . s. centonici, \mathfrak{z} . s. cinnamomi, \mathfrak{z} . iiii. croci. \mathfrak{z} . s. zuechari li. s. fiat confectio solida cum aqua abinthii, uel graminis.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio apud nos non est in usu, sed ualet mirabiliter pro uermibus. Simplicia quæ sunt declaranda delarabo. Ipse Bartholomæus habet unam aliam descriptionem, sed ista est nobilior illa. Alexandrum apud modernos est semen Macedonicum & non est fenum factum, ut quidam dicunt: quod in ista confectioe possimus uidere, quia hic Bartholomæus ambo in ista confectioe ponit.

Cetonicum siue xanthonicum idem est, & est species abinthii, sicut patet apud Sera. in cap. de abinthio. Præterea ipse Sera. in cap. de schea inquit: Schea. i. xanthonicū, ut in cap. de abinthio, & dicit ex auctoritate Dioscor. xanthonicum est planta: & est abinthium marinum, & sic mea opinio est quod schea siue xanthonicum fit abinthium marinum quod alio nomine herba marina appellat & sic reperitur apud Michaelen Saunarolam in ca. de uermibus, qui inquit: Quidam dant semen sanctū, siue femenzina, & idem

cit

precioso sanguine redemisti, & sic dicendo collige unam herbam uel duas. Sed si multas colligas oportet orationes iterare, & tunc suspende herbam circa collum patientis a quo fluit sanguis, uel circa membrum a quo fluit, & ibi dimitte, & stringet certissime. Si uis ne homines cognoscant herbam tuam, frica eam inter manus tuas, & post suspende eam in aliquo panno, uel in syndone, uel in aliquo tali. Itē Nicolaus dicit: Bursa pastoris. i. linguinaria, uel capsella, aut scindiuula. sine dubio ē cōsonū q̄ bursa pastoris sit capsella, quia eius semē fert in capsellis, & ppter id apud Lombardos dicitur herba gugarolla: ipsa enim in uitis ac ciuitatibus inuenitur, & comeditur cum signis, sicut alia olera.

E PETRO TVSSIGNANA IN NONO ALMANSORIS.

CXC.

DIAROB CVM RHEVBARBARO: in tractatu. 2. cap. de solutiuis.

R. Turbith albi, gumosi & cannulosi. \mathfrak{z} . i. zingiberis. \mathfrak{z} . s. rheubarbari. \mathfrak{z} . i. picæ. \mathfrak{z} . s. cinnamomi, garyophyl. ana. \mathfrak{z} . ii. galan. g. piperis longi, macis. ana. \mathfrak{z} . i. diagyrdii. \mathfrak{z} . iiii. zuechari albi. \mathfrak{z} . xvi. cum uino cydoniorum, fiat confectio, dosis an. \mathfrak{z} . ii. ad. vi.

COMMEN. MANLII.

Hæc confectio diarob cū rheubarbaro est in usu, & fit aliquando cū rheubarbaro, aliqui sine, tñ cum rheubarbaro est nobilior: de hac reperiuntur uariæ descriptiones ego meo tempore uidi fieri diarob cum rheubarbo. i. confectioe delectabilē fm Bartholomæum Mōtagna. quam ipse uocat cōfectionem diaturbith cum rheubarbo, de quo infra.

CXC I.

DIAROB CVM TURBITH, ibidem.

R. Turbith albi, gummosi & cānulosi. \mathfrak{z} . i. zingiberis. \mathfrak{z} . s. cinnamomi, garyophyl. ana. \mathfrak{z} . ii. galangæ, piperis longi, macis, an. \mathfrak{z} . i. diagyrdii. \mathfrak{z} . iiii. zuechari lib. i. fiat confectio cum uino cydoniorum & aqua communis, dosis ut præcedens.

COMMEN. MANLII.

Ego uidi multoties aliquos non facientes differentiam inter diarob cum turbith, & inter diarob, cum rheubarbo, sed errant. Nam aliud est diarob cum turbith, aliud est diarob cum rheubarbaro.

Hæc confectio solutiva reperit etiam apud Ioannē. Coccoregium in c. de paralyti, & ictigatione, tamē differt notabiliter ab ista, sed una descriptio quæ inuenit apud Leonardū de Prædapalea in c. de cura scrophularū est huic similis.

CXCII.

DIAROB CVM AGARICO, ibidem.

R. Agarici. \mathfrak{z} . i. falis gēme. \mathfrak{z} . iiii. picæ nardi. \mathfrak{z} . iiii. s. cinnamomi, g. yophyl. macis, galagæ. an. \mathfrak{z} . ii. diagridii. \mathfrak{z} . iiii. polypodii. \mathfrak{z} . i. s. zuechari albi lib. s. cum uino cydoniorum, & aqua communis fiat confectio, dosis ut præcedens.

COMMENT. MANLII.

Hæc confectio nō est in usu Leonar. de Prædapalea in c. de cura scrophularum, habet etiam hanc descriptionem. Io. Coccoregius in ca. de paralyti, & ictigatione habet unā aliam descriptionem, sed non est eadem.

CXCIII.

DIAROB CVM SENA, in ca. de paralyti, tremore, tortura, & spasmus de repletionē.

R. Senæ mundæ. \mathfrak{z} . i. cinnamomi, garyophyl. macis, masticis an. \mathfrak{z} . s. diagyrdii. \mathfrak{z} . s. & cum zuecharo fiat confectio cū uino granatorum. Dosis eius ab. \mathfrak{z} . s. ad. \mathfrak{z} . vii.

COMMEN. MANLII.

Hæc confectio non est in usu.

Senæ uero quod de Arabia desertum magis laudatur quā illud de Mecha. Miror q̄ Auic. in. \mathfrak{z} . can. ubi de simplicibus tractat, quod de sene non fecerit cap. cum ipse in multis locis eo utatur. Mef. laudat folliculos senæ, & dicit q̄ est melior pars ipsius plantæ.

est. Io. Mattheus Gradi in ca. de uermib. qui in uentre nasci-
tur dicit: Seminis sancti uel herbe ianuina: uel foch quid
ide est, sed uult dicere fchea. Infra habet quoddam emplastrum
& dicit seminis alexandrinis, quod coiter appellant herbam
ianuinam, sed falsum est. Na semen alexandrinum non est her-
ba ianuina, pro hoc uide quod in ista confectioe ingrediuntur
semen alexandrinum. i. Macedoniis, & centonum. i. semē
sanctum, quod non fit in his, quia idem sunt. Tu uero uide quod
semen sanctum est uerum xanthonicum, fchea fchea, siue
zina, siue granella, & hæc est approbata & mirabiliter ualet
ad interficiendum uermes. Deferunt de Ianna ad nos.

CXC VII.

DIATVRBITH cum rheubarbaro.
R. Sandalorum alborum & rubeorum, uolarum, zingiberis
ana. 3. i. s. anisi. Cinnamomi, croci, malticis, ana. 3. s. turbith
hermodactylorum, an. 3. i. rheubarbari electi. 3. x. diagrydii.
3. iiii. zuchari albi lib. ii. fiat confectio solida.

COMMENTA. MANLII.

Hæc est confectio diaturbith cum rheubarbaro, & sunt ex
hoibus qui uocant ipsam diarob cum rheubarbaro, alii confec-
tionem delectabilem, uel dictum est supra & sunt ex hoibus
qui faciunt ipsam cum rheubarbaro, & quicquid sine rheubarba-
ro secundum diuersitates descriptionum quæ reperiuntur.

CXC VIII.

DE OVIS.

R. Albuminis ouorum lib. ii. mellis costi desumpti li. i. mi-
sceanatur simul, & diu agitentur cum spatula agitanda usque
quo insipiscitur: deinde addantur hæc species. R. zedairæ.
3. s. cinnamomi, garyophyllorum, spicæ, liquiritiæ, zingibe-
ris, piperis, galangæ, rosarum, sandalorum rubeorum, ana. 3. i.
misce & fiat electuarium.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium non est in usu apud nos.

Oua secundum Aui. meliora sunt oua gallinarum recentia
& melius quæ est in eis est uitellus, & melius eorum artificium
est ut non cum alio congeletur. Post autem oua gallinarum
sunt oua auium, quæ cursu eius procedunt sicut antedixi, &
adoram, & alcubugi. i. perdicis, & ateenigum. oua uero ana-
tis, & similia sunt mali humoris. Serap. dicit ex autoritate
Gal. Illa quæ eligimus sunt oua gallinarum. Non ergo oportet
quod narremus naturam aliorum ouorum, quia natura eo-
rum est eadem cum natura istorum & ceteris. Rasis autem in tertio
Almanforis in cap. de ouis ait: Oua plus alii omnibus o-
uientia gallinæ sunt, & perdicis & ceteris. fiat confectio solida cum
aqua matricaria in rotulis.

CXC IX.

DE LEPORE COMBUSTO.

R. Lapidis Iudaici, spongiæ, ana. 3. i. pulueris leporis combustum
sem artem. 3. ii. specierum electuarium lithotriptum, descriptio-
ne Nic. 3. ii. zuchari secundæ decoctionis 3. iiii. cum aqua
faxifraga: fiat confectio in rotulis. i. in forma manuscriptorum.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium non est in usu.

De lepore Aui. in. 2. can. duo cas. facit, unum de lepore syl-
uestri, aliud de lepore marino, quem quidam existimant esse
unicum, quem dixit Aui. esse animal ostracum, lutosum
declinans ad rubedinem aliquantulum, inter partes cuius sunt
quædam similia foliis alutem. i. herbe chali. Illum uero quæ
hic intelligimus est ille qui omnibus est notus. De modo co-
burendi. uide supra in electuario de cineribus.

Lithotriptum. i. conteres & frangens lapidem interpre-
tatur descriptio ipsius posita fuit supra ex intentione Nicolai.

CC.

DE SEBESTEN.

R. Sebesten recentis. 3. v. infundatur in li. i. aquæ uiolarum
& bulliant: deinde coles, & predictæ colaturæ addatur aqua
sicca. i. reos & anguriz, ana. 3. vi. tamarindorum, prunorum
ficcorum contusorum, ana. 3. v. uolarum femininum communium frigido-
rum, ana. 3. i. succi mercurialis. 3. iiii. coquantur simul us-
que ad consumptionem medietatis, & fortiter exprimantur
& colemur, colaturæ addantur penidiorum. 3. viii. diapru-

nis non solutui li. i. s. pul. diagrydii, drach. iiii. misce & fiat
electuarium.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium apud nos non est in usu, sed in Mediola-
no utitur ipso. Scias quod ego uidi prædictum electuarium
scriptum, sed non apud autorem autenticum, & ibi ingreditur
quædam herba quæ nominatur chachile, quam Bartholomæus
in sua descriptione non habet, tamē si esset aliquis qui
uellet eam ponere declarabo quid sit. Chachile, est quædam
herba quæ reperitur in partibus Romæ, in loco qui dicitur
Cornetum, folia habet sicut umbilico ueneris, & hæc a moder-
nis soldanella uocatur. Est etiam alia species chachile ha-
bens folia similia uermiculari, & nascitur in sterquilinis lo-
cis ista uero non est ita nota ut altera.

Sebesten. i. mammilla canis Ser. ca. de sebesten, narrat ar-
borem ipsorum, & de fructu ipsius dicitur, quod mochata est
reth in arabia, & est arbutum altum super terram habes corti-
cem, cuius color uergit ad albedinem, & fructus ipsius est
sicut granum oliuæ. Ille fructus colligitur & exciccatur donec
corrugetur, & est illud quod utitur in medicina.

Aqua uiolarum intelligitur esse illa quæ fit ex floribus uiolarum
per sublimationem in alembico.

Anguria est melon magnus, uiridis, qui apud Aui. In. 2.
can. uocatur bareca, in tpe antiquo in partibus nostris non
reperiebantur, sed hodie deferuntur ex Venetiis.

Mercurialis est herba satis nota. Hæc apud Dio. uocatur
linozostis. Gal. etiam. 7. simp. dicit: Linozostis. i. mercuria-
lis. Plin. Linozostis siue parthenius a Mercurio inuentus est
ideo apud Græcos hermiporona dicitur. Nam multi ex no-
stris uocant mercurialem.

Diaprunis, uel Diadamasenon, a prunis Damascenis di-
citur. descriptio ipsius est posita superius autoritate Nico-
lai, & ibi uidebis quod fit sine diagrydio, & cum diagry. Illud
uero quod fit sine diagrydio appellatur non solutiuum quando
fit cum diagrydio appellatur solutiuum.

CCI.

DE POLIPODIO ad melancholiam.

R. Anisi, liquiritiæ, dauci, feminis leuistici, aniseos, florum
eupatorii, ana. 3. i. s. acoris, zingiberis, cinnamomi, croci, an.
3. ii. feminis anethi: petrofili. api. an. 3. ii. hermodactylorum.
3. i. s. turbith. 3. vi. diagrydii. 3. i. polypodii quercini. 3. ix.
thymi, cepithymi, ana. 3. v. lapidis lazuli, hæmatitis præpara-
torum. ana. 3. vi. penidiorum. 3. iiii. zuchari lib. iiii. coquantur
zucharam & penidii cum aqua sublimationis ireos uolunt
ad decoctionem zuchari, & fiat confectio solida. Poteris et
facere in forma liquida ad modum electuarij: deinde zucha-
ro liquefacto addantur pulueres.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium non est in usu.

Polypodium autem dictum est a similitudine flagellorum
polypi piscis in eminentiis quæ sunt in ipsis flagellis siue pe-
dibus, si pedes dici possunt. Nā radices polypodii sunt si-
miles eminentiæ. unde polypodium, quasi polypes. Diosco-
dicit, quod polypodium nascitur in parietibus humectis, &
in ripis & circa radices arborum utetur illud, & in quercu-
bus, & propter id dicitur polypodium quercinum. Hoc qui-
dam herbatice liquiritiam sylvestrem uocant.

Hæmatites. lapis qui dicitur hæmatites, siue sanguina-
ris: hoc lapide pictores utuntur.

EX NICOLAO FLORENTINO.

CCII.

DIACARTAMI, Sermone. ii. in cap. de cura

hæmatitici, ualet in euacuatione cho-
leræ, & phlegmatis.

R. Specierum diadragati frigidi. 3. i. carni cytoniorum. 3. ii.
zingiberis albi. 3. i. medullæ cartami. 3. s. turbith electi. 3. ii.
diagrydii. 3. v. manne granatæ, mellis rosati ad solem purifica-
ti, ana. 3. iiii. zuchari albi. 3. xv. fiat confectio in bolis, quo-
rum unusquisque fit. 3. iiii.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio apud nos non est in usu. Petrus Argillata in

ea.de podagra,sive gutta calida,hēt unam aliam descriptio-
nem,quæ eadē est.Lumen malelucens describens hanc con-
fectionem,dixit eam esse magistralē,cum non sit,ut eius
descriptionem sibi uendicaret,& quidem indigne.

Cartamus ē crocus hortulanus,cuius flore tingit sericū,
eius semē inter laxatiua ponit.Hoc ginecus uocat Græcus.
Diof.uerō enicū.Auer.in.5.col.dicit:Elcratis alcattamū.i.
semen papaga.Ego credo quod uult dicere, quia illud aīal
quod uocatur papaga,comedit ipsum liberter.Mef.de ipso
loquitur dicens:Melius est illud quod est album,& planum
grossum,& plēnū,cuius medulla est unctiosa,pinguis &c.

CCIII.

ELECTVARIVM sublimē conseruās sanitatem
oculorum,& confortans spiritum uisibilem in claritate sua
in libro.3.in cap.de custodia sanitatis oculorum,& de iuuā
tibus & nocentibus oculis.

Re.Herbæ adhil.3.ii.feminis feniculi.3.s.macis,cubebe,cin-
namoni,piperis longi,garyophyl.an.3.i.pitēt & cribellē
tur,& accipe mellis despumati lib.ā.succi foeniculi cocti,&
despumati.3.i.succi chelidoniz sit cocti.3.s.Coquatur suc-
cum melle quousq; mellis habeant ipsitudinem, & con-
ficiantur cum eo species, & referuntur in uase uitreato.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium non est in usu, sed Nicolaus ipsum lau-
dat mirabiliter.

Herba adhil secundum Nicolaum in lib.& cap. prædi-
ctis, est herba de qua quidam dicunt quod est herba quam
comedunt aquilæ, & cōfricant oculos suos, & dicitur quod
est eufragia, postea iterum ait: Verum alii dicunt quod est
quædam species herbæ albz, cuius folia quando rumpuntur
in loco rupturæ faciūt fila quasi ad modum bombacis, & est
amari saporis, ab Aui.uocata bombacum, a quibuldam casī
lago, a quibuldam dicitur herba uerula. & postea dicit: Ve-
rula est auis &c. neq; per id Nicolaus cognouit quid esset
herba adhil:ipse dicit q; ab Aui.uocatur illud bombacum, de
quo non reperitur ullum fessile capitulū.in.2.can.uobi de
simplicibus rta. & dicit quod a quibulda casilago dicitur,
quod non credo, quia casilago est infusum, sed sit quo-
modocunq; prima expositio est melior, hoc est quod herba
adhil est eufragia, quia in hoc multum ualeat. Præterea Mat.
Syl.in cap.de eufragia inquit sic: Eufragia Latine, Arabice
herba adhil. Mef.in cap.de ægritudinibus oculorum laudat
ipsam, sed contradicit Io.Cocoregus in c.de debilitate ui-
us, qui inquit: Herba adhil. i. uia mulsata, sed secundum ali-
quos eufragia, q; non creditur: sed mea opinio est q; adhil
sit eufragia.

Chelidonia ēm Isid.ideo dīr, ut q; ad aduentum hirundi-
num vī erumpere, uel quod pullis hirundinum si oculi ause-
rantur matres eorū illis ex hac herba mederi dicunt. Liber
qui dicitur Bulchafim in tract.2.in.ca.de modo colligendi
ac chelidoniz, & extrahēdi succum eius inquit: Principiū
ortus chelidoniz est quando hirundines incipiunt appare-
re, & quando desinunt apparere desiccatur, & non apparet,
& propter hoc appellatur herba hirundinum &c.

CCIII.

DIABVTYRVM expertum in lib.iiii.
cap.de tulsī.

Re.Mellis despumati, } ana.3.iiii.
Butyri, }
Cymini, }
Anisi, } ana.3.s.
Glycyrrhizæ.3.i.

Consume in forma * loch.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium non est in usu, & sicut reperi apud Ori-
basium in cap.de tulsī, est ex auctoritate ipsius.

De butyro Aui.in.2.can. dāo cap.faciū, unum de buty-
ro simpliciter, aliud de butyro non recenti. Ser.de butyro,
lacte, & caseo in uno cap.loquitur, & sic inquit: Liben. i. lac
lubon. i. caseus zebed. i. butyrum, serum. i. mantega. Papias
dicit: butyrum pinguedo quæ ex lacte colligitur, est tamen
pinguis, & solidius oleum ex butyro fit.

CCV.

DIAPEGANON, vulgo Diapigamum, in
lib.v.in cap.de inflatione, & tentione
stomachi.

Re.Nitri,piperis,cymini infusi i aceto, & postea torrefacti,
ana.3.iiii.foliorum ruta siccorum ad pondus omnium.

Consume cum melle & fiat.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confessio apud nos est multū in usu, sed non sub hoc
noīe diapigamum: immo sub noīe diaspolitonico, q; idem est
ipse Nicolaus in eodē libro inquit: diapigamū. i. electuariū
de ruta: postea in ca.de debilitate digestionis ponit electua-
riū de ruta quod idē est cū diapigamo. Et sic dico quod elec-
tuarium de ruta secundum Nicolaum diapigamū & dia-
spolitonico idē sunt, de quo infra in diaspolitonico. Diof. in c.
de ruta ponit descriptionem diapigami, quæ eadem est. Ma-
cer in c.de ruta describit diapigamū i uericulis incipiēdo:
Ex hac antidotum non paucis utile causis.

Constituunt, medici dicunt diapeganon illud.
Peganon in græca, nos tra, quia ruta uocatur.
Illius antidoti confessio talis habetur.
Pondere iunge pari nitrum, piper, atque cyminum.
De tribus his tantum de ruta ponito quantum.
Sed prius ex acri uino macerare cyminum.
Conuenit, & ferro post affari calefacto.
Omnia deinde simul bene trita ex melle ligabis &c.

Nitri, id est aphronitrum, in ista cōfectione laudatur sal
nitrum, quia utitur bōbardariis, quia est fortius q; sal panis.

CCVI.

DE FICVBVS in eodem lib.in cap.de cura
cholicæ ex fæce, & est utile senibus.

Rec.Croci hortensis, zingiberis albi mundati, ana.3.ii. teratur
& cribellatur, siccum albarum pinguium nume. xxx. terantur
in uno mortario ligneo in modū q; non appareat grana,
& si nō possunt teri bene, serueant modicū, & ponatur
cum eis de baurach, fæce argenti, ana.3.s. & pistetur omnia
simul & incorporentur cū melle despumato, in quo miscea-
tur de aqua in qua decoctū fuerit, & fiat.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium non est in usu, sed secundū intentionē
Nicolai est utile senibus.

Crocus hortensis ē crocus aphricanus siue hortulanus cu-
iur semen ginecus lue cartamus dicitur.

Ficus. i. carica. Isid. inquit: Ficus a fecunditate uocat est
.n.arboribus cæteris fecundior. Nā terq; quaterq; per sim-
ulos annos generat fructum, atq; altero maturecente, al-
ter abortit, hinc & carica a copia noīat &c. Est alia ficus
dicta pharaōis siue ficus latua, siue fycomoros, & ē nomen
cōpositū a fycos Græcæ, quod ē ficus & moro latine &c. In
de fycophanca. i. comestor ficum, ut apud Terentium.

Fex argenti ēm Nicolaus est scoria argenti, ego puto q;
sit mardalengi, q; alio nomine lithargyrium appellatur.

CCVII.

DE CICADIS, in eodem libro cap.
de cura lapidis.

Rec.Cicadarū abiectis capribus alis, & pedibus granorum
molis, feminis faxifragiz, ana.3.i.piperis, galangæ, cinnamo-
mis, ana.3.ii.ligni aloes.3.s.mellis quod sufficit.

COMMEN. MANLII.

Istud electuarium nō est in usu. Isid. in cap.de minutis.no-
latilibus inquit: Cicadæ ex cuculorū nascuntur spūo. hæc in
Italia apud Reginos multæ sunt: nec usquam alibi. Hortus
medicinz ait: Cicadæ sunt uermes ad similitudinem locu-
stæ, & habitant in locis calidis. Quidam uero sapientes di-
xerunt q; cicada est aīal parū uergens ad nigredinem, quæ
in capite ipsius hēt duo cornua minuta, & in tempore aīa-
tis maioris caliditatis apparet, & uolat super arbores, & su-
per cacumina domorum uel aliarum rerū, & ibi stat & gar-
rit quousque sol amittat suam caliditatem, & prædictum ani-
mal a multis uulgarī nomine sic est uocatum.

Grana solis. i. Miliū solis siue lithospermon. Ser.in.ca.de
milio solis inq; ex auctoritate Gal in translatione batarie-

* ἀνίσταται
τὸ
Græci no-
stri ilin-
dus uo-
cant.

* Aphro-
trum uo-
cant.

lilacos quod est semen quod assimilatur lapidi & est chulb. i. milium solis, & est semen herbe quæ dī fironcos, quod fibitur frangit lapidem & prouocat urinam. Serap. iterum ait ex autoritate aben melui calbasari, q̄ achulb defertur ab India & assimilatur semini lini, nisi q̄a est maius. Miror tamen quod Ser. dicat quod milium solis habet semē simile semini lini, & tū illud quod nos utimur non assimilatur semini lini: hæc herba in nostris hortis nascit, & abundat plurimum, quamuis dicat Sera. quod defertur ab india.

CCVIII.

DE SISELEOS, in lib. vi. in cap. de sterilitate.
Recipe siseleos, limaturæ eboris, radicum & granorum prœniz, darisafahan, an. 3. i. s. cinamomum, cyperi, calami aromatici, quinanti, artemisiz, an. 3. i. nardi, garyophyllo, folii, masticis, olibani, an. 3. s. ambræ purissimæ. 3. ii. mellis quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Istud medicamen de siseleos, id est fileris montani non est in usu.

Darisafahan est cortex radicum buziæ siue cortex radicū mali granati agrestis, apud Dios. uocatur asphalium de quo dictum fuit in electuario de uino.

Arthemisia. i. mater herbarum.

Maltix est gummi lentiscii uel spēs eius. Dios. in c. de thure ait: Thus lachrymū est arboris quæ Græce libanus dicit.

CCIX.

DE IVA, in lib. 7. de preseruatione a doloribus iuncturarum.

R. Iuxta recentis, subtilissime incise, & conficiatur cū melle & fiat secundum artem.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuariū apud nos est in usu. Ipse enim Nicola. non ponit dosim iuxta, sed proportio mellis ad iuam apothecariis est nota.

Iua fm Simonem Iauēn. est Iua, ut dicit supra in chamæpityos, ipse uero in c. de chamæpityos ait: quasi in fine. uide quod nulla istarū specierum sit illa quæ moderni uocant pro chamæpityos. Arbitratus fui, quod prima istarū sit planta illa, quæ in iuam moderni uocant propter similitudinem huius descriptionis cum ea, & propter experientiam quæ inuenitur in ipsa in sciatica quæ ipsa laudatur postea uero in tellectis quod apud Græcos ficulos, maxime ipsam iua chamæpityos uocant, & sic ex meo iudicio credo quæ uera iua sit chamæpityos, & qui non credit consideret formam chamæpityos quod apud Dios. uocatur chamæpityos, & ponit spēs tres quarum una est ipsa super terram, & gibberosa habet folia, atq̄o minori. idemperiuiæ minori siue uermiculari similia, sed tenera & pinguiora & aspera, & spissa circa uirgas odorem re dolentia, pini ramulos mittit oblongos: & curuos in similitudine anchusæ. i. lactucæ asini, & frondiculū tenuem, uel semen cum tenui coma, flores minutos & mellinos profert, & semē uigrum odorem picuinum. i. rasi iuxta pini uide ergo illa iua quæ utimur, & aggrega ipsam cum illo cap. de chamæpityos, & uidebis quod in odore & in omnibus iua est chamæpityos, & omnes species habent odore pini: fed nobilior est quæ magis odore pini refert, illud uero chamæpityos quod utitur moderni, non habet formam chamæpityos, ut describit nostri auctores, sicut est notū eruditis apothecariis. Mel in c. de ægritudinibus laudat ipsam sub nomine ziziniæ, & est Iua.

CCX.

DE ANAGALLO SYLVESTRI,

in lib. 7. cap. de cura eminentiæ umbilici, & est multum utile.

R. Radicū eius bene decoctam in uino austero, & postea optime contritam, & mellis desumptam, ana. lib. ii. & coquantur lento igne usq̄ ad perfectionē, & tunc superponatur pulsus qui sic fit, sanguinis draconis. 3. s. masticis, pilorū leporis incisorum, an. 3. ii. gūmi arab. 3. ii. lapidis hzmaticis 3. i. nucis cypresis. 3. ii. garyophyl. macis cinnamomi, nucis muschatæ, ana. 3. iii. piperis, zingiberis, croci, ana. 3. i. & bene incorporentur, & fiat electuariū.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuariū non est in usu, sed secundum intentionem Nicolai est utile.

Anagalli fm Dios. sunt duæ spēs, una est quæ florem hyacinthinum profert, sed apud Sera. habet florem cœlestē, altera est cuius flos daçtily colore habet, sed apud Sera. habet florem rubrū, & est plantula habens folia subtilia parua & ramos quadrangulatos, & ambræ habent semen rotundū simile semini coriandri apud nos in pratis ætatis reperitur. Quidam expoluerunt quod esset cicorea, quod non est alii q̄ sit maiorana; q̄ non est alii auriculā muris dicit, q̄ non est. Auic. in. 2. cano. capitulum unum facit de auriculā muris, aliud de anagalo, in cap. de anagalo inquit: Est duobus modis, unus eorum est, cuius flos est citrinus, & alius cuius flos est cœlestis, hic textus Aui. uidetur corruptus dū nō dicit, quod prima spēs anagalli habet florem rubrum, ut dicit Sera. Galenus in vi. simpl. inquit: Anagalis. i. morfus galli nā, & dicitur quod una habet florem cœlestis coloris, & alia rubei. & sic est secundum ueritatem, & est quā nostro idiomate morgelinam aut morfum gallinæ uocamus, & aliquādo ipiam Mat. Syl. dicit: morfus gallinæ uocatur a quibūdā anagallus qui ipia uocatur, quidam morgelinam uocāt &c. Nicolaus dicit: electuariū de anagallo lyulæstri. id. illo qui florem rubrum gerit &c.

CCXI.

CONFECTIO boli armeni, in lib. 4. in cap. de prauisione, cautelis, & custodia a uenenis, & eorum nocumentis in generali.
R. boli armenis, terræ sigillatæ, an. 3. i. grauarii iuniperi, 3. s. Conficiantur cum melle, dosis est. 3. ii. cum uino.

COMMENTA. MANLII.

Hæc confectio apud nos non est in usu. Bolus armenus est quedam uia terra, quæ reperit̄ p̄cipue in Armenia, & eligendus est subrubeus, apud Aui. uocatur lutū a. mēnum.

EX SAVONAROLA.

CCXII.

DE MORIS, secundum MICHAEM
Sauonarolam iu practica cap. de dylen
teria intestinali.

R. Carnium mori immaturi. 3. iii. zuchari, lib. i. Coque cū facilitate: deinde protice litypica calida, aut frigida, ut exigat dispositio, & fiat electuariū.

COMMENTA. MANLII.

Apud nos in usu non est.

APPENDIX.

Qui plura desiderat, ex nostris in illius praxim ANNOTATIONIBVS petat, nam eo in loco rem abunde pertrinximus, quæ apud nobilissimos IVENTAS Venetis quā diligētissime iam iam imprimentur.

EX GALENO.

CCXIII.

CYPHOIDES Andromachi antidotus, uulgo
CHIFODEA, secundum Gal. lib. viii. medicamentorum per loca ca. 7.

R. 1. Vuz passæ carnis. 3. xvi. alii. 3. c.

Croci. 3. i. alii obol. iii.

* Calami, 1. 3. ii. s.

* Bdelliū, 3. ii. s.

† Cassiz. 3. s.

Cinnamomi * obol. iiiii.

Spicæ nardi. 3. iii.

† Floris iunci odorati. 3. ii. s.

Myrrhæ. 3. iii.

Terebinthine. 3. iiiii. alii. 3. xvi.

* Rameutorum aspalati. 3. iii

Mellis. 3. xvi.

Vini quod satis est.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuariū apud nos est in usu, sed nō uimur sub noie chifodea: immo uimur sub noie electuariū de uino ipse Gal. describit iu diu. descriptione: quarū prima est nobilior, & dicit q̄ chifodea nominatur: etenim in odore.

Annotationes in
Savonarola
lib. Nicolai
Muro-
al.

† I. carniū
passularū.
* Aromatici
ci nenope.
† Mendose
prius. 3.
ii.

* Iudaici
fane.
† Ligneę
quidam.

* 1. prius
non sine
menda.
† Squinan-
tani officii
nis.

* Limatu-
ra Barbæ-
ris.

S E C T I O P R I M A

& in gustu similis est uocato ab Aegyptiis chisi, qui in primo composuerunt hoc & utuntur eo. Idem in partibus nostris facimus. Et sic postquam ego aggregavi istud electuario de chifodea apud Gal. cum uno electuario quod habetur ab Auic. in tertio quod nos facimus sub nomine electuarii de passulis seu de uino uidi quod idem sunt: & sic ut melius & apertius rem dignoscas, lege illam descriptionem, quā superius posui sub nomine electuarii de passulis, cū ista & uidebis q̄ eadem est. Franciscus de Pedemontium in ca. de debilitate hepatis habet eandem. Michael Sauonarola in ca. de debilitate hepatis hēt eadē. Limatura aspalathi seu aspalci. rasura aspalcos & hoc est arbor sicut narrat Diosc. q̄ nascitur i Asia, & Rhodo, cuius spēs duplex est. Est n. una spinosa fruticē & tirsū graue hūs & depositū cū cortice purpureo uel rubro & de presso odoris, & summi & amari. Altera & alba, lignosa, & imbecillis &c. quid aut sit fere ab oibus ignoratur: sū aliquorū modernorum medicorū opinionē teneatur quod sit aspalum. i. bitumen iudaciū, sed nō recte. Nā si Gal. hēt aspalchi fuit errore scriptoris, quia debet dicere limaturā aspalci, & est quādam arbor q̄ apud Ser. & Aui. uocat darsifahan, & sic est sū ueritatē. Nam ibidē Aui. loco eius habet darsifahan. quod idem est. Michael Sauonarola loco aspalci habet radicē simon, inde & ibi ait: Loco eius pōt poni xylocaracta, ut uult Simon Ian. uerum Aui. loco eius ponit fructus alibuchi. i. xylocaracta, & hoc aduentus, quia ipse ignorauit quid esset uerum loco eius xylocaracta potest, poni tamen idē nō esset Sera. uere agno uit ipsum dicēs, quod est arbor granati syluestris, & sic est scdm ueritatē. Nā si legis capitulū de aspalcos apud Diosc. cum ca. de arbore granati syluestris seu darsifahan, uidebis, q̄ idē est. Præterea Io. Arculanus in cap. de debilitate hepatis inquit: Darsifahan. i. arbor granati syluestris, secundum uero modernorum sententiam granati syluestris dux (uue spēs. Quā uū est darsifahan, seu arbor dicta amiberberis, cuius fructus dicitur abel, & de hoc a multis locum efficit. Vnde Rasse in synonymis suis dicit: Licium loch de aqua in qua cortices berberis coquantur, & sic approbatum fuit q̄ arbor berberis in debilitate hepatis ac in fluxu hepatico multum ualet Aliud est xylocaracta, siue siliqua, siue charubiz que fuit idem, & sic a modernis uinum pro alio ponitur sed debent ponere corticem buziz. i. corticem radicis mali granati, seu berberis, & est arbor dicta apud herbarios cri spinus. hęc duo apud sapientes sunt ex secretis aliorum.

Vinum fati notum est Sera. de ipso loquitur in ca. de uite & suis speciebus, et quæ ex eis sunt. Hidd. ait: Vinū di diti est eo q̄ eius potus uenas sanguine cito repleat, hoc alii q̄ nos curis soluat leyū appellat, alii lineum a leniendo: uere res uinū uenenum uocabant, sed postq̄ inuentum est uirtus letiferi, succi, hoc uinū uocatum est, illud uenenum unde & Gieronymus in libro quem de uirginitate cōseruanda scripsit, Adolescens uas dixit, ita uinū bibere debere, fugere ut uenenum, nē p̄ ætatis calore feruenti bibāt & pereat. Inde est q̄ apud ueteres Romanos foemina non utebatur, uino nisi sacrorū causa certis diebus: ho die uero inueniuntur homines multi, qui si nō biberent uinum, deficerēt oīno. Io. Anglicus in ca. de passionibus stomachi recitat hos uersus. Dat uinum purum tibi nobis comoda primum. Confortat stomachum, cerebrum, cor dat tibi letum.

Vires multiplicat, & uiscera plena relaxat. Efficit audacem, sudorem prouocat, aptat Ingenium, tali lusu congaudet amico. Sic mensura comes nē uioletur opus. Nam siq̄ mensura deperit omne quod est. Dicitur autem electuariū de uino q̄ ingreditur, & de bet coqui cum magna diligētia.

CCXIII.

DIOSPOLITICON, Galeni lib. iiii. & vi.
de Sanitate tuenda.

R. Cymini,
Piperis longi,
Foliorum rutæ,
Nitri,

} ana. 3. iiii.

Terantur grosso modo; & cum melle bene desumpatū quantum sufficit fiat confectio.

COMMENTA. MANLI.

Hęc confectio ē in usu Ipse uero Gal. in 6. de regi. sanita. ipsam describit, & solet cōfici dupliciter. Quidam. n. cōponunt isam ex 3. iiii. rutæ uiridis, & aliorū equali pōdere, sed ēm modernos ex oibus componentibus sumitur æquale pōdus & conficitur, & sunt ex hoibus qui uocant istam confectioem sue istud antidotum electuariū de ruta: uerum ipse Gal. in ca. de medicinis Zenonis in suis experimentis habet electuariū de ruta, quod idem nō est, forsā illo tpe nō erat idem, sed apud multos modernos idē sunt. Nā Petrus Argillata in cap. de duritie splenis inquit: Confectio diaruta, & ibi habet eius descriptionē sicut habet hic Gal. in fine eius descriptionis dicit, & Gal. appellat hoc diaspoliticon. Nico. Floren. in lib. 3. in ca. de iustione & tēione stomachi ait: Diaspoliticon. i. electuariū de cymino. Nā apud medicos uocat hoc electuariū de cymino cum speciebus grossis Aui. in 3. can. hēt diacyminum Galeni, quod idem est. Dio. in ca. de ruta habet idē. Macer in eodem ca. habet idem sub noīe diapiagmū. unde q̄ hoc possumus dicere diaspoliticon confectio de diaruta, diapiagamū, & electuariū ēū speciebus grossis esse idem. uide supra diapiagam.

Cyminiū. i. cyminum uisale. hic Gal. nō dicit si cymini debet poni infusum in aceto, & torrefactū, aut non. Verum nostri doctores magis laudāt ipm debere poni infusum in aceto & torrefactū, quā infusum. Nam Petrus Argillata, Nicolaus. Diosc. Macer, & Auic. habent oēs cyminum in fusum. & idem uolunt facere hodierni, & modus est q̄ accipiat cymini, & mundeat a sordibus eius, & superponat acetū quantitatis sufficiens, & ibi dimittat per diem & noctē: deinde extrahat & desiccetur, & eius torrefactio est q̄ ponat super patellā ferream latā, & calefat ipsa sine cymino. deinde auferat ab igne, & statim cito superponatur cymini, & ipsum miscetur & uoluit semper cum aliquo, & hoc fiat bis uel ter quousq̄ eius torrefactio sit completa & utere ubi oportet. idem potest ferre de aliis feminibus.

Spēs piperis nota sunt, ac eorū sunt, & Græca et Latina p piper uero absolute piper nigrū intelligimus, aut q̄ nobilis, aut q̄ fortius est aliis, aliq̄ tñ ēm diuersas intentiones in aliquib. electuariis ac confectioibus magis conuenient piper albū aut longum, quā uigrum sicut in confectioe proxime descripta: in qua licet alibi dicit debere poni nigrū plurimi tamen ac fere oēs laudāt: apponendum esse piper lō gum: ab aliquibus uero magis laudatur piper album.

Ruta est herba satis nota. Diosc. aut laudat illā quæ nascit circa cucumeres. Auic. uero laudat illam quæ nascitur circa arbores ficus. hic Gal. nō dicit si ruta debeat esse sicca, aut uiridis. uerū moderni doctores laudent mediā inter uiriditatem & siccitatem. Diosc. in eodem antidoto dicit rutē uiridē. Petrus Argil. dicit: & uult quod ruta non sit sicca nec uiridis, & sic debent facere apothecarii.

Nitri. i. Aphronitri Aui. loco eius hēt Baurach. i. sal rubē, idem inquit: Baurach est fortius sale, & est de genere uirtutis eius, idē in cap. de nitro ait: Nitrum est baurach armenū, in loco eius sunt ex hominibus qui ponunt sal panis. & sunt ex hoibus qui ponunt sal nitrum quod uentur bombardarii, & hoc est fortioris uirtutis in hac materia.

APPENDIX.

Non ineleganter, arbitror, cum ex Mes. diacyminū exponeremus, Galeni DIOSPOLITICON proximum quare (modo plura desiderent), locum probe studiosi consulamus, superius nempe no. xiii. compositionum.

EX GILBERTO DE ANGLIA.

CCXV.

DIACAPPARIS, secundum Gilbertum de
Anglia in cap. de uitis splenis.

R. Capparis. 3. iiii. squillæ, asari, centaureæ, pyrethri, piperis nigri, thymi, apii, seminis gith, agrimoniz radicis, an. 3. i. mellis quod sufficit.

COMMENT. MANLI.

Istud electuariū nō est in usu apud nos.

Capparis seu **kapparis** cum **K.** est planta uel frutex spino sa **spania** super terram spinis uncis plena sicut rubus, folia li milia cytonio, fructum similem oliuæ, qui si aperiatu er mitit florem album li uero deciderit de planta sua, apparet lógus ut balanus, & tunc si aperiatu inueniuntur in eo grana minuta: & hoc in Alexandria maiori reperitur, & in magna copia. **Haly. in. 2. practicæ. c. de radicib. uocat** ipsum bubugi.

Gith. id est semen nigellæ nigræ, quæ uocatur melathion de qua supra dictum fuit.

CCXVI.

DIACERASEOS, ibidem.

R. succi ceraforum lib. iiii. mellis lib. iiii. diagridi. 3. xvi. cinnamomi, masticeis, an. 3. i. conficiatur, succus cum melle léto igne ad spissitudinem decoquatur, & in eo pulueres te rendos téperabis cú. 3. iiii. manzæ, & ei unetur usque ad fero.

COMMENTA. MANLII.

Diaceraseos aut dicitur a succo ceraforum quæ recipit plus quæ de aliis rebus. **Cerafa** sive **Sera.** sunt grana parua similia pinis, & sunt in oriente, & est granum regû, & est illud quod apud nos est. **Intelligendum** est iuxta authoritatem **Sera.** granum regum duo significare, etenim iam ipsum significare uidetur **cerafa.** secundu uero illustres medicorum, sicut **Auic. in. 2. can. ca. de mehemberthene.** & **Mef. cap. de albemefuch,** est cherua siue cataputia maior. **Isido. in. ca. de propriis nominibus arborum** inquit: **Cerafus** a **cera** uel **Poti** uocata. **Nâ Lucullus** cum **Cerafum** ciuitatem **Ponti** delesse, hoc genus pomi inde adinuenit, & a ciuitate **cerafum** appellatur. **Arbor enim** **cerafus,** pomum **cerafum** dicitur.

CCXVII.

DIADRAGANTVM calidum, secundum eundem in cap. de strictura thoracis.

R. **Draganti** triduo in aqua infusi temperati. 3. iiii. & hyssopi. 3. i. & 3. ii. cinamomi. 3. s. zingiberis. 3. ii. liquoritæ & succi eius, an. 3. i. & gr. xv. confice cum calamento, dragacho, cú sufficienti melle, & lento igne ad spissitudinē decoquas post ab igne deponito, & puluerem specierum adde & usui referuas, da in modum castaneæ.

COMMENTA. MANLII.

Diadrugantum autem dicitur a **draganto** quod recipit dicitur calidum ad differentiam alterius descriptionis, quæ dicitur **diadrugantum** frigidum, quæ superius posita fuit. Et dixerunt quidam quod ambas descriptiones sunt de mēte. **Ni colapsi** possunt etiā esse ambæ de mēte **Gilberti.** **nâ Gilbert** tenet in allegato ambas descriptiones compositi: uidet uero quem uoco **Lumen male lucēs,** ambas posuit descriptiones de mēte (ut asserit) **Nicolai,** & tamen ambas a uera descriptione declinant: nec secundum eius descriptiones debent constitui dictæ confectioes.

CCXVIII.

DIAPENTE, secundum eundem in cap. de causis tussis.

R. **Storacis** optimæ, myrrhæ, draganti, galbani, croci, opii, an. 3. xvi. balsami, aut olei nardini, mellis quod sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Istû electuariu in usu non est. **Nico. Flo. in lib. 5. in cap. de succi** habet electuariu **diapente** quod quasi idem est. **Verum Nic. ponit** insequium album: **Gilbertus** loco eius habet **Opium.** **Nic. habet** cyminum torrefactum: **Gilbertus** habet **crocum,** in reliquis idem sunt.

EX IOAN. CONCOREGIO. in cap. de paralyti, & ictigiatione.

CCXIX.

DIACASSIA FISTVLA.

R. **Prunorum** damascenorum, uiolarum, ana. lib. s. bulliant in libris. v. aquæ usq; ad consumptionem tertiæ partis, & co laturæ addatur: manzæ, cassiæ pinguis & mundæ an. lib. s. ta marindorum. 3. v. bulliant lento igne & claro usq; ad spissitudinem: deinde addatur caudi puluerizati. 3. zucha. cadi. 3. iiii. penidi. 3. ii. zuec. rubei li. 5. frupi uiolati. 3. x. fiat electuarium. & est pro delicatis & eius dosis est. 3. i. uel. 3. s.

COMMENTA. MANLII.

Diacassia autem dicitur a **dia** quod est confectio. **Cassia** dicitur, quia in ipsa cassia ingreditur, supra posita fuit una alia descriptio quæ est ex authoritate **Francisci de Pedemuntium** quæ apud nos nō est in usu: uerum nostri doctores magis laudant istam descriptionem, quia est confectio leuis, & sit pro delicatis.

EX OFFICINIS. & sunt compositiones (ut uocant.) Magistrales.

CCXX.

LENITIVVM.

℞. Passularum. 3. ii.	Liquiritiæ. 3. s.
Capillorum ueneris.	Prunorum,
Violarum,	Tamarindorum, an. 3. vi.
Hordei, an. m. s.	Folliculorum fenæ,
Iuiubarum,	Polypodii, an. 3. ii.
Sebesten. an. nu. xx.	

Misce & fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis: deinde addatur mercurialis man. i. s. bulliat bullitione una & coletur, & dissoluatur.

Pulpæ cassiæ,	} ana. 3. vi.
Tamarindorum,	
Prunorum,	
Zuchari fini,	
Zuchari uiolati,	

Coquendo lento igne semper mouendo cum spatulâ, i. fine adde pro qualibet libra electuarii. 3. i. iii. Folliculorû fenæ, & fiat electuarium secundum artem.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium apud auctores non inueni, nec apud nostros doctores est in usu, sed utuntur ipso in partibus **Ve netiarum,** & utuntur ipso in illis partibus sicut nos utimur **diapruni** non solutiuo.

Mercurialis est herba quæ in nostris partibus in ciuitatibus inuenitur iuxta muros & dicitur uulgo **marcoriela.** **Hæc** apud **Dios.** uocatur **linozostis,** & sic eâ uocat. **Gal. in. 7. simplicium.** **Plin. ait:** **Linozostis** siue **parthenius** a **Mercurio** inuentus est. ideo apud **Græcos** **hermiporona** dicitur, **nâ** mul ti uocant **mercurialem.**

CCXXI.

DE FARFARA.

℞. radicum farfaræ li. i. lauentur bene in aqua, & decoquant optime, deinde pilleant cum. 3. iii. passularû & 3. iii. pinearû in mortario lapideo: post hoc ℞. zuchari albi li. i. & dissoluatur in prædicta decoctione farfaræ, & coquatur ad formam electuarii: deinde addantur pulueres infra scripti. ℞. dragati albi. 3. ii. cinnamomi, macis croci. an. 3. i. succi liqui. 3. i. s. nucis mulcharæ. 3. i. misce. & fiat electuarium.

COMMENTA. MANLII.

Istud electuarium apud medicos. **Papientes** non est multum in usu, sed apud medicos. **Mediolanenses** magis.

Farfara uero a modernis dicitur ungula caballina, quidam mâli herbarici crediderunt quod hæc in uincis inueniatur, sed falso. **Nam** apud nos eius species sunt duæ: quarum una habet florem album, & hæc dicitur **nymphæa,** & est illud quod magis usui medicinæ competit, altera habet florem rubrum & est apta in medicina sed non tantum, & utraq; in aquis inuenitur, apud sapientes nota sunt. apud **Aui. in. 2. can.** uocat **nymphæa,** & dicit quod **Gal.** uocat ipsum caulem aquæ, & nominat granum eius granum sponi: hæc apud **Dios.** uocatur **nymphæa** siue ut alii **cacabus** ueneris. i. **papauer** palustre, siue ut **Latini** **alga** palustris. **Antonius** magis, inquit: **Nomen** herbæ **nymphææ** a **Græcis** dicitur **prothea,** alii **cacabos,** alii **lichometra,** alii **androcinos,** alii **idrogothos** alii **he racleos,** alii **arnenon,** **Itali** **nymphæam** uocant.

EX BENEDICTO DE NVRTIA.

CCXXII.

CONTRA PESTEM, secundum dominum **Benedictum** de **Nurtia** physicum illustrem.

℞. **Boli** armeni, diprami albi, myrrhæ, pipinellæ, zedoariæ,

S E C T I O P R I M A

an. 3. i. theriacæ. s. tyriacæ andromachi distemperatæ cū aqua uitæ optimi uini, & distillatæ in balneo mariæ. 3. s. croci. 3. i. caphoræ, margaritarū non perforatarū, smaragdinarū. 3. iiii. tormentillæ, sigilli marini. an. 3. ii. se minis citri. 3. i. s. omnia puluerizantur & incorporantur cū syrupo de acetositate citri & ex eis fiat electuariū. de quo detur 3. s. cū aqua melifici ieiuno stomacho, certe tollit febre pefilentie, & extinguit omne uenenum in corde, & toto corpore.

C O M M E N. M A N L I I.

Istud electuariū in re pefilentiali ualet mirabiliter ad ea quæ diximus, & est optimum in illo casu.

Diptamū album credo q. fit uisale. Nam illud diptamum quo utimur hodie est album, fm Diosc. diptamum multi dicunt pulegium agreste & describit tres uel quatuor species quarū prima species dicitur quod nec florem, nec semen habet, sed illud diptamum quo utimur hodie, habet florē purpureum ac semen nigrum, quod apud omnes est notum. Serap. de ipso loquitur in cap. de origano, Simon Ianuensis in cap. de altharami inquit, quod Sera. in ca. de calamentho, de diptamo loquitur, quod non est uerum diptamum. Apud Aui. in. 2. uocatur mescatramescir. Aqua uitæ est aqua distillata facta ex uino optimo, & quanto uinum est bonum, tanto melior erit aqua, & eius modus est notus. Raynaldus de uilla noua in li. i. in ca. de passionibus aurium, & primo de surditate tinnitu & sonitu inquit: Dixit mihi quidam prædicator in urbe quod imposuit de aqua quæ dicitur aqua uitæ, quam ponit, Aristot. in lib. 12. de aqua & uere, sed si hoc fit uerum non uidi.

Peroratio in primam Sectionem.

Hic huius distinctionis calcem atq. uis annuente altissimi mentis sima; eius genitrice que cuiuslibet generis cōfectiones ac electuaria, uidelicet solutua & non solutua, dulcia, amara, opiata. & non opiata rōnabiliter cōplectit, quauis diuus Mesfin tres distinctiones secuerit. Inquit uero nunc dabimus subsequenti sectioni, quæ est de conditis si opifex ille rerū conditor; uniuersi cūctorumq. initium mentem nostrā suo lumine illustrauerit, ut tandem omnia in illius decus atq. laudem, sicut par est, sint euasura accedamus iam igitur ad propositum negotium.

L V M I N. M A I O R I S

S E C T I O S E C U N D A.

C O N D I T O R U M G E N E R A. X. secundum Mesue continens, tam usualium quam non.

Vna cum Manlij Commentarijs.

I. S E C A C V L C O N D I T U M.

* Eryngii
uocant.



RE CIPE radices* secacul albas grossas & teneras, & radatur cortex eius cineritius, & elixetur, & mundenat a uenenis interioribus, & incidatur in frusta sicut est mensura pollicis, & ponatur in eius uacuitatibus haridinosi frustū zingiberis humectati sicut dicemus in c. de zingibere cōdito, & garyophyllus un* humectatus, & accipiatu ad omne pondus corū mellis pondera. iiii. & alii ponunt mellis pondera duo, & zuehari pōdus 4. & postq. fuerit coctū cū facilitate proiciatur super illud specierum alephanginarum partes conuenientes, & fiat.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Secacul, sicut dictū fuit, ē sigillū sanctæ mariæ. Mattheus

autem Syl. non cognouit eū, quia ipse in litera. s. inquit: Sigillū sanctæ Mariæ. i. secacul. Idē ait: Secaculū eryngiū, idē sentit in ca. de alfaratico, sed si legis ca. de alfaratico apud ipsum & cap. de alfaratico apud Sera. uidebis quod eryngus nō est secacul nec spēs eius. Siquis recte consideret ca. de grano culcul apud Matth. Syl. deprehendere poterit ea quæ dicit de grano culcul, conuenire eū ca. de secacul apud Sera. & quod idē sunt, licet ipse non uideat cognouisse. Est n. granū culcul fructus ipsius secacul, & pp uerba Mathwii Syl. iunt quidam apothecarii qui falso opinantur eryngū esse secacul, quod nō est: quia Ser. reponit eryngum inter medicinas frigidas, secacul uero inter calidas. Item uide apud Manfredum de monte Imperiali, qui de formis utriusq. scripsit, & ibi comprehenditur eryngū esse spēm spinæ, sed secacul est radix quem moderni zingogello uulgo dicunt. &c. Aui. in. 5. can. in cap. de conditis habet etiam de modo conendi, & dicit q. secacul est uena ficut zingiber & affertur ex India. Hodie in nostris partibus reperitur in multa quātitate, & est multum in usu apud nos.

Conditū autē n. preparatū, & sunt multiplicia. Nā quædam sunt ex radicibus, quæ d. ex floribus, quæ d. ex fructibus. Nā ex radicibus sunt sicut zingiber, secacul, eryngus, & similia: de floribus sunt ficut uiole, rosæ de fructib. sicut pyracidonia, emblic, chebuli, & similia Mat. Syl. in ca. de rapa inquit, ex autoritate Gale. Rapa multo formiter autē & hanc homines preparant ulq. ad hoc quod componunt eā cum garo. i. almiri, quod uulgariter nuncupatur albi muria & aceto, ut habeant pro usu per totum annum: credo quod hoc fit illud quod communiter comedif in quadragesima. Idē ait: Conditum uocatur quod non sit simplex, sed cōmixtione pigmentorum compositum. Plin. in c. de uinis silitis, fuit, inquit, alia uina, & nunc ex pipere & melle & aliis speciebus, de quibus supra dixi quæ inquit: Alii condita, alii perata uocant. Mesf. inquit, quod super secaculo proiciatur species alephangine. i. de aromatis, & sunt ille species quæ ingrediuntur in mīua cydoniorum. i. conditum de cydoniis sicut infra apparebit.

II.

Z I N G I B E R C O N D I T U M.

Re. Zingiberis recentis si haberi potest uel saltem humectati per arem partem unam mellis partes tres, & zuehari partem unam, coquatur sicut secacul, & quidam accipiunt sicut secacul & zingiberis humectati, an. partem. s. & ficit delicatius, & quidam super condunt cum speciebus alephanginis, & quidam faciūt aliter. Modus autem humectationis eius est ut infundatur in aqua: deinde sepeliatur in arena, & fit zingiber album, & mundum & recens. humectatur zingiber, ut docet ipse de chebulis.

C O M M E N. M A N L I I.

Zingiber uis zengibel fm Dioscorbo est, nascens in Arabia plurimum, cuius comæ frequenter utunt incolæ, sicut nos ruta, in bibendo & manducando: sunt uero ei radices minus sicut cyperi sub albedo colore, habentes sicut piperis guttum: eligendæ sunt non perforatæ sed grauēs: has multi comedunt uel condunt. i. ne putrescant, & mittunt in uas, cui addunt mel coctum, & sic reponunt Gal. inquit: Radix huus plantæ deferret ad nos ab India: & est id in quo est iuuamentum. Papias ait: Zingiber, qui & artemisia, genera habet tria menoglossa tangentes & leptophyllos: miror ob tā lia uerba infra uero dicit: Zingiber genus pigmenti est qd in India nascitur, lingua eorum ita dicitur.

Conditū. i. preparatū, ut dictum est. Aui. in. 5. can. etiam docet modū conendi zingiber & dicit quod zingiber est uena de uentre terre sicut uenæ tinctorū. Nico. in fine sui antidotarii etiam docet modū cōdendi zingiber. & inquit: Eryngorū qui habent folia ad modū cretani marini quod Saraceni secacul uocant. Verba hæc inferunt mihi admirationem, quia eryngus nō est secacul, nec folia hēt sicut cretanus marinus, sicut patet per ca. de eryngo, & per cretanū marinum apud Diosc. quem ipse uocat crid imo n., tamē hic declarare nolo quod cretanus marinus est quædā herba quæ in tempore antiquo nascebatur in maritimis locis, sed hodie

die de lata est ad nos, & nascitur in nostris partibus, & est il-
la quæ nostro idiomate baxigia vulgariter uocat, mirabili-
ter ualet doloribus rerum ac lapidis exitimant quidam q̃
hæc apud Auic. in. 2. can. uocatur alblage. Mes. dicit, quod
zingiber condictum cum melle & zucharo. Auic. uero di-
cit apud nos assertur conditum cum melle, aut cum aqua ri-
zi. Serap. in proprio capitulo de zingiber inquit. Sunt qui
dam condientes zingiber cum melle, quidam cum rob: id-
est sapa: moderni uero generaliter conditum solum cū zuc-
charo, & est nobilior modus deferetur de Damasco ad nos,
& quanto albus tanto melius.

IIII.

PASTINACE, uulgo Baucæ conditæ.

Baucæ conditæ ualet sicut secacul, & eius modus est si-
cut secacul. i. sigilli sanctæ Mariz.

COMMENT. MANLII.

Baucæ. i. pastinacæ, conditum apud Arabes nominatur
algingibel. Auic. in. 5. can. docet modum condiendi: & di-
cit: Sumatur de duris clari coloris mūdæ, pastinacam autē
fm Isido. in cap. de oleribus dicit sic uocatur, quia radix
eius præcipuus pascus sit hominis: unde Macer sic ait: Qd̃
pascum tribuat est pastinaca uocata. est enim odoratu iocū-
da, cibo delectabilis, reperitur alia species quæ dicit sylue-
stris, quæ uocatur Daucus apud Auic. in. 2. can. quidam cre-
diderunt quod bacia esset chariata, quod non credo. Nā Ga-
le. in lib. 2. de alimentis facit unum cap. de pastinacæ & dau-
co, & chariata, qd̃ non faceret si essent idem, sed sit quomo-
docunque, hic uolo declarare, quod chariata est species pa-
stinacæ, cuius radix est citrina bona ad manducandum, &
est illa quam Lombardi uulgariter gnisso uocant. Plini.
ait: Alterum genus est staphilinos quam pastinacam errati-
cam uocant.

IIII.

ACCORVS CONDITVS.

Acorus conditus ualet ægritudinibus cerebri & neruo-
rum, & eius modus est sicut leacul conditi. Addatur tamē
ad omnem partem eius secacul boni partes duæ.

COMMENTA. MANLII.

Acorus. i. piper apum uel aphrodisia, ut dicit Dioscōdi-
tum. i. præparatum. Hæc apud nos est multum in usu: repe-
ritur etiam una confectio conditi ad ægritudines neruorū
frigidas mirabilis, quam ipse describit in summa quarta de
ægritudinibus neruorum, & est confectio diacori, quæ etiā
in usu est, ut dictum fuit.

V.

ZVCCARVM ROSATVM.

R̃. Foliorum rosarum albarum, aut rubearum quantitatem
quam uoueris, & expandantur super tabulas in umbra us-
que dum superfluum humiditatis ipsarū resoluatur, & sint
rosæ habentes medietatem inter complementum & acerbi-
tatem, & terantur in uase lapideo: deinde proiciatur super
eas zucharus tabarzeth. i. album triplum ponderis earū,
& reponantur in uase uitreato, & obturetur eo eius cum p̃
gamento, & apponatur foliis menibus tribus omni die sepe
agitatio illud: deinde remoueat a sole & feruetur, & qui-
dam faciunt illud cum rosis non habentibus aliquid de con-
plemento, & inuenitur magis stypticum, & sunt qui non te-
runt rosas, sed incidunt cum forficibus & fricant manibus
fricatione ultima rosas & zucharus: deinde exponūt soli.

COMMENTA. MANLII.

Zucharus rosarum, siue conditum rosatum, siue cōser-
ua rosarum idem est Nicolaus in suo antidotario ait. Rod̃
zachara. i. zucharus rosatum, sed nō sit sicut dicit Mesue.
Petrus de Crescentiis in cap. de rosaria, idest rosa habet unā
aliā descriptionem, sed non est eadem. Moderni uero ge-
neraliter faciunt, ut docet hic Mesue.

VI.

ZVCCHARVM VIOLATVM.

Zucharus uiolarum eius modus est sicut zuchari rosa-
cei indigent tamē uiolæ expansione longiori, et expositio-
ne prolixiori soli.

COMMENT. MANLII.

Zucharus uiolarum, idest conditum uiolatū, siue cōser-
uera uiolarum, quod satis est notum.

VII.

ZVCCHARVM BVGLOSSATVM

Zucharus buglossatum eius modus est sicut zuchari
rosacei.

COMMENTA. MANLII.

Zucharus buglossatum, siue diab u glossatum dicitur a
floribus linguæ bouis, quæ alio nomine buglossa uocatur.
Aui. in. 2. can. de lingua bouis ca. facit, sed uere credo quod
illa qua utuntur moderni non sit illa de qua loquitur Auic.
ipse autem Auic. ponit quod sit genus almaru. i. marmacor,
ut dicit in cap. de maru Mes. non ponit modum conficiendi
zucharus boraginatū quod fit ex floribus boraginis quæ
est species buglossæ, tamen si diaboraginatū facere uolue-
ris facies illo modo sicut buglossatū. Christophorus de ho-
nellis putauit, sed non recte quod zuchari alchilil sit zuc-
charum de floribus boraginis, quod non est: apparebit in-
fra conditum de buglossa, quod est conferua uel diabuglos-
satum.

VIII.

**ZVCCHARVM Rosmarinatum, uulgo
zucharus Alchilil.**

Zuchari alchilil stomachum, cerebrum, & cor confort-
tat uetostiles fugat, & eius opatio ē sicut zuchari rosati.

COMMENTA. MANLII.

Zucharus alchilil. i. zuchari q̃ fit ex floribus rosma-
rini qui alio nomine corona mnotis uocatur. Christoph. de
Honestis dicit: zucharus alchilil. i. zucharus factum ex
floribus boraginis, sed nō est uera expositio, ut pater apud
Math. Sylua. in litera Kil Kil, ubi sic ait: Chinchil. i. rosma-
rinus illud uocabulum ponitur in antidotario Damasceni.
i. Mesue septimo quæ incipit zucharus alchilchil, & post
sex qui incipit Zucharus buglossatum, & sic est quod al-
chilil, uel alchilchil, flos est rosmarini, sed grana alchil-
chil, sunt grana syluestria.

IX.

CITRI CONDITVM.

R̃. Corticum citri. 3. vi. buglossæ. 3. i. s. * marmacor. 5. s. ga-
ryophyllorum aur. i. ligni aloes aur. s. terantur & proiciantur
super ea uini boni lib. i. iij. et dimittat diebus tribus: dei
de proiciatur super ea zuchari tabarzeth. i. albi. lib. ii. &
aromatizetur cum galliæ bonæ. aur. s. croci. 3. a. quarta, ma-
sticis. 3. i. musci. 3. i. sexta.

* Melissa
uocant.

COMMENTA. MANLII.

Conditum, idest præparatum. Mes. in distinctione de cō-
ditis ponit citra cōdita, & in distinctione de syrups habet
duas descriptiones conditi de citro: sed illæ duæ descriptio-
nes non sunt in usu. Ego uero scripsi secūdam descriptionē
ut declararem quid sit marmacor. Marmacor secundum in-
tentionem Mes. est melissa, et sic credo esse bene expositū:
quia Serap. in cap. de melissa inquit. Beneragie. i. turun-
gen, & dicitur marmacor. i. melissa Aui. in. 2. can. in cap. de
maru. De marmacor loquitur, & ibi distinguit in plures
species, & ponit linguam bouis. i. buglossam inter species
eorum. Stephanus Iudeus affirmabat quod est marrubium,
quod ignoro. Verum sapientes dixerunt quod marmacor
est melissa: & marmacor est marrubium. Gulielmus Placen-
tinus dicit. Marmacora. i. marrubium, siue prasium quod
idem est.

X.

BVGLOSSI CONDITVM.

R̃. Buglossæ, mentæ siccæ, foliorum rosarum, corticum ci-
tri, aut foliorum eius, an. 3. iij. * alselegemisch. 3. i. trium ge-
nerum cyoniorum, tritum generum poniorum, an. 3. i. s. se-
cundæ crudæ incise, nucis muscatæ, zedoariæ, galangæ, been
utriusque. salbi & rubei, sandali citrini, croci, an. 3. i. s. ligui
aloes. 3. ii. uini. & aquæ, an. 3. vi. mellis lib. vii. aromatize-
tur cum musci. 3. i. tertia, galliæ. 3. ii.

* Ozimū
garyophyl-
latum no-
minant.

COMMENTA. MANLII.

Cōditū. i. p̃paratum de buglossa. i. linguæ bouis: cōditum
Lumi. Ma. H

SECTIO. III.

autem de buglossa non est zuccharum buglossatum, q̄ fit ex zuccharo & floribus buglossæ, vt quidam crediderunt.

Trium generum cytoniorum, vel trium sp̄rum cytoniorum Græci vero ponunt ipsas in numero malorū, & genera ipsorum sunt multa, quorū quædam sunt dulcia, quædam acris, quædam muza, & sic de singulis: sed hic solum intelligimus tria genera quæ sunt dulcia, acetosa, & muza. i. quod fapor ipsius fit compositus ex dulcedine & acetositate.

Trium generū pomorum similiter intelligit de tribus generibus pomorum, & sunt proprie dulcia acetosa & muza.

Setæ crudæ & non coctæ, vt dictum fuit. Papias inquit. Bombices dicuntur apud Seres frondium vermes qui fericum creant ex cuius tinctura bombiicius fit.

Peroratio in secundam sectionem.

Hic sectio de conditis complementum specipit fm̄ d. Me sue, nūc vero aggrediamur sectionem de speciebus loch fm̄ eundem. Nobis igitur adit dator auxiliū Deus terrarū, coeliq̄; sator, rerumq̄; omnium opifex, & comitor.

LV MIN. MAIORIS SECTIO. TERTIA.

ELIGMATA SEV. ILLINCTVS,

officinis LOCH, E MESVE.
ac aliis Continens.

Vna cum Manlii Commentariis.

I.

EX PINEIS NVCLEIS, vulgo Loch de Pino.



EST P̄ granorū pini. 3. xxx. amygdalarum dulciū, auellana-
rum assatarum, dragacati,
gūmi arabici, liquiritiæ & suc-
ci eius, amyli, capiloriū vene-
ris, radicū lilii cœlestis, an.
3. iiii. carnū dactylorū t̄ cha-
rion. 3. xxxv. amygdalarū
amararum, 3. iiii. mellis passula-
rū, zucchari tabarzethi. albi,
butyri recētis, an. 3. iiii. mell.

tabarzeth quantum sufficit, fumatur ex eo quasi lambendo.

COMMEN. MANLII.

Loch est autem medicina liquida in modum syrupi, sed est inspissata valde, aliquater viscosa, apta vt labatur deglutendo ipsam paulatim: cōtra dispōnem pectoris ac pulmonis valet. Lafrancus chyrurgicus in cap. de gibbositate impartiri habet vnum medicamen, & inquit: Fiat loch. i. medici-
cina spissa sicut mel liquidum seu cridum, mitigans tussim: apud nos istud loch est multum in usu. Aui. in. 5. can. in trac. 3. de auri dolore habet vnam aliam descriptionem, sed nō est eadem. Ioan. Sera. in suo antidotario habet vnam aliam descriptionē quæ vocatur loch de granis pini, & ibi inquit: Atrocilibe & sunt grana pini.

Pinus arbor fm̄ lfid. in ca. de propriis nominibus arborum vbi inquit: Pinus arbor picea ab acumine foliorum vcata: pinum. n. antiqui acutum uominabant: pinum aut aliā piceam, aliam Græci paucem vocant: quam nos piceam dicimus, eo quod desudet piceam, nam in specie sibi differūt. In Germaniæ autē insulis huius arboris lachryma electrum gignit. hic textus lfidori non acceptatur. Nam electrum nō est lachryma pini, sed potius agiros, & est gummi dictum charabe, vt patet apud Simonem Ianuam. Aui. in. 2. can. facit vnum cap. de grano pini, & aliud de geloum, & ibi dicit quod est granū pini maioris. Certe illud nomen de geloum apud Arabes est de auellana maiore, quam nos nucellam dicimus, hoc granum satis est notum.

Auellanz notæ sunt. Ioan. Sera. in suo antidotario in cō-
sectione alchechēgi inquit: Abut & sunt auellanz affatz. Pet. de Cresc. ait: Auellanz ex eis quædam sunt syluestres quæ in memoribus & sepibus nascuntur, quædam domesticæ. Syluestres sunt parua, saporosa, grossam testam habentes. Domesticæ vero quædam sunt rotundæ grosse, & quædam longæ, ex quibus longæ saporosiores sunt, & citius maturantur, & assantur auellanz, vt dictum fuit de cymino.

Liquiritia est radix dulcis satis nota. Albuch. in tra. 2. docet modū faciēdi succū ipsius, & dicit q̄ fit de mēse Iulii, quā tūc planta eius est plena succo. Calsius foli. ca. de glycyrrhiza inquit: Glycyrrhiza Græce ex eo dicta q̄ dulce radicem habet glycy. n. Græce dulce dicit. Gal. ait, Maius iqua mētū q̄ est in liquiritia, est in succo radicis eius: quidā prae sophisticant succum ipsū ex puluere ipsius, & melle.

Amylum. i. amidum. Serapi. in capit. de frumento docet duos modos faciēdi amyllum siue amidum. Gale. in lib. ad Partenianū dicit: Amylum omnibus notum, est enim quasi medulla frumenti.

De melle passulorum seu passularum ingrediente compositionem huius loch. Contrarietas existit aliq̄ inter apothecarios nō parua. Aliqui. n. male accipientes verba Mes. ap. nunt mel & passulas pro loch conficiendo, quod minime facere conuenit, quia hæc nō est intentio. d. Mes. Nam hæc ipse, nec alii post mel vix vnquā medicinas aliquas suis cōpositionibus subiungūt, sed per mel passulorum intelligere debemus cum passulis confectum, sicut etiam conficitur, cū emblicis & anacar. & aliis rebus. Et modus ipsius est q̄ accipiantur passulorum mundatarum a sordibus eorum. 3. iiii. aquæ communis lib. i. coquantur simul vsq̄ ad cōsumptionē aquæ, deinde fiat fortis expressio cui addatur mellis d. uplū ponderis, hoc est pro qualibet lib. i. carniū passulorum addatur lib. ii. mellis bene depurati, & iterū simul coquantur vsq̄ ad necessitatem, deinde deponatur ab igne, & vsui reserua in vase vitreato, & erit mel passulatum: istū etiam mel myrrinum facere volueris de modo ipsius docet Nicolaus in fine diacodion, vt ostensum fuit.

II.

DE PAPAVERE, & est Diapauere.

R. Papaueris albi, 3. xxx. amygdalarum dulcium ex cortice tarū, granorū pini, gūmi arabici, dragacantis, succi liquiritiæ an. 3. x. amyli. 3. iiii. feminis portulacæ, feminis lactucae, feminis cytoniorum, an. 3. iiii. croci. 3. i. pendiorum alborū. 3. iiii. syrui de papauere q. s. etiā fit proprie syrupus ex capitibus papaueris albi & nigri, & semine lactucae, & violis.

COMMEN. MANLII.

Loch de papauer fm̄ intentionē Mes. est diapauere, sed secundum intentionem apothecariorum, aliud est loch de papauere, aliud est diapauere, tamē vnum pro alio pōt dari. Ipse in sua practica describit multas descriptiones diapaueris, vt in cap. de tussi, & in cap. de fluxu sanguinis ab auri, sed non sunt in vsu. Alia vero descriptio quam nos habemus in vsu est ex autoritate Nicolai de quo supra Aui. in 5. cano. habet vnam descriptionē loch de papauere, sed non sunt, idem, ista vero est nobilior illa.

III.

DE SQVILLA.

R. Squilla, mellis depurati partes cōuenientes, decoquātur in substantia loch, & accipitur sic lambendo.

COMMENTA. MANLII.

Istud loch apud nos est multum in vsu, idem Mesue describit aliam descriptionem in cap. de tussi humida, sed eadem est Aui. in. 5. cano. habet vnam aliam descriptionē quæ eadem est.

Squilla apud Aui. in. 2. can. est coepe muris, eo q̄ interfi cit mures. Circa inflans, Squilla alio noie coepa marina dicit illa q̄ sola reperit nisi fit plantata, mortifera est. Succus aut squillæ isto modo fit oportet: vt mundet squilla cum culitello ligno ex corticibus superioribus, & postea inuoluat illa recte i passa facta ex farina frumeti vel chersene. i. i. liguinis fm̄ Albuchasim, & ponant in furno panis teporato nō nimis calido, nec nimis frigido, & ibi dimittatur vsq̄ q̄ passa erit cocta:

costa: deinde extrahatur & accipiatur laminæ squillæ ita calida, & habeas paratū mortariū lapideū calidū cum pistello ligneo, & bene contendantur, postea cum peria lini subtilis exprimatur fortiter & succus extrahatur.

APPENDIX.

Non absimile apud Galeum 7. medicamentorum per Loca, est Eclegma Antio. Musæ ex Asclepiade ad Dyspnoicos in hunc sane modum.

Scillæ crudæ succum exprimito, eiq; parem mellisatici mensurant addito, & ad prunas admota coquito. Dato inde ante, & post cibum mystri mensuram.

III.

EX RADICE BRYONIAE,

vulgo Loch de Alsefeca.

Loch de alsefeca valet sicut loch de squilla, & eius modus est sicut in illo, & est medicamen expertum.

COMMEN. MANLII.

Istud loch de alsefeca nō est in vsu, ideo nō est necesse, vt ipsum describā. Fescera vero fm Mes. est vitis alba, quæ alio nomine bryonia vocatur. hæc apud Diosc. vocatur ampeloseuce, et apud herboticos cucurbita syluestris dicit.

APPENDIX.

In simplicibus Bryonicū Eclegma. Mesues ca. de Bryonia perbelle exponit, ijs sane verbis.

Ex succo Bryoniz, ac sapa, vel melle malum, vuarū paratū Eclegma ad tussim, asthma efficax, sili? Zesar cōponit.

V.

SANVM, ET EXPERTVM.

R. Cinammomi, hyssopi fœcæ, liquiritiz, an. 3. s. iuiubæ, sebestenæ, an. nume. xxx. passularum enucleatarum, ficuum siccarum, dactylorū pinguium, ana. 3. ii. fenugræci, 3. v. capillorū veneris, ma. i. anisi, feniculi, iireos, calamathi, feminis lini, an. 3. iiii. hæc oīa coquantur in lib. 4. aquæ vsq; dū remaneat lib. ii. & proiciantur super ea penidiorum lib. ii. & coquantur, & impinguetur vsq; ad spissitudinē mellis: deinde proiciantur super eum pinearum mundatarum, 3. v. amygdalarum mundatarum, liquiritiz, dragacanti, gummi arab. amyli, ana. 3. iiii. iireos, 3. ii. misceantur omnia & agitentur vsque dum nedicamen macereur, & album fiat, & referua.

COMMENTA. MANLII.

Istud loch apud nos est multum in vsu, & est sanum, & expertum ad tussim & ad rauedinem vocis.

VI.

AD caliditatem, & asperitatem pectoris, & ad tussim calidam.

R. Radicis glycyrrhizæ, 3. xv.

Chesnes pinguium, 3. ii.

Sebesten,

Iuiubarum, } ana * nume. xxv.

Decoquantur cum facilitate in. iiii. lib. aquæ, vsq; ad lib. i. & proiciatur super ipsum caliz fistulæ. 3. i. deinde coleantur a scolis, & proiciantur super illud, Rob. 3. iiii. Penidiarum, lib. s.

Deinde coquantur donec impinguntur: deinde misceatur cum isarine fibarum 3. ii. & lambatur ex eo.

COMMEN. MANLII.

Non est in usu.

Chesnes sunt passulæ sine ossibus, & meliores ex eis sunt illæ quæ veniunt de oriente, quæ satis sunt notæ.

VII.

ALIVD ex intentione nostra.

R. Seminis papaueris, 3. x.

Glycyrrhizæ, 3. vii.

† Muxa. nume. xx.

Psyliu,

Granorum cydoniorum,

Coquantur cum. iiii. lib. aquæ, vsq; ad lib. i. s. & colentur, & proticiantur super illud, Rob.

Penidiarum, } ana. 3. iiii.

Et iterum coquatur illud donec impinguetur: deinde mi fceatur cum eo, Gummi, } ana. 3. v. Papaueris albi, } Tragacanti, } ana. 3. ii. Trium granorum,

COMMEN. MANLII.

Hoc non est in vsu. Simplicia tamen quæ declarāda sunt declarabo.

Per tria grana secundum quosdam intelliguntur tria femina ex feminibus quatuor maioribus frigidis f. femina melonis, citrulli, & cucumeris, & quādo reperitur quatuor granorum, vt est in tryphera perfica quatuor femina: communia maiora frigidā intelliguntur. f. melonis, citrulli, cucumeris, & cucurbitæ.

VIII.

BONVM, confersens Hæticis, & consumptis, Phthisicis.

R. Papa. albi, spodii, feminis lini torrefacti, croci, amygdalarum dulcium, ana. 3. iiii. amyli, dragacanti, gummi, feminis, cydoniorum, feminis citrullian. 3. vi. granorum nasturcii, coctorum amygdalarum amararum, fabarum, ana. i. s. penidiorum, 3. lx. dissoluantur penidiz in aqua fontium & coquatur & conficiantur cum eis cetera.

COMMENTA. MANLII.

Istud loch in vrbe Ticinensi non est valde in vsu, sed in vrbe Mediolani magis. Ipse Mes. in cap. de phthisi quasi in fine habet vnam descriptionem ex autoritate Sabor, quod dicitur loch confersens phthisicis & consumptis, sed nō sunt eadem, nec sic fecerunt illam descriptionem.

Granis nasturcii, cōtrariū euenit ei quod aduenit ligno aloes. Nam istud per decoctionem debilitatur: immo extrahitur, illa vero sunt virtuosiora. Nasturtium vero apud Diosc. vocatur cardamus. Gale. in 6. simpl. inquit: cardamus i. crocus hortulanus, & est ex herbis pinosis. hic textus Gale. non videtur bene sonare, sed credo quod fuit error scriptoris. Nam ipsemet in 7. inquit: Cardamus i. nasturtium, & sic est fm veritate: sed sicut dicit cardamus, debet dicere cartamum. i. crocum hortulanum. Mesue inquit, granorum nasturticii coctorū nō intelligitur quod debebat coqui in aqua: sed intelligitur quod sint bene cocta. i. matura ad solem.

IX.

AD ASTHMA BONVM.

R. Squillæ assatæ, 3. iiii. radicis lilii celsæ, 3. ii. hyssopi, praef. an. 3. i. myrrhæ, croci, an. 3. s. confice cum melle, & fiat.

COMMEN. MANLII.

Istud loch apud nos est multum in vsu. idem in capit. de asthma habet vnam aliam descriptionem ex autoritate Ioan. Serap. quæ eadem est. De modo assandi squillam, vide supra vbi ostentum fuit.

X.

DE AMYGDALIS.

R. Amygdalarum dulcium, & amararum, feminis lini torrefacti, granorum lini, anisi, dragacanti, gummi arabici, succi liquiritiz, & radicis eius, an. 3. i. s. zuchari, penidiorū, ana. 3. iiii. conficiantur cum melle, & succi feniculi, & succi apii prius bullitorum quantitate sufficienti.

COMMENTA. MANLII.

Istud loch apud nos est in vsu. Amygdala fm Isidorum apud Græcos idem sonat quod latine nux longa: hanc alii nuclicam vocant, quasi minorem nucem. Amygdala etiam pro morbo aliquando accipitur, & sunt duæ eminentiæ iuxta radicem linguæ in faucibus similes capitibus namillarū, & dicuntur branci.

SECVNDVM EVNDEM IN SVA PRACTICA.

XI.

DE ALLEIS, in cap. de tussi humida.

R. Alieorū mundatarum, lib. s. & elixa ea in aqua decoctio nis cicerum & hyssopi sicce vsque dum sint bene cocta: de-

Lumi. Ma.

H 2

* ali. xv.

† Sebesten
oiliis.

SECTIO III. LOCH

ur & teratur allea sicut medulla, & proice super ea mellis & butyri, ana ꝑ. vi. & decoquantur lento igne usq; ad termi-
num loch. & utere bonum est.

COMMEN. MANLII.

Istud loch apud nos non est in usu.
Allium em Isido. in cap. de oleribus dicit: Allium dictum
quod oleat, vlpicum appellatum, quod alij odorem habeat
Papias inquit: Allium dictum quod oleat, cuius odorem ue-
nenata ferre nō sultinent, leo quoq; & pardus fugiunt, cor-
poribus tamen humanis salubre est. Nam sui calore dedu-
cit, & interius medicatur doloribus, oculis vero i cibo cre-
brius sumptum caliginem inducit. Auicenn. in ꝑ. v. cano, habet
unam aliam descriptionem quæ eadem est.

XII.

DE CAULIBVS in eodem cap.

ꝑ. Succu caulium lib. v. lento igne coque auferendo spumã
eius usq; dum redeat ad lib. ii. deinde coquantur cum rob. i.
multo cocto, siue sapa & mellis lib. i. usque dum ingrosses-
tur. & bonum est.

COMMEN. MANLII.

Istud loch apud nos est multum in usu. Ioan. Sera. in suo
breuiario in cap. de phthisi absq; febre habet unam aliam
descriptionem, & est fere eadem.

Caulis a Græco caulos quod est hasta hastile, & virga vi-
rilis, fueritrum, unde caulis est tirfus cuiuslibet plantæ. Iso-
do. inquit: Caulis est generatiter herbarum & olerum me-
dius frutex qui vulgo tirfus dicitur, quod a terra sursum cõ-
scendat, hinc autem generale nomen: omnis enim frutex cau-
lis dicitur: Caulium autem genera quinque: cumanium, scilicet
Pompeianum, Arcinum, Sabellicum, Brucium. Apud
Diosco. caulis vocatur brassica.

XIII.

DE PVLNONE VVLPIS.

in cap. de phthisi.

ꝑ. Pulmonis vulpis fisci, succi liquiritiæ, capillorum uene-
ris, feminis fœniculi, ana ꝑ. iiiij. confice cum zucchero deco-
cto cum aqua quantum sufficit, & quandoq; conficitur cum
rob myrtino, & est confortatium amplius.

COMMENTA. MANLII.

Istud loch apud nos est multum in usu: secundũ intentio-
nẽ Mes. & est medicamẽ Gal. Aui. decima tertiũ. in ca. de cu-
ra ulcerum pectoris, & cura phthisis habet unam aliam de-
scriptionem quæ est eadem: sed Lumen maluelens inquit:
Loch de pulmone vulpis magistrale: uidelicet quod non re-
peritur ab authoribus, sed falsa est opinio sua. Nã uide quod
sua descriptio est eadem cum ista. Præterea Nico. Florẽ. in
lib. 3. capi. de catarro & coriza ponit ad literam loch de pul-
mone vulpis, & ibi nec addit uel minuit aliquid: immo
est eadem descriptio. Pulmonẽ vulpis antequã administretur
in medicinis oportet primo pparari. Et modus eius est
quod accipias pulmonẽ vulpis & mundetur optime & inci-
datur per uenas: postea abluatur cum uino albo odorifero
parum calido, hoc fiat tantum quod pulmo vulpis efficiatur
sine putredine: postea ponatur in olla & excicetur in furno
leuite calido, & post ipsius excicationem referuetur, sed
prius inuoluatur cũ abstinio, & utere ubi oportet: ait pul-
mo vulpis cum uino nigro asthmaicis subuenit.

Vulpes est animal satis notum. Isido. dicit: Vulpes dicta
quasi uolupes: est enim uolubilis pedibus, & nunquam re-
ctis itineribus, sed tortuosis fractionibus currit, fraudulẽt
animal insidiosq; deinceps. Nam dum non habuerit escam
fingit mortem: sicq; descendẽtes quasi ad cadaver uolucres
rapit & deuorat. hoc apud Arabes uocatur thaleb. Sera. in
cap. de amygdalis inquit: & quando uulpes comedit amygd-
alam amaram cum aliquo cibo moritur. Mes. ac Auic. uo-
lunt quod prædictum loch conficiatur cũ zucchero: sed hoc
di. generaliter conficitur cum melle: etiã Nico. uult quod
conficiatur cum zucchero. Mesue inquit: Etiam si conficitur
cum rob myrtino est confortatium optimum.

EX SERAPIONE.

XIIII.

DE SEMINE LINI, ad illud qui tulsit in Antidotario.

ꝑ. Seminis lini torrefacti. ꝑ. iiiij.

Confice cum melle, & fiat loch.

COMMENTA. MANLII.

Istud loch est multum in usu: tamen ego uidi ipsum fieri
ex farina feminis lini nou torrefacti, & melle, & est mirabi-
le ad tussim peruerum. Auicenn. in ꝑ. v. can. in tract. 5. de alloho-
cat ad spiritalia habet loch ad tussim ficam, & est idem
cum descriptione Serap. Linum. s. semen medicinx aptum
est ad multa. Isido. in ca. de linis inquit: Linum ex terra spe-
cie mittenti oritur: de fluxuq; nomẽ eius ex Græco est. Nã
linũ Græci linarin dicunt, siue quod sit melle & leue. Petr-
de Crescen. in cap. de canapis dicit: quod est de natura lini,
torrefit autem semen lini sicut alia semina.

EX AVICENNA.

XV.

ALBOTIN, in v. cano.

ꝑ. Seminis lini torrefacti, passularum mundatarum an. li. i.
amygdalarum pini, amygdalarum dulcium, amygdalarum
amararum mundatarum, ana ꝑ. vi. auellandarum torrefactarũ
glutinis albotin, radicũ lilii coelestis, ana ꝑ. j. mirrhæ, croci,
thuris masculi, ana ꝑ. s. tere & cribellentur & inuoluantur
cum lacte asinino, & conficiatur cũ eo, & fiant trochisci, &
excicentur in ymbra: deinde terantur & conficiant cũ melle.

COMMEN. MANLII.

Istud loch apud nos non est in usu.

Albotin uero terebenthina quæ alio nomine largatũ di-
citur, & grauius ipsius secundum Aui. in. 2. can. uocatur gra-
nũ uiride: secundũ Circa inlans trebenthina melior est alba
nel citrina & clara sine putredine, per centum annos serua-
tur. Serap. in cap. de terebenthino dicit, quod sunt duæ spe-
cies. s. domestica & syluestris. Domestica est botin secun-
dũ ueritatem, & fructus eius est granũ uiride. Et syluestris
est lentifolius, & ambræ habent gummi. Gal. in suis secretis in
ca. de dolore capitis & splenis, & multorum aliorũ inquit:
Cere elchalimbac, id est terebenthina uel albotin.

Amygdalæ pini sunt grana ipsius uel semina quæ alio no-
mine nuclei pinearũ dicuntur: Græci uero dicunt strobilia.

EX OFFICINIS.

XVII.

DE FARFARA MAGISTRAL E

Recipe, Radicum farfaræ ꝑ. vi. lauentur bene a sordibus
earum: deinde bulliant bene donec sint bene coctæ: deinde
bene pistentur, prius cum dicta aqua dissoluantur zucchari
lib. i. s. coquantur usque ad formam electuarii: deinde adda-
tur pinearum mundatarum ꝑ. i. s. passularum ꝑ. ii. pistentur
in mortario lapideo, & misce cum syrupo supra scripto: de-
inde adde croci, garyophyllorum, ana ꝑ. s. succi liquiritiæ. ꝑ.
j. gr. xv. cinnamonomĩ, macis, ana. ꝑ. i. misce, & fiat loch in
forma bona.

COMMEN. MANLII.

Hoc medicamen in Papiã nõ est in usu. Immo magis est
in usu in partibus Mediolanensib, sed descriptio ipsius ab au-
thoribus non reperitur: Farfara uero f. modens est ung-
ula caballinã, siue ut alij dardanum uocant, species ipsius
duæ sunt: una est iã proxime dicta, altera uocata nenuphar:
utraq; in aquis nascitur, una cum flore albo, altera cum flo-
re rubeo, ut dictum fuit supra in electuario de farfara.

Peroratio in tertiam Sectionem.

Pertecimus fauore domino hanc sectionem de loch: pro-
sequamur nunc circa sectionem syrporum iulep: præstet
igitur altissimus nobis gratiam, & sub umbra alarum suarũ
protegat nos. De iulep, syrpus ac rob. Secundum d. Mesue
& alios doctores per ordinem, si Deus uoluerit describam
quæ sunt in usu, & quæ non.

L V M I N. M A I O R I S

SECTIO Q V A R T A.

ZVLAPIA, uel cum officinis IVLEBOS, seu IVLEPOS, E MESVE continens.

I.

ROSATVM ex infusione rosarum, febrium adustioni confersens.

Rx. Aquæ infusionis rosarum, lib.v.

Zucchari, lib.iii.

Coquantur cum facilitate, & administretur cum aqua frigida.

COMMEN. MANLII.



IVLEP uel Iulep Arabice est syrup⁹ simplex & sola aqua & zuccharo uel adhibita aliqua parte aquæ rosacæ, ut inquit Io. Ser. 17. Gê. sup. 5. cā. Aui. dicit: Iulep Arabice, i ubel Græcè ē syrupus ex sola aqua rosata uel cōi & zuccharo. Itud iulep apud nos ē multū in usu, sed nō uicimur sub noie iulep; uerū est q⁹ facimus & fa

cere debemus & utimur sub noie syrupi rosati ex infusione rosarū, & pūctā infusōne ipse docet inferius: qñ uero medicus ordinat iulep nō intelligit de ista descriptiōe, sed illud iulep quod utimur apparebit infra sub nomine iulep aliud rosarū Nic. ponit syrupū rosatū cuius infusio eadē est cum illa Mesue, tamen in dosi non concordant.

Infusio rosarum est illa quam docet idem sub nomine: operatio infusionis rosarum, aut uiolarum. hic annexa.

II.

INFUSIO ROSARVM & uiolarum.

Rx. Foliorū rosarū, aut uiolarū rectitū lib. vi. ponantur in uale uitreato terreo stricū orificiū et fundatur sup ea aquæ calide lib. xv. & stringatur orificiū uasīs & dimittatur p horas octo, uic denuo colent, & in uale iterum tātūdem foliorū rosarū rectitū, aut uiolarū imitantur, & denuo eadem aqua calefacta super ea mittatur, & stringatur orifi cum sistr per octo horas: deinde coletur, & si conseruare uo lueris, ponatur in uale uitreato stricū orificiū, & distilletur oleum in orificiū eius, & stringat caput eius, & exponatur soli diebus. xl. & dr illud mucharum rosarum, aut uiola.

COMMEN. MANLII.

Hæc operatio infusionis rosarū aut uiolarū ē illa de qua fit syrupus rosatus ex infusione rosarum, et illo modo fit infusio uiolarum pro faciendo syrupum violatum ex infusione uiolarum ut dictum fuit supra, & qñ prædicta infusio est completa pōt conseruare in uale uitreo et nō in uase terreo, quia putrescit, & in hac infusione zuccharo dissoluto & cō cto secundum artem possunt fieri confectiones, & alia est ut diarodon descriptione communi, & ita de aliis.

III.

VIOLATVM ex infusione VIOLARVM, confersens ad febrem, & inflammationem; & asperitatem pectoris, & tussim, & pleuritidem, fit ut IVLEPVM rosatum.

COMMEN. MANLII.

Iulep, ut dictum fuit, est syrupus simplex ex sola aqua et zuccharo. Et ppter id dominus Mesue dicit iulep uolatū quod fit ex infusione uiolarum, & nos facimus & nomina mus syrupum uolatum simplicem sue syrupum uolatum ex infusione uiolarum Et eius modus est sicut modus syrupi rosati, hoc est quod pro lib. v. infusionis uiolarum addatur lib. iii. zucchari, & fiat syrupus uolatus ex infusione, et est ille de quo intelligit quado medicus ordinat iulep uolatum simpliciter. Infra apparebit una alia descriptio quæ uocat syrupus uolatus compositus qui etiam in usu est, etiam apparebit aliud iulep rosatum uel uolatum, & sicut erit quæ ex aquis distillatis & non per infusionem.

IIII.

ROSATVM e succo rosarum.

Rx. Aquæ rosarum lib. iiiii.

Zucchari, lib. ii.

Et fiat iulep.

COMMEN. MANLII.

Itud iulep quod fit ex aqua rosata distillata ab elambico est illud quo utimur pro iulep rosato, & est illud de quo intelligitur quando absolute ponitur, duæ descriptiones iulep posita fuerunt quæ sunt ex infusione florum, siue rosarum siue uiolarum, & nominantur suo nomine. Aui. in. s. can. etiam docet facere iulep cum aqua rosata.

V.

VIOLATVM e succo uiolatum.

Rx. Aquæ uiolarum, lib. iii.

Zucchari, lib. ii.

Fiat ut supra.

COMMEN. MANLII.

Siue modo iste iulep debet fieri ex aqua uiolarum distillata sicut fit iulep rosatum, quod etiam in usu est, in fundo uasis iulep uolati uel rosati aliquando inuenitur zuccharū induratum in fundo uasis, quod uocant modernī candum uiolatum uel rosatum.

VI.

ALCHESMES, in Mesue practica cap.

sermo in aqua cicurum &c.

Rx. Alcheshmes, & decoquatur in aqua, decoctione sufficienti, & recipe huius aquæ partem i. penidiorum parrem. s. de coquantur usque dū sufficiat, secundum eundem modum fiat iulep.

COMMEN. MANLII.

In usu non est. Alcheshmes uel cheshmes scriptum ut hic cum litera. s. sunt passulæ sine arillis, fed chermes scriptum cum r, est grana cum qua tinguntur panni & apud Dios. uocatur coccus.

* Succum alii legunt, uerum nō abre aqua substatuimus, cū e succo in uisū minime existat quod & in rosatū ad notationē uo lunt.

L V M I N. M A I O R I S

SECTIO Q V I N T A.

SERAPIA, uel ut uulgo SYRVPOS ex quam plurimis Authoribus continens.

E M E S V E.

I.

DE POMIS SIMPLEX.



ECIPE succi pomorum dulciū & acetosorum, an. lib. v. coquantur succus usque ad consumptionē medietatis ipsius & dimittatur per dies. ii. usq; dū clarescat: deinde colet, & cū lib. iiiii. zucchari fiat syrupus, & sunt qui submergunt in succo scitā tinctā ex chermes an succi depurationē, usque dū rubeat & recipeat uirtutem

tincturæ, & est excellentior.

COMMEN. MANLII.

Iste syrupus apud nos est multū in usu, & maxime scdm istā descriptionē qua dicitur syrupus de succo pomorū uel syrupus de pomis simplex ad differentiam alterius, descriptionis quæ uocatur de pomis compositus, de qua infra.

Succus fm lido. in cap. de potu dictus est quod succo ex primatur ut prisanx Plin. in ca. de generibus succorū et de odore ait: Interim quæ sunt cōia ex pomis omnibus, succis saporū genera tredecim reperitur, dulcis, suauis, pinguis, amarus, austerus, acer, acutus, acerbus, silis &c.

Mesue inquit q⁹ sunt alii qui submergunt scetam tinctā

Lumi. Ma.

H 3

SECTIO V.

ex chermes in isto syrupo, & est excellentior, sed raro apud apothecarios fit per illum modum.

APPENDIX.

Perfimilem sane compositionem Aegineta li. 7. cap. 15. abunde explicat, uerum ex cydoniorum succo, quamquam nonnullis in compositionis calce, cōsimiliter ex malis dulcibus Hydromalon (sic nanque compositiones ambe inscribuntur,) componere affirmet, is nempe uerbis.

Hydromalum ex succo Cydoniorum.

Malorum cydoniorum conciliorum, purorum, libræ. v. in aquæ fontis sextariis decem, transper elixato, dum subiuga reddantur, et tabescant, & sublata ab igne, refrigretaq; exi me, & expresso cremore, mala proice, aquæ mensuræ, mellis quantitatem dimidiam admisce, & rursus assidue despumando, donec octaua pars euascescat, decoque. Sunt uero nonnulli qui Hydromalon ex malis dulcibus cōsimiliter cōposuerūt. Mel autem loco sacchari Paulus habet, cū anti quiores olim zucarum latuerit, at si hæc Pauli compositio ex zucharo paretur, aptiorem Syrupum inueniemus.

II.

DE PYRIS.

Syrupus de Pyris, fit ut syrupus de Pomis.

COMMENT. MANLII.

Non est in usu.

Auic. in. 5. can. habet nūā aliā descriptionem quæ eadem est: id. in. 4. can. in fen. i. in cap. de cura morbilli laudat ipsum sub nomine syrapi de altelea. Nam altelea ut exponitur in suis synonymis sunt pyra, & syrupus de altelea. i. de pyris, ut exponit etiam Ioan. Arculanus super illo passu.

Pyrus uocata vr quōd in ignis speciem sit formata: Nā hoc genus pomi ab amplo incipit, & in angustum finit sicut ignis: pyrus autem arbor, fructus eius pyra sunt.

III.

DE CYDONIIS.

Syrupus de cydoniis ualet sicut syrupus de pyris, & est idem modus utriusq; hoc est pro qualibet lib. i. succi cydoniorum purificati adde lib. i. s. zuchari, & fiat secundum artem, & uocetur syrupus de succo cydoniorum.

COMMENT. MANLII.

Cydonium uero est fructus facis notus. Mes. habet hic syrupum de cydoniis qui apud quosdam est miua cydoniorū, simplex: tamen idem iterum ponit descriptionem miuæ cydoniorum, quæ potest fieri cum speciebus, & sine speciebus. Auic. in. 5. in distinctione de syrapiis habet syrupum de cydoniis, & dicit quod est miua: quidam sapientes dixerūt quod si necessitas fuerit in operando loco syrapi de succo cydoniorum potest dare miua cydoniorum sine speciebus, tamen differunt inter se.

APPENDIX.

Hoc recētiore quidam *μυλαζουλαπρον*, atq; *νυδονη αν γυλισμα* appellant, & Miua cydoniorum simplex aliis uocita tur, quamquam inferius e Mesue miua sine speciebus, & cū speciebus describitur. Aegineta quoq; hunc Hydromelon inscribit, ut antea numero. i. annotatum fuit, ubi & compositionem ad uerbum conscripsimus.

III.

DE SVCCO ACETOSE.

R. Succi acetosæ purificati, lib. iiii.

Zuchari, lib. ii.

Fiat syrupus secundum artem.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus est multum in usu.

Acetosa uero ē herba satis nota, cuius hortus est in pratis, folia ipsius dum sunt uiridia manducantur. apud Dios. & Sera. uocatur lapacium, sicut pater si legatur utriusq; ca. de la pacio cum acetosis apud Au. Gui. Placen. inquit: Ribes. i. acetosa uel acetofella. hic textus Guille. est falsus. Nam ribes non est acetosa, sicut patet per Serap. ac Auicem. qui de utraque ca. faciunt. uerum ad necessitatem unum p. o. alio potest poni, tamen idem non sunt.

V.

DE SVCCO CVRCVBITAE.

R. Curcubitam magnam, & inuoluatur pasta, & decoquat in furno, ut recipe expressionis eius lib. v. zuchari albi lib. iiii. misce, & fiat syrupus.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus non est ualde in usu. Cucurbita uero communiter satis est nota: reperitur alia cucurbita dicta sylvestris apud herbaricos: & hæc apud Dios. uocatur ampelos leuca. i. bryonia.

VI.

DE GRANATIS ACETOSIS

ualet contra febres cholicas.

R. Succi granatorum dulcium purificatorum li. v. zuchari albi lib. iiii. Fiat syrupus secundum artem.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus secundum plurimum est ille qui nobis est in usu: tamen qui idem describit unam aliam de granatis dulcibus ambas describam.

Granatum malum. i. pomum granatum. Sera. ca. de granatis ex autoritate Gal. inquit, quod sunt ex eis acetosa et dulcia, & uirtus cuiusq; eorum est secundum suum saporem, & sapor totius granati & granorum ipsius est plus stypticus quam sapor succi eius, & plurius delicatioris reperitur aliud granatum cuius sapor est *mucus*, scilicet cuius sapor est mixtus ex dulcedine & acetositate.

VII.

DE GRANATIS DVLCIBVS.

R. Succi granatorum dulcium purificatorum lib. v. zuchari lib. iiii. & fiat ut supra: sed sunt qui immergunt in succo feta tinctam ex chermes. i. grana cum quibus tinguntur pāni, & est excellentior inter has duas descriptiones syrapi de granatis, sed secundum plures prima est nobilior.

COMMENT. MANLII.

Petrus de Crescentiis inquit: Mala punica sunt mala grana nata quæ nota sunt, ex quibus quædam sunt dulcia, quedā acra, siue acetosa, quedam mediocrius saporis inter dulce & acrum composita.

VIII.

DE CORTICIBVS CITRI.

Recipe corticū pomorū citri recentium, lib. i. decoque cum lib. v. aquæ fonticum usq; ad consumptionem duarum partium, & cum lib. i. zuchari fiat syrupus & condiaur. i. aromatizetur cum gra. iiii. musci, & sunt qui in uleup proiciunt ex corticibus citrorum partes cōuenientes, & prius quando incinatur complexioni cocturæ eius, est delectabilis, & quando submergitur in aqua decoctioni citri sera tincta ex chermes. i. grani tinctorum, tunc est excellentior.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus apud nos est in usu. Citrum uero apud Arabes uocatur hategi. Ser. in ca. de citro ait ex autoritate Gal. fructus huius arboris nominat in Græco pomū aquæ. Idem in. 7. inquit: Mille medica. i. citrus huius fructus non dū pomum medicum, sed citrum ab omnibus nominatum.

IX.

EX ACIDO CITRI SVCCO,

uulgo de acetositate citri.

R. Succi acetosificati citri, lib. xii. decoque in uase uitreato super prunas cum facilitate usque dum consumatur tertia pars ipsius: deinde coles & dimittatur donec clarificetur. Et accipe ex eo quod est clarum lib. vii. & funde super ipsum ex uleup claro & depurato li. v. & coquatur donec inspissetur: si autem altas fuerit, dimittatur in sole donec eius acetositas consumatur.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus de acetositate citri est multum in usu, & debet fieri cum magna diligētia, apud nos generaliter faciūt ipsū in hyemali tempore apud festum Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi, quia illo tempore citri deferūtur ex Iannua ad nos tunc faciunt syrupum.

X.

EX OMPHACIO, officinis de agresta.

Syrupus de agresta fit ut syrupus de acetositate citri, & quidam condunt cum garyophyllis.

Com-

COMMEN. MANLI.

Iste syrupus est in usu. Auice. in .5. cañ. habet unam aliam descriptionem, & est fere eadem. Etiam Franciscus de Pedemontio in cap. de cura male complexionis stomachi cum materia simplicis, & composita habet unam aliam descriptionem quæ eadem est cum illa. d. Auic.

Mesue dicit quod modus operationis eius est sicut syrupi de acetositate cytri, & sic est quod accipiantur lib. xii. succi vuz acerbæ & decoquantur lento igne, vel ponantur ad solem vsq; ad consumptionem tertii partis: deinde coletur & dimittatur donec clarescat, tunc accipe ex co. f. succo qñ erit clarus lib. vii. zuch. clarificati sicut uleup. lib. v. & coquant simul vsque ad perfectam cocturam & seruentur.

Vuz plura sunt genera, sed hic intelliguntur illæ, quæ in colore sunt citrinæ & ruffæ: & dicunt sapientes quod prædictæ vuz debent esse ex illis ex quibus fit agrestis. Albuchasim in trac. 2. docet modum extrahendi succum vuz acerbæ. Petrus de Cres. inquit, Agrestium sit duplex liquidum & siccū agrestium liquidum sit hoc modo, cum vuz sunt acerbæ vsque ad debitum vel quasi penenerint ad Augustum colliguntur, & pistantur, & in malleum vel tinam vel aliud vas ponuntur ad solē, & in eis aliquid de sale ponatur: postquā duos dies vel tres ad solem iteriter, accipitur luccus & repositus vsui referuatur: & quidam sal non ponunt, sed cū eo melius referuatur &c. ibi etiam docet facere agrestis siccū.

APPENDIX.

Huic affinem ex Onphacio componē tūm ab Actio, tum ab Eeginetæ, tum etiam ab Actuarij fusissime habemus, sicuti iamiam ordinatim oculis subiiciemus, cum tamen Paulus atq; Actius mellis ratione in descriptionem variant.

OMPHACOMELITIS præparatio,
ex lib. v. cap. cxxiii. Aciri.

Botri vuz acerbæ accipiuntur qui iam maturefcere incipiunt: deinde in domo teperie moderata ad bidduum vel triduum expandantur, & ressecati exprimantur, & liquor in vase vitreo excipiantur, & optimi mellis desumpati pars vna ad tres succi partes admisceat, & ad dies aliquot ad solem exponat hoc pharmacū donec feruere desierit, acque uerit: deinde in domo superiore feruetur ne putrescat. Hæc autē proportio tibi pro regula fit in optimo melle, & optimo vuarum acerbarum succo. Augebis autem & minues quantitatem mellis pro tenuitate aut crassitie succi.

OMPHACOMELITIS breuissima concinnatio. ex lib. vii. cap. xv. Aeginetæ.

Vuz immaturæ succi sextarios treis.

Mellis sextarium.

Mixta per quadraginta dies in solem exponito, siue igne decoquito.

Ex Actuario.

Succi vuz acerbæ libram. i.

Sacchari lib. ii.

Vtrum bellissima est Actij præparatio, quam alijs etiam nobiliorem facimus, quamq; probe parari posse censemus, modo zucharum mellis loco substituitur, vt Mesue Omphacium protius æmuletur.

XI.

DE GRANIS MYRTI.

R. Succi granorum myrti purificati, lib. vii.

Zuchari albi, lib. v.

Fiat syrupus secundum artem.

COMMEN. MANLI.

Iste syrupus apud nos est in usu. Myrtus est arbor, semen vero ipsius dñ myrtillus spēs eius dux fuit. f. alba & nigra idem posses dicere domesticā & agrestis Domesticā vero est myrtus quæ semen nigrū habet. Agrestis est cubebæ, quæ alio nomine myrtus alba appellatur, & ambæ sunt notæ.

APPENDIX.

Hunc belle expressit Aeginetæ lib. vii. cap. xv. ac myrton appellat, ijs nimirum verbis.

Lyræti præparatio.

Succi myrton sextarios treis.

Mellis sextarium.

Ad consumptionem vsque tertie partis decoquito, At ipse ex melle facit, nam zucharum nescibat.

XII.

DE DATILIS, vulgo albelac.

R. Albelac & enucleentur & cōcērantur & coquantur vsque ad consumptionem duarum partium, & fiat syrupus cum zuccaro secundum artem.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus apud nos non est in usu. Io. Sera. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem albelac vel belac: sñm opinionem plurium doctorum sunt dactyli immaturi: alij dicunt quod sunt anacardi, quod ignoro. Matr. Syl. inquit: Albelac est ipēs dactylorum, & sunt dactyli immaturi. i. acetosi. Nicol. Flor. in lib. 4. in cap. de squinantia dicit: Albelac. i. aldela. i. dactyli immaturi: & hæc communis est opinio.

XIII.

DE PAPAVER.

R. Papaueris albi & nigri, & propriæ capitum eorum añ. 3. lx. & decoquantur in lib. iiii. aquæ pluuialis usq; dum redeat ad li. & 5. & cum zuccari albi, & penidiorum, añ. 3. iiii. & fiat syrupus.

COMMEN. MANLI.

Iste syrupus sñm intentionem doctorum non est ille quo utimur, sed ille quo utimur est syrupus de papauere compositus, cuius descriptionem idem describit, de quo infra. Nic. habet unā descriptionē, sed non est in usu. Auic. habet duas in .5. cañ. sed non concordant cum ista nec in usu sunt. Miror quod illud Lunen uel uerius tenebra apothecariorum poluerit descriptionem syrupi de papauere ex auctoritate Mes. sed non concordat descriptio sua cum illa domini Mes. Rasis in lib. diuisionum in cap. medicinarum tussis, asthmatis, & sanie habet unam aliam descriptionem, sed non est eadē.

Papauer quando simpliciter repetitur de semine papaueris albi intelligitur, Macer inquit:

Dicunt uim gelidam speciemq; pauperis esse.

Tres illi tribuntur species, flos uinis abus.

Alterius roseus, rubeus, pauensq; minoris.

Flos est, hanc uulgo dicunt agrestis papauer.

Nobilior cunctis est semen quæ gerit album, & florem, hoc est notum.

XIII.

BIZANTHINVS, vulgo syrupus Dinarij hoc est, de Bizantijs.

R. Succi endiuiz, succi apij, añ. lib. ii. succi lupuli, succi boraginis, aut buglossi, añ. lib. i. bulliant ebullitione una, & de spumetur & depurentur. Reci. eorum depuratorum li. iiii. zuchari tabazret. i. albi lib. ii. 5. & coquantur cum facilitate donec fiet syrupus, & qñq; ad omnem partem succi depurati ponitur acetū boni & clari pars. 5. & quandoq; bulliat in succis foliorum rofarum. 3. ii. liquoritæ. 3. 5. spicæ nadi. 3. ii. anisi, feniculi, seminis apij, añ. 3. iiii. & est mirabilis.

COMMEN. MANLI.

Iste syrupus est in usu, sub noie syrupi de bizantijs, non aut dicit syrupus de bizantijs, quod in ipso blatæ bizantiæ ingrediuntur, sed potest dici de Bizantijs a loco quodā nominato Bizantium in confinio Macedoniæ, ut dicit Gentil. super. 5. can. Aui. Dios. aut in cap. de purpura marina. i. blatabizantiæ aut, q Bizantiū est quidam locus in quo primum inuenta fuit blattabizantiæ: & ideo Bizantiā a quodam loco pōt appellari. Papias etiam dicit: Bizantium est urbs Thraciæ a Pausania rege Sparthonorum condita: post a Constantino principe in maius aucta, Constantinopolis nuncupata, est totius caput orientis. Ioan. Torrellius inquit: Bizantium prima cum y grecos, sequente z. consonante penultima cum t, exili. & y latino scribitur, urbs est Thraciæ maritima, a Pausania Sparthanorum rege prius condita, ut testatur Iustinus lib. 5. epithomatis. 9. nunc uero Constantinopolis a Constantino Imperatore qui eam adauxit & exornauit uocatur. Idem etiam notat supplementum chronicarum lib. iiii. etiam alio uocabulo potest dici q Bizantium est genus denarii uel ducati unde Guarinus Veronenfis ait: Bizantium uel Bizante olim dicta est Constantinopolis, inde Bi-

S E C T I O V.

zantiis Bizantia Bizantium, vel Bizanteus Bizantia Bizantium. Constantinopolitanus, hinc etiam adhuc moneta istius civitatis dicitur hic Bizanteus vel hic Bizantium. & sic Mel. vult q. per Bizantium intelligamus denarium. & hoc quia iste syrupus apud medicos est carissimus, & est apud in firmos pp. utilitatē quē reperitur in ipso ficut Bizantii, vel denarii sunt charissimi apud homines: & iste syrupus potest fieri cum aceto & sine, sed sine aceto est magis in usu.

Si autem syrupum de bizantiis cum aceto facere volueris, addatur q. qualibet lib. syrupi de bizantiis sine aceto l. s. acetum boni, & iterū coquatur q. tunc appellatur syrupus de bizantiis cum aceto, sed q. doctor ordinat syrupum de bizantiis simpliciter de illo qui fit sine aceto intelligit, & illos succos qui in ipso ingrediuntur oportet cōseruare p. totū annum ad necessitatem trochiscorum de eupatorio ac aliorum.

XV.

ACETOSVS SIMPLEX.

R. Zuchari boni albi lib. v. & funde super illud in vase lapideo aquę fontici dulcis & clarę l. iiii. & decoquat semper abiciendo spūmā eius, & fit ignis in quo coquitur prunarū aut tenuis flāmę sine fumo & decoque hoc modo donec clarificet & diminuta sit aqua sicut mediētās eius d. deinde funde super ipsum acetū vini albi clarū l. iiii. & forti l. iiii. & in mediocri l. iiii. & da ei post illud pfectionē & cocturā.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus est multum in usu. Mef. dicit: Sermo in syrupo acetoso dicitur, q. iā magnificata est iure verificatores virtus syrupi acetosi, & excellētia eius. l. in cōitate & posse ipsius in materiis calidas & frigidas, & subtiles & grossas, & viscosas siue adherentes &c. Iste est syrupus acetosus simplex. Gale. in lib. secerro. habet vnam descriptionem syrupi acetosi quod cōservatur sanitas corporis, sed non sunt idē. Auic. in 5. habet multas descriptiones, sed non sunt in usu.

Acetum. i. oxos, oxī vero Græce est acetum. Serap. ca. de aceto ex auctoritate Dioscorici quod infrigidat & itypicet & est bonum stomacho, & prouocat appetitum. Petr. de Cre scen. docet qualiter fit acetū & de virtute et. Liber qui dicitur Albuchasis in tract. 2. in cap. de præparatione medicinarum quæ fit ex plantis inquit: Modus distillandi aquam ex squilla quæ occidit mures & quæ ponit in medicinis, ex qua fit syrupus acetosus hic intelligitur quod ex aqua distillata ex squilla debet fieri syrupus acetosus, sed ista non est intentio Mef. ipse dicit: Acetū vini albi clari, & non dicit aquam factam ex squillis, vt vult Albuchasis Gal. in suis fecretis dicit: Saturēli. i. acetum acetosum, & hoc est in cap. de stricture antheilus & doloris stomachi.

APPENDIX.

Ex Galeni oxymelite hanc syrupi. acetati simplicis imaginē. Mef. belle sumptit, cum in nullo differant, nisi quod (vt infra suo loco exponemus) mellis loco, saccharū. Mef. accipit.

XVI.

ACETOSVS cum radicibus.

R. Aquę fontium clarę lib. x. & proice super ipsam radices foeniculi, apii, endiuiz, an. 5. iiii. anisi, feminis foeniculi, apii, an. 5. viii. feminis endiuiz. 5. s. coquatur cum facilitate vsque dum veniat ad lib. v. tunc proice super ipsam zuchchari boni lib. iiii. & clarificetur sicut prius: deinde funde super ipsum acetū boni quantitatē sufficientem iuxta modum superioris doctrinæ, & da vbi oportet.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus est in usu, sed non vtiuntur sub nomine syrupi acetosi cū radicibus generaliter faciūt & facere debet apothecarii sub nomine syrupi acetosi cōpositi, vel sub nomine syrupi de duabus radicibus, tñ Mef. habet tres radices, quod non est consonū, sed error hic est q. radices cōes sunt ad nūmerum quinq. videlicet foeniculi, apii, petrosilii, brulci, & alparagi. de quorum ex istis quinq. nisi duæ ingrediuntur in istū syrupo, & ppter id nominatur syrupus de duabus radicibus. Endiuia vero non ponitur in numero istarum quinq.

XVII.

DE CANNIS.

R. Succī grano. ū dulcium lib. iiii. aquę malo. ū de feni, aquę

canarū zuchchari, aut penidiorum, an. lib. i. s. & fiat syrupus.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus non est in usu. Mef. habet syrupum de cannis s. de canna de aqua fit zuchcharum, quidam mel cane vocāt. hæc in Sicilia partibus reperitur. Sicilia insula est ppe Sardiniam, ab oriente cingitur mari Hadriatico, a meridie Africæ & ab occidente. forma cānarum zuchchari est sicut forma cannarum mel illic foris & intus, sed canna melius dulcem guillum reddit: canna vero mellicæ habet contrarium.

Malum feni siue mororum de feni sunt moroni grossi de quo fit diamoron.

XVIII.

DE PORTVLACA.

R. Succī endiuiz cocti & depurati lib. iiii. femin. portulacę 5. xii. teranur femina & fundantur super ea succus & dimittantur in vase lapideo per diem & noctem, & coquatur cū facilitate vsq. ad medium, & addas zuchchari lib. iiii. fiat syrupus, & quandoq. additur acetū lib. i. aut succi malorum granatorum acetosorum lib. i. s. & fiat syrupus.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus non est valde in usu, & pōt fieri per duos modos, videlicet si accipiatur succus endiuiz coctus & depuratus & addas zuchcharū: tñ est syrupus de succo endiuiz, si autem addas alia, tunc est syrupus de portulaca.

Portulaca secundum Circa instans habet maiorem efficaciam viridis quam sicca. Serap. cap. de portulaca nominatur herba fluita & parpiella. Hæc apud Dioscor. vocatur, andrachine Macer ait, Andrachinis Græce quæ portulaca latine dicitur, hæc vulgi pes pullimoræ uocatur.

XIX.

VIOLATVS, vulgo de Violis compositus.

R. Violarum 5. ii.

Cydoniorum, an. 3. viii.

Malux,

Iuiubarum, 5an. numero. xx.

Sebelsten,

Coque cum 1 lib. i. aquę cucurbitę, usq. ad tertiam partem, & cum 1 lib. i. s. Zuchchari fiat syrupus.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus est in usu, sub nomine syrupi de uiolis cōpositi, sed quādo doctor simpliciter ponit, R. syrupi de uiolis, intelligit de illo qui fit ex infusione violarū, cuius descriptionē uide supra. Idē Mef. in sua practica in cap. sermo in aqua cicurū, habet duas descriptiones, sed ista est nobilior illis.

Viola sñ Mef. est medicina temperata conueniens, & fit per eam male qualitatis permutatio & naturę solutio melior est quæcumq. est ex primis, quam non inuenit calor resoluens uirtutem, aut pluuia dispans. Ifidorus inquit: Viola propter uim odoris nonē accepit, cuius genera sunt tria, & sunt hæc: purpurea, leucoc. i. alba, cheiri. i. uiola citrina d. citra saracenicā, & omnes sunt notæ. Secundum Circa instans omni anno uiola debet renouari.

Malux. s. semen quod satis est notū. Plin. ait: Malux satius & syluestris duo sunt genera, amplitudine foliorū differunt, maiorem Græci malopen uocant in satius, alterā a molliendo uentrem malachen uocant, & syluestris cuius grande folium & radices albe: althea uocatur ab excellētia affectus. Serap. ca. de malua dicit: Cubeze. i. malua. Avi. in. 2. de cubeze cap. facit & inquit, quod est spēs malux, & dicit quod cubeze est syluestris, & maluchia est domesticā, & cubeze quidem est species quædā quæ dicitur maluchia arborea, & ipsa est althea & est olus iudicum, & non est longum quin sit species eius, & est melior quæ sit in ipsa &c.

XX.

DE IUIVIBIS.

R. Iuiubarum nūo. lx.

Tragacanthi,

Cydoniorum,

Sem. Papaueris.

Melonis,

Lactucę, an. 3. iiii.

Capillorum ueneris 5. i.

Seminis malux,

Violarum, an. 3. v.

Liquiritis,

Hordei mundi, an. 3. viii.

* Mendo
se prius
bras. x. h
terarū ab
finitate
deceptus
nam. 50
libri pu
tauit, &
numeri
nota re
gius ex
stat.

Decoquē in lib. iiii. aquæ fontium, & cum lib. ii. zuchæ
 et fiat syrupus.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus est in usu, & maxime scdm istam descriptionem. Idem in sua practica in cap. de affluatibus habet unam aliam descriptionem ex autoritate Hamech & est fere eadem, tamen ista est nobilior illa.

Iuibe apud Aui. in 6. can. meliores sunt maiores earum Dioscoridis nominat zinzifas, sed de forma ipsius non loquitur. Auezoar in ca. de fractura ossis causa doloris dicit: Iuibe qui Arabice dicuntur aupini habet fructus sicut cornu, & apud omnes satis, est notum.

Capillus ueneris scdm Mesd. dicitur apud quosdā capill⁹ fontium, & dicitur capillus hominis nemoralis, capillus ueneris uero est debilis in qua, & uirtutis eius cito tollitur.

XXI.

DE PAPAVERE.

Papaueris albi & nigri, an. 3. l. capillorum ueneris. 3. xv. liquiritæ. 3. v. iuibe n. uo. xxx. seminis lactucæ. 3. xl. seminis malux. seminis cydoniorum. an. 3. vi. decoquat in li. iiii. aq. usq; ad duas, & cum zuch. et penidiōrum. an. 3. viii. fiat syrupus.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus est ille qui nobilis scdm plurimū usū uenit. Supraposita fuit alia descriptio ex autoritate eiusdē, sed non est ita in usu. Idem in ca. de cusi habet tres descriptiones sed sunt in usu, nec eadem.

Papauer sicut inuenitur in 7. simp. apud. Gal. sunt mulgæ spēs. Nam inquit Micon. i. papuer. scabum, micon ceratis. i. papauer cornutum, nominatum quidē sic a fructu breuē cōnexionem habente, sicut frugærum, ut assimileat cornu bouino uocatur: & est aliud quod dī micō heraclea. i. papauer herculeum, uocatur autem & spumofum, quia tum album est, & spumofum parum: fm Circa instans semen papaueris & albi & nigri feruatur per decem annos.

XXII.

AQUA MVLSA, uulgo aqua mellis.

Mellis boni & mundi & proprie cuius est color sicut color paleæ, & quod est inter tenue & spissum, et quod est boni odoris, & quod est modice acuitatis, et quod non est antiquū, & sit eius lib. i. & pone ipsum in uase lapideo ut uitreato, & funde super ipsum aquæ fontis dulcis, & clare li. viii. & coque ipsum cum facilitate, & auferatur spuma eius, & non dimittatur super ipsum multiplicari: immo quam cito appareat auferatur deinde coletur coloratio densio de pāno, & utere fm q. ipse docet. Et sunt ex hominibus qui aro matizant illam cum speciebus elephangin eis, sicut zingiber, croco, cinnamomo, mace, & similibus, & sunt qui aromati zant cum gallia muscata, ligno alooe, & similibus.

COMMENTA. MANLI.

Mesue inquit, q. posuerūt antiqui diuersitātē i aqua meli, qui locuti sunt de ipsa, & scripserunt ei iuuamenta pluri ma, quæ sunt in ea, quia sicut sedat, & multa alia, ut uidetur ibi, licet apud quosdam in usu: quidā existimāt q. sit mellis cratum, quod igitur, quia idē aliud ca. facit de mellificato, de quo infra etiam hydromel apud Græcos est aquam mellita. Kasis in 9. Alman. in cap. de cholica habet modum faciendi, hydromel, & est quasi idem. Auicē. in 5. can. habet duas descriptiones syrupi de fauis mellis, & idem est cum hydro melle fm descriptionem Io. Serap. & sic si legis utriusq; descriptionis uidebis q. syrupus de fauis mellis apud Aui. cum hydromelle apud Ioan. Serap. sunt idem.

Mel scdm Dioscoridē ros celestis quē apes colligunt. Isid. in ca. de efcis dicit: Mel Græce appellatum est quod ab api bus nomē habere probatur. Nam apis Græce mel esse dicitur &c. Mel scdm intentionē McMelior est quod colorem paleæ habet, & quod est inter tenue & spissum, & quod est boni odoris: scdm autē Ser. bonum est cuius color cedit ad rubedinem, neq; est nimis liquidum, & q. immisceris in eū digitum adhaeret digito & uenit cum eo, & melius quidē mel est mel ueris: deinde mel æstatis, incl uero hyemale est malum. Auic. laudat illud quod est uere dulcedinis, boni odoris declinantis ad acriditatem, et ad rubedinem, et quod

est ut palea in colore, quod non est subtile, uiscofum, quod non absconditur, & melius est uernale: deinde æstium hyemale autem est malum. idem ait Serap.

APPENDIX.

Græcorū quam plurimi, ne dicam omnes, nō inegerant mulse compositionem literis mandarunt: uerū ex Aegine ta tantum, ac Dioscoride rem oculis subiciemus.

MVLSA hac ratione concinnatur, ex lib. i.

cap. xcvi. Aeginetæ.

Aquæ octuplum mellis miscetur, & quod nihil amplius spumæ eiiciat decoquitur, oportet autem spumam e medio si mul atque exoritur, identidem tollere.

Aqua mulsæ ex lib. v. cap. x. Dioscoridis.

Fit duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alii fontanā aquā adiciunt, & ad tertias partes decoquit, & ita recedunt. Nec desunt qui Hydro meli appellā, q. a melle elutis aqua fauis confici solet, sed meracius facere conuenit, Aliqui id coquant.

Aqua Paulo cum Mesue est octupla, Dioscoridi uero dupla, quem Auicenna etiam imitatur.

XXIII.

XYMELI simplex seu acetum mulsū, uulgo SECANIABIN purum.

Re. mellis boni li. ii. acetū boni lib. i. aquæ fontium claræ & dulcis lib. iiii. & q. q. exigat dispo ut addatur ad quantitatē acetū, sicut te scire fecimus in ca. de syrupo acetoso, & ope ratio est ut accipiatur mel & aqua; & abiciat spuma eius; deinde fundat sup illud acetum & decoquat, & non dimittatur eleuari, & excrecere super ipsum spuma eius: immo auferatur oī hora & clarescat, & cū coctum fuerit recode.

COMMENTA. MANLI.

Iste secaniabin uel sūgingebin est in usu, sed non utimur sub nomine oxy melis simplicis. Simon Ioan. dixit. Quingibin Arabice est syrupus acetosus sine mellinus, & q. est oxymel: & sic sapientes hodierni faciunt oxy mel simplex secum dum istā descriptionem de secaniabin puro, et sic debet fieri. uide Nicola. in suo antidotario, nam habet scriptum oxy mel simplex, quod idem est.

APPENDIX.

Antiquiores Græcorū, Arabū, ac Latinorū XYMELI uarie nimirum composuisse, omnibus ex eorum monumentis iā perspectum arbitror, unde nimis longum foret singulorū placita breuibus hic recensere, uerum fat erit ex Principe GALENO. I I I I, tuendæ Sanitatis, rem ab uerbum explicare, sic inquiris.

XYMELI ita præparari debet.

Quū mellis optimo super carbones spumā acidulæ, conitices in ipsum acetū, tm, unde gustari nec acetum nimis, nec dulce uidebit, ac denuo sup prunas coqs, quo ad plane unitæ amborū qualitates sint, nec appareat gustari acetū adhuc crudum. hinc ab igni depones, cuius; uti uoles, aqua ei miscēbis, ita nimirū tēperas ut uiuū. Ergo qui bibet, si nec de acore ei querit, nec dulcedine, assidue eo utatur, sin alter utro offendit, adiecto q. desideratur, rursus id coques. Neq. n. eos. pbo. qui sub una quapiam mēsurā id consuevit, qui mihi sitis affectū uidentur, qui bibēt oēs similitur aquā uino miscere cēsent, non aduertentes, quibulidā utique qui diluitori insueuerunt, caput statim si uel pusillo meracius hauserint, tentari: quibuldam qui meraciore delectantur, iuchum si dilutus biberint, subueri. Quum igitur in uino tā familiari potione ista incendant, multo sane magis in Oxy melite, ut pote quam uinum tum minus familiarī, tum magis forti, ipsa sequi par est. Satiū ergo sit ex fumentis gustu, nō nostro, Iudicium de modo facere, id esse fumentis natū re conuenientissimum Oxy meli raras, quod utiq; est iucū dissimum, proinde; etiam uile, contra aduersissimum esse quod iniucundum. Ipsam ta nē primam ipsorum mixtionem quo plurimis conueniat, talem esse oportet.

Vni acetū, parti mellis a quo de tracta spuma sit, duplum est miscendū: deinde ambo in leni igni coquenda donec eorum qualitates in unum coierint. ita enim nec acetum amplius crudum apparebit.

SECTION V.

Cum aqua uero statim ita facies Oxyveli.

Melli quadruplū optimæ aquæ miscibus, deinceps quos modo igni, quoad spumare definat. Ac malū quidē mel, multum egerit spumam, quo ēt diutius coqui debet. Optimū uero, ut breuissimo tpe coquatur, ita minimum spumę, eo mit, unde nec pari ei cōctione est opus: plurimū certe quartam partem eius quod ab initio est inditū, amittit: post uero dimidio aceti adiecto, rursus coquēdū, donec qualitātū omnino fit unitas, nec acetum crudum etiam appareat.

Conficitur sane oxyveli, etiam tribus statim ab initio mixtis, ad hunc modum.

Aceti uni parti additur mellis duplum, & aquæ quadruplū, atque hæc ad tertiam partem coquuntur, uel etiam quartā, spuma interim detracta. Quod si ualētius id facere studeas, tantuudem iniicias aceti, quantum mellis.

XXIII.

OXYVELI de radicibus, uulgo SECA- NIABIN de radicibus.

R. Corticū radicis apii, fœniculi, an. ʒ. ii. seminis anisi, fœniculi, apii, an. ʒ. i. mundenut cortices, et conterantur, & perliciantur sup eas in uase lapideo aceti boni antiqui & albi lib. x. aquæ lib. xii. & dimittatur per diem ac noctem: dein de coquatur donec eius tertia cōsumatur, postea coletur & proiciatur super ipsum mellis quod sit medietas eius: coquatur cum facilitate sicut superius diximus.

COMMENTA. MANLI.

Secaniabin sicut dictum fuit est oxyvel, & propter secaniabin de radicibus est oxyvel, est quoque moderatū pro oxy-mele compositū utatur. Oxyvel uero secundum Isidorū appellatur, quod aceti & mellis permixta conficitur materia unde & dulcedinem retinet & aciem. Idem in ca. de pleureth habet unam aliam descriptionem ex autoritate Gal. & ibi habet mellis & zuchari fulemen, id est illius regionis, sed non sunt idem nec utitur illa.

APPENDIX.

Bellissime Aduariis hanc ex radicū Oxyvelite cōpōnē aduerbum fere cum Mesue expressit, in hunc sane modū Mellis, lib. lv.

Aceti, lib. xv. Radicū apii ʒ. ii.
Anisi, lib. i. Radicū fœniculi, lib. i.

XXV.

DE MENTA inuentione nostra.

R. Sucri cydoniorum mucorum, & est sapor compositus ex dulci & acetofo, succi cydoniorū dulciū, succi granato rum acetofo, & dulcium & mucorum, an. lib. i. s. proiciatur super eos mente fœcæ lib. i. s. foliorū rosarū ʒ. ii. & dimittantur per diem & noctem; deinde coquantur cum facilitate usque ad medium, & cum mellis uel zuchari lib. ii. fiat syrupus & aromatizetur cum gallia mulsata.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus est ille qui est in usu. idem habet unam aliā descriptionem, sed ista est excellētiore priore. Aui. in. ʒ. can. habet unam descriptionem, sed non utitur illa.

Menta apud Dioscorum uocatur Hedyssomon, mentæ autē ge nera sunt quinq; . J. menta domestica quę proprie hortulana dī uel communis uel odorifera. & est alia syluatica quę mentaltrum siue calamenthū fluuiale dicitur: & est alia dicta balsamita, siue menta aquatica: & hæc iuxta aquas reperitur, & est alia cuius folia sunt nigriora aliis, & hæc dicitur menta Romana uel Saracenicā, & est alia dicta menta non odorifera, & hoc est calamenthū, & oīa ista quinq; ge nera debent poni in unguento Marciantē, de quo infra.

XXVI.

DE ABSINTHIO.

R. Absinthii Romani lib. s. foliorū rosarū ʒ. ii. spicę ʒ. iii. uini albi boni antiqui & odoriferi, succi cydoniorum, an. lib. ii. s. & dimittantur per diem & noctē in uase lapideo deinde coquantur cum facilitate usque ad medietatē, et cū mellis lib. ii. fiat syrupus expertus & nobilis.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus est ille quo utitur, idem describit unā aliā descriptionem, sed ista est nobilior. Absinthium sū cūdem

Mesue est multiplex, sed illud quod intendimus nunc est ab sinthium Romanum. Isidorus ait: Absinthium Græcum nomen, cuius probabilis est quod in Pōti regione nascitur. unde absinthium ponticum nominatur. Dioscor. absinthium est omnibus notum cuius probabilis est Pōticum et Capadocium nascens in monte. unde nomen accepit, Halyab. in practica uocat ipsum bulengi.

XXVII.

FVMARIE MAIOR, officinis de

Fmo terrę maior.

R. Myrobalarum citrinorum, chebulorum, an. ʒ. xx. boraginis uel buglossę, uiolarum, absinthii, cuscute, an. ʒ. i. liquiritię, rosarum, an. ʒ. s. epithymi, polypodii, an. ʒ. vii. prunorum numero. c. passularum enucleatarum lib. s. tamarindorum. c. fassę fistulę, an. ʒ. ii. hæc omnia bulliant in aquæ lib. x. usque dum deueniant ad lib. iii. & cum succi fumiterre cocti & depurati, & zuchari an. lib. iii. fiat syrupus.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus de fumoterrę maior est ille qui est in usu, & habet maiorē efficaciam quā minor. Fumuterrę scdm eundē ponitur inter medicinas benedictas, sed de forma herbę ipsius nō loquitur, & hoc est, quia credo q sit nota oībus. Circa instans dicit: Fumuterrę dicitur quasi fumus a terrā i multa quātitate emittit, dicitur autē fumuterrę, quia generatur a quadam grossa fumositate a terra resoluta. & quanto uiridior est tāto melior, & in secco nulla est efficaciam. Aui. in. ʒ. can. inquit. Fumuterrę melior est ille qui est uiridis, recēs acutus, amarus & c. Mes. dicit: Boraginis uel buglossę, q. d. pone unū pro alio ex istis duobus quia iis uirtute & spē fere conueniunt, ambę confortant cor, sicut est notum.

XXVIII.

GLYCYRRHIZE, uulgo de Liquiritia.

R. Liquiritię ʒ. ii. capillorū ueneris ʒ. i. hyssopi siccę ʒ. s. proice super illud aquæ lib. iii. & dimittatur die et nocte, deinde coquantur usque ad mediam partē: deinde proice super illud mellis & zuchari, & penidiorū ʒ. vii. aquæ rosarū ʒ. vi. fiat syrupus & administretur.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus apud nos est multum in usu. Liquiritia uero apud Dioscorum uocatur glycyrrhiza. Gligoritia uero reperitur in multis libris de Græco translatis, quod est dictū dulcis radix, nam glyceon dulcis, riza radix. Idem inquit. Glycyrrhiza Græce ex eo dicta q dulcem radicem habeat eadem ad ipsos, quia sitientibus sūm sedat, hæc est satis nota. Gal. in. 7. simpl. ait: Chus. i. liquiritia id quod est uile de hac plāta est succus radicis eius. Mes. habet in isto syrupo aquæ rosatę, q sapientes uolunt intelligi aquam rosatam distillatā per alembicum. Quidā uero dixerunt quod intelligitur de aqua quę sit ex infusione rosarum, sed non est credendum.

XXIX.

DE HYSOPO.

R. Hyssopi siccę radicū apii, petroselinii, fœniculi, liquiritię, an. ʒ. c. hordei mundī ʒ. s. seminis mahæ, draganti, seminis cydoniorum, an. ʒ. iii. capillorū ueneris ʒ. vi. iuiubarum, sebstē an. numero. xxx. passularum enucleatarum ʒ. xii. ficuum siccarum, & dactylorum pinguium, an. numero. x. albarum penidiorum lib. ii. & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus est in usu, & maxime scdm istam descriptionem. Idē Mes. in capitulis de cusi habet quatuor uel quinque descriptiones syrupi de hyssopo, quarū nulla cum ista concordat, nec etiam inter se.

Hyssopus sicca ad differentiam hyssopi humidę dicitur, quę est sordes aggregata super lanam. Idē. Hyssopus herbę purgandis pulmonibus apta, unde in ueteri testamento per hyssopi fasciculos aspergebatur agni sanguine, quos mundare uolebant, de ipso uide supra in dia hyssopo.

XXX.

DE PRASSIO.

R. Prasi ʒ. ii. hyssopi, capillorū ueneris, an. ʒ. vi. liquiritię, calamethi, anisi, radicū apii, fœniculi, an. ʒ. v. seminis malugę, scēnugręci, troscos, an. ʒ. iii. seminis lini. seminis cydoniorū, an.

g.ii.pasillarū enucleatarum.3.ii.ficus ficcas pingues nume
ro.xv.penidiorum lib.ii.mellis boni despumati li.ii. & fiat.

COMMEN. MANLII.

Iste syrupus est in vfu, & maxime fm istam descriptionē.
Idē in ea. de asthma habet duas descriptiones ex autori
tate Hamech, sed cum ista non concordant, nec in vfu sunt.

Prasium. i. marubium album. Pli. ait: Græci perison vo
cāt, alij linoistropon, nō nisi philopede, aut philogares. Cir
ea infans ait: Marrubium herba est, quæ alio nōe prasium
dī, folia eius medicinē cōperunt, herba collecta, & in vmbro
sulo loco suspēsa per annum feruari pōt. Et aliud prasium
quod vocatur prasium viride, & hoc secundū intentionē Ni
colai est flos æris. Prasium apud Græcos est porrum: pras
ium vero est marrub. album, & est herba satis nota.

XXXI.

DE CALAMENTO, conferens splenetis,

Rx. Calaminthes Domestice, } ana.3.ii.
Syluestris, }

Ligustici } ana.3.v.
Dauci, }

* Schœnuanthus, }
Pasillarum enucleatarum, lib.s.

Mellis. lib.ii.

Fiat syrupus,

COMMEN. MANLII.

Iste syrupus est ille qui cōter est in vfu, idem habet vnā
aliā descriptionem, sed hæc est nobilior illa Gal. in lib. se
creto. habet vnam aliā, sed nec eadem, nec est in vfu.

Calamentum domesticum secundū modernos est vsua
le. Circa infans calamentum inquit, herba est quæ alio no
mine nepita dicitur.

Calamentum montanum melius est, quia est magis sic
cum, cū flores producit debet colligi. Dio. ait: Calamitham
quā pulegiū agrete multi dicunt, & ipsa montuosa est &c.
Calamentum vero agrete fm intentionē Nicolai est ne
pita vna herba dicta a vulgo gattaria siue neuida. Nam siue
dubio nepita est calamithi species. vnde Macer
Herbam quam neptam vulgari nōpe vocamus.

Hanc medici Græco calamenthi nomine dicunt.

XXXII.

DE EUPATORIO

Rx. Radicū apij, fœniculi, endiuic, an.3.ii. liquorizæ, squinā
ti, culcutæ, abinthij, rosarum, an.3. xvi. capillorum veneris,
* bedeguar, fuchaha, florum anguloffæ aut radicem eius, ani
li, fœniculi, eupatorij, an.3. v. rheubarbari, masticis, ana.3.
* i. spicæ, asari, folij, an.3. ii. coque in aquæ lib. viii. vsque ad
tertiā. & cum lib. iiii. zuchaci fiat syrupus addendo succi
apij, endiuicæ, quantitatem sufficientem, & vsui referua.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus apud nos est multum in vfu, & magnificata
est virtus eius, ut docet experientia, sed non solum in oppi
lationibus hepatis, vt in alijs proprietatibus, sed sunt qui fa
ciunt, & qñ credunt aliqua facere nihil faciunt, & hoc est
propter simplicita quæ in ipso ingrediuntur, vt ostendam.

Bedeguar siue bedeguard idē sunt, & est quā Diof. Acan
tis leuce vocatē apud Sera. est spina alba, de qua ipse Se
rap. scribit in litera b. bedeguar. & in litera s. scribit spina al
ba, quæ idē est similiter facit Auic. in. 2. can. sed opo ignoran
tiū apothecariorū multorū est q̃ bedeguard sit quædam res
similis spōgiæ q̃ nascitur sub quadam plāta quæ apud Diof.
vocatur cinosbatos. i. rubus canis, & in ea aliqui reperiunt
vermes: & sic meo tpe vidi multos eam ponere in isto syru
polo loco bedeguard, sed decipiuntur. Nam vide Nico. Flor.
in lib.7. in cap. de cancro qui dicit: Dicunt quidam experi
mentatores q̃ fiat pulvis ex eriton qui oritur subrubum co
nis qui a quibusdā, sed nō recte ponitur pro bedeguard. Mo
derni generaliter in puluere qui sit contrabotium gulæ ha
bet bedeguard, sed litera nō est bona, quia prædictus pulvis
reperitur apud Rainaldum de Villa noua in ca. de botio gu
læ, & ibi dicit. Rx. spinæ rosarum, & c. edo quod sit illa spon
gia quæ falso bedeguard dicit. Ille q. de nouo scripsit Lumē
apothecariorū dicit, q̃ bedeguard. est radix cardonis bene

dicti masculi, quod non est credendum, sed vt veritati aper
tior sit via, hic volo scribere formam veri bedeguard, & qd
debet administrari in isto syrope secundū Sera. ex authorita
te Diof. qui dicit bedeguard. i. spina alba. Diof. nominat acā
this leuce, & in Græco est spina alba, & est planca quæ na
scitur in montibus Zagial, & habet folia similia cameleūti
albæ, nisi quia sunt strictiora & albiora, & super ea est simi
le boræ, & sunt spinosa, & habet stipitem longum duobus
brachijs in grossitudine digiti pollicis vel plus: color eius
est vergens ad albedinē, & super sumitates eius sunt capitula
la spinosa simili eritio marino, nisi quia sunt minora & ob
longa, & flos eius est coloris purpurei, & semineius est si
mile grano cartami, sed apud Diof. est simile grano gincio
quod idem est, nisi quia est rotundius eo, & id quod admini
stratur ex ipsius planta est radix, vide ergo si bedeguard est
illa spongia vt volunt ignorantes.

Suchaha est est spēs cardonis & ē propinqua bedeguard.
& est quā Diof. vocat acanthium Arabicam. i. spinam Arabi
cam & est similis supradictæ. i. similis bedeguar, nascitur spi
nosa & alba. Marr. Syl. vult q̃ suchaha sit cameleunta alba,
qd nō credo Nā Diof. & Sera. de vtraq; faciunt distincta ca
pitula. Et secundū Christophori de hone suchaha est bedeg
uar, quod nō est, & secundū Lumē est radix cardonis bene
dicti fœmenis, quod non reperio apud auctores, sed sit q̃
cūq; suchaha apud Diof. est acāthis arabica. & secundū Sera.
est spina arabica. & secundū Rasm est megailē. & idē Sera.
ex autoritate Gale. ait: Herba est similis plantæ bedeguar,
nisi quia virtus eius desiccac & dissipacit plus eo, & fructus
& radix eis est fortior. secundū Paulum suchaha est her
ba dulcis quæ extēditur super terram, & facit capita grossa
prope radicē, & exeunt ex illis capitibus flores sanguinei,
& sic est secundū veritatem q̃ suchaha est herba spinosa al
ba expādens le super terram cuius flos est in colore sangui
nis, & hæc est proprie suchaha quæ administratur in ipso sy
rupo: radix eius vsui medicinz competit.

Potq̃ dixi de bedeguar ac suchaha quæ sunt spēs cardo
nis. Etiam mea intentio est declarare quasdam alia spēs quæ
ponuntur in numero cardonum. Nam primo est cameleun
ta alba & nigra: sed de alba Sera. dicit q̃ sunt homines qui
nominant eam acaciam: & de nigra dicit q̃ nominant eam
hoies cameleuntum propter varietatē florum eius, quia ex
eis reperiuntur virides multum, & aliqui ad albedinem de
clinantes & aliqui ad cœlestem co lorem, & quidam ad ru
bedinē sanguinis secundū diuersitatem locorum in quibus
nascunt. Et est alius cardus qui alio nomine scolimas voca
tur. & iste apud quosdam est cardus dictus arcolof, sed igno
ro verum. Serap. in suo cap. ait in fine capituli de cardo co
meditur planta ista recens sicut comeduntur asparagi. Ego
vero nec nego, nec affirmo q̃ scolimas sit arcolof. i. artigio
cho, sed nomen suum verum est sit chinera, aut alio nomine di
citur arcolof, de quo vide Rasm in. 3. Manso. qui virtu
tem eius describit, sed formam nō tamen iste cardus est spi
nosus, cuius capita comeduntur referunt de Ianua. Auic.
in. 2. can. dicit. Cheuchezed est gūma arcolof. Io. Serap. in
suo antidotario in fine inquit: Cancarized. i. gūmi arcolof.
Auer. in. 5. col. inquit: Rachaf. i. cardus alchi vult dicere
artigiocho, & est alius cardus quod videntur homines ad gar
gellandum pannos & bitera & similia: & iste apud Diof. vo
catur dipfacus, & a multis ignoratibus uirga pastoris: & est
alius cardus dictus affaration, flos centum capita cœlestis
coloris, & iste apud nos nascitur iuxta vias, & est alius qui
dicitur cētum capita alba, & hæc est iryngus & est alius qui
a modernis cardus benedictus appellatur, & iste est quē ho
die herbam turcham vocant siue sedum, ut apud Diof. siue
eregeron, ut apud Plini. flos buglossæ, ut radicem eius: flos
vero vt vult Papias dictus est quod cito fluat, quasi floru. Ibi
dorus vero inquit: Flores nominantur quod cito defluant
de arboribus, quasi flores quod cito soluantur.

Folium. i. malabathrum in hac descriptione loco eius po
nitur macis, vt dicit Auic. in. 2. cano. cap. de folijs, i. vero in
ipso non ingreditur spica potest poni, sed quia spica non
ingreditur ponitur macis.

* Squinā
ti dicitur.

* I. spine al
bi.
* I. spine
Arabice.

S E C T I O V.

XXXIII. D E T H Y M O.

R. Extrematatum thymi. ℥.ii. calamenhi, menta sicca, ana 3. v. seminum anisi, fœniculi, apij, dauci, ana. 3. iiii. passulârû enucleatarum. ℥. iiii. & cum lib. ii. mellis fiat syrupus, & aromatizetur cum. 3. i. galliæ mufcatæ.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Iste syrupus est in vfu. Thymus secundû Ifido. appellatû est quod flos eius odorem refert de quo Virg. Redolentq; thymum fragratia mella. Pli. Thymû flore facto nascit, nec du rat nisi afflatu maris, pp thymum. u. quod in Attica regione abûdat, mel atticum lummæ laudis in toto mûdo est. Mef. in ca. de hyssopo quem vocat hæc inquit: Dicunt quidâ quod est hyssopus hortensis, & dicunt alij q̃ est una ex sp̃ibus ori gani, & in fine formæ p̃dictæ plantæ ait: & planta eius ut di citur est mater epithymi, ergo est thymus: nâ sine dubio hæc pollicariam maiorem vocant alij hæc. Mefue habet hic ex trematatum thymi, & est melior pars plantæ eius.

XXXIII.

D E E P I T H Y M O.

R. Epithymi boni hortensis. 3. xx. myrrhæ, citrinorû indorû, an. 3. xv. cuscutzæ fumiterre, an. 3. x. thymi, buglossæ, calamê thî, emblicî, bellericî, liquiritiæ, polypodij, agaricî, sticados an. 3. vi. rosarû, seminis fœniculi, anisi, an. 3. i. s. prunorû nu me. xx. passulârû enucleatarum. ℥. iiii. tamarindorû. ℥. ii. s. zuchari lib. iii. rob. ii. uini cocti lib. ii. & fat syrupus.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Iste syrupus est in vfu. Epithymû uero fm Mef. est ex her bis supra crescentibus alijs herbis, & est simile cuscutzæ: fm Dios. epithymum est flos thymi similis thymbræ. i.ature gis. Ifid. inquit: Epithymam Græce, quod Latine dicif flos thymi, nam flos Græce thymû uocatur: est aut flos thymbræ similis. Circa instans, epithymû flos, & nō herba medicinz competit, & qñ producit flores, colligi debent: Mef. laudat subfrumfū cretense acuti odoris Aui. laudat Cretensē & Hie rosolymitanum, & est decliue ad rubedinem.

XXXV.

D E S T O E C H A D E, vulgo de Sticados.

R. Florum sticados. 3. xxx. hæc, calamenhi, origani, an. 3. x. anisi, pyrethri, an. vii. piperis lōgi. 3. iiii. zingiberis. 3. i. passulârû enucleatarum. ℥. iiii. mellis lib. v. cōdias cum cinnamomi, calami aromatici, spicæ nardi, croci, zingiberis, piperis nigri & lūgi, an. 3. i. s. līga in pāno raro, & suspē de in syrupo, dosis eius est. ℥. i. cum aqua decoctionis spicæ, & florum alchilil. i. chilchil, & est flos roris marini.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Iste syrupus est in vfu, maxime secundû istam descriptionem. Idem Mef. in cap. de ægritudinibus neruorum habet vnam aliam descriptionē ex auctoritate Iudæi, & dicit q̃ est medicina mirabilis conferens omnibus ægritudinibus neruorû, sed nō est eadē nec in vfu: tamen ibi habet ziniam qd̃ est iua siue chamæpityos, ut dictum fuit in electuario de iua.

Sticados secundum Mefue medici laudant Arabicum, & melior pars plantæ est flos post folia. Diosc. dicit. Sticados ab insula Galatiæ quæ sticados dicitur nomē accepit in rei veritate illud sticados quo moderni vtuntur non est verum sticados de quo intelligunt Mefue & Auic. vt dictum fuit in confectione de sticados.

XXXV.

O E N O M E L I, idest unum mulfum, vulgo perperam Melicratum conditum.

R. Vini boni antiqui lib. x. mellis boni & despumati lib. ii. proijce super ea cinnamomi boni & subtilis. 3. v. spicæ aromaticæ. 3. i. garyoph. zingiberis, ligni aloes, macis, ana. 3. iiii. theil. 3. i. croci. 3. i. s. tere contritione grossa, & coletur cum colatorio grosso de pāno, & aromatizetur cum mufci. 3. v. nius tertia idest 3. i.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Melicratû secundû Diosc. est mulla & ipse docet facere, sed non hoc modo. Melicratum vero secundum. Simonē est vinû ex melle & aqua factum & vocatur mulla. f. ex tertia

parte mellis. & duabus aquæ. differt autē. ab hydromelle eo quod hydromel plus aquæ habeat quasi ipsa sit aqua mellita Melicratum uero est unum ex melle, a crasis qd̃ est unû, & ipsa est mulla. Ifid. inquit: Melicratû vinum melle mixtum mediûs quasi mellus, quia ex melle fit sicut calamitas p̃o cadamitas, non est aqua mellis, vt quidam crediderunt. Nâ supra etiam posita fuit descriptio aquæ mellis.

A P P E N D I X.

Galenus. v. Sanitatis tuendæ onemeli compositionem pro be edocet, cuius verba in studiofior gratiâ breuibz hic iamiam subnectere non grauior.

Non vetem etiam nec ips quæ melle (vina. n. enumerat) condiantur, senes vii. maxime quibus suspicio est calculi in renibus gignedi. aut podagræ alicuius, articularis v. morbi impetus futuri. Porro vinû huiuscemodi cōpōni aptissimû fuerit Sabinû, aut simile aliqd̃. Coniciatur aut in id petroselinû, atq; id solû articularibus facisfaciat. Iis qui calculo laborât, & aliquid betonicæ, & cœteri qui Galliis nascit, est immiscendum, uocant aut herbam eam saxiphagon. Qui vero curiosius id medicamentû cōponunt, etiam spicæ nardi aliquid iniiciunt. Sunt uero & alia quæ dâ, quibus vrinæ mouendi uis inest. Verum simplicem potionem, pleriq; ex vino melleq; consiciunt, adiecto rutæ, piperisq; exiguo.

XXXVII.

C O N D I T I V M ex cydonijs, vulgo Miua.

cytoniorum sine speciebus.

R. Succu cytoniorum acetosorum lib. xx. vini antiqui boni li. x. coquantur, cum facilitate usq; dum consumpta sit eius tertia pars, semper auferendo spumam eius deinde coletur & dimittatur residere & clarescat, postea proijce sup illud mellis boni & despumati lib. vi. & iterum bulliat & auferatur spuma eius, & coquantur usq; dum habeat perfectam cocturam & referuetur.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Conditum de cytoniis secundû intentio. Mef. est miua: sed fm Aui. & Gulie. Placen. est syrupus de cytoniis tamen Mef. ponit etiâ descriptionem syrui de cytoniis qui aliud est. hæc fm. miua pōt fieri cum sp̃ibus & sine sp̃eciebz, & am bæ sunt in vsusd̃ isti est miua cytoniorum sine sp̃ebz. Rasis aut in. g. Almanfo. in ca. de his quæ confortant stomachû, & ciborum perficiunt digestionem, habet descriptionē miuæ, & syrui acetosi de cytonijs. Idē in li. diuisionum in ca. de medicinis solutionis ventris: ait Cōfectio miuæ constrictiuz, qui est syrupus de cytoniis.

Cytonium est pomum nortum. Petr. de Crescen. dicit: Cōctanum siue cytonium est arbor nota: & ex eis quædâ sunt quæ faciūt pyra cytonia, & hæc arbores maiores sunt: & minora hñt folia quædam sunt arbores minores, & latiores habentes frondes quarum fructus pprie uocatur cōctana. Pa pias ait Mala cydonia eē dicta ab oppido in insula Cræta.

XXXVIII.

M I V A Cytoniorum cum speciebus.

R. Succu cytoniorum acetosorum lib. xx. vini boni antiqui li. x. coquantur cū facilitate usq; dū consumpta sit eius tertia pars, semper auferendo spumam eius: deinde colet, & dimittatur residere & clarescat, & proijce sup illud mellis boni & despumati li. vi. & iterû bulliat & auferatur spuma eius, & proiciatur super illud spicæ alephanginæ ligatæ, panno suspensio super illud medicamen, & sunt proprie cinnamomi, & heiljan. 3. iiii. garyoph. 3. ii. zingiberis, masticis, an. 3. i. s. croci. 3. ii. ligni aloes, macis, an. 3. i. s. oia p̃ter crocum te rantur contritione grossa, & suspendantur in panno sicut diximus omni hora fricando illud super medicamen donec fiat ei spissitudo: deinde aromatizetur cum. 3. v. nius tertia mufci hoc est. 3. i. & galliæ mufcatæ. 3. ii. & referuetur.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Hæc uero est miua cytoniorum cum speciebus, siue miua aromatizata. i. q̃ supra miuam cytoniorum simplicem ad duntur quædam aromata, i. quædam redolentia, & sunt pro prie illa q̃ in pāno ligantur, & de p̃dictis aromatibus aromatizantur, etiam quædam alia condita, ut est seacacul conditum & alia huiusmodi.

* Thymû
appellant.

† Carda-
momû ma
i^o noiant.

Heil sicut dictū fuit, ex autoritate. Serap. est cardomomū maius: de quo miror q̄ Aui. in p̄dicta cōfēctione habet. cardomomū maius & minus & heil. Christoforus de hone. in p̄dicta cōfēctione dixit, q̄ heil est sp̄s cardamomi quā non habemus hic, sed loco eius assumit cardamomū maius, quasi dicat q̄ heil non est cardamomū maius: hoc assert in dubitationem. Guliel. Plāce. eodē loco habet cardamomū maius & minus, & melegeta. etiam textus Gulielmī fm opinionem Bartholomēi Montagnanē est falsus. Nam si cut dictum fuit supra in electuario de aromatibus cardamomū maius est melegeta, & sic hodie gñaliter habetur opinio, quod heil sit cardamomū maius, siue melegeta, q̄ alio noīe grana paradisi uocantur. etiam Math. Syl. in ea. de cardamomo errauit dicens ex autoritate Serap. q̄ heil est cardamomum minus. Nam Ser. non dicit quod heil sit cardamomum minus: immo dicit quod est maius, & sic est.

XXXIX.

ACETVM Squilliticum, uel rectius Scillinum. Ex laminis squillæ, & proprie quæ sunt medix inter corpus & corticem ipsius, quantitate quam uolueris, & con sue eas separatim in filo cum stilo ligneo, & dimitte sicari in umbra diebus. xl. post illud continue eas in frusta cum incisorio ligneo, & pone ad omnem libram eius aceti boni albi lib. viii. & pone in uase uitreo stricti orificii, & strin ge caput eius, & dimitte in sole per alios dies xl. post illud cola & administra ubi oportet.

COMMENTA. MANLII.

Mesue inquit quod cōcordati sunt antiqui sup̄ iuuamēta aceti squillitici ad zgritudines multas, de descriptionē ipsius describit etiam Sera. in ca. de squilla, & syrups de squilla, et multa alia. Liber qui dicitur Albuchasim docet modū præ parandi, & desiccandi, & de forma castrandi squillam, & conficiendi acetum squilliticum, & distillandi aquam ipsius, & de modo albigandi acetum squilliticum, & sic de singulis: squilla dicitur cape muris eo q̄ interficit mures.

APPENDIX

Græcorū Dioscorides. v. ca. 18. Paulus Egineta. 7. c. 11. Actuarii capite de Liqueoribus medicatis. Nicolaus Alexandrinus de cōpositione Medicamentorum cap. 135. Cō stantinus Cæsar. Arabum uero Auicennæ. 5. cano. Fi lius Serapionis Albucasis Seruitur uocatus. Latinorum in de. Columella. xiii. cap. 34. Palladius in Iulio mense cap. 1. Plinius. xx. cap. 9. Scyllinum Acetū iisdem fere uerbis abutur ad omnes exponunt uerum non ab se silentio eorum placita inuoluam, ne hæc eadem sapius inculcenuis, cum præ fertim a Mesue parum, aut nihil differant: satis namq; duxi mus Locos indicasse.

XL.

OXYMEL SQVILLITICVM,
descriptio Democriti.

Origanī, hyssopi sicca* althæe, i cheism, cordumeni, sticados, an. 3. v. coquatur in tribus libris aquæ usq; dū deueniat ad lib. i. & pice sup̄ ipsum mellis lib. ii. mellis passu lati lib. s. succi altheæ. 5. v. aceti sgillitici li. s. auferat spu ma eius omni hora, & coquatur ad perfectā decoctionem.

COMMENTA. MANLII.

Oxymel Græce est syrupus acetosus tam cum zuchero factus quam cum melle: idem habet duas alias descriptiones, sed non sunt in usu, ut est ista & sunt qui faciunt ipsū, sed decipiunt ut ostendam.

Cheism. i. leuisticū hortulanū, & est aliud cheism dictū capēstre, & istud est cordumenū, qd̄ apud ignorantes nō est notū. supra ostendit q̄ cordumenū est carui agrestis siue le uisticū: tamen opinio multorum est falsa, quia hic Mesue in isto oxymelle habet cheism & cordumenū: ergo non sunt idē sed error est horū qui nō cognoscunt sp̄s leuistici, sed secundū modernorum sententiā sunt due species. f. hortula nū & capēstre hortulanū uero est illud quod cōiter utun tur campēstre uero est cordumenū, & est leuisticum cam pestre siue montanū, & est semen quod reperitur sub plan ta: quæ dicitur peucedanum, & sic est opinio herbariorū: tamen scias quando reperitur in cōfēctione aliqua ubi so

lum ingreditur cordumenū, intelligitur de hortulano, sed hic ambæ species debent poni.

Mel passulatum est medicamen, qd̄ fit ex melle & passu lis expressis, ut ostendit supra in cōfēctione loch de pino.

Altheæra uel sefæra est uitis alba, quæ alio noīe bryonia uocatur, siue amplex leuce. ut apud Diosc. Gal. in. 6. simpli inquit: Carinabiat. i. uitis alba, & dicit altheæra: hæc plantam quidam noiant bryoniam, & quidam abra dentes cutē, summitates eius comedūt in principio iuli hortus, sicut mos ē.

EX GALENO.

XLI.

OXYMEL IVLIANI, secundum Gale num. ii. ad Glauconem in cura podagræ a bilioso humore factæ.

Rx. Foliorum rutæ, origani, ana. 3. iiii. radicis mandragoræ, anethi, ana. 3. ii. ieros. 3. i. agarici. 3. ii. tedæ pinguis lib. i. coc cognidii. 3. iiii. lacteridarū, alipiados, ana. 3. s. polypo. 3. ii. fo lii, colici, spicæ nardi, ana. 3. i. rheupontici. 3. i. squillæ interio ris, cimarū ebuli, ana. 3. iiii. alari. 3. i. canopi. 3. iiii. epithymi, el lebori, acori, ana. 3. ii. hyssopi, amomi, hyperici, cymini, ana. 3. i. anisi. 3. ii. aceti acris. lib. i. mellis lib. ii. cōfice aut hoc mo do Lacterides & costum, coccognidium, & spicam nardi teres diligenter, ceteras aut herbas infundes in aceto per dies tres, & postea coques donec media pars aceti deco quatur & tunc proiecis herbis mites, & cum iterum deco ctum fuerit ad spissitudinem mellis, supra scriptas spe cies tritas miscebis, & utere ubi oportet.

COMMENTA. MANLII.

Istud oxymel apud nos non est in usu. Nicolaus in suo antidotario habet unam aliam descriptionem quæ quasi eadem est. Alexander in cap. de cathartici ad podagræ ex phlegmate, habet unam aliam quæ eadem est, simplicia autem quæ declaranda sunt declarabo.

Teda pinguis, est nomen quod apud rusticos appellatur theia, & est lignum pingue pini, uel abietis, & utuntur ipso ad faciendum lumen pro candelis. Sera. in cap. de pino inquit, q̄ una est species pini, ex cuius sudore extrahitur pix & cum ligno suo fit lumen sicut cum cera.

Coccognidium fuit dictum fuit, est semen mezereon. Lacterides Io. Sera. in. 7. ca. de laxatiuis simplicibus inquit: Lacterides est mendana, & dicit fructus amarus. Hæc est quæ Aui. in. 5. ca. uocat mehebene: ergo est catapucia minor. Nā uide Sera. in p̄prio cap. de catapucia minore, qui inquit: Médana. i. catapucia minor, & est planta quæ multi cōputat inter species lacticionorū, et hæc planta apud nostros rusticos dicitur cagarola, et in hortis abundat.

Alipiados scdm̄ Nico. est coccognidium uel laureola, q̄ non uidetur esse uerū. Nam si consideretur bene in p̄dicto oxymelle ingreditur coccognidium. i. semen mezere on. et etiam alipiados, quod non fieret si idem esset, sed cōmuniter tenetur quod alipiados sit laureola.

Canopis secundum Nico. est Medianus cortex sambuci. Similiter ait Gale. quidam crediderunt quod esset cana pis, quod non est. Nam etiam Alexander inquit: Canopis est cortex medianus sambuci.

EX ANTONIO CERMI SONO.

XLII.

ACETVM PASSVLATVM, secundum Anto. Cermisonum in cap. de zgritudinibus capitis.

Rx. Acetum uini non multum uinosi lib. ii. passularum. 3. ii. bulliant usque ad consumptionem tertiz partis aceti: dein de coletur, et fortiter exprimantur passulæ: deinde iterum passulæ terantur in mortario, et fiat earum expressio, et acetum tali usu referat.

COMMENTA. MANLII.

Apud nos tale acetum non est in usu.

EX PRACTICA MESVE.

XLIII.

Ad zgritudines Melancholicas in cap. de Soda frigida ab humore melancholico.

Rx. Capillorū ueneris, radicis buglossæ domesticæ et sylue stris, et florū earū, polypodii, epithymi, ana. 3. i. follicul. fens Lum. Ma.

SECTIO V.

chamæpityos, ficados, ana. 3. vii. chamædryos, quia natri, ellebori nigri, ana. 3. iiii. fumiterreæ. 3. viii. eupatorii. 3. iiii. fucci pomorū dulciū. 3. viii. omnia præter epithymū, & fucū pomorū bulliant in lib. iiii. aquæ usque ad lib. ii. deinde bulliat in eo ebullitione una epithymū & coletur, & cū succo pomorum, & lib. i. zucchini fiat syrupus.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus est preciosus ac dignissimus contra quartanam, & suo nomine ab apothecariis non est sic appellatus, sed ad meliorem declarationem feci sub isto nomine, quia in Mediolano multi medici ordinant syrupum ad quartanam, sed apud apothecarios fit lib. nomine syrupi de pomis compositi & idem est Franciscus de Pedemontano habet unam aliam descriptionem syrupi ad quartanam, quæ non est eadem, nec est in usu, sicut infra ostendamus.

Buglossa est lingua bovis, & proprie domesticæ: sylvestris vero buglossa est borago, cuius herba cibo apta et medicina, flos, & folia, & semen, ac radix in isto syrupo debent poni.

Pomum vero ab optimo. i. a copia. i. ubertate est dictum: inter alia poma Parisiana sunt magis laudata quam alia: post hæc est pomum distans redolens.

XLIIII.

DE PSYLLIO, in cap. de phtisi.

Rx. Spodii, semini portulacæ, seminis cymoniorum, papauæ ris, albi, ana. 3. ii. psyllii mundi. 3. v. fucci arnoglossæ cocti & despumati. 3. xx. cancorum fluuium lotozorum secundum doctrinam. 3. xx. decoquantur in libris. iiii. aquæ usque ad lib. i. & cum lib. i. zucchini fiat syrupus.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus apud nos non est ualde in usu. Raynaldus de Villanova in lib. 4. in cap. de hæctica, habet unam aliam descriptionem, sed non est eadē. Psyllium est semen simile pulicibus, & laudabile est ad conseruandū caphoram, in bladis ac viis abudat, & vulgari sermone linofella dicitur. Arnoglossa sive Papiam in litera. a, inquit, q. est quæ a latinis dicitur plantago, i. lingua agni, in litera. p. ait: Plantago a Romanis dicta, q. planta eius cito terræ adhaeret, herba quam Græci arnoglossam vocant. Macer:

Herbam quæ nostra lingua plantago vocatur,

Hanc arnoglossam Græcos vocat, est quia lingua

Agnæ similis foliis plantaginis, huius

Sunt geminæ species, sed maior prima vocatur.

Alterâ vero minor, quam vulgo lantoliatam

Dicunt & sic est. Plantago vero maior secundum opionem modernorum est quam nostri rustici bleteram syluestre vocant: minor est quam falsi herbatici lingua canina vocat, sed decipiuntur, in pratis ambæ ac viis reperiuntur.

Cancer fluuialis est nocuus. Auicenna in secundo canon. dicit. Cancer fluuialis notus, est aliud cap. facit de cancro marino, & ibi inquit: Cum dicitur cancer marinus, nolumus intelligere per hoc omnem cancerum maris, immo speciem canceri quæ proprie habet omnia membra dura ut lapis.

XLV.

SABOR, in cap. de Mania, & Melancholia sanguinea.

Rx. Succo buglossæ domesticæ, & sylvestris, ana. lib. ii. fucci pomorum dulcium redolentiū lib. iiii. folliculorū fenæ. 3. iiii. croci. 3. ii. zucchini tabazeth. i. albi, lib. iiii. sit aut sic. fenæ polliciantur in fucis per diem & noctem post contritionem eius: deinde bulliat ebullitione una aut duabus: deinde cum zucharo fiat syrupus: crocus autem confricetur in panno, & eius decoctione & fiat.

COMMENTA. MANLII.

Isto syrupo in partibus Mediolani videntur apothecarii: quidam crediderunt quod esset syrupus de pomis compositi rus, sed aliud est. Ioan. Concoregius in cap. de mania & melancholia inquit: Sabor rex Medorū qui ab hodiernis prædicantibus penitus habetur in usu, quo ut plurimum utor, & in quo multum inueniuntur amentum.

EX FRANCISCO PEDEMONTANO.

XLVI.

DE BERBERIS, in cap. de cura uomitus sanguinis.

Rx. Spodii. 3. iiii.

Berberis. 3. iiii.

Vux acerbæ. 3. ii.

Cicoreæ. 3. m.

Zucchini lib. ii.

Fiat syrupus secundum artem.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu.

Berberis est fructus rubicundus satis notus apud Aui. in. 2. cañ. vocat amirberis, sed apud Dios. vocatur oxicanthos & est arbor minuta spinosa, habens fructū rubicundum, & ex eo fructu a modernis conficitur lycium, & arbor ipsius vocatur darisahan, ab aliis crispiflorus arbor: negant quidam quod hæc arbor sit darisahan, sed errant ut dictū fuit. Petr. de crescen. inquit: Berberi sunt fructus cuiusdam arboris par ualde spinosæ sicut arbor mali punici, id est arbor mali granati domesticæ, & sunt rotundi rubei, quasi subnigri sicut fructus spinæ albae aliquantulum oblongi &c.

XLVII.

DE ENDIUIA, in cap. de cura male complexionis hepatis simplicis, & compositæ.

Rx. Endiuiæ versiusq. añ. m. ii. semini cōium recentium. 3. ii. acetū albi. 3. ii. zucchini tabazeth. i. albi lib. i. & syrupizet cum aqua hordei & aromatizetur cum sandali utriusque, & spodii ana. 3. i. & vsui referua.

COMMENTA. MANLII.

Iste est syrupus de endiuiâ cōpositus ad differentiationem simplicis qui fit ex succo & zucharo sicut ostendamus infra in tractatu de magistralibus. Gentilis scripsit unam aliam descriptionem, & secundum illam generaliter faciunt lycium de endiuiâ compositum sive Gentilem, cuius infra apparebit descriptio sunt quidam qui faciunt ipsum secundū Franciscum quod etiam est laudabile.

Endiuiâ sive Gal. in. 8. simpl. est feris Dios. vocat ipsam seridis, & ista est illa quæ coiter utuntur. Hic Franciscus habet endiuiæ utriusq. quod intelligitur usualis & cicoreæ quæ flores azurinos habet. Auic. in cap. de endiuiâ in. 3. cañ. ait: quod magis inuaria ex eis hepatis est illa quæ est magis amara. Ego existimo quod ipsa sit cicorea, quia est magis amara & mirabiliter confert hepati.

XLVIII.

DE HEPATICA, in cap. de cura malæ complexionis Hepatis simplicis, & compositæ.

Rx. Hepaticæ. m. ii. lenticularum aquæ m. ii. florū cucurbitæ, uolarum ros. ana. 3. i. cimarum squinant. 3. i. zucchini tabazeth. i. albi lib. i. irroretur cum succo granatorum. 3. iiii. & aromatizetur cum sandali & spodii, ana. 3. i. & fiat.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu.

Hepatica uero est herba nascens sup lapides semp madidos iuxta flumina et fontes sup extensa lapidibus Sera. ca. de hepatica ex autoritate Gal. inquit: nascit in lapidibus humectatis, & cadit sup ea ros, & est fitis lenticulæ aquæ: hæc est illa quæ Dios. vocat lichenam. Circa istas aut: Hepatica herba, est & quæto maiora folia habet ratio melior est, & dicitur hepatica, quia principaliter est inuaria hepatis Arabes uocant ipsam azezal saber. Rustici, nostri frigidiariam dicunt.

Léticula aq sive Dios. sup aquâ inueniuntur natans, rotunda est sicut léticula, colorē viride habens. Sera. dicit: q. ex ea marina, & ex ea aq dulcis, fed illa q. est dulcis utit ut plurimū.

XLIX.

DE NENUPHARE, in cap. de cura malæ complexionis Hepatis simplicis, & compositæ.

Rx. Florū nenupharis. 3. ii. ungulæ caballinæ aquaricæ, psyllii integri, acetosæ, ana. 3. i. seminum cōmuniū. 3. ii. semini frigidi. 3. s. radicem feniculi. 3. i. bulliat in aqua ho. dei, & addatur

et addat lib. i. zucchari, acetii albi, et succi granatorum. añ. 3 ii. & aromatizetur cum sandali & spodiū. añ. 3. i. & addatur parum spicæ ne frigida te oppilationem inducat.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus non est ualde in usu. Guliel. Pla. in suo tractatu de cōfectionibus hęc unā alii descriptionē, sed nō est eadem: ipse Guliel. facit suā descriptionē ex decoctione florū nenupharis incorporata cum zuccharo & albumine ouorum. & sic syrupus secundū artem: isto modo ut docet Guliel. idem ait: Circa instans in cap. de nenuphare

Nenuphar. i. nymphaea apud Dios. & nascitur in aquis stagnibus sicut dictum fuit: species eius sunt duæ, scilicet una quæ in medio floris cretum habet colorē, et est proprie nenuphar siue ungula caballina: alia uero habet florem albu, & ista est nenuphar usuale, & ambæ in aquis nascuntur nide de ipso in electuario de farsara.

Ungula caballina aëatica ē nenuphar scđm modernos quæ florem croceū habet, & eius folia ad similitudinem nenupharis albi, & ista est illa quæ apud herbatricos farsara uocatur, nō nascitur aut in uineis, ut quidā falso crediderūt: immo hęc duo gēa in aquis currentibus & non currētibz reperiri. Hic Franciscus habet femina cōia, sed nō speciat fī debent esse femina cōia maiora uel minora: sed patientes uolunt q̄ sint femina cōia minora, frigida & sunt hęc scilicet portulaca, fcsarole, lactuca, & endiuia.

Semina frigida simpli. indiguntur femina communia maiora frigida quæ sunt ad numerum quatuor scilicet melonis cucumeris, citrulli, & cucurbitæ, & sic in isto syruposemina minora ac maiora frigida debent poni.

L.

AD QVARTANAM, INVENTIONE

Pedemontani, in cap. de medicinis Febrium melancholicarum.

Rx. Calendula leuē, pimpinellz, lupuli quinq; folii, trifolii linguz arictis, capillorū ueneris, endiuiz cū radicibus boraginis, fumiteræ, radicū buglossæ utriusq; & florū earū, cicoreæ, hepaticæ, * bedeguaris, querculæ maioris & minoris, capparorum recentium, & corticum radicū eorū, corticum feminis tamaricis, scolopendricæ cū radice añ. ii. violarum, florū boraginis, añ. 3. ii. prunorū, fcselsten, añ. numero. xxv. senæ culcutæ, thymi, eprhimi, anisi, fcseniculi, añ. 3. s. liquiritiz passularum, stercados, añ. 3. s. hordei mūdi pugillū unum, seminū cōium, corticum citri, añ. 3. ii. quinanri. 3. ii. quinq; radicem cōium refectūm in aceto 3 ii. prædicta bulliant in aquæ lib. vi. usq; ad mediū inde colentur, & colaturæ addatur succi buglossæ succi pomorū dulcium, ana. lib. i. s. & dissoluantur in eis zucchari lib. ii. & mellis rosati lib. s. acetii prædictarum radicum. 3. iiii. & aromatizetur cum sandali. 3. i. garyophyllorum. ligni aloes, añ. 3. s. & sit syrupus secundum artem, & usui referua.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus scđm ingestionem Francisci est syrupus expertus ad quartanam, qui apud nos in usu non est: maxime secundum istam descriptionem, sed supra fuit posita una de scriptio huius syrupi, quæ confert quartanæ, & ille est quo utimur sub nomine syrupi de pomis compositi, sed quia in isto Francisci ingrediuntur quedam simplicia quæ declarata non sunt ideo declarabo.

Calendula uel kalendula scđm Nico. & Manfredum de monte imperiali est herba dicta herba blaca, de qua Matth. Syl. speciale facit ca. ex autoritate Plinii, & uocat ipsam charamos: quidā crediderūt q̄ esset primula ueris siue herba paralytis, sed falso. Nā scđm opinionē modernorū uera calendula est herba dicta apud nos herba blanca, in hortis reperiri, cuius folia comēditur sicut aliorū olerū. Ioan. Anglicus in cap. de paralyti dicit: Calendula. i. folsequium uel primula ueris. Idem in cap. de sterilitate ait: Et calendula crescit in hortis, portis florē rubrum uel crocū, de quo flore faciūt puellæ coronas, & in mulieribus in gbus aliqui instillantur mamillæ propter retentionē mēstruorum, tūc dē tur flores calendula cum spica & uino, quia tumorem sedat

& mēstrua prouocat.

Laurcola scđm Matth. Syl. est primula ueris, sed nō scribit: de forma ipsius, sed laudula scđm modernos est plāta sicut libanoides: cuius folia fista sunt rori marino, sed albio ra cum flore purpureo paruo, apud nos in hortis reperitur, cum odore iocundo, hunc florem mulieres ponunt in panis propter odorem suum.

Pimpinella est herba facta sicut saxifragia, sed minora folia habet: hęc apud omnes est nota.

Trifolium scđm Sera. ē handachocha, & species eius sūt plures. Nam est trifolium trigonum, uel polyphylon quod latini trifolium odoratum dicunt, & est trifolium acutum, & est trifolium leporinū, & est alia species a modernis dicta planta leonis, siue herba flaura, & sic de singulis. Isid. inquit: Trifolium est quod Græci triphylum vocāt, quod sit foliis trinis per singulas annotationes.

Lingua arictis, scđm Auic. ē duorum generū, s. parua & magna: hęc est quam Dios. arnoglossū uocat, siue alio nomine plantaginem, siue bletam lytlestem, minor dicitur a falsis herbatricis lingua canis, sed aliud est.

Quercula maior scđm Simonem Ianu. est chamæpityos & interpretatur apud Græcos infusa pinus a camī, quod ē breue et pitheos qđ ē pinus, eo quod omnes species ipsius odorem pini habeant, hęc a modernis est uera iua quam Mesue in cap. de ægritudinibus neruorum laudat sub nomine ziniam, et idem est.

Quercula minor est chamædrys, & non est chamæpityos, ut dicit Matth. Syl. Guliel. Pla. inquit: Quercus terre uel quercula minor est chamædrys, & est dicta infima quercus a camī. i. infima & dris dria Græce. i. quercus inde chamædrys. i. infima uel parua quercus, quia folia sunt similia foliis quercuum. In antidotario uniuersali positum est trifogum. i. chamædrys. Plin. chamædrys est herba quā Latini querculā dicunt, Auic. in 2. cano. in cap. de chamædrys dicitur quod nominatur quercus terre, & hęc ē quam hodie calamandrinam uulgariter uocant.

Quinq; radicem apothecarii generaliter debent scire q̄ p quinq; radices cōes intelliguntur radices fcseniculi, api, perroselinī, brusci, & sparagi, et sic istæ quinq; poui debent in isto syrupo. Radix autem secundum Isidorum appellatur quod quasi radice quibuldā fixa terris in profunda demergatur. Nam phyci dicunt parem esse altitudinem radicū et arborum, alii radicem a similitudine radiorū dictam putant uel si eradat non repullat.

EX NICOLA O.

LI.

DIAMORON, BATV.

Rx. Mororū celsi lib. s. mororū bati lib. i. mellis lib. s. lapz. 3. iiii. Confice sic succum mororum cum melle & sapa in uase æneo stānato ad prunas leues ad perfectam decoctionē bullire desine, cum autē scire uolueris si coctum sit pone guttā sup marmor, et inclinato marmore si se ut mel retineat coctum est, et tunc cola, et in stānato uase usui referua.

COMMEN. MANLI.

Diamorū scđm intētionē Nicolai dicitur a moris celsi, batinum a moris rubi. Mesue in suo antidotario. in digestio ne de loch habet cōfectionem de moris: et dicit qđ est dia moron et sic est. nā sua descriptio cum ista Nico. concordat sed generaliter conficitur secundum istam descriptionem. ipse Mesue in practica in cap. de sinantia gutturis habet unam aliam descriptionem ex autoritate Alexandri: sed non est in usu. in eodem cap. habet unam aliam quam dicit diamoron, quam Gal. composuit, sed nō est in usu. Gal. uero in tractatu sexto de mēimr describit duas descriptiones: quarum unam ipse composuit: aliam composuit Andromachos, sed non sunt usuales.

Mora celsi sunt fructus arboris sic dictæ: et ex foliis huius arboris pascuntur uermes qui gñant fericum. Isid. in ca. de noibus arborū inquit: Sycomorus sicut et morus græca nomina sūd dicta autē sycomorus, eo qđ sit foliis fistis moro: hanc latini celsam appellant ad altitudinem, quia nō ē breuis. ut morus. sycomorus uero secundū sententiā modernorum

est nomen compositum: a ficcos græce quod est fuscus: & moro latine, & uocatur ficus fæta, siue ficus Pharaonis. Meslocotius habet mororum de feni: quod idem est.

Morus batus. i. mora. Mesue habet mororum dulcium: & idem sunt: & est rubus ferens mora, est aliud rubus canis: qui apud Diof. cynosbatus uocatur: & est spina quæ nostro idiomate rosagna uocatur. Idiosur ait: Morus a græcis uocata quæ latini rubū appellant. Gal. in. 6. simpl. inquit: Lamich est rubus, uel de bato qui dicitur robus.

Sapa secundum compositum est uini coctum siue mustum coctum usq; ad consumptionem duarum partium. Mesue loco eius habet robi. i. carenū siue triplicatū: & dicitur carenū: eo qd seruendo parte careat tertia. Matth. Syl. inquit: Sapa est multum coctum ad consumptionem trium partium.

Vas æneū. i. vas de eramine. Nico. uult qd prædictus syrupus fiat in uase æneo stannato, & hoc est quia generaliter apothecarii faciunt syros in cassis de ære qd non sunt stannatæ, & ibi coquunt, sed faciunt male, quia ille cibis uel potibus qui coquitur & stat in illis uasis: si comeditur facit aliqui incurrere elephantiæ: & cancrum, & dolorē hepatis: & splenis: & malitiā cōplexionis. Ili. in cap. de uasis oleariis inquit: Lenticula modicum uas æneum uel argenteum quadrā gulum lateri aptum, quod & lechitum. e. l. n. vas olei quo reges & sacerdotes ungebantur a liniendo dictum.

LII.

RHODOMELI, uulgo MEL ROSATVM.

R. Mellis albi despumati lib. x. succi rosarum rectifici lib. i. ponatur in caldario ad ignē, & cum bullire inceperit, uiridit rosarum cū forcibus, uel cū cultello incutatur lib. iiii. ad dantur: & tandiu bulliant quousq; ad succi deueniant consumptionem; & dū bullierit semper agitetur cum spatula, & cum coctum fuerit in subili uase recondatur.

COMMEN. MANLII.

Mel uerum rosatum: scdm intentionē Nicolai apud græcos appellatur rhodomele. quidā geleniabini uocant. Mel. in antiq. i. in distinctione de conditis habet unam aliā de descriptionem, sed ista Nicolai est illa: quæ gñaliter utitur, tamē inter ipsas est parua differentia. Circa istam in cap. de rosis, hęc unā aliam descriptionē: & eadē est. Ili. inquit: In cap. de potu rhodomele, dicitur eo quod in succo rosæ mel admisceatur caleniabin: & chaliebinū reperio in præctica Halysabari p geleniabini: & sunt rosæ condite: hodie uero p geleniabini mel rosatū intelligit qd mel uiolati facere uolueris eodē modo si sed nō est tantum in usu ut est rosatum.

LIII.

OXYZACCHAR, uulgo OXYACCHARA.

R. Zucchari lib. i. succi malorum granatorū. ʒ. viii. aceti. ʒ. iiii. ponatur super ignem in uase stannato, & tandiu bulliat cum spatula semper agitata donec ad quantitatem zucchari ueniat: & in pisside possit deportari ad modum electuarii.

COMMENTA. MANLII.

Oxyzachara scdm intentionē Nicolai dicitur ab oxy, qd est acetum & zucchero ipse Nicolaus habet unā descriptionē quæ dicitur oxy, sed hęc dicitur ab acetoso succo malorum granatorum, sed in usu non uenit.

Malum granatum est pomum granatū: quod satis est notū. Papias inquit: Mala granata. i. punica dicta: quia interius grana habeant olentia quæ comedunt, & significant ecclesiam de multis gentibus congregatam uel gratias habentes.

Acetum qd oxos dicit Ili. in cap. de pou. Nicolaus uult quod oxyzachara coquat tātum quod possit ferri in pisside ad modū electuarii, sed nos gñaliter facimus ipsam ad formā syrupi, & nō ad formā electuarii. Ili. in cap. de uasis oleariis inquit: Pissides uascula unguentaria ex buxo facta. nam quod nos buxum græci pixum uocant.

EX RASI.

LIIII.

DE MYROBALANIS citrini secundum Ram-

sim in tractatu de agriudinis iuncturam, in cap. de medicinis mundificantibus sanguinem & choleram.

R. Myrobalanorum citrinorum. ʒ. centum, & albug cū aqua

calida, rheubarbari. ʒ. cētum, mitte in aquam frigidā, ita qd aqua supereminet duobus digitis. postea in nitare pone ad solē p quatuor dies. deinde aquā abice iterum, & remaneant myrobalani & iterum mitte in alia aqua & dimittede tandiu donec amittat saporem suum & albescant, deinde aggrega primā & secundam aquam, & cum. ʒ. centum manna alba quæ coque ad ignem, & remoue spumā donec fiat sicut iulep, & si uis acue cum cum scamonea, quā qualibet lib. pone. ʒ. vnam scamonea, & super qualibet pone lib. ʒ. i. aquæ rosæ, & utere quando uuleris.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu: credo quod sit ex cariorib' alii Myrobalani citrini magis sunt laudati illi qui in calore suo sunt citrini multæ citrinitates declinatæ ad uiriditatem & in pondere sint graues & grossi, & cortex ipsorum sit spissus densus completus, ossa parua. Guliel. Placent. inquit. Myrobalani sunt quinque specierum, sed citrini sunt meliores omnibus aliis.

L V.

DE TVRBITH, secundum eundē in eodē tractatu, in capitulo de medicinis quæ purgant phlegma & crudos humores.

R. Turbith lib. i. mitte in tribus libris aquæ frigidæ, & moretur una die ad solē: deinde cola, & deinde si sapore amiserit proice, & aquam feruā: sin autem appone aliam aquā, & iterum appone ad solem donec amittat saporem: postea aggrega illas duas aquas, & mitte lib. i. zucchari, & coq; donec fiat sicut iulep: educit multotiens humorem phlegmaticum & si uolueris citius facere coque ad ignem, quoniam est debilior a principio, sed postea non est ita clarus.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu. Turbith scdm Mesue est radix herbæ cuius folia sunt sicut folia ferulæ minora tñ & c. Diof. de ipso cap. facit, sed non inuenitur sub noie turbith, sed ipse uocat eripoliō: quā propter miror qd Matth. Syl. de tripolion cap. facit, sed non cognouit quid esset, sed postea quæ aggregat cap. de tripolion apud Diof. cum cap. de turbith apud Sera. i. uidi quod idē sunt: scias quod flos ipsius mutat colorem suum ter in die: nā mane est albus, et in meridie declinat ad colorem purpureum, in uesperis uero fit rubescens.

EX AVICENNA.

LVI.

DE VVA, IN V. CANO.

R. succi uæ pōicæ thipeicæ lib. vi. & decoquat usq; ad tertiam, & fundatur super ipsum mellis lib. i. fumach radicis liquiritiæ, gallarum balustiarum et superioris rosarū oium, an. sextarium unum et est. ʒ. vi. scdm Gētilē croci. ʒ. iiii. myrrhae aluminis iamenti, an. ʒ. i. decoquatur, et coletur, et potetur.

COMMEN. MANLII.

Iste syrupus apud nos nō est in usu. Franciscus de Pedemontium in cap. de resolutione continuitatis stomachi et ulceribus, et ruptura, et eius cura, habet unam aliam descriptionem, sed ex auctoritate Auic. et eadem est.

Vua pōtica itypica. i. in sapore nō autē intelligit pontica ab illa regione, sed dicitur et intelligitur ponticum, quia ponticum. i. fortiter habet saporem. Petr. de crescen. docet modum cōseruationis unarum, et de uirtutibus, et de apparatus uindemiz, et de tempore uindemiandi, et sic de aliis.

L VII.

DE FRVCTIBVS.

R. Succos cytoniorum, malorum, pirorum, granatorum, mazorum, sumach, zarur, et decoquat leui igne donec ingrossetur: si autē uis dulcorare ipsum proice super ipsum zucchari quantum uis, et bulli ipsum, et cola, et utere.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus nō est in usu. Idē habet unā aliam descriptionem nem interius, sed nō est eadē. Gal. in lib. secretorum habet unam aliam quæ eadem non est, nec aliquæ sunt usuales.

Fructus. Ili. in ca. de arboribus ait: qd fructus nō accipit ab eminebat gutturis pte quæ uescitur, inde et fruges.

Fructus

Fructus autem proprie dicuntur agrorum & arborum qui bus utrimque in animalibus uero abusiue & trāslatiue uocari fructum dicimus.

Zarur fm Amcen.in.2.cā. est noiatum triangulus latiorū, & zarur est species quam noiant Græci telefimon, & sentabinū, & quandoq; nominant eam malum fructestre. Zarur uel zarur fm sententiam modernorum est fructus similis piro in figura sua, sed est minor: quidā putauerunt q̄ esset forba, sed non est; uerum est q̄ loco zarur ponitur forba. Sera.in.ca.de forba ait: Zaror.i. faciens appetitū & est forba, & ibi describit formā ipsius: zarur sit forba aut non, nō nego, nec affirmo, sed uero pro alio potest poni. Zaror fm Math.Syl.est mēspilū siue auzarola uel tricocon Gal.in.7.simpl. inquit: Mēspilū quod tricocon noiat e o q̄ tria habeat ofcula oia intra se. Ioan. Arcu. in cap.de opililatioe hepatis inquit: Zaror.i.forba Nicolaus Flor.in lib.4.de squinantia dicit: quod zarur est mēspila.

L VII.

DE FRVCTIBVS, alius.

Rx.Cydonia,
Mala,
Acetositaris citri,
Pyræ,
Granata,
Agresta,

Et exprimitur aqua eorum omnium, & infundatur in ea aliquid de,
Sumach,
Zarur,
Alnabach,
Granis myrti,

* Ambiberberis,

Et dimittatur die & nocte, & exprimat & coletur & proiciatur desuper mel, & decoquatur donec fiat ei spissitudo, & administretur.

COMMEN. MAN LII.

Nō est in usu, sed quia ibi ingrediunt quzdam simplicia q̄ nō ingrediunt in alia descriptione: ego solū illa declarabo.

Alnabach.i.nabach fm eundē in 2.cano. est fructus arboris dictæ fardar, & hæc est quā Diof.agrifoliū uocat: cuius semen est simile pipere dulcis faporis. Idē aliud ca.facit de lothos, & dicit q̄ caligarij rosū uocat. Io. Concoregius incap. de capillis dealbandis & denigrandis inquit. Rx.foliorum rozi de quo præparantur coria, hæc non sunt agrifolium nec lothos, ut quidam uolunt. Serap.de nabach speciale cap.facit & inquit: Nabach est cortex similis corici mori, & odoris boni, hoc non est cap. de uero nabach, sed est cap.de nascatimon, sicut patet si legis illud cap. de nabach apud eundem cum ca.de nascatimon apud Diof. uidebis q̄ idem sunt: sed rextus Serap.ibi est falsus. Nam ipse Sera.in cap.de fadar inquit: Sadar est arbor, & fructus eius est nabach: ergo est agrifolium, & non est cortex, & hæc arbor nascitur in partibus Ianuensis, semen est rubicundum maius pipere comestibile, & uocant ipsum herbatrici laurum syluestrem.

Ambiberberis fm eundem in 2. cā. est azatarasch, & est ex eo rotundum, rubeum, campestris, & nigrū, longum, arenosum, aut montanū, & est forte hæc arbor quam Diof. oxiachantos uocat, & est arbor dicta apud herbaricos cri spinus siue berberi, & satis sunt nota.

EX ANTONIO GVAINERIO.

LIX.

Sancti Ambrosij scdm magistrū Antonij Guainerium incap.1.de febre tertia pura interpolata, & eius cura. Rx.Parū milliæ cortice superiori depilati, quod pistum appellat, & decoqui facies in aqua donec creperet, quia cito decoquatur deinde de tali bulliente brodio accipiam, uerbigratia 3.iiii. & imponantur. 3.ii. uini, et ita calidum bibatur, & mirabiliter sudorem prouocat, & sedat sitim.

COMMEN. MAN LII.

Iste syrupus secundum intentionem dñi magistrī Anto-

nii, Mediolanenses tpe magis æstus utuntur eo, & cōiter appellant ipsum pistum uini, & sic adhuc generaliter utuntur ipso, sicut ex norum apud ipsos.

Millium, scilicet quod uicium generaliter Sera. cap. de milio inquit ex autoritate Diof. q̄ sunt duæ species, una earum est asperum habens granum, & est illud quod potest teri & a quo auferret cortex, sicut fita rizi. & alia species est fortissimi & asperissimi grani, & non potest ab eo auferri cortex. Gal.in.7.simpl.inquit: Cenchrum.i. millium. hoc grauum est de speciebus granorū, & est simile panico, quod notum est.

E IOAN. ANGLICO.

LX.

De Pimpinella, scdm Ioan. Anglicum, quæ alio nomine Rosa Anglica nominatur, in cap.de cura phthisis. Rx.Pimpinellæ, consolidæ maioris, consolidæ minoris, cōsolidæ mediæ, hyssopi rectis, pollicrichi, ceterach, adiantos, scariolæ, radicis ungulæ caballinæ aquatice. i. farfar. ana. m.i. capillorum ueneris. m.iii. uiolarū. 3.ii. foliorum nenupharis, quatuor seminum frigidorum mundatorum, liquiritiæ seminis, ana. 3.i.candi. i. zucchari candi, penidiorū, medullæ, feminis bōbacin, feminis cytioniorum, boli ar. feminis lactuce, portulacæ, papaueris albi, myrristorum, succi liquiritiæ, ana. 3.s.dragacanti, gummi arab.amyli, foliorum rosarum rubearum, spodiū, sanguinis draconis, ana. 3. iiii. feminis althææ, feminis maluz, uuz passæ mundatæ ab arillis. i.a granis pinearū, caricarum. i. sicū, ana. 3.ii. hordei mundi lib. i. zucchari lib. iii. fiat syrupus cum aqua pluuiali, & bene clarificetur, & detur mane & sero.

COMMEN. MAN LII.

Iste syrupus nō est in usu. Pimpinella est herba cuius folia sunt similia saxifragiæ: sed minora hæc generaliter Lom bardi in hortis habent. Math. Syl. inquit: Pimpinella est herba multum similis saxifragiæ: unde uersus, Pimpinella pilos, saxifragia non habet illos.

Consolidæ maior est herba q̄ a uulgo anealcho dr.Diof. de ipsa cap.facit sub noie symphytum: & ibi describit duas species: quarū prima nascitur iuxta riuos, cuius flos est albus, radicem habet subnigram, & est illa quæ iuuamentum hēt in medicina. Aui.in.2.cā. de ipsa cap. facit sub noie succuum, sed in arabico est symphytum, & sic apparet manifeste q̄ illud ca.de sicū aut Aui. cum c.de symphyro apud Diof. sunt idē, fed ipse Aui. non habuit perfectam noticiam quid esset, quia dicit est semperuiua, & dicitur q̄ ē species feminis mandragoræ, & dicitur aliud, nec Guliel. Placen. agnouit eam sicut patet in ca.de anagallo, & in ca.de succuto. hanc quidam anagallicum consolidam uocant.

Cōsolidæ minor est herba habens folia similia arthriticæ sed nō sunt ita nigra sicut arthriticæ, sed flos ipsius purpureus factus in modū floris stœcados hæc herba in pratibus aut iis nascitur, hæc rustici Papiēs, sōda uulgariter uocant.

Cōsolidæ mediæ, de ista pauci auctores sermonē faciunt, sed uide de forma ipsius apud Manfredum de Monte Imperiali. si uero nō poteris habere, ponatur loco eius radix consolidæ maioris in pondere.

Polytrichum uel polytrichō græce dictū multarum comarum. nam græci trix comā seu capillum uocāt. Pl. polytricha distat a gallitrichis: q̄ uiscos habent albos, & folia plura maiora, quæ frutice quoq; maiora sunt. Diof. inquit: Adiancon flos gallitrichon, uel polytrichō, fed aliud est, & sic ex isto syrupo possunt certificari q̄ adiancon non est capillus ueneris, nec polytrichon: ut quidam uolunt.

Ceterach secundum modernorum sententiā est herba q̄ in muris humidis & in lapidibus nascitur, & secundum intentionem meam est species scolopendriæ, uerum moderni distinguunt aliter. ualet q̄ ceterach est herba dicta apud herbaricos adorata & scolopendria lingua ceruina, infra apparebit descriptio syrapi de scolopendria, & ibi melius ostendat si Deus uoluerit.

Adiantū. Diof. inquit: Adiantū siue gallitrichon uel polytrichon, folia habet coriariō similia scissa, in summitate habet ramos subtiles duos lōgitudine unius palmi nigros, Lum.Ma. 1 3

S E C T I O V.

& non habet stipitem, nec florē, nec semen, hoc est cap. de capillo veneris sicut patet si legis capitulū de capillo ueneris apud Auiet. Sera. uidebis q̄ idē fuit sed moderni distingunt p̄ diuersas herbas. uidelicet q̄ aliud ē adiāton, aliud est capillus veneris, aliud est polychricon, aliud est gallitrichon licet tres primæ species habeant quasi eādem uirtutē.

Bombax uel bombix secundum quosdam est uermis: qui facit felum Papias inquit: Bombix græce uermis est, penultima producit. Sera. inquit. Coton. i. bombax. Aui. in a. cano. uocat ipsum Kotum & ait, quod eius semen est cale factum uel lenitium. hoc est notum.

Althea s̄m Gal. in. 7. est malua syluestris. Macer inquit: Altheam malux speciem nullus negat esse, Altheamque uocant illam quod crescat in altum. Hanc ipsam dicunt e uiscū quoddā quasi uisco illius radix contra matre uidetur. A mul tisque solet agrestis malua uocari.

L X I.

DE LILIO, in cap. superius citato.

Radicum Enulæ campanæ, ireos, ana. ʒ. i. hyssopi, cala meti, adianthos, ana. ſ. i. succorum caulū, gallicitrici, ana. ʒ. ii. caruium dactylorum, succi liquiritiæ, ana. ʒ. i. mucilagini, seminis lini, & foenugræci, ana. ʒ. s. mellis despumati li. i. & si non abhorreat amara, tunc addatur de pralsio. i. mariu bio, & gramine, ana. ʒ. iii. & fiat.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus apud nos uō est in usu, s̄m intentionem Io. Anglici fusc Copositoris est syrupus de lilio qui florē purpureum gerit, sed generaliter habetur opinio, q̄ quando reperitur syrupus de lilio simpliciter, de lilio albo intelligi debeat: tamen hic Ioannes habet syrupum de lilio, & ibi non habet nisi ireos quod est radix lilii cœlestis, & propter hoc dicit q̄ iste est syrupus lilii purpurei, si aliquis uoluerit facere syrupū de lilio albo iuxta apparebit eius descriptio.

Enulæ cāpanæ non autē est enula quæ elenium dicit: sed potius est quædā species panacis de qua Diosc. ca. facit sub nomine paxa, chironia dicitur, quia nascit in monte pelion folia habet amara s̄m, & florem aurolum & radicem ter nemem, hæc apud nos non est cognita.

Ireos apud Aui. in. a. cano. est radix lilii cœlestis: uide ergo q̄ iste syrupus est uerus syrupus de lilio cœlesti, seu purpureo gñaliter: moderni admittant q̄ Mellin. ca. de ireos dixerit, ireos dux sunt spēs, una quæ florem habet purpureū, & alia quæ habet albū. Electio. habēs florē album melior est in omni re, hoc est ireos qui florem gerit albū est melior q̄ qui gerit purpureū, quod non reperit esse uerum. Circa instans inquit: Lilium ē domesticū & syluestre, sed syluestre album gerit florem, purpureum efficacius est, & sic hodie pro lilio cœlesti, siue ireos accipitur radix lilii, quod florē purpureum facit, & non album, uidet Mellus.

Gallitrichon siue centrum galli est planta quam multi moderni uulgariter noīe bozomo uocant, eius spēs sunt dux una q̄ in hortis nascitur quæ comedit sicut alia olera, alia nascit in pratis & hæc est syluestris, & est illa quam rustici nostri uulgariter scarlezzā dicunt, & ista secundū plures est nobilior in medicina quam hortulana. Circa instans dicit: Gallitrichum. i. centrum galli.

L X I I.

DIGESTIVVS, in cap. de cura Paralyfis.

Seminis foeniculi, petrosilii, dauci, anisi, saluæ, origani, laundulæ, primulæ ueris, betonica, sileris montani, stœcadodæ, sanamundæ, abrotani, iuniperi, ana. ſ. i. zingiberis, pyrethri, costi, nigellæ, pipis nigri & longi, oxi, m. i. rutæ sicce, basiliconis, maioranæ, aristolochiæ rotundæ, baccarū lauri, sinapis, gētiænæ, ana. ʒ. iii. pilletē & coquant, & colentur, & fiat syrupus cū melle quantū sufficit: uel cum lib. ii. mellis si uis, uel cū lib. i. si patiens fit robustus & rudis, tñ si patiens fit delicatus ponatur minus de abrotano. Et si uis adde acetam squillicum. Et uoco illum syrupum de sanamunda.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus non est in usu, s̄m intentionē cōpositoris est syrupus digestiuis. Idē inferius ipsa descriptio aī. Voco istum syrupum de sanamunda. i. garyophyllata de quo infra.

Laundula s̄m Matth. Syl. est primula ueris, sed non credo, q̄ in hoc possumus certificari q̄ laundula non sit primula ueris, q̄ si essent idem, non repeterentur.

Primula ueris s̄m Nicolaum est herba sancti Petri, siue herba paralyfis, quod idem est. Moderni uero ponunt quod de hac reperitur maior & minor, & maior secundum ueritatem est herba sancti Petri quæ oibus est nota: minor uero est illa quæ in pratis ac viis reperitur: cuius folia comeduntur sicut aliorum olerum. Et ista a uulgo dicitur herba margarita: ab aliis ē primo flore.

Sanamunda. i. garyophyll. nō est pes leporinus, ut quidam ignorantes herbatūci uolunt, sed garyophyllata, siue sanamunda, siue auriā ē herba filis agrimonix: cuius radix odorē hēt garyophyl. hæc apud nos nascitur iuxta hortos & in cāpis, hæc adolefcentes suo tpe euellūt, & portant ipsam in manibus p̄ odore, folia ipsius sunt illa quæ habēt efficaciam in medicina: de qua ait Circa instans, garyophyllata uel garyophyllatum dicitur proprie quædam confectio ex garyophyllis confecta: unde folia, & nō radices in medicinis ponuntur, & quanto est recens tantum melior est. Plin. ait uocat ipsam gēchim hic syrupus secundū intentionem Compositoris est tyropus de sanamunda. i. garyophyllata.

Ozimū. i. ozimū garyophyllatum, quod alio noīe alselem gemisū uocat. Huc Ioā. Angl. in isto syrupo habet ozimū, & inferius habet basiliconem, quod idem est: tamē species ozimi sunt plures, & sic hic pro oximo possumus intelligere semen ozimi garyophyllati, & pro basilicone possumus intelligere herbam ipsam ozimi, uel quādam speciem ozimi, ut est ozinum citratum. i. mellisā.

L X I I I.

DE RAPHANO, in cap. de cura paralyfis.

Radicum raphani, lapatii acuti, lilii, prœniz, ana. partē. i. tēperetur cum uino & aceto per diem & noctem. Tunc ʒ. saluæ eupatorii, chamædrios, chamæpityos, calamenti, pēthaphylli, hyssopi, an. ſ. i. anisi, marathri. i. foeniculi, carui, prœniz, ana. ʒ. i. acori, squinanti, ana. ʒ. ii. nucis mulchæ, cinnamomæ, ana. ʒ. s. foliorū boraginis, ʒ. i. corticis fraxini, & arboris tremulæ, ana. ʒ. s. mellis lib. i. decoquantur ista in aqua extinctionis ferri, & in tpe calido & in xate iuuentutis possent addi scolopendria cum herbis prædictis.

COMMENTA. MANLI.

Iste syrupus nō est in usu Diosc. de raphano inquit: Raphanū græcis uero radicem uocamus, eo q̄ tota deorsū mittitur cum reliqua olera magis sursum proliant: & c. infra ponit quod est aliud genus raphani, quod multi aromaracion dicunt: & sic inuenitur apud Sera. in. ca. de semine raphani ubi sic ait: sed raphanus agrestis quem Romani uocant aromaracion Gal. in. 8. inquit: Raphanus. i. raphani da. Idē. ait: Raphanus Græcis radicem uocamus, eo q̄ totus deorsum mittitur.

Fraxinus est arbor satis nota. Pet. de Cre. ingit: Fraxinus est arbor satis magna, quæ in pinguibus & humidis nemoribus delectat, eius lignū satis igni cōperit, & est optimum, q̄ circulus uegeret, & tūarū, eius semen est factū admodū linguæ passerum, & propter id apud nos uocatur lingua zūis.

Arbor tremula s̄m opinionem plurium modernorū, est arbor granati syluestris, sed ē opin. Bartholo. Montagna. aliud est nā ipse Bartholomæus in suis consiliis, in consilio de regimine ardoris urinx p̄ medicinalia ingit, ibi administratio est trochiscorū de carabe, & proprie qui sibi sunt nono Almanfo. allega. cap. quorū descriptio hæc est. ʒ. charabz, gūmi arboris tremulæ, & est populus: sed in ueritate ille textus est falsus. Nam Matth. Syl. inlitas ingit: Arbor tremula. i. arbor granati syluestris. Io. Arcula. in ca. de mistu sanguinis & saniei ait: Gūmi tremulæ arboris. i. granati syluestris. Rasis in suis synonymis in fine similiter ait:

L X I I I I.

DE MEZEREON, in cap. de fluxu uentris.

Radiciū foeniculi, petroselæ, brusci, radicū prœniz, lapatii acuti, aristolochiæ ro. an. ʒ. i. hyssopi, pulegii, montani, pen taphylli, chamædrios, chamæpityos, chymi, rosarum, ana. ſ. i.

in. mente modicum, succorum boraginis, scabiosæ, fumiterre, añ. 3. ii. seminis pzoniz, anisi, marathri, carui, ana. 3. i. ameos. 3. s. cufcutæ. 3. vi. uici quercini, epithymi, fenæ, foliorum thocadæ arabici, añ. 3. ii. polypodii. 3. i. & si fit in ęstare ponat inter herbas scolopendriæ, corticum ęnestre, fra xini, añ. 3. i. mæxere non boni. 3. i. mellis rosati lib. i. s. fiat dige stium q̄ uocetur syrupus mezerius.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus apud nos non est in usu. Mezeron autem herba ē quæ apud Dios. uocat chamæxæ, & eius semen est coccognidii. Vide supra de ipso in electuario de mezerō, LXV.

DE RVBEA tinctorum in cap. de sterilitate.

Artemisia, rubæ maioris, fauinæ, añ. lib. s. tñ fauina ama ra, est, i. potest poni in minori quantitate foliorum mente, foliorum abſinthii, summatum origani, & calamethi, añ. 3. ii. spicæ nardi. 3. i. i. quantant 3. i. calami aromatici. 3. ii. anisi marathri, carui, añ. 3. i. s. leris mōtariameos. añ. 3. ii. pzoniz. 3. s. mellis ro. lib. ii. fiat syrupus quo utatur mane & sero.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu. Rubæ autem maxime tinctorum est herba cuius radix usui medicinæ cōperit. Dios. aut de ipsa duo cap. facit. unū sub nomine eritrodanū aliud sub nomine rubæ, & hæc herba apud rusticos dicitur rosa, & ab aliquibus dicitur vena tinctori, sed uenæ citrina aliud est.

LXVI.

MACEDONICVS, ibidem.

Radicū petroselinī domesticī, & macedonici, apii, fœnici, aristolochiæ, ieros, lilii, enulæ campanæ, rubæ maioris, añ. m. s. artemisiæ, pulegiū, calamethi, hyssopi, paticæ origani, diptami, collegi, añ. m. i. cinnamomi, anisi, carui, pzoniz, dauci, marathri, ameos, añ. 3. i. spicæ celti. 3. ii. spicæ nardi. 3. i. caliz liguz, colli ana 3. s. liquiritiæ. 3. ii. mellis quod sufficit & fiat.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus apud nos non est in usu. macedonicū autē est olusatrū, & est ex speciebus apii, & est q̄ Dios. hysopelinū uocat. alii apii agreſte uocat: siue ut latini olusat melius est tinctoria, & albedius, radix est alii grossa & alba & mollis, folia hñs obrotunda & uiridā in capite pleni est flore, in quo semē uiride & oblongū & uiscidū, aromaticū habens odorē, radix eius odorata & alba & eulomacea est, nascit in locis umbrosis humidis & in hortis, hæc herba cibis apta ē cruda & cocta comeditur sicut apii. Hęc apud modernos Alexandrū uocat, Nicolaus ē dicit. Alexandrū uel olusatrū est macedonicū seu petroselinū macedonico quod idem est. Math. Syluz. de ipso loquitur in capitulo de apio.

Solsequiū ēm Simo. Latine a multis uocatur intuba, ergo est endiuia, nam intuba est nomen græcum: sed a latinis endiuia nuncupatur. Circa instans in cap. de spōsa solus aut Sponfa solis, heliotropia, intuba, cicorea, dynisfa, solsequiū idē sunt. Mat. Syl. in ca. de cicorea dicit cicorea latine uel spōsa solis uel solsequiū, ēm Nicolaus solsequiū est mīxatolū, spōsa solis siue cicorea: hic textus Nicolai nō uidet sonare bene, q̄ miratol. nō ē cicorea, immo est pēradactylos, hæc uero planta ab aliquibus pentadactylis uocatur & ab aliis heliotropia. Io. uero Angli. seu Compositor in ca. de paralyti ait. Kalēdula. solsequium uel primula ueris ergo ē herba diſta a uulgo herba planca: & hæc uidetur habere plura nomina, nam cicorea potē dici solsequiū: heliotropeia idem Kalēdula idem, sed quia intectio Compositoris ē quod solsequium sit Kalēdula, ergo debemus eam ponere.

LXVII.

DE PVLEGIO, ibidem.

Artemisiæ m. iiii. sanamūdæ, calamethi, caprifolii, origani, pulegiū, camomillæ, melissæ, costi, balauſtarum, silybrii, radicū fœniculi, petroselinī, leuistici, apatii, radicū lilii, capilli ueneris recentū, adiatōs, enulæ cāpanæ, añ. m. i. marathri, carui, petroselinī, calami, aromatici, utriusq̄ scocados, anethi, epithimi, nucis mus. macis, sem. basilicoidis, chamædryos, endiuie, pastinacæ, añ. 3. ii. mellis li. ii. zuechari lib. ii. uini albi q̄r. s. fiat syrupus secundū artem.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu, secundum uero intentionem Compositoris, iste syrupus est de mente Albucasi qui ipsum describit in sua practica.

Pulegiū autē herba est satis nota. Circa instans in ca. de pulegio ait: Pulegiū in tēpore florum colligitur, per annū seruat. Dios. in ca. de diptamo dicit: Diptamū multi dicunt pulegiū agreſte est, sine dubio pulegiū est spēs diptami sicut apparet apud Sera. in ca. de origano. Idē in cap. de calamēto de pulegio loquit. Plin. inquit: Pulegiū fœmina effracior, est aut flore purpureo, samē candidū habet & c. syluestri ea quæ de domestico dicta est efficacior uis est q̄ simile est origano minoribus foliis q̄ satium, & a quibusdam diptamos uocatur guttatam a pecore caprisque balatū cōcitatur. vñ quidā græci literas mutantes ibeconō uel biconon uocauerunt: ēm autē modernos pulegium regale est usuale: sed pulegium indum seu ceruinum est diptamum.

Sanamūda. i. garyophyllata seu affusa baccara agreſtis, si ue auantia, ut inquit Compositor in cap. de uulneribus recentibus in carnē & neruis: & hæc apud herbatricos dicitur pes leporinus sed non recte, uide in syrupo de sanamūda: quod de ipsa aliquid ostendat.

Caprifolium ēm Nicolai uidet matris silua, matris silua autē apud Dios. perilymenon uocatur: & ex foliis ipsius apud quosdam fit lyciū: & est herba quæ iuxta hortos inuenitur: & est illa quam rustici uocant cezolo: in unguento de matris silua melius ostendat, si Deus uoluerit.

Adiantos seu adiantos ēm Dios. adiantos siue gallitrichō siue polytrichon est herba quæ habet folia similia coriandro scissa in summitate, habet ramus subtiles duos in longitudine unius palmi nigros, & nō hēt stipites, neque florem, neque semen, hoc uidetur esse capitulum de capillo ueneris. Nā adiatos seu polytrichon species sunt capilli ueneris, & sunt ex hominibus qui ponunt unū pro alio. Hic Compositor in isto syrupo habet adiatos, quod potest dici & de floribus marini, uel potē dici adiatōs confectio de floribus marini, sed quia Compositor in isto syrupo uerum infens habet anthos, ideo idem non sunt.

Anthos uero apud Græcos ē flos. vñ antos, id est flos roris marini, & adiatos est spēs capilli ueneris, de qua uidet Circa instans in ca. de errore marini, qui sic accūatū repetit. Recip. anthos uel roris marini, debet poni flores, & sic est.

LXVIII.

COLVMBINVS, ibidem.

Radicū fœniculi, petroselinī, hyssopi recentis, radicū lilii, radicū apii, capillorum ueneris recentū, ceterach, polytrichū, adiantos, radicū scabiosæ, huglossæ, ana. m. i. herbæ sancti Christophori, maruſe, pedis columbini, pimpinellæ, cōtolide minoris, utriusq̄ lactis corticū mori celsi, fumiter re, i. hyperico, añ. m. s. liquiritiæ m. 3. i. marathri, florū boraginis, florū camomillæ, sem. brusci, sem. sparagi, florū uolarū, añ. 3. i. zuechari lib. ii. fiat syrupus quo utatur mane & sero.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus non est in usu, secundū autem intentionem Compositoris curat omne apostema, & omnem inflammationem tempore frigido, & a ueneno liberat, dicitur autē syrupus columbinus a pede columbino qui ingreditur.

Pes autē colubinus, ēm Sera. est amomum, sed hic alius intelligitur: apud modernos pes columbinus est herba, de quo infra in troch. diacoralī de forma ipsius apparet.

Herba sancti Christophori, ēm Nicolai uidet filius ante patrem uel oculus cōsulis. Secundum uero Mat. Syl. filius ante patrem est herba quæ ex auctoritate Plin. dicitur garyophyllon, & est herba faciens florē rubeū buphtalmos: cuius stipites faciūt ramulos plurimos, sed ramus post natus ex cedit longitudine ante natū, & ob hoc filius an patre uocat similiter oculus Christi: hæc herba apud nos in pratis inuenitur, sed flos eius nō est ita, ut inquit Math. Syl. quia eius flos non est rubeū buphtalmos: nam buphtalmos habet florē citrinū similē flori camemille, & oculus cōsulis habet florem nigrū: ergo nō cōueniūt, sed error est hic. Nam buphtalmos secundum antiquam translationem habebat flores.

* Applenā uocat.

† Herba sancti iohānis vulgari.

S E C T I O V.

nigros sicut habet oculus Christi, sed secundum translationem nostram bupthalmos siue oculus bouis habet flores citrinos, & oculus Christi seu herba banti Christophori habet flores nigros, ut est notum.

Amariscus seu amaracus, secundum Dioscorid. & Plin. & Isid. est samplicus quæ alio nomine maiorana uocatur. Secundum autem modernorum opinionem amaracus est alachoen seu uchuen, ut apud Auicennam. & est illa quæ a Dioscorido theu dicitur: & apud Serapionem matricaria, & sic credo quod intentio Compositoris fit quod amariscus sit matricaria, quia in illa materia multum ualet.

EX PETRO TVSSIGNANA.

LXIX.

DE SCOLEPENDRIA, in cap. Isteritia.

Re. Scolopendria, lingue ceruinæ, endiuia, hepatica, abinthii, cicorea, ana. m. s. culcuta. 3. i. feminum communium. f. maiorum, florum boraginis, buglossæ, ana. m. i. capillorum ueneris, radicum foeniculi, petrosilii, brusici, ana. m. s. & cū zuccharo fiat syrupus secundum artem qui aromatizetur cum isto puluere. Ite foliis loco eius ponitur macis, spice nardi, laccæ, casie lignæ, ana. 3. ii. ligentur in panno lineo & bulliant in syrupo & usui referua.

COMMENTA. MANLII.

Scolopendria secundum Serapionem auctoritate Dioscoridi nominat hoc nomine propter similitudinem cuiusdam uernis dicti scolopendria: & eius expositio est quatuordecim pedum, habet folia multa egredientia ex una radice, & nascitur in petris muris ædificiorum, & non habet stipitem, nec florē, nec semen, & folia eius sunt ficut folia polyopodi & pars eius inferior est quasi rubra, & pars superior uiridis &c. hæc est quam Dioscorid. asplenon uocat, & sic si legis bene illud capitulum de asplenon apud Dioscorid. cū capitulo de scolopendria apud Serapionem uidetur quod idem sunt, sed moderni pro asplenon intelligunt ceterach, sed ego credo quod in tempore antiquo uera scolopendria erat ceterach quæ a modernis herba dorata uulgariter uocatur: & sic in isto syrupo pro scolopendria intelligitur ceterach siue herba dorata: uera scolopendria quæ inuenta fuit a modernis uocatur lingua ceruina: & ambx in isto syrupo ingrediuntur.

Lingua ceruina secundum modernorum opinionem est uera scolopendria quæ folia magna, longa & lata habet ab uno latere rugosa: & hæc secundum herbarios est uera scolopendria: uera species non habet cognitionē per scolopendriam, sed si tu uocas ceterach scolopendriam negat, & falsa est opinio, ut ostensum fuit.

EX ANTIDOTARIO BARTHO. MONTAGNANA.

LXX.

DE SEBESTEEN.

Re. Sebesten 3. ii. rubræ tinctorum, 3. s. anisi, cymini, liquiritiæ, sem. lactuæ, melonis, cucumeris, maluarū, ana. 3. ii. alchechegi, fenugreci, stoeados, prassii, ana. 3. iiii. sem. apii, amosiem, petroselinii, radicū tritici marini, dauci, feniculi, meu, ana. 3. ii. sanguinis erubii preparati, scordeon asii. 3. v. lapidis spongise, iudaici, corticū ouellanarū ana. 3. vi. coquantur in lib. ii. aquæ usque ad consumptionē medietatis, deinde colet, & colaturæ addat acetici quillitici. 3. ii. s. zucchari secundæ decoctionis lib. ii. s. coquantur lento igne, & fiat syrupus.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus apud nos in usu non est. Sebesten sicut dictum fuit in electuario de Sebesten: est quidam fructus ficut granū oliuæ: hic fructus colligitur & exsiccat donec fiat passus, & sic utimur.

Tribuli fm Dioscoridi grana sunt duo. siccus & humidus: sed humidus est ille quo nos utimur, & gerit semen ad modum castaneæ: & propter id a multis castaneolus dicitur: & dum sunt recentes comeduntur & dixit Mar. Syl. quod ex semine eius fit panis: nā ipse est dulcis & nutrit: & sic utimur loco panis tritici & apud Auicennam in a. can. uocatur hæf K.

Ericius alius est marinus: alius est terrenus. Isido. ait. ericius animal spinis coopertum quod exinde dicitur nominatum eo quod subrigit se quā spinis suis claudit quibus undique prætectum est contra insidias &c. Auic. in a. can. dicit ericius syluestris est notus: & mōtanas est alduldu habens spinas sagittales propinquas naturæ syluestris uel terreni. ille uero qui est marinus est spēs habentū ostraca. Guliel. Plac. dicit: Ericius est trium specierum unus qui est natus: alius qui habet spinas sagittales, & appellat porcus spinosus. & alius est marinus, & est spēs piscium habentū ostracum, ille quæ est notus est ille quod intelligere debemus: & de modo præparandi dicunt quidam sapientes quod modus præparandi est sicut modus sanguinis hirci.

Iudaicus. f. lapis qui dicitur iudaicus, cuius figura est similis glandi albus bonæ figuræ multum habens lineas angulatas in longitudine protendentes, & nominantur summitates laceratæ, & est lapis qui dissoluitur in aqua & non habet saporem, & dicitur iudaicus, quia in partibus iudeorum reperitur.

EX ANTIDOT. GVIELI. PLACENTINI.

LXXI.

DE CICOREA.

Re. Foliorum cicoræ m. i. foliorū boraginis, lactucarū, uolularum, scariolæ, lingue bouinæ, buglossæ, acetosæ, baccifolæ, & est herba cuius flos est celestis & eius semen est ut semen fencariolæ agrestis, sed non est albu, neque nigrum, & nascitur in bladis, ut plurimum credo quod sit scariola agrestis, ana. m. s. rheubarbari. 3. ii. pistent herbæ & coquant in lib. iii. aquæ donec tertia pars consumpta fuerit & colet, & ad datur in illa aqua lib. ii. zucchari: & cū dissolutū fuerit zuccharū ad ignē cū aqua iterum colet & ponat ad ignē cum rheubarbaro puluerizato & ligato in una petia, & sæpe exprimitur cum manu petia rheubarbari, taudiu permittatur decoqui quod bene syrupizatum fuerit totū, & tunc ab igne deponatur & referuetur.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus est ille quo utimur & maxime fm istam descriptionem: & sic adhuc in Mediolano utuntur ipso: & sic faciunt in aliis ciuitatibus: sed collegi nostrorum doctorū Papiensium magis laudat unam descriptionē quam describit Nicolaus Florentinus, & dicit, quod illa Nicolai est nobilior illa Gulielmi & hoc est quia ipse Nicolaus hæt plura simplicia in sua descriptione quā Gulielmus, & sic de rheubarbaro maiorem quantitatē habet Nicolaus quā Gulielmus. Si autem facere uolueris syrupum de cicorea secundū Nicolaum infra apparebit eius descriptio.

Cicorea secundum quosdam est intuba, alii folsequium, sponfam folis uocant. Columella in libro de cultu hortorū ait Cicorea iam teneris fundens lactiula fibris.

Plin. ait. Intubum erraticū apud nos quidam ambulam appellat. In Aegypto cicoriū uocant &c. Cicorea uero secundum Compositore est rostrū porcinum, & est herba cuius flos est celestis, & sic est secundum ueritatē, quod uera cicorea secundum sententiam Modernorū habet flores azurinos, & est spēs endiuia, de quibus Guliel. in isto syrupo nō habet nisi tres species. Cicoream, endiuia, & scariolam, sed Nicolaus in sua descriptione habet sex, de qua infra.

Scariola etiam est species endiuie uel cicoræ. Mattheus Syl. in cap. de lactuca inquit. quod sunt eius tres species: una est quæ uocatur agrestis, quæ graeci saralliam uocant nam sine dubio sarallia secundum Isid. est lactuca agrestis, ut ait in cap. de oleis, ubi inquit: Lactuca agrestis, est quæ sarallia nominamus, eo quod dorsum eius in modū serræ est. Simon Ianu. dicit Scariola fm Modernos est uelut lactuca agrestis, nisi quia in dorso costarū habet spinas paruas. pro endiuia ponitur secundū Serap. & Circa insanas scariolæ est endiuia, & secundū Petrum de Crescentiis. endiuia est scariola uel lactuca agrestis, infra in alia descriptione de speciebus endiuie si Deus uoluerit ostendam.

Baccifolæ apud nostros auctores non reperio aliquem de ipso loquere secundum intentionem compositoris est quædam herba, cuius flos est celestis, & eius semē est ut se-

men scariolæ agrestis, sed non est album neq; nigrum, & na scitur in bladis ut plurimum, & credo q; sit scariola agrestis quid autem sit communiter ignoratur: sed secundum plures est illa herba quæ in bladis reperitur quæ nos uulgo moneghetam uocamus, & sic meo tempore uidi eā poni in isto syrupo, sed scdm plures sapientes errat illi apothecarii qui ponunt ipsam. etiam male faciunt medici qui dimittunt ipsā poni, & hoc aduenit: quia nō habent cognitionē quod spēs endiuiz uel scariolæ sint: sed scdm modernorum opinionē spēs scariolæ sunt. vi. uel vii. de quibus tres uel quatuor sunt quæ faciunt florem coelestem: & una de ipsis habet florem ac semen: ut dicit Compositior: & in bladis reperitur sicut monegheta. Verum existimauerunt aliqui quod monegheta sit bachisofere, eo quod apud tuseos ita uocetur: sed error est nec eorum sermo apud sapientes acceptatur. nā opinio Compositioris est aperte q; sit scariola agrestis: quæ similis est moneghetæ, ut innuere uideatur in præsentī loco. Si ergo Cōpositior credi: q; bachisofere sit scariola agrestis, nos debemus intelligere scariolam agrestem quæ formā habet ut ipse docet: & non moneghetam: quæ non habet odorem nec sapore: & pro bachisofere, siue scariola agrestis intelligi tur cicorea agre. siue scariola agrestis: quæ florem coelestē gerit. Præterea omnes species endiuiz uel scariolæ uel cicoreæ sunt laudatæ in syrupo.

LXXII.

DE OPIO.

Opīi, pondus gra. iiii. iusquamī, pōdus gr. viii. corticum mandragoræ gra. i. s. feminis apīi q. iiii. feminis papaueris, feminis lactucarij, an. f. i. s. foliorum lactucarū, endiuiz, uel cicoreæ, an. iiii. foliorum papaueris, mercarialis, an. iiii. pistentur grosso modo, & bulliant in lib. iiii. aquæ donec cōsumatur medietas & coletur & addatur zucharum & in spissetur & clarificetur, & referuetur.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrups in usu non est. Opium secundum Auic. in a. can. est succus papaueris nigri & Egyptii ipsum seminat. Macer in cap. de tribus generibus papaueris inquit: Ex uuiis teneris opium faciente capitellis. Incisa leuiter summa cute, lacq; quod inde Desciuit, excipiunt coctileis succum; reseruant. Anidotis multis aptum uariisq; medelis. Sunt qui contundunt cum lacte suo capitella. De quibus expressum siccant in sole liquorem &c.

E RAYNALDO DE VILLA NOVA.

LXXIII.

DE PLANTAGINE, in lib. ii. cap. de Dyfen teria hepatica & intestinorum.

Succi plantaginis depurati. f. iiii. aquæ pluuialis uel rosarum quod melius ē lib. i. spodi, nucis cypressi, balauitæ, sumach, sanguinis draconis, gummi arabici, masticis, thuris, gallarum, hypogistidos, lapidis hematitis, rasuræ eboris an. 3. ii. terantur omnia in prædicto succo & aqua ros. ulq; ad medietatem coquantur, & addito zucharo fiat syrups.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrups apud nos non est in usu. Plātago uero apud Auic. in a. can. uocatur lingua arietis, & sunt ei duæ spēs scilicet maior & minor, maior est quam rustici nostri bleam scilicet inquit dicitur, & minor est quinq; neruia, quæ alio nomine lanceola uocatur & hæc est illa quæ apud falsos herbatarios pro lingua canis habetur, sed errant. Diosc. ait uocatur arnogiola siue eptapleuron. i. septē costæ uel. Serap. ait: Lise alcham. i. lingua arietis & dicitur arnogiolla, & eius expositio est lingua agni, ideo quod Græci nominant arnō agnū & glossam linguā, & dicitur etiam eptapleuron. i. habens septem costas: nam in folio eius sunt septem costæ: & eptā in Græco est septem, & pleura. i. costæ.

EX NIC. FLOREN.

LXXIII.

DE IVA secundum Nicolum Floren. in lib. iiii.

(in cap. de Paralyti.

℞. Iuz. iiii. saluæ, maioranæ, roris marini, polij, organica

lamenti, mentastri, pulegij, hyssopi, thymi, rutæ domesticæ & syluestris, betonicæ, serpilli an. m. radicū acori, aristolochiæ longæ & rotundæ, peucedani, ualerianæ byroniæ, gentianæ, diphtami an. f. s. radicū foniculij, petrosilij, apij, paragi, bruci, an. f. s. stoeados, anisi, foniculij, euilicij, ameos earui, fileris montani an. 3. iiii. pyrethri, f. i. s. passularum f. ii. aquæ & mellis quantum sufficit, & aromatizentur cum cinnamomo uisæ mulsata, & cubebis, & fiat. Iste enim syrups in hac materia est optimus.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrups non est in usu. Iua uero ut dictum fuit est uerum chamæpitoyos & nō est chamædyros: ut quidā crediderunt generaliter tenetur quod iua non sit chamæpitoyos, sed errant. Nā ego uidi apud multos apothecarios in sacculis chamæpitoyos, sed nec in sapore, nec in odore, nec in forma nō est chamæpitoyos, de quo loquuntur nostri authores, sed loco chamæpitoyos habent chamædyros: unū p hoc dico si aspexeris illam iuā quæ moderni utuntur pro iua mulsata: uidebis q; in forma, & in reliquis est uerum chamæpitoyos. Ioannes Anglicus in cap. de dolore iuncturarum ait: quodd prodest gutosis. unde uersus.

Si capias iuam guttam tollet tibi uiuam.

Serpillū secundū Plin. a serpendo putant dictum, quod in syluestri euenit in petris maxime. Satiūm non serpit, sed ad palmi altitudinem crescit. Diosc. serpillum siue ut alij herpillum: Latini ut cicer erraticum uocāt &c. folia & florem secundum Circa instans medicinz competunt.

Valeriana idest phu.

Byronia. i. cucurbita agrestis Papias ait: Ampelos leucoseu byronia quam Latini albam uitem uocant: uide de ipsa in confectioe de alfefera.

LXXXV.

DE LILIO in lib. v. cap. de Bolismo.

℞. Flores lilij albi, & decoquantur in aqua non quidē soli quia nocent fimocho cum proprietate eorum, sed cū aliis aromatibus corrigentibus maliciam eorum, & fiat syrups cum zucharo, & decoctio eorum secundum artem.

COMMENTA. MANLII.

Itius syrups sicut inquit ibi Niculus, nō reperitur descrito apud alios auctores secundum intentionem ipsius potest fieri sicut ipse docet.

Lilium scilicet lilium albū quod florem album gerit. Rosa anglica habet unam descriptionem syrups de lilio, sed ibi non habet nisi ireos, idest lilium coeleste, & propter id ille est syrups de ireos, ut dictum fuit. Macer ait. Lilia iure sequi quæ nec specie nec odore Credere creduntur, roseo colata decori. Nec minus in multis hominum sunt apta medelis. Eius radices bulbus qui lilia profert &c. Hoc lilium satis est notum.

LXXXVI.

Optimus ad omnem hemorrogiā undecunque fiat secundum eundem in libro. v. in cap. de præseruatione a spu sanguinis & cura eius.

℞. Hypocistidos, cimolæ, boli armeni, acaciæ, coralli albi & rubei, mumij, psidiz, gallæ, mentæ, balauitæ, gummi arabici, draganti, symphiti, corrigiolæ, feminis arnogiollæ, sumach, radicū pētaphylli, sanguinis draconis. an. f. i. decoquantur in aqua pluuiali usque ad tertiam, & coletur & addantur lib. iiii. zuchari, & fiat syrups.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrups apud nos non est in usu, sed secundum intentionem Nicolī est optimus in illa materia.

Chimolea secundum Diosc. est gicimolia: cuius alia est alba atq; densa, alia purpurea. Apud Auic. uocatur lutū chī molea: uide de ea supra, in confectioe eodæ.

Psidia est cortex mali granati: sed psigia est thorax ligda.

Symphytum de ipso dictū fuit quod est consolida maior, siue anagalicum: uide de ipso in syrupo de pimpinella.

Corrigiola. i. polygonia, siue cētū nodia, siue uirga pastoris. Diosc. uocat ipsam polygonos masculum: & ibi etiam de scribit aliā quæ dicit polygonos femina. Petrus de Cres.

inquit. Virga pastoris est cardus sylvestris: ille textus non videtur bene sonare: nam virga pastoris non est cardus, vt ipse & alij dicunt. Nam si legis capitulum de polygonos Dios. cū cap. de virga pastoris apud Sera. & Auic. videbis quod idē est. Et idem Ioā. Sera. in ca. de lapide vocat ipsam dimirison, & hæc herba in vis multum reperit. Matt. Syl uaticus in cap. de displaco. i. cardo fuluolū dicitur quod est virga pastoris: sed non recte. Quidam vocant corrigiolam sanguinariam, sed secundum aliquos sanguinaria est illa herba, quam hodie burfam pastoris vocamus, siue a vulgo herba gugiariolla.

LXXVII.

AROMATICVS, in eodem lib. cap. de De-
bitate Digestionis.

✱. Cubebarum garyophyllorum, zingiberis, cinnamomi nucis muscatæ, cardamomi, macis, calami aromatici añ. 3. s. spice, mastice, asari, squinanti, folij. ana. 3. vi. amomi, ameos, colli, cyperi, carpobalsami, xyloaloes ana. 3. iiii. sup pistata infundatur in vino alio veteri pōderis lib. x. tribus diebus, deinde coquat ad tertiā partē, & cū frigeſcit mani bus fricent & colent, & cū lib. iiii. mellis decoquantur, in va se bene obturato reponantur, & cū multo aromatizentur.

COMMEN. MANLII.

Iste syrupus non est in vſu. dicitur autem aromaticus propter species odoriferas quæ in eo ingrediuntur. Idolorus in capitulo de arboribus aromaticis inquit: Aromata sunt quæque fragrantis odoris quæ India & Arabia mittit siue alia: regiones. nomen autem aromata traxisse videtur, siue quod aris imposita diuinis inuocationibus apta videantur seu quod ipsa aeri inferi ac miseri probantur. nam quid est odor nisi aer contractus.

LXXVIII.

DE CICOREA, in eodem lib. cap. de oppi-
latione Hepatis.

✱. Endiuia domestica & sylvestris, cicorea, taraxacon ana. ii. i. cicerbita, hepatica, scariola, lactuca, fumicetæ, lupi norū, ana. m. i. hordei non excoſicati, alchechengi ana. 3. i. i. quititæ, capillorū veneris, cetherach, polytrichi, adiantū, cuscutha, ana. 3. vi. radicū fœniculi. apj. sparagi añ. 3. ii. fer uant in aqua sufficiēti, & colunt, & cū zucchero albo soli do fiat syrupus, pro cuius, vnaquaq; libra ponatur ad co- quendum. 3. iiii. rehu. electi, & 3. iiii. spice ligatæ in peſia rara quæ sape exprimat donec ferpinū sit pſectē decoctus dosi 3. iiii. cū aqua mulſionis ſemipū cōmuni frigidorum.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus secundum collegium nostrorum doctorum Ticinensium est ille quo vti debemus: aliqui tamen magis laudant descriptionē Gulielmi Placeti. Et ea videntur sicuti Mediolanenses qui descriptionē Gulielmi præparat. Ioā. Matt. gradi in cap. de cura malarum dispositionū hepatis habet vnā aliā descriptionē: quæ quasi idē est cū illa Nicolī: licet aliqua simplicia mutauerit. aliqua omiserit: nunc vero in- tendo declarare oēs species endiuie, cicoreæ vel scariolæ.

Endiua nomē latinum est post gradū intuba. Arabes & post græcū vndebe dicunt. In hac uero uolo ostendere omnes ipſes cicoreæ uel endiuie, vel scariolæ: sed primo uo lo ostēdere illas spēs: de quibus ipſe Nicolaus in proprio li- bro loquitur. nam in cap. de debilitate hepatis ait sic. dicit Auic. taraxacō: quā Gētilis dicit esse cicerbitā. siue rostrū porcinū. & Guli. dixit ipsā esse cicoreā. & est illa species quæ a multis uocatur. plāta leonis. hic textus Nicolī uidet corruptus. nam ipſe Nicolaus debeat dicere quod dens leo nis quæ est ipſe cicoreæ & non planta leonis quæ est herba dicta flaura uel herba maura quæ odorem asphalī habet & hæc est ipſe trifolij quod est consonum. idem iij. cap. de op- pilatione hepatis dicit. taraxacon est ipſes sponſe folis, & in ferius in eodem cap. inquit: Rostrum porcinum est cicerbi- ta &c. Habita opinione Nicolī sequit opinio Ioannis Anglici in ca. de ſarax calidē hepatis quæ est q. alaraxacon est rostrū porcinū uel cicoreā idē ſentit in cap. de ſitula ſulce

re, cancro, & sanie oculorum.

Postquam ostendi uerba Nicolī & Ioannis Anglici de taraxaco & rostro porcino, etiam uolo ostendere opinio- nem aliorum: & dico quod species endiuie uel cicoreæ sūt septem ad numerum, de quibus ipſe Nicolaus sex species in isto syrupo ponit. Gulielmus autem in sua descriptione nō pōnit nisi tres ostendit cicoream, scariolam, & bactifole- ram, ut per ſe ſcilicet ostendat.

Endiua domestica. i. usualis est herba satis nota. syl- uestris uero potest dici quod sit crispinus herba cicoreā uero secundum sententiam modernorum habet flores azurinos uerentes seipſos ad solē: quare sponſam folis, & solſequiū uocauerūt de qua Circa inſitās ait: Sponſa folis est cicoreā uel intuba, uel solſequium, hæc ē satis est nota. Sera. in ca. de endiuia inquit: undebe sunt ipſes. nam est ex ea domesti- ca & est scariola & est ex ea syluestris quæ est taraxacon: & est tertia ipſes quæ dicit cadārel & est amiron. &c. in Circa inſtans & Petrū de Creſcen. in ſitua ē scariola. Gale. in 8. simplicium dicit. feris idē endiuie, inferius dicit.

Condrine est species cicoreæ, uel lactucæ. Aui. in 2. can. in ca. de indiuiā ait, quod est ex ea syluestris & hortulana, & est duarum specierum, & magis inuatiua ex eis hepā- ti est illa quæ est magis amara ego credo quod sit cicoreā. idē aliud capitulum facit de taraxacon: & dicit quod est ipſes endiuie: etiam ista nota est.

Scariola uero ſecundū Simo. Ia. est uelut lactuca agreſ- tis, nisi quia in dorſo coſtarū habet ſpinas paruas, ſe Mat- theus Syl. & Idolorus uolunt quod lactuca agreſtis ſit ſca- riola uel dictū ſiuit etiā hic dictā herba Idolori quæ in cap. de oleribus dicit, lactuca agreſtis eſt quam ſarraliam nomina- mus: eo quod dorſum eius in modū ſerræ eſt. Simon in hac errat. nam in ca. de ſcariola dicit, quod ipſa eſt uelut lactu- cam agreſtis, & in capitulo de ſarralia inquit, ex authorita- te Idolori, quod ſarralia eſt lactuca agreſtis. & in fine dicit q. eſt ſcariola, & ſic uolunt multū moderni.

Cicerbita uero ſicut dicit Nicolaus eſt roſtrum porcinū, ſecundum Gulielmum eſt cicoreā, & eſt herba cuius ſlos eſt coeleſtis. Etiam reperitur duæ aliæ ſpēs quæ ſlorem cœ- leſtē habēt, & oēs in bladīs reperiuntur. Et ſic ſi bene cōſider- re uidebis quod ſpecies endiuie uel cicoreæ ſunt ſepē: & ſunt ipſe uidelicet endiuiā domestica. i. usualis. cicoreā quæ ab omnibus nota eſt roſtrum porcinū dens leoninus, diſſerūt parū inter ſe: ſed mōdernoſū opinione in pratis reperiuntur cum ſlore croceo, niſi ſolum in folijs diſſerunt. Poſt maturationem ſlorem producant quandam laui- gem albā quæ cum tangitur euolat, & alia eſt dictā criſpi- num a uulgo. & hæc apud quosdam eſt lactuca aſini, quod non credo ſicut patet ſi legis capitulum de anchuſa apud Dioſ. uidetis q. cum. cap. de criſpino non conuenit, & eſt alia ſpecies quæ dicitur cicorialis, & eſt ſcariola quæ in bla- dis reperitur, & omnes ipſe ſpēs uocantur endiuiā, uel cico- rea uel ſcariola. Et he notæ ſunt apud ſapientes.

Alchechengi ſeu chechengi eſt ſtrignus agreſtis, ſecun- dum Dioſ. & eſt herba proferens granum rubicundū ſim- ile cereſo in ueſica inſeſum, citrina in colore, quæ a multis ueſicaria dicitur, ſed apud Lombardos ſiaccio nominatur, & in uijs reperitur. Aduertendum eſt in deſcriptione præ- ſentis ſyrupi quod in omnibus codicibus Nicolī quos uidī deſicit doſis hordei & alchechengi ingredientium dictā de ſcriptionem, quod credo accidit ſi errore ſcriptoris potius quam alia cauſa, ſed ut haberetur modus doſandi prædicta duo ſimplicia, uolui conſerre hanc deſcriptionē cū illa quā ponit Io. Matthe. gradi, qui etiam prædictum ſyrupū deſcri- bit: & inueni eas in ordine pōdere, & in omnibus alijs con- cordare, & ipſm doſare prædicta duo ſimplicia hoc modo ſim- mit. n. hordei non excoſicati. 3. ii. Alchechengi. capil. uene- ris &c. ſed mōdū ordinē Nicolī ana. 3. vi. ideo & nos debemus nō proculdubio eo modo doſare illa duo, uidelicet hordei nō excoſicati. 3. ii. alchechengi. 3. vi. quanuis præter noſtrā uoluntatem appoſuerint impreſſores æquale pondus eo- rum. Nam ſi ſumeremus. 3. ii. chechengi: excederet debitū pondus, nec bene proportionaretur alijs.

Ceterach, sicut dictum fuit in syrupo de scolopendria est herba quæ a modernis herba dorata dicitur.

Polytrichon est herba quæ in puteis & in locis humidis reperitur, vt dictum est supra in syrupo de pimpinella.

LXXIX.

DE FICVBVS, in eodem lib. in cap. de cura colicæ ex fœce.

Recipe ficum albarum .j.i. aquæ .j.x. coquantur ad lentum ignem vsquequo venerint ad statum iulep de quo accipiat omnino die .j.iii.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupo apud nos non est in vsu. Ficus. i. carica. Serap. in cap. de ficu ex autoritate Gal. inquit: quod sunt ex eis domesticæ & syluestres & montanæ, & ex domesticis quædā sunt recetæ, & quædā siccæ, virtus recentium est debilis, quæ admissæ eis de humilitate, siccæ sunt meliores nixine carnosæ: syluestres vero ficus sū quosdā vocat caprificus: & dicit Plin. q. huius fructus nunquam maturescunt.

LXXX.

DE ARTEMISIA in lib. vi. in ca. de retentione menstruum prius naturam.

R. Artemisia. m. ii. pulegij, calamenti, metastri, origani, melisse, persicariæ, fauicæ, sancti, chamædii, yos, pforatæ, chamæpityos, matricariæ, cum flore, centaureæ minoris rutæ, betonicæ, melissæ, ana. m. i. radicis foeniculi, apij, petroselinij, sparagij, bruscij, xaxifragæ, enule, diptami, ciperi, rubeg, tinctorum, reos, prœniz. añ. .j. i. seminis iuniperi, leuistici, petroselinij, apij, anisi, nigellæ, carpopalsami, costij, asari, pyrethri, casie lignæ, corderum, calami aromatici, phia. añ. .j. s. conqussentur & infundant in aqua pluuiali sufficienti per diem & noctem. Postea decoquantur ad medietatis aquæ consumptionem, tunc deponatur ab igne, & dimittat donec aqua tepuerit: tunc manibus in ipsa aqua positis fricentur postea colentur, & in colatura addatur mellis vel zuchari quantum sufficit, & fiat syrupo, & si humor fuerit viscosus acetosetur cum aceto acuto vel squillitico & fiat syrupo aromatizatus cō cinnamomo & nardo, cuius dosis sit. .j. ii.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupo apud Modernos in vsu non est: & maxime sū istam descriptionem, sed illa descriptio quæ vimur est magistralis quam Moderni praticantes, maxime Papienses multum laudat, & multū valet ad ea quæ dicit Nicolaus Ioan. Marr. Gradi in ca. de prouocatione menstruum habet vnam aliam descriptionem quæ ab hac non differt.

Artemisia sū Circa instans est mater herbarum: cuius folia magis competunt vsui medicinz quam radix, Diosc. in cap. de Artemisia dicit: Artemisia tria sunt genera: vnum est quod vocatur artemisia monodonos. i. mater herbarū, quæ est fructuosa, & similis abanthio: folia pinguiora & maiora hīs, & hastes longas: nascitur in maritimis locis lapidosos & sabulosos: Altera artemisia tagetes cominatur quæ tenera est semen habet minutū, & vna hastes folijs plenam, & nos lingua latina vocamus thanasiam, vel secundū quosdam anthaniam. Est & tertia artemisia quæ leptaiflos dicitur: sicut circa fossas & agros, foliosculum eius si contriueris sancti odorū habet. Gal. in .6. sin. añ. Berengef. i. artemisia, sed textus Auic. in .2. can. non videtur multum cōsonus, quia ponit quod est abrotanum q. communiter non creditur nisi sumpsisset abrotanum pro artemisia.

Melissa sū modernorum fen. entiam est ozimum cigratū cuius folia odorem citri habent, etiam citraria dicitur: miror quod Nicolaus in isto syrupo habeat. & melissæ: & inferius iterum replicat eandē, credo q. sit error scriptoris, vt ostendat in alia litera.

Persicaria, id est herba sanctæ Mariz: & est herba quæ habet folia similia persicis signata: apud nos iuxta hortos reperitur existimant quidam quod hæc sit zingiber caninum, vt videtur sentire Auic. in .2. cano. etiam putauerunt quidam q. ipsa sit piper aquæ.

Pistoria. i. herba sancti Ioannis sine fugadæmonum, siue hypericon, & dicit pfo. atq. quia folia eius habet foraminā parua in locis domesticis reperit. Auerois in v. col. ait.

Heufericon. i. hypericon, nelfricon: & quidam appellat hanc herbam cordiale, eo q. assimilatur cordi.

Matricaria etiam est artemisia: & est illa quam Diosc. vocat leptaphyllous, sed Auic. in .2. can. vocat ipsam vehuen aliquando alaoen, & hæc est quam Lombardi crisfulam dicunt, de ipsa melius ostendam infra in cap. de trochiscis alindaracaron, si Deus voluerit.

Melissa vt dictum fuit, est ozimum citratū, miror q. Nicolaus in isto syrupo habet superius melissam, & inferius iterum habet melissam, sed existimo quod sit errore scriptoris. Nam Ioan. Marr. Gradi loco eius habet abing lissam. i. lactucam asini, sicut patet apud Auic. in .2. can. in proprio cap. de abugillisse, & idem de ipsa quatuor cap. facit, vñ sub noie abugillisse, aliud sub nomine heartelli, aliud sub noie lactucæ asini, aliud sub noie sciniar, & hæc vñpōd Diosc. vocatur ancusa. Sapientes vero existimant quod Nicolaus volebat dicere abugillisse: vt dicit Ioan. Marr. & dicunt quod loco eius potest poni lactuca vialis.

Leuistici apud Auic. vocat cheisim: & est semen satis notum, sed eius genera sunt duos. hortulanū & campestre, hortulanum vero est proprium illud quod notum est, campestre sū modernorum opinionem est corderum, siue carui agrestis, & ambe in isto syrupo ingrediuntur.

Corderum sū Scra. est carui agrestis, Ioan. Arculanus in cap. de epilepsia in electuario q. valet ad omnem epilepsiam inquit q. corderum est cōardomū, & sed mihi non placet liber qui dicit Albuchasis in tractat. in ca. de forma stypticandi oleum ad faciendum oleum de lilio ait: Carui agrestis & est corderum. similiter ait, Guliel. Placen. in di. stinctione de theriaca vt dicit in fute, & hic pro corderum intelligit semē leuistici campestris, & hoc est semē q. reperitur sub planta peucedani & hoc est ex secretis simplicium.

EX GENTILE DE FVLGINEO.

LXXXI.

DE ENDIUIA, inuentione Gentilis de Fulgineo, R. Succus endiuiz, succi hepaticæ añ. lib. iiii. clarificetur predicti succi ad ignem vt expedit, foras violatū, lentulicæ aquæ florum nenupharis, polytrichi añ. .j. s. capillorū veneris, hordei mundi, seminum communium maiorū frigidorum añ. .j. i. fiat syrupo cum zucharo quantum sufficit, secundum artem, & aromatizetur cum sandalis albis & rube, & berberis, seminum cyoniorum, ligni aloes, cinnamo, corticum citri. añ. .j. i. & vsui referetur.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupo secundum plurimum est ille quo vimur p syrupo de endiuia compositos: tamen sunt qui faciunt ipsū sū descriptionem quā superius posui ex autoritate Francisci de Pedemontium: & sic ambz habent efficaciam. Hepatica est herba satis nota, Diosc. vocat ipsam lichenam, vt dictum fuit in syrupo de hepatica.

DE OFFICINIS, vulgo MAGISTRALIS.

LXXXII.

AD MATRICEM.

R. Matricariæ, carpopalsami, calami aromatici, xylobalfam, fileris montani, casie lignæ añ. .j. iiii. anisi, foeniculi, seminis carui, pulegij, origani, calamenti, rosmarini, ferpillij añ. m. i. ligni aloes daronici, cinnamomi. añ. .j. s. seminis agni casti, cuscute añ. .j. iiii. radicū mādrazog, vsquā mi. añ. .j. s. mellis despumati quātū sufficit. fiat syrupo sū artem dentur mulieribus habentibus malum stomachum frigidum, & ad passionem matricis mirabiliter valet.

COMMEN. MANLII.

Iste syrupo sū istam descriptionem est in vsu in quatuor Mediolanensibus, & debet fieri decoctio cum aqua ferata ad pōdus lib. viii. & lib. i. vini albi odoriferi & oia coquantur vsq. ad cōsumptionem medietatis. Mattheus Syl. de ipsa loquitur in litera ferugo. matricaria est artemisia, & est illa quam Diosc. vocat parthenion: sed Auic. vocat ipsam vehue aliquando alaoen: quod idem est & hæc est herba quam Lombardi crisfulam vocant.

S E C T I O V.

Agnus castus, s. semen notum est. Dios. inquit: Agnus si uel aligis latine alexandrina appellata Serap. de ipso duo cap. facit. vnum de arbore quod dicit agnus castus. aliud de piperella q̄ semē eius infra apparebit descriptio roc. de agno casto: & ibi melius ostendit si domino placuerit.

L XXXII.

DE ARTEMISIA.

R. Florum Artemisiz m. ii. calamēti folij, saturegia, origani, thymi, tamariſci, stoeceados ana m. i. florum camamillæ, florum melliloti, sanſuci, anthos, ana ʒ. i. blaſci bizantie, calami aromatici, añ ʒ. i. iii. spicæ celticæ, ʒ. i. chamædryos, matri cariz minoris, bethonica, abrotani, ana m. s. acori, praslii, foliorū rubæ maiorū, sleris montani añ. ʒ. i. affari, quinanti, anisi marathri, ameos, apij, añ ʒ. vi. fiat decoctio ex istis & cum melle quantum sufficit fiat syrupus.

COMMEN. MAN LII.

Iste syrupus est ille qui generaliter in usu est: tamen hodie inueni vnam aliā descriptionē q̄ describit Nico. Florentinus, quæ etiam est laudata apud nostros doctores, de qua vide supra: tñ vide vtranq; & elige quæ volueris.

Artemisia. i. aleſia berengelſi. Papias ait: Artemisia ab inuentore dicta vt Plinio placet herba a Gētilibus Dianæ consecrata, nam græce arthemis Diana dicitur. Macer inquit in principio libelli sui.

Herbarum quoddam dicturus carmine vires.

Herbarum matri dedit Artemisia nomen.

Cui græcus sermo iustum putō ponere primo.

Huius opem fertur prior inuenisse Diana.

Arthemis græce quæ dicitur, indeq; nomen.

Herba tenet &c. sed Circa instans est mater herbarum.

Folium. i. malabathrū, loco eius ponatur spica: aut mactis saturegia. i. thymbra: Pli. inquit: Tymbra vero quæ sit cucula hæc apud nos habet vocabulum, & aliud saturegia dicta in condimentario genere, feritur mense Febuario.

Anthos græce est flos: vnde aloſantos. i. salis flos, sed hic pantoos intelligit flos roſmarini, inde Nicolaus diathos dicit: quia fit de florib. roſmarini est flos eius dicit alchilil.

Matri caria minor secundum plurimum est secunda spēs artemisiz. Dios. de forma ipsius describit, & hæc est illa quam hodie tenacetur, siue daneta vocant.

Abrotanum herba est satis nota. Io. Sera. in cap. de retentione menstruum, & cura eius inquit Sanguifera est abrotanum in antidotario in decoctione ad hydropicos dicit Belengelſi est sanguifera hic textus Serap. nō videt verus nā ipse vult q̄ sanguifera, & abrotanū & berengelſi sint idē sed non est, quia berengelſi apud Gal. ac Simonem est artemisia, & non est abrotanum, vt dicit Io. Sera. ac Auic.

L XXXIII.

CORDIALIS.

R. Melissæ buglossæ boraginis, endiuiz, lactuce. añ. m. ii. seminum communium frigidorum maiorū, sandalorū, rubeorum, acetosæ añ. ʒ. i. fiat decoctio cum aqua rosata, aquæ mellisæ aquæ buglossæ, aquæ endiuiz, aquæ boraginis, vini gratorum vini berberorum, agrestis, lucci, rāciurum añ. ʒ. vi. zuchari albi lib. vi. misce, & fiat syrupus secundum artem.

COMMEN. MAN LII.

Iste syrupus in Papiā non est valde in usu sed in Mediolano magis: & sine dubio est cordialis, quia confortat cor & custodit pericula quæ accidunt in corde.

EX HIERONYMO DE CASALI.

L XXXV.

DE ACOR O, secundum intentionem domini magistri

Hieronymi de Casali physici clarissimi.

R. Radicem acori. ʒ. iii. hyssopi, calamenti, origani siccz, melissæ, buglossæ, añ. m. s. stoeceados arabi, polypodij, pyrethri, boni ana ʒ. vii. piperis longi & nigri ana ʒ. iii. cinamomi fini, zingiber. fini, senæ bonæ ana ʒ. s. myrob. chebulorum indorum, emblicorū ana ʒ. i. s. sanſuci, rutæ, beronicæ, pulegij, saluæ ana ʒ. vi. hæce, epithymi ana ʒ. i. zuchari lib. iiii. fiat syrupus secundum artem.

COMEN. MAN LII.

Iste syrupus a modernis practicantibus non est valde in

usu, sed tempore domini magistri Hieronymi magis erat in usu & ipse laudat eum ad ægritudines neruorum, & ad multa alia. Acorus secundum Dios. est herba venerea vel aphrodisia vel piper apum. Pli. super hoc ait: quod semper in aquosis nascitur. Serap. dicit: Hæc. i. acorus & nomina tur spatella: quidam vocant ipsum gellam, & ab aliis gladiolus palustris dicitur. Arabice vero nominatur huegi vel oggi: radix eius vsui medicinz competit.

Hæce. i. rhymus. Io. Sera. in ca. de retentione menstruum dicit: Alfoura. i. alhafe, quod idem est.

DE OFFICINIS.

L XXXVI.

DE SCABIOSA.

R. Succi scabiosæ depurati lib. i. aquæ decoctionis herdei, capillorum veneris ana quantum sufficit, zuchari lib. ii. dissoluti in prædicto succo, & decoctione, cui addantur corallorum rubeorum tritorum ʒ. iii. ligaturum in pecia rara & ex eis fiat syrupus.

COMEN. MAN LII.

Iste syrupus in partibus nostris nō est valde in usu. Scabiosa vero ē herba satis nota, sed miror qd̄ nostri authores de ipsa non loquuntur, tamen secundum intentionem Matthei Syl. dicit: Scabiosa Latine, Græce stibes vel stibos: & ibi loquitur de scabiosa ex autoritate Dios. sub litera scabiosa q̄ nō reperitur. verum q̄ Dios. ca. vnum facit de sti beos, sed ignoro quod illud sit de scabiosa, sed secundum intentionem Matthei, idem est. Concoregius in ca. de tussis in fine capituli inquit sic, sed quia scabiosa confert in hac passione & parū de ea dicit ab authorib; ideo hos versus nota.

Vrbanus per se nescit precium scabiosæ.

Nam purgat pectus quod comprimit ægra senectus.

Purgat pulmonem laterisq; simul regionem.

Rumpit apostemata, lenit virtute probata.

Emplastris foris necat antracem tribus horis.

Intus potatur, & fit vnus euacuatur.

L XXXVII.

DE BETONICA.

R. Betonicæ m. i. rutæ, chelidonis, fragariæ, eufragiæ, leuistici, pulegij, chamædryos, roſmarini, origani, foliorum lauri, saluæ, hyssopi, liquiritiz, rubæ tinctorum, garyophyllatæ, sanamiz ana m. s. semen anisi, anethi, ameos, petrosilij, lactuce, ana ʒ. i. s. rosarum, florum boraginis ana ʒ. i. fiat ex ipsis decoctio, & cum zucharo albo fiat syrupus.

COMEN MAN LII.

Iste syrupus apud nos non est in usu. Sed in Mediolano vntur ipso.

Betonica vero est herba satis nota. Dios. vocat ipsam betonicam. Sera. in ca. de betonica dicit plurimum q̄ ex ea administratur sunt folia. Gal. in 7. simpl. dicit: Cestrum latine dictum betonica: Macer ait: Betonicam soliti sunt cestron dicere Græci.

Pli. veronesis in Hispania eam quæ Betonica dicitur in Gallia: in Italia autem sarratula, & Græcis cestron dicitur. Auer. in 5. col. ait: Alchison quæ in latino dicitur betonica, & in Persica lingua berahum.

Fragaria herba est ferens fragra, & granum ipsum fm Matth. Sylua. est granum acetosolum, eius plāta similis pentaphylloni est quæ propter Pli. in ca. de quinq; folio dicit, Quinq; folium fragra gignere, non quod illud sit quinq; folium quō nos vtuntur in medicinis, sed ad eius similitudinē s. a numero foliorum quinq; folium appellatur apud nos vero fragra sunt fructus, qui quando matureſcunt, rubicundi efficiuntur, & satis noti sunt.

Euphrasia est herba quæ in pratis ac alibi inuenitur, & secundum Mattheum Sylua. est herba adhil, & laudat ipsam, quia medetur eggritudinibus oculorum.

L XXXVIII.

DE LVPVLIS.

R. Succu lupulorum lib. ii.

Succi fumiteræ lib. i.

Puri-

Purificetur succi, & cum lib. iii. zuchca. fiat syrupus.

COMMEN. MANLII.

Iste syrupus apud nos non est in usu. Lupulus uero secundum Mes. est species uolubilis, & est habens folia similia citrullo: cuius nos est sicut ampullæ adhaerentes: ipsa uero planta dum est recens, in principio hortus sui comeditur cima ipsius. Petrus de Cresc. dicit: Humilis. i. leuerrigo flos eius, propter siccationem maximam suam seruatur per longissimum tempus in uirtute sua: ita quod uulgaris opinio est quod nunquam putrefcat, & est acuti odoris, & fortis: hæc apud nos in hortis reperitur.

LXXXIX.

DE BUGLOSSA.

¶ Succu buglossæ, succi boraginis, ana. lib. ii. succi pomorū dulcium. lib. i. s. folliculorū senz. 3. iiii. croci. 3. ii. folliculi senz. & crocus ponantur in infusione per diem & nocte in parū aquæ, & cum illa infusione fiat decoctio, & cum succo & lib. iiii. zuchari, fiat syrupus secundum artem.

COMMENTA. MANLII.

Iste syrupus in usu nō est apud nos. Buglossa uero herba est satis nota. Gal. in 6. simpl. dicit: Lifen althaur. i. lingua bouis. Id. ait: Buglossa a Græcis dicta, eo quod folia asperima ad modū linguæ bouis habeat. Auic. in. 2. can. de ea loquitur in tribus locis, uidelicet in ca. de chen zauguen, & in ca. de lingua bouis, & in ca. de maru, & sed m quosdam habetur opinio, quod ipse Auic. nō cognouerit uerā buglossam.

XC.

DE SVCCO ENDIUIAE.

Rec. Succu endiuie depurati lib. viii.

Zuchari tabazer. lib. v. s.

Fiat syrupus secundum artem.

COMMENT. MANLII.

Iste syrupus apud omnes generaliter est in usu, & miror quod descriptio sua ab authoribus auteticis nō reperiat unde quid doctor ordinat syrupum de endiuia simpliciter de isto semp intelligitur, & est syrupus de endiuia simplex, uel syrupus de succo endiuie: supra positz fuerūt duæ descriptiones, sed sunt descriptiones syrupi de endiuia compositi.

XCI.

ROSATVS ex infusione Rosarū siccarū.

Rec. Infusiois Rosarū siccarū, } ana. lib. ii.

Zuchari,

Coquatur & coletur, & fiat syrupus secundum artem.

COMMEN. MANLII.

Modus autem faciendi infusione rosarū siccarū est sicut fit ex rosis uiridibus: cuius descriptionē ipsius supraposui. Et scias quod etiam ista descriptio aliquando utimur: tamen raro, si esset aliquis qui uellet facere syrupum rosatū solutiū uideat descriptionem suā apud Auic. in. 3. cano. in fen. in. xxiii. in cap. de solutiis, sed non est in usu.

LVMIN. MAIORIS.

SECTIO SEXTA.

ROB, vel ROBVB, hoc est SAPA S, vel SVCCOS MEDICATOS continens.

EX MESVE.

I.

DE RIBES.

Ecce succi ribes lib. x. decoquatur cum facilitate uale dum consumatur tertia ipsius, deinde coletur, & dimittatur residere usque dum clarescat: deinde coquatur cum multa facilitate in uase uitreo dum habeat spissitudinem, aut ex ponatur soli usque dum pinguescat &

conseruetur.

COMMENTA. MANLII.

Rob uero apud Arabes ē, succus cuiusdā fructus coctus

ad spissitudinē ut seruari possit. Auic. in 5. can. in 6. tracta. ponit differentiam quæ est inter syrupum & rob, & ait quod syrupi sunt decoctiones, & succi inspissati cū dulcedine, & rob sunt succi inspissati per seipsos. Gale. in lib. secretorum in cap. de Phrenesi & tussis sicca, & fere cōclūsa ait: Coagulatū & est rob: tamen scias quando simpliciter reperitur rob intelligitur multum coctum.

Ribes secundum Serap. est planta habens capreolos recentes rubeos ad uiriditatem tendentes in fine cap. ait: Et putauerunt aliqui medicorum quod sit illa quam nos nominamus acetosam. i. lapaciū: & putauerunt alii quod ipsa sit granum acetosum quod deferret ex coraceni: & Guliel. Plac. ait, ribes. i. acetosa uel acetofella quod nō credit. nam aliud est ribes, aliud est acetosa. uerū ē quod ambz uidetur habere eandem uirtutē: sed non sunt eadem. Auic. in. 2. cano. in cap. de ribes ait. inest ei uirtus acetositatis citri agrestis. Et fit in Da mafco syrupus de ribes qui deferret ad nos: & utimur ipso.

II.

OMPHACON, vulgo de AGRESTA

Modus eius est sicut, Rob de Ribes.

COMMENTA. MANLII.

In usu non est.

III.

DE CORNIBVS, ualens sicut Rob. de Agresta. Rec. Succu Corniū, & propriis quibus est meditatio inter matutinitatē, & acerbitatē, et opatio eius ē sicut Rob de Ribes.

COMMENTA. MANLII.

Cornu est fructus similis oliuæ, sed oblongior apud nos in hortis nascitur. hoc apud Diosc. uocatur cranea arbor. i. cornea semen habet simile oliuæ sed paulo oblongius & uiride, quod cū maturū fuerit obruffi coloris ē. exiliūmāt quidam quod iste sit fructus qui apud Auicem. in. 2. cano. uocatur mauran. Quid meth. i. ait.

Corna quæ est in duris hęc gentia mora rubetis.

Et Virgilius.

Vitum infelicem baccas, lapidosaq; corna

Dant rami.

IIII.

DE SVMACH.

ROB de Sumach ualet sicut Rob de Berberis, & eius operatio est sicut Rob de Ribes.

COMMEN. MANLII.

Non est in usu: sumach ēm Auic. aliud est coraceni: & aliud est seni minus coraceno rubet: lentis similitudinē habens, & est conueniens ei cui cōueniūt acacia, & rosa &c. Sera. ca. de Sumach dicit ex autoritate Diosc. sumach sunt quidam qui nomināt ipsum adiutorio & est sumach cibus in arabico, & est plāta quæ dicitur ros barfodistichos: & ē in arabico sumach coriorum, & est arbor nascens in locis saxosis, cuius longitudo est duorū brachiorū, folia habens oblonga quorum color uergit ad rubedinem sanguinis grana habet magnitudine lentisci aliquid uelut lata, iuuamentum eius est in cortice granorū. Gal. melius quod est in tota arbore est cortex granū eius: & succus eius, ēm Circainlans eius granum per quatuor annos seruatur.

V.

DE MORIS SENI.

Rob de Moris seni immaturus ualet sicut Rob de sumach, & fit sicut illud.

COMMENTA. MANLII.

Non est in usu.

Peroratio in. IIII. V. & VI. Sectiones.

Sectioni de syrupis & robis secundum intentionem diui Mesue & aliorū doctorū hoc loco finem imponimus: uertamus modo sermonem nostrum in sectionem de decoctionibus. Illuminet igitur sensus & corda nostra ille qui est lux, ueritas, & uita.

Lumi. Ma.

K

SECTIO VII.

LV MIN. MAIORIS

SECTIO SEPTIMA.

APOZEMATA, vel DECOCTIONES continens.

EX ANTIDOTARIO MESVAE.

I.

ADIANTHI, vulgo capillorum veneris.



*Manna
appellatur.

ECIPE Capi. vene. ʒ. i. s. fumiterra. ʒ. i. lupuli, uolaurum siccarum ana. ʒ. viii. prunorū numero. xl. iuiub. numero xx. coquantur in lib. iiii. aquæ cum facilitate usq; dum redeant ad lib. i. & proice in ea castæ fistulæ mundatæ a cortice suo. ʒ. iiii. tamarindorum ʒ. ii. * siracost. ʒ. i. rheubarbari boni. ʒ. iii. fricetur manib; , & coletur, & propinetur ius in mane, & quandoque ponitur loco aquæ feri caprini idest aquæ lactis vel casei lib. iiii.

COMMENTA. MANLII.

Decoctio uero est apozima diuersarum medicinarum. s. aqua, in qua medicinz conponuntur id est in cap. de tussi humida habet unā aliā descriptionē, sed nō est eadem. in fine decoctionis dicit. Et si uolueris accipe ex hac decoctione lib. ii. & cum meihueg. i. uino coctis, & zueha. ʒ. x. fiat syrups, & p ista uerba quæ dicit Mesue exilimant quidam q̄ ex illa decoctione pot fieri syrups de capillo ueneris.

Capillus ueneris apud Auic. in. a. can. uocatur bescegnasce n, & dicit qd est coriadrū putei, & Persice est bescegnasce n. & Siriace est capillus porcinus: & arabice ē capillus algul. Isidorus dicit. Capillum ueneris uocatū, siue qd elapsos post alopietiam capillos recreat, uel qd capillorū fluores coercet, uel quod sit uirgulis nigris leuib; cū splēdo re quasi capilli: eius spēs secundum modernorū opinionē sunt tres. s. capillus ueneris qui satis est notus: polytrichon quod herba est quæ in puteis reperit: & adianton qd similitudine habet capillorum ueneris, & hæc iuxta flosse reputat, & sic istæ tres spēs in uirtute differūt parū ab inuicē.

Siracost est species manne sicut apparet apud Aui. in. a. can. in ca. de manna. & dicitur quidam sapientes q̄ siracost est deterior aliis speciebus manne.

EX RASI.

II.

DE EPITHYMO, in. 9. Almanfo. capitulo de melancholia.

R. Myrob. indorum. ʒ. x. polydod. ʒ. v. senz. ʒ. ix. turbith ʒ. iiii. floccados. ʒ. x. passulorum enucleatarū. ʒ. v. epithymi cretēsis. ʒ. x. oia excepto epithymo in tribus libris aquæ coquenda sunt donec ad unam librā & mediā redeant, & cum hoc factum fuerit addatur epithymum, & illico ab igne remoueat, & dimittatur donec infrigidari ceperit: cūq; in frigida fuerit manibus fricata coletur, ac usui referent.

COMMENTA. MANLII.

Hæc decoctio de epithymo finaliguit illa de qua intellexit Rasis in hoc. 9. in ca. de hemorrhoidibus & fistulis & ragadiis in fine cōfectionis de scoria ferri, cum dixit, cōficiat qd apozimate emblicorū, sicut in cap. de melancholia nominamus: sed si bene cōsideremus ista nō est apozima eblicorū, de quo Rasi. intelligit, q̄ ibi nō ingrediūt emblici. uerū potius apozima de qua intelligere debemus, est illa quæ ponitur a Rasi. in fine dicti cap. de melancholia. in descriptione electuarii. Iustificat qd in ingrediunt myrobalani, chebuli, & emblici hoc mō. R. myr. cheb. emblic. ana. numero. xx. rantur, & in tribus lib. aquæ coquantur donec ad unā redeāt, & coletur, & profecto de isto apozimate intelligere debemus, ut uolūt sapientes, & eā ponere in

dicta cōfectione de scoria ferri, & non decoctione de epithymo quæ nō conueniret in casu, licet, in declaratione dictæ cōfectionis dictum sit debere intelligi decoctionem de epithymo superius scriptam.

EX PETRO TVSSIGNANA.

III.

COMMVNIS, in cap. de Paralyti, tremore, tortura, & spasmus de repletionē.

R. Hordei. ʒ. iiii. prunorum numero. xii. liquiritiæ, tamarindorū, anisi, fœniculi, ʒ. s. aquæ lib. iiii. bulliat simul usq; ad consumptionem tertie partis lento igne, & conferuet.

COMMENTA. MANLII.

Hæc decoctio apud nos est multū in usu, sed sunt ex hominibus qui faciunt ipsam per aliā em voluntatē decoctorum, & si em istā descriptionē facere uolueris, addatur in fine decoctionis iam dictæ buglossæ & boraginis ana parum & usui referuat: quanto recentior rāto melior: in ampullis de uitro melius conferuat. Isido. dicit: qd ampulla est dicta quasi ampla bulla. similis est enim in rotunditate bullis quæ spūmis aquarum fiunt, atq; ita inflantur ueniō.

EX BARTHO. MONTAGNANA.

III.

PECTORALIS, in Antidotatio.

R. Caricarum pinguium. i. sicuti siccarum. ʒ. vi. dastylorū pinguiū, pralsi, i. seminis apii, fœniculi passulorū, capil. ueneris, hyssopi, liquiritiæ, ana ʒ. v. coquantur cū in lib. xiii. aquæ usq; ad consumptionem medietatis, & coletur, & fiat decoctio.

COMMEN. MANLII.

Hæc decoctio fit ex uariis intectionibus, sunt quidam qui faciunt ipsam magistraliter, & sunt quidam qui faciunt ipsā em aliam descriptionem, sicut est intentio medicorum.

LV MIN. MAIORIS

SECTIO OCTAVA.

PASTILLOS, vel TROCHISCOS et quamplurimos continens.

EX MESVAE.

I.

GALLIAE MVSCATAE.

R. Xyloaloes crudi. boni, & electi. ʒ. v.

Ambra, ʒ. iiii.

Moschi boni. ʒ. i.

Glutinis tragachantis. ʒ. i.

Aquæ rosatæ quantum sufficit ad miscendum ea. Fiant trochisci, similes foliis myrti, & sigillentur, & in uase uitri reponantur & admixtrentur. Apud alios dissoluitur ambra in uase uitreo cum oleo de ben pauco, ac eo cetera cōficiunt.

COMMEN. MANLII.



A hæc cōfectio apud apothecarios est multum in usu, & maxime secundum istam descriptionem. Et dixerunt sapientes quod ista descriptio debet poni in cōfectionibus ac electuariis quæ sunt ex autoritate ipsius Mesue. Nicolaus in uero antido. habet aliam descriptionem cōfectionis galliæ muscatæ quæ etiam est in usu. Et sapientes dixerunt quod etiam secundum illam descriptionem debet fieri, & administrari in cōfectionibus ac aliis quæ sunt ex autoritate Nicolai. sunt ex hominibus qui uocant trochis de galliæ muscatæ Mesue. & dicunt

*al. Pa.
res. ii. d
Sylluini
recepta
tione.
tin aqu
rosarum
soluisti.

dieunt quòd gallia dicitur a quadam provincia sic nominata. Gulielmus Placentinus inquit: Gallia est quædam herba quæ gallia odorifera appellatur Serap. de gallia cap. facit: & dicit q est fuch. Ralís.in.g. Almanforis describit trochiscos mufcatos: sed non sunt idem de quibus infra.

Trochiscus autem dicitur a trochos quod est rota: quia trochiscus est factus ad modum rotæ, Simon Lanuen. ingit: Trochiscus dictus a trochos græco: quod est rota vel aliqd simile rotundum: Mesue dicit quod fiant troc. similes foliis myrti. hodierni apothecarii nō faciunt ipsos illo modo, sed faciunt ad modum troc. currētis, ut est notum. Mesue dicit, quod prædicti troc. debent figillari. Iulius autem qui dicitur Bulchafim. in tra&. 2. docet modum faciendi sigillum, quo figillantur trochisci, & fit sigillum ex liguo ebanis, aut buxi, aut eboris, aut alterius rei.

Oleum de ben. i. de g. anis ben quod uocatur balaninum & non muscellinum: ut quidam putauerunt. eius faciendi modum ponit Mesue: de quo infra.

APPENDIX.

Ambracani loco, Ambræ in hac compositione apud quā plurimos, vulgare loquendi modum secutos, non inlegantur legitur Ambracani enim seu Ambracum uel vulgaribus, Græcorum ἀμραξ aut ἀμραξ. Arabumq; Ambarum seu Ambra, nulla absq; controuersia omnino existit. At cum hoc ē Cucullatorum turbæ nōn illi, altiora forsitan perscrutantes, minime adnotassent, non sine maximo errore bipartitam dictionē prorsus inepte sinxerunt, atq; ambræ cāphoram addiderūt, mendose sic legentes, ambræ, cāphoræ, &c. quodq; absurdissimū sit, ne dū frigidis eorū rōnes, uerū res ipsa (ut alias abudē exponemus,) belle indicat. Nō.n.galliam mufcata sed uerius camphorata perferibūt, cum tāta sit camphoræ uis, ut omni ex parte cōpositionem immutet.

II.

GALLIA SEBELLINAE.

℞. Foliorum rosarum recentium, & humidarum, quæ iam incipiunt referre nodos. ʒ. i. s. terantur contritione ultima in mortario lapideo. deinde proiciantur super illas.

* Aloes boni, & electi.
Garyophyllorum,
Gummi,
Spicz indz,
Sandal citrini. ʒ. ii.
Ramich. ʒ. iii.

} ana. ʒ. i. s.

Quæ trita prius minutissime sicut alcohol, terantur cū rosis, & humectentur cum modico aquæ rosatæ infusionis gummi arabici, & iterū terantur. Deinde iterum humectentur, & terantur, & hoc fiat per diem unum. ultimo uero aromatizentur cum mufci. ʒ. i. partibus duabus. i. ʒ. ii.

Ambræ,
Camphoræ,
Forma trochiscos, & sigilla.

COMMENTA. MANLI.

Confectio galliæ sebellinæ non est in usu: tamen ingreditur in confectioe aromatici nardini, sed loco eius sunt qui ponunt galliam mufcatam.

III.

GALLIAE ALEPHANGINAE, & eius interpretatio de aromaticis, & est illa de qua Antiqui considerant, & de qua plurimum loquuntur.

℞. Emblicorum bonorum abiectis osibus. ʒ. iii. conterantur contritione grossa, & ponantur in uase uitreo. & fundatur super eos aquæ rosatæ bonæ & electæ infusionis rosarum siccatæ & corticū citrorum li.s. & stringat os uasis, & dimittat p dies tres. deinde fundatur in eis aquæ prædictæ infusionis. ʒ. iii. & in crastinum sic sim. l. ter ulquequo emblicorū uirtus in aqua immissa sit. tūc uero. Rec. ligni aloes boni. ʒ. vii. ramich. ʒ. i. s. rosarū. ʒ. x. garyophyllorū. ʒ. x. spicz indz. ʒ. iii. sandali citrini aromatici. ʒ. iii. gūmi ara. ʒ. vi. terat oia sicut alcohol. i. subtiliter sicut fuit atomi solares

& fundat super ea parū succi infusionis prædictæ emblicorum, & terantur cum eo usq; dum totum in eo paulatim fundatur. ultimo aromatizetur cum. ʒ. i. cāphoræ & ambre ʒ. ii. mufci boni. ʒ. ii. fiant inde trochisci, & sigillentur sicut diximus, & ponantur in uase uitreo & administrentur.

COMMENTA. MANLI.

Hæc confectio istius galliæ, sū intentionem Mesue interpretatio est de aromaticis quæ apud nos est in usu. Liber qui dicitur Bulchafis docet modū faciendū trochiscos de gallia & inquit: Si uis facere trochiscos alios de fuch. i. gallia. sed non sunt idem. infra ait. quando autem transuerit super eos annus erit gallia bona. & quāto amplius tempus habuerit tāto erit gallia melior: & galliæ quatuor sunt species. f. gallia ex mufco, & gallia ex uentribus, & ex corio, & ex aqua. Operatio galliæ ex mufco est illa quam dī xi, & iterabo operationem eius breuiter quando ramich fuerit siccum: & est quod accipias ex mufco, & teras ipsum per se, & teras ramich p se: & cribra cū cribro medio. eri, & proice sup ipsum mufcum, & malaxa in uase, quod arabice dicitur salachia cū oleo de cheiri, aut zabath, & fac trochiscos, & exiltimāt quidā sapientes quod isti trochisci sunt illud quod nos zebeth uocamus: Simon Lanuenfis inquit: In litera gallia mufcata dicebat Iudeus uocari zebeth arabicæ, nos seperam uocamus & cætera.

III.

DIARHODON.

℞. Foliorum rosarum rubearum aur. vi. spicz aromaticæ. l. nardi aur. ii. liquiritiæ aur. iii. ligni aloes aur. ii. spodi aur. i. croci aur. s. malficis. drac. ii. confice cum uino albo, & fiat inde trochisci.

COMMENTA. MANLI.

Trochisci diarhodon sū Matheū Sylua. sunt trochisci de rosis tñ sū intentionē Mesue. aliud sunt troc. diarhodon, & aliud sunt troc. de rosis, ut apparebit, quod ipse Mesue aliam descriptionem facit. & de hac debent fieri duæ descriptiones, quarum una est ista domini Mesue, quæ solum debet administrari in suis cōfectionibus ut est in diarhodō & in electuario de gemmis, & in aliis. Alia uero descriptio est ex authoritate Nicolai, & illa debet administrari in suis cōfectionibus, ut docet ipse Auic. in ʒ. can. hēi trochiscos de rosis nominatos diarhodō, sed non sunt in usu.

V.

DE ROSIS.

℞. Foliorum rosarū. ʒ. x. liquiritiæ. ʒ. v. spicz aromaticæ. i. nardi. ʒ. ii. s. confice cum uino albo, & si laxatiuum facere uolueris adde scamoneæ. drac. iii. & referuentur.

COMMENTA. MANLI.

Isti troc. sunt illi quibus nos utimur. idem inferius habet unam aliam descriptionē, sed hæc est nobilior illa Auic. in ʒ. can. habet multas descriptiones, quarum prima descriptio est de rosis uniuersitatis: secunda est de rosis Asclepiadistertia est de rosis cū scamonea, & iste exdem funt cum illis domini Muse addidit scamonea, ut dicit ipse: alii faciunt cū spodio alii cum spica, & sic de singulis, sed nō sunt in usu. Ralís. in g. Alman. in cap. de his quæ confortant stomachum: & ciborum perficit digestiōem, habet unam aliam descriptionem, & in 10. Alman. in cap. de quotidiana quæ uocatur phlegmatica, habet unam aliam descriptionē quam nominat de rosis completis, sed nō est in usu.

VI.

DE ROSIS, ET EVPATORIO.

Rec. Foliorum rosarū. ʒ. viii. spicz. ʒ. iii. * raved feni. ʒ. iiii. spodi. ʒ. i. s. liquiritiæ. ʒ. iii. s. & succi eupatorii. ʒ. x. fiant troc. cum tereniabin idest manna.

COMMEN. MANLI.

Hæc descriptio illorum trochiscorū de rosis, & de eupatorio apud nos est multū in usu: rosa flos est satis notus. Pl. ait: Rosa nascit spina uerius quam frutice, in cibo quoque proueniens illic etiam iocūdi odoris quamuis Augusti. Se cundum Circainstant, rosa sicca & uiridis cōpetit usui medicinz, & est max effraciz: species autē rose sunt mul-

Lumi. Mas

K 2

* al. Xylol.

aloes.

ʒ. i. Auic. s. i. mēdo.

f.

* Rhabarb.

cura. i. di-

cuna.

S E C T I O V.

te: nam est rosa asini quæ nerenisch dicitur siue pponia, & est rosa regia. i. staphisagria, & est rosa vineæ. i. flos spinæ albæ, & est rosa zamen. i. malauilci. & est rosa Persica. i. rubra, quoniam a Persia habuit hortum, & est rosa canina idest planta in cuius radice nascitur fungus, ex quo fit hypoglossifidos & est rosa marina quæ apud quosdam corona montis, siue rosifmarini dicitur, & sic de singulis.

VII.

D E R O S I S.

R. Rosarum. 3. iiii. ligni aloes. 3. ii. masticis. 3. i. s. spice nardi, cinnamomi casia lignæ, florum quinquant, abanthii ro mani ana. 3. i. fac trochif. 3. ii. cum uno antiquo & aqua de coctionis radicum.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Ista uero descriptio apud nos non est in usu: sed illa quæ utimur superscripsi. Mesue inquit quod prædicti troch. de bent fieri cum uino & aqua decoctionis radicum, sed non persificat quæ sint illæ radices quæ debent poni: sed sapientes credunt quod quādo simpliciter reperit radicū, intelligit de quinq; quæ sunt propriæ istæ. scilicet feniculi, apii, brusci, petroselinii, & sparagi, & sic istæ quinq; radices debent bullire in aqua, & de illa aqua quæ erit decoctio debent fieri prædicti troc.

VIII.

S V C H A H A L E R T I F, idest galliæ magnæ, seu regalis.

R. Succi albelach lib. i. bulliat ebullitione una: deinde coletur & prociat super ipsam galliarum recentium contritura contritione ultima. 3. iiii. & bulliat donec fiat sicut mel currens, deinde. R. foliorum rosarū. 3. s. cardamomi, linguis ausi. i. seminis frasinii. garyophyllorum, nucis muscatæ, masticis, ligni aloes ana. 3. vii. s. darfeni. 3. iiii. sandali, mahazari. citrini. 3. v. croci. 3. v. gummi arab. 3. i. terant & cribellentur, & misce cū prædictis, & expande super marmore in uncto oleo amygdalarum donec ficeat: deinde puluerizet sicut alcohol, & aromatizetur cū musci aur. s. deinde cū aqua rosata fiat troc. subriles, & siccetur in umbra.

C O M M E N. M A N L I I.

Hæc descriptio istius galliæ non est in usu. Secundum intentionem Mesue est gallia magna, siue regalis. i. imperialis.

Albelach sive multos sunt dactyli immaturi. Supraposui syrump de albelach & ibi ostendi quod Auic. in. 2. can. in cap. de gallia inquit: Gallia uera est finia facta ex emblicis: nunc autem quoniam illud est difficile fumiur pondus ipsorum de gallis & albellam, quod est alberach, ut dicit Genilis, & sunt propriæ dactyli immaturi.

Darfeni est cinnamomum grossum, sed lumen apothecariorum, uel uerius tenebra exponit quod est cinnamomū electum quod non est, sicut ostensum fuit supra in cōfectio ne de cinnamomo.

IX.

R A M I C H.

R. Succi herbæ acetosæ. 3. xvi. bulliat ebullitione una cū. 3. i. rosarum, & 3. ii. granorū myrtillorum, & coletur, & misce cum eo galliarum recentium & humidarū tritarum ultimæ contritione. 3. iiii. & coquantur adhuc: deinde puluerizet supra ea foliorū rosarum. 3. i. sandali mahazari. i. citrini 3. i. & quarta. 3. ii. gummi arabici. 3. i. s. carniū sumach, spodii, an. 3. vii. succi agrestis. 3. vii. succi granorū myrti tritorum contritione ultima. 3. iiii. ligni aloes, garyophyllorum, masticis, nucis muscatæ ana. 3. iiii. inuoluantur oia simul, & expande in furella lapideæ vsque dum siccetur, deinde tere sicut alcohol. i. subtiliter sicut atomi solis, & cū camphoræ aur. i. & aqua rosata fac trochif. subriles, & exicca in umbra, & apud alios loco succi acetosæ ponitur succi citoniorum acetosorum immaturorum tantundem: & quidam sunt qui aromatizant cum musci drac. unius quarta.

C O M M E N. M A N L I I.

Hæc cōfectio ramich, seu trochisci de ramich apud nos est multū in usu, & utimur multi in aliis cōfectionibus, sed descriptiones ipsius sunt diuersæ secundum diuersitatē medi-

corum, nam eius descriptio reperitur etiam apud Serap. in suis simplicibus, qui sic ait. Ramich est gallia seu materia ex qua fit gallia, & dicit quod accipitur ex multis speciebus, & aliquando accipitur ex dactylis immaturis, & aliquando accipitur ex gallis, & aliquando accipitur ex corticibus granatorum & ex herbis asperis, & omnes species eius sunt frigida & styptica, & ipsum est radix such. i. galliæ & c. inferius docet modum faciendi, sed non est similis isti Mesuæ. liber qui dicitur Albuchasis in tract. 2. habet unam aliam descriptionem quæ fit ex passulis bonis rubeis, & aliis, sed non fit: nobilior uero omnium est hæc Domini Mesuæ.

Mesue inquit Succi herbæ acetosæ. i. lapacii acuti, quidā crediderunt quod esset ribes, sed non est: si autem habere non poteris succum acetosæ, pone succum cytoniorum immaturorum ad pondus eorum.

X.

D E C A M P H O R A.

R. Foliorum rosarū. 3. iiii. spodii. 3. ii. sandalo. citri. 3. ii. s. croci. 3. i. iquirizit. 3. ii. seminis citrulli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, draganti, gummi ara. 3. i. ligni aloes, cardamomi, amyli, cāphoræ ana. 3. i. partes duas scilicet. 3. ii. zuchari tabazet. i. albi, tereniani. i. mannæ. 2u. 3. iiii. confice cum mucillagine psyllii, & aqua rosata.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Hi trochisci apud nos sunt in usu. & maxime secundum istam descriptionem. Auic. in. 6. habet quinque descriptiones: sed non utimur illis. etiam Rasis in. 10. Almanforis in cap. de febre hectica habet unam aliam descriptionem, sed non est in usu.

Camphora sēd m Auic. & Serap. est gummi arboris, sed Serap. de ipsa melius loquitur dicens: quod camphora est gummi arboris nascens in partibus illis, & est gummi maculati coloris rubei: & lignum eius est album tenerū, quasi uelut firi nigrum. & camphora reperitur in corde ligni arboris in petiis ligni quæ sunt ibi intus extēse. Auerro. in 5. colligit dicit. amba est una ex speciebus. cāphoræ quæ oritur in fontibus maris.

Modus faciendi mucillaginē psyllii quod est semen fadium ad modum pulvis, oportet quod accipitur psyllium & mundetur a sordibus suis in pondere lib. i. & postea ponatur supra ipsam aquam calidam lib. iiii. aut minus, sive quod tu uolueris magis uel minus pinguem mucillaginē, & dimitte per uoctem. in mane uero calefacias parum prædictum psyllium cum aqua: post hoc pone ipsum in petia, uel sacculo facto ex tela lini fortis noua & grossa: & stringe os suum cum ligamento fortiter: ne aliquid de psyllio lubri cet extra, deinde fortiter exprimatū tātum quod ibi nihil de mucillagine remaneat, & utere ubi oportet.

XI.

D E R H E V B A R B A R O.

Recipe Raueboni. i. rheubarbari. dra. x. succi eupatorii. 3. iiii. rosarum. 3. iiii. spice anisi, rubæ tinctorum, seminis apii, abanthii, afari ana. 3. i. amygdalarum amararum, drac. iiii. & fiant troch. aur. i.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Hi trochisci apud nos sunt multū in usu, & maxime secundum istam descriptionē Auic. in. 5. can. habet unam aliam descriptionem quæ quasi idem est. Rasis in. 9. Almanforis in cap. de dolore hepatis, habet troch. de raueboni. i. de rheubarbo, sed non sunt in usu. Mesue non ponit cū quo liquore debeant fieri isti troc. sed fecundum quosdam debent componi cum succo de eupatorio, & sic consiciuntur.

XII.

D E S P O D I O.

R. Spodii. 3. iiii. rosarum rebarum. 3. vii. seminis portulacæ sicut iquirizit. ana. 3. ii. confice cum mucillagine psyllii, & fac trochiscos. 3. i. & da cū succo mali granati, & alii addiderunt quatuor seminum, gummi ara. draganti, croci, ana. 3. i. s.

C O M M E N T A. M A N L I I.

Isti troc. sūt in usu, & maxime sēd m istā descriptionē ipse Mesue

Mesue dicit. q. debent fieri predicti trochisci ex illis quatuor rebus. inferius uero ait. qd alii addiderit quatuor feminu. i. quatuor semina communia frigida maiora. gummi ara. dragatū. & crocum. & sic debent fieri. quia sunt multæ efficaciz. Aui. in. 5. can. habet unā descriptionē & dicit troc. de spodio cum tereniabin: & sunt quasi idē. Rafis in. 9. Almanfo. in. ca. de fluxu uentris. habet. vnā aliā. & in decimo Almanfo. in. c. de febribus. ex quibus accidit frigus & calor similiter habet unam aliam. & in eodem tractatu. in. cap. de febre hectica. habet unam aliam. sed non sunt in usu.

Spodium fm Aui. c. in. 5. cano. dicit radix cannarum adustarum. Auerr. autem in. 5. colligit dicit: Tamē baifir. i. spodium. spodium carbo est odororum harundinum adustarum. nos uero loco spodii vitmur offe elephantis combusto. de quo Circa instans ait: Spodium os est elephantis combustum. elephas habet ossa folia. ut sunt dentes: & illa non comburuntur. sed ad diuersa officia & artificia seruantur. sophisticatedur sæpe ex radice cuiusdam cæne cōbustæ quadoq; ex ossibus cannis cōbustis: quandoq; ex marmore combusto. sed hoc nimis ponderosum est. unde eligēdum est subalbidum & ualde leue & grossum: quia in puluere facile adulteratur. & uix cognoscitur.

XIII. DE SPODIO.

¶. Rosarum rubearum. 3. xii. spodii. 3. x. feminis acetosæ. 3. vi. feminis portulacæ. 3. feminis coriandrorum infusorum in aceto & torrefactorum. pulv. fumach ana. 3. ii. s. amyli ass. i. balustiarum. berberum ana. 3. ii. gummi arabi. ass. 3. i. s. confice cum succo agrestis.

COMMENTA. MANLII.

Isti troc. etiam in usu sunt. Aui. in. 5. can. habet troc. de spodio cum semine acetosæ. sed idem non sunt.

Coriandrum est semen satis notum. Infusorum in aceto. i. preparatorū. modus torrefaciendi coriandrum oportet calefacere patellā ad ignē. deinde supra semem coriandi ponatur. & cum aliquo instrumento misceatur. & hoc facias tantum q. sit bene torrefactum. & utere obi oportet.

Gummi arabicum fm Ser. ex autoritate Diosc. est gummi quod reperitur super arbore acaciz. sicut alii spēs gummi. & melius ex eo est illud qd est ex hac arbore q. est similitudine nemiculis i figura sua. color eius est sicut vitru clarum. & non habet lignum. Modum assandi ipsum docet liber qui dicitur Bulchalis in tract. 2. & eius modus iste est. Accipiat gummi arabicum & fragatur in frusta ad magnitudinem orobi. deinde accipiatur patella. & calefiat. & auferatur ab igne & ponatur super eam gummi arabicum. & misceatur bene sine intermissione donec albefcat. & si non albefcit prima uice fiat iterum. ut prius donec fiat album. eodum modo de dragacanto ac gummi amygdalarum dicendum est.

XIIII.

oxyACANTHAE. uulgo de BERBERIS.

¶. Berberorū. aut succi eorum. spodii. succi liquiritiæ. & seminis portulacæ ana. 3. iiii. rosarū. 3. vi. spicæ. croci. amyli. draganti ana. 3. i. femi. citrulli. 3. iiii. s. camphoræ. 3. s. confice cum tereniabin. i. manna.

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. apud nos sunt in usu: maxime fm istam descriptionem. quia idem inferius describit unam aliam descriptionem. sed ista est nobilior. Aui. in. 5. can. habet septem descriptiones quæ in usu non sunt. etiam Raf. 9. Almanf. in. cap. de dolore hepatis. habet unam aliam descriptionem quæ non est in usu.

Berberi apud Aui. in. 2. can. nominantur amirberis. & apud Diosc. uocantur oxyacanthos. i. spina acuta. & est arbor quæ in partibus nostris iuxta aquas nascit: eius fructus ex primit & fit ex eo uinum. quod apud herbatricos dicit uinū de crispio. Etia apud modernos ex succo ipsius fit licitū. & fm multis hæc est arbor mali granati syluestris quæ a Ser. darisialis uocatur. Sapientes habent hoc pro secreto.

Citrullus est cucumeris cuius forma longior & maior est nostro. & sunt qui loco eius ponūt semina cucumeris usua lis. Ille uero qui de nouo scripsit dicit sem. citrul. an. 3. iiii. s.

ille textus huius tenebræ est falsus. Nā regula est inter medicos ac apothecarios. q. ana significat duas uel plures res esse acceptas sed hic nō intelligitur nisi seminem citrulli. quia propter illa dictio ana non conuenit.

XV.

DE ABSINTHIO.

¶. Rosarum absinthii. anisi. ana. 3. ii. rauid. i. rheubarbari. succi eupatorii. asari. apii. amygdalarum amararum. spicæ. masticis. folii ana. 3. i. fac. troc. cum succo endiuiz.

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. in usu sunt: & maxime secundum istam descriptionem. Aui. in. 5. cano. habet duas descriptiones. sed nulla earum est eadem huic.

Absinthium fm Diosc. est notum: cuius probabilius est Ponticum & Capadocum nascentis in montibus: unde nomen accepit a terra. infra habentur duæ alie species. Plid. cit: Plura sunt eius genera. s. andonicum appellat a ciuitate Galliæ ponticum de ponto. ubi pecora illo pinguescunt. & ob id line felle reperiuntur. neq; aliud præstantius multo Italico amariis. sed medulla pontici dulcis. sed illud absinthium. quod hic intendimus est absintium ponticum uel romanum uel commune. quod falsum est notum.

Folium. i. malabratum: raro inuenitur. sed loco eius ponimus maceam. aliquando spicam.

XVI.

DE EUPATORIO.

¶. Tereniabin. i. manna. succi eupatorii ana. 3. i. rosarū. 3. s. spicæ nardi. 3. iiii. rauid. i. reubarbari. asari. anisi. ana. 3. ii. s. spodii. 3. iiii. fac. troc. cum succo herbarum.*

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. sunt in usu. Eupatorium uero fm Guliel. Pla. & Circainstans est salua agrestis. sed hoc uidetur alienū a sententia Diosc. nam dicit ipse eupatorium uocant Græci radicem agrimoniz: eo quod diuretica sit ualde. etiam scdm eundem marrubium quidam eupatorium uocauerunt. sed moderni distinxerunt per herbas. Gal. 6. simp. inquit. Casti. i. eupatorium. sed melius est dicere gathy. quod idē ē. Mesue inquit: quod prædicti troch. debent fieri cū succo herbarum. sed non specificat cum quo succo herbarū fieri debeant sed fm modernorum opinionē fieri debent cum succis qui sunt ex quatuor herbis. & sunt propriæ illæ quæ ingrediuntur descriptionem syrupi de bizantiis: & sunt illæ endiuiz & api. 3. i. lupuli & buglossæ uel boraginis. 3. s. & simul misceatur. & fac troc. de eupatorio & alios: & qn nō habemus prædictos succos. loco eius ponat syrupus de bizantiis.

XVII.

DE ANISO.

¶. Anisi. eupatorii. ana. 3. ii. feminis anethi. spicæ. masticis. folii. absinthii. asari. apii. amygdalarum amararum. ana. 3. s. aloes succotrin. 3. ii. confice cum succo absinthii & apii.

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. sunt in usu: & maxime secundum istam descriptionem. Aui. in. 5. can. habet unam aliam descriptionem quæ quasi eadem est.

XVIII.

DE ANISO. alii ex decem simplicibus. uulgo de decem medicinis.

¶. Anisi. 3. iiii. masticis. spicæ. apii. absintii romani. asari. folii. ana. 3. i. amygdalarum amararum. 3. s. aloes boni. 3. ii. succi eupatorii. 3. iiii. confice cum decoctione absinthii.

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. utimur sub noie trochifid. decē medicinis. & nominant de decem medicinis. quia ibi nō ingrediuntur nisi decem simplicia ad numerū. Aui. in. 5. can. quasi si fine habet trochif. de decem medicinis. & idē sunt. Oportet autem scire quod quando doctor simpliciter ordinat trochiscos de aniso. de prima descriptione intelligi oportet.

XIX.

DE LACCA.

¶. Lacce mūdæ. succi liquiritiæ. absinthii. berberis. succi eupatorii. rauid. i. reubarbari. aristoloc. longæ. costi. asari. Lulm. Ma. K 3

SECTIO VIII.

amygdalarum amararum, rub. cinctorum, anisi, apii, squinanti ana. 3. i. fac trochisc. de. 3. i.

COMMENT. MANLII.

Isti troch. sunt in usu: maxime secundum istam descriptionem. Auic. in. 5. can. habet unam aliam, sed eadem non est. Rasis in. 9. Alman. in cap. de dolore hepatis habet unam aliam sed non videtur illa.

Lacca vero est gummi rubicundum quo tincturae sunt arbor eius est in Arabia similis arbori myrrhae: dixerunt quidam sapientes quod lacca non debet poni in medicinis si ablu ta non fuerit, & eius modum abluendi ostendit supra in cofectione dialaceae, & de praedicta decoctione pnt est fieri isti tro.

XX.

DE TERRA SIGILLATA,

ex inuentione nostra.

*. Sanguinis draconis: gummi arab. alsi, ramich, folioru ro farum, & feminu earu, amyli, alsi, spodi, acaciae, hypoquistidos, lapidis hematitis, balautiae, boli ar. terz sigillate, schedenegi, coralli ruhei, charabae ana. 3. ii. margaritarum draganti, papaueris nigri ana. 3. i. s. portulacae aris. cornu cerui, adulti, thuris gallarum, croci ana. 3. ii. fiant troch. cu aqua arnoglossae.

COMMET. MANLII.

Isti trochi. sunt in usu. Terra sigillata secundum Diof. & Auic. est terra rubea, sed hodie quidam utuntur una alia quae est albi coloris, sed non est tante virtutis. Sera. in cap. de terra sigillata ait. quod est sigillum marinum: quidam si gillum laicis uocant.

Semen rose secundum plurimum est illud semen, quod reperitur in fructu cinosbati. Ioannes Anglicus in cap. de fluxu ventris in febre inquit: Anthema. i. semen rosarum Schedenegi secundum Auic. est semen arabis canapis, & Sera. in cap. de canape dicit schedenegi est canapis. si autem reperitur scriptum schedenegi sine h. non est idem, sed est la pis hematitis. Christophorus de honestis super hoc passu dicit, quod schedenegi est fumulterre: sed hoc mihi non multum placet quia si diceret schedenegi bene est fumulterre: sed Copositor dicit schedenegi, quod est uerum semen canapis. & sic debet poni.

XXI.

COLOCYNTHIDOS, vulgo Alandahal, qui ponuntur in Hiera Hermetis & in aliis cofectionibus loco colocynthidis.

*. Pulpae colocynthidis albae & leuis, & mundae a granis s. x. inciduntur cum incisorio incisione conuenienti, & fricentur cum 3. i. olei rosati, deinde recipe draganti, gummi, bdellii. ana. 3. vi. infundantur cu aqua rosa. p. dies quatuor, & coquantur colocynthia incisa cum glutino eorum, & fiant in troch. & exicentur in umbra, deinde iterum terantur contritione bona, & iterum confice cum glutino eoru, & fiant troch. & administrentur.

COMMENT. MANLII.

Isti troch. sunt in usu sub nomine trochiscoru Alandahal, & sub noie troch. de colocynthia. & secundum intentionem ipsius debent poni de hiera hermetis & aliis cofectionibus loco colocynthidis, & sic generaliter faciunt apothecarii. Gummi scilicet gummi arabi. quidam crediderunt sed non recte quod esset gummi bdellii. s. lachryma eius, quod non est.

XXII.

DE SANDALIS.

*. Trium sandalorum ana. 3. viii. spodi, feminu cucumeris, cucurbitae, citrulli, portulacae ana. 3. iiii. rosarum rub. 3. vii. camphorae. 3. i. berberorum aut succi eius. 3. vi. boli arme. 3. iiii. confice cum aqua portulacae.

COMMEN. MANLII.

Hostrocas nos non habemus nec sunt ualde in usu. Mesue habet duas descriptiones: sed ista est illa quae magis utimur.

Sadalsum fm Sera. deferret ex sim. & est albi rubei & citrinum, & idem Sera. ex auctoritate Isaac ebé amrā inquit: Sadals est lignu quod deferret ex sim. & spes eius sunt tres. s. albu rubu, & citrinu, & omnes sandali conpetit usui medicinae, & sic hic p trium sandaloru de illis tribus intelligitur.

XXIII.

DECYPERIS.

*. Zingiberis, heilii. cardamomi maioris, nucis muscae, cubebae, macis, garyophyllorum, gallie musanae, aur. i. corticu citri, masticis, florū squinantu, cyperis, spicae, cinnamomi, emblicorum, extrematium myrti, ana. aur. ii. & in alio musci, charat. ii. confice cum melle passularum & fiant.

COMMENT. MANLII.

Isti trochisci sunt in usu. Cyperus fm modernorum setentiam, est iuncus triangularis in pratis ac iuxta fossas reperitur. Gale. in. 7. simplicium ing. Cyperi utiles maxime sunt radices. Circa instans in tria, de cypero ait: Est autem radix iunci triangularis quae in transmaritimis partibus nascitur & eius radix coepit usui medicinae, & p annu seruat. Halabybas ait in tertio practicae scriptu suadum pro cypero: Differentia aut magna est inter cyperu cupressum & cyperu quia cyperus est iuncus triangularis, cupressus est arbor ex qua fiut capsule sic odoriferae, & gerit fructu dictu nux eupresii. Cyperus est et arbor quae apud arabes alchanna uocatur unde oleum de alchanna graece uero uocatur oleu cyprinū.

Charabes uel cherates siue chirat est pondus sumptum a semine xylocaratae siue filiqua. Iisd. dicit. Si quia uigesima pars solidi est ab arbore suum uocabulum tenens. charates oboli pars media est habens filiquam unam seminis. hinc latinis semibolū uocat. cherates autem graece latine filiqua cornu interpretatur. nos uero uocamus chirat pondus quatuor granorum hordei.

XXIII.

DE CAPPARIBVS.

*. Corticum capparis, feminis agni casti, ana. 3. vi. nigelle calamiti, succi eupatorii, acori, amygdal. amararum, nasturtii, armoniaci, folioru ruta, aristo. r. rotunda ana. 3. ii. cyperis, scolopendriae ana. 3. i. armoniacum dissoluitur in aceto, & aliarum rerum pulvis conficitur cum eo, sunt qui duplicant armoniacum & est melius.

COMMEN. MANLII.

Isti troc. apud uos sunt in usu: maxime fm ista descriptionem Auic. in. 5. can. habet unam aliam descriptionem, sed eadem non est, sed una descriptio quo reperitur apud Rasin in. 9. Almanforis. in. ca. de dolore splenis, uidetur quasi esse eadem.

Capparis secundum Circa instans cortices radices folia & flores competunt usui medicinae, debet colligi cortex in uere & in umbra suspendi & desiccari, uel etiam ad solem per sex annos, in multa efficacia seruat. Columella in libro de cultu hortorum ait.

Capparis & tristes uelae feruque min axes.

XXV.

EX ELECTRO, officinis de CHARABE.

*. Charabae aur. vi. cornu cerui adulti, gummi arabici, coralli adulti, draganti, acaciae, hypoquistidos, balautiae, macis lae, papaueris nigri asfi ana. aur. ii. thuris, croci, opii, ana. 3. i. s. fac trochiscos cum mucillagine. * p. siliu.

COMMENT. MANLII.

Isti troch. sunt in usu, maxime secundum istam descriptionem. Rasis in. 9. Almanforis. in cap. de mictu sanguinis & puris, habet unam aliam descriptionem, sed non est in usu apud nostros doctores.

Charabae uel cabare est gummi arboris fm Auic. & Sera. dicitur haur romi, & fm Diof. est spes populi arboris iuxta Rhodanum fluuium nascentis, fm Simonem Ianue nsem electrum est charabae, & est gummi arboris dicit agrios, apud Diof. est spes populi arboris Isid. in cap. de pino dicit in fine. huius arboris lachryma electrum gignit. Barthol. Montagnana, in consilio de regimine ardoris urinae per medicinalia dicit, administratio est troc. de charabae, et propriis illoru qui scribunt. p. Alman. allegato ca. quorum descriptio haec est. Re charabae gummi arboris tremulae, & est populus, hic textus Bartholomei non uidet securus. nam arbor tremula non est populus, sed arbor mali granati syluestri. ut dicit Matt. Syl. charabae aut dicit quasi rapiens paleas.

Corallus est arbor nascentis in mari: & eius species sedm Auic.

* Semis aqua feruente uocatur,

Auic. sunt tres. f. albus rubeus & niger: & modus coëbustio-
nis ipsorum est, ut docet Bulchafis in tractat. 1. & est iste te-
ratur coralli grosso mō: & ponatur in olla terrea, & ponā-
tur in furno p noctem: si bene cōbūrantur bene elcti nō aut
iterum ponantur donec comburantur & referentur,

APPENDIX.

Pastillū dī ἰλἐκτρη, seu ex succino inter alia, quæ Asclepias
des ad Hecmopicois scriptis vii. medicamentorum per lo-
cā, cap. 4. Galenus fufissime explicat, quæ ad verbum Oribas-
ius. Paulus lib. 7. cap. 1. 2. Actuarii inde medi. compositione
emulantur, quamquam Aegineta pondera non nihil im-
muet, verum iam Galenum audiamus.

Pastillū est succino.

Psyllii mundi. 3. xlv.

Iridis illiricæ,

Mastiches,

Ramentorum succini,

Croci,

Opij. 3. xv.

Psyllium in aquam calidā coniectū macerari finito: atq;
vbi viscosum, ac glutinosum de se in aquam depoluerit, li-
quorē exprimito, & cum eo pharmacum præparato in pa-
stillos ipsum cogendo, ex quibus obo. iii. ad somnum dato.
Sint autē aquæ sextarii. iii. in aliis exemplaribus psyllii ad
triduum madefcit: deinde bulliat ter donec coquitur, & ab
igne ademptum rursus ad triduum finitur, atq; tunc liquor
ad pharmaci confectionem segregatur.

XXVI.

E VESICARIA, seu HALICACABO,
vulgo de ALCHECHENG I.

℞. Granorū alchechengi. 3. iii. seminis citrulli, albathechæ
curcub. añ. 3. iii. s. boli armenici, gūmi arabi. thuris, sangui-
nis draconis, papaueris albi, amygdalarum amararū, succi
liquiritiz, dragant. amyli, granorū pini añ. 3. vi. seminis
apij, charabz, boli iulquiami, opij añ. 3. ii. & fiant troc. da 3.
i. cum iulep. aut cum aqua mellis.

COMMENT. MANLI.

Isti trochisci sunt in usu: maxime secundum istam descri-
ptionem, & possunt fieri cum opio & sine opio secundum
voluntatē medicorū. Auic. in 5. can. habet duas descriptio-
nes sed non sunt in usu. Etiam Rasis in libro diuisionum. in
cura medicinarum urinæ habet unam aliam descriptionē
quæ eadem non est, nec est in usu.

Alchechēgi vero ē spēs flosci, sicut apparet apud Dios-
c. in cap. de litychno. & ipsa est scdā species litychni. i. sola-
ris, eius granorum inuenitur in quadā re simili vesicæ rubi-
cundæ: & est id qdā nostris rusticis fiaccho vulgariter dī,
Halyabbas autē in 4. ca. de electione granatorū scripsit ea
quenēgi pro alchechēgi. Simon Ian. dicit q: trochi. diaphy-
salidos sunt trochif. de alchechengi, quod non nego, nec as-
sermo, sicut ostensum fuit in philoantrōpos.

Albathe, siue batheca, ut apud Auic. in 2. can. quid sit
cōiter ignoratur. Gulī. Lōbardus inquit: Batheca: est quæ
dā spēs melonis, & sic est ego existimo q: sit anguria, &
sine dubio ficut est, sicut reperit apud Guainerium in ca.
de tertia cōtinua, & eius cura: qui ing: Batheca est melo-
n magnus qui a Veneris vocatur anguria. Auenzoar in c.
de saphar. dicit. ℞ cucumeri faracenorum. i. anguriarū.
Simon Ian. dicit: Batheca Arabica est melon magnus uiri-
dis qui anguria a quibūdam dicitur, & sic est secundum mo-
dernorum opinionem, eius semen usui medicinz cōpetit.

Bolus uel Boli quiddā talis præuenerunt qd iste bolus
debet hic ingredi & dicunt qd ste bolus ar. qd non credi-
tū supra in p̄dictis trochif. hec ℞. boli ar. & inferius iterū
habet boli, quod indicat quod idē nō sunt. Sapietēs uero ex-
ponūt q: boli, sit terra rubea qua utuntur carpentarii ad fi-
gnādū ligna. Auer. in 5. col. dicit. Halmogra i. bolus cū quo
tingunt muri seu parietes. Itē Aggregator Patavinus dicit
Boliū dīnū fuisse uel macra, lūtū carpentariorū, vel lurum
pictorū: & sic est: & hæc terra est quā Auic. uocat macra,
& apud Diosc. multa sinopodia. & apud Serap. dicit sinopa-
dia, & sic legis illa capitula videbis qd eadem sunt. uerū

moderni loco eius ponunt terram sigillatam rubeam, quia
existimant, ipsam esse eius speciem.

Opium succis est papaueris nigri, ut dictum fuit: prædi-
cti troch. possunt fieri cum opio: & sine opio si sine opio fa-
cere uolueris non diminuat ex illa descriptione nisi opium:
& tunc dicuntur trochif. de alchechengi sine opio, &
debet fieri cum aqua mellis.

APPENDIX.

Trochisci δ'αρωματαλιδων, ē vesicaria nēpe, seu ex halicaca-
bo, ab Aegineta lib. 7. ca. 12. nec nō ab Actuario magna ex
parte cum iam expositis Mesuæ cōueniētes, profus habentur.
ut mox ex eorū descriptionibus clarius hinc apparebit.

PAVLVS.

Seminis cucumeris satui pelle exuti. 3. iii.

Seminis alterci,

Cicutæ,

Foeniculi,

Seminis rumicis,

Croci,

Nucleorum pineorum

Amygdalarum amararum,

Opij,

Vesicariæ, sextar. iii.

Vini quantum opus est.

ACTVARIVS.

Lachrimæ papaueris,

Seminis cucumeris,

Seminis apij,

Apollinaris herbæ,

Foeniculi,

Vesicariæ,

Amygdalarum, triens. i. 3. iii.

Croci, sextans. i. 3. ii.

Vini dulcis quantum erat satis, ut hoc ueluti fermēto con-
crescat in pastillos.

Ad hæc GALENVS. V. Medicamentorū κατὰ γιν, seu
per genera malum, pastillorum historiam explicans,
pastillos δ'α τῶν ἀλκακαδῶν, i. ex uesicaria, uel pluries, in-
culcat, utrum id alterius ab instituto considerationis existi-
t. nam ea maxime ex eorum classe apparent, quæ corpo-
ri exteriori admoventur.

EX PRACTICA MESVÆ.

XXVII.

ALCADICON, in cap. de Polypo
qui fit in naribus.

℞. Calcis nō extinctæ, arsenici citrini, añ. 3. ii. colcothar, flo-
ris æris, aluminis, añ. 3. i. gallarū, chichiz, balastiz añ. 3. s.
tere ea in mortario gneo. i. æraminis cum aceto forti, cōtri-
tione vltima usq; ad quinq; dies, deinde fiant ex eis troch.
& conseruentur in vase uitreo in loco frigido.

COMMENTA. MANLI.

Isti trochif. apud nos nō sunt in usu. Ioan. Sera. in cap. de
alcola dicit. calidum sunt troch. facti cum arsenico, & scēdū
dum Almanforē dicitur achali, quod recipit. tamen Mesuæ
in sua descriptione nō habet chali, verum est q: per vnā de-
scriptionē quæ reperitur apud Dinum Florentinū ingredi-
tur chali, de quo infra declarabo quip sit, si Deus uoluerit.

Calcis scdm Auic. in 2. can. per calcem significatur cine-
reitas corporū lapidosorū & oltracorum natura: illa quidē
quam non reitig aqua & illa quā aqua retigit: cum rema-
net extincta duobus diebus aut tribus, tunc non adurir im-
mo calefacit: tamen abluta quidem est sicca &c.

Arsenicum scdm Diosc. nascitur in metallis vbi & sanda-
raca. verum optimū est latiores laminas habēs, & aureum
colorem & venas separabiles a se, ut separari uideat mun-
dum sine forditie. tale in Hespēpō nascitur, cuius genera
sunt duo. vnū est æquales pyradictū, & aliud fuscū: apud
Auic. sunt tria genera. f. album, citrinum & rubeū. Album
secundum modernorum opinionem est arsenicum crystalli-
num: rubeum est regazala. citrinum est auripigmentum
vsiuale, & omnia tria nota sunt.

Colcothar apud Auic. in 2. cano. in ca. de atramēto est vi-

S E C T I O VIII.

trioli citrinū: & ibi ponit species utrioli sunt quatuor. f. colocar. i. citrinū calcadis. i. albu. calcantum. i. uiride, alfurit. i. rubu. Ioannes Arculanus in cap. de febel dicit. colocar vltū. i. viti iolum romanum, & hoc est notum.

Flos æris scdm intentionem Simonis nō est uiride æris sed moderni generaliter loco floris erisponit uiride æris. Serap. in cap. de ziniar inquit. Ziniar. i. ærugo æris siue uiri de æs, quod idem est in capitulo uero de ære, & quæ ex eo sunt. docet moderni facienda flos æris: de quo infra in emplastro apostolico erit sermo.

Cachiaz credo qd uult dicere acacia nam Dinus & alij loco eius habent acacia, nam et scdm Modernorum sententiam est succus prunellorum syluestrium, ut est notum.

XXVIII.

OROBİ, in cap. de Vulturibus, & vlceribus gingiuarum.

R. Farinæ Orobı quantum uolueris & misce cum ea tantum mellis ut confici possit ex eis sic pasta dura, & fac troch. & pone super laterem, & mitte in furnum usq; dum maturantur, bonam faciunt nasci carnem.

COMMENTA. MANLII.

Isti trochisci apud nos nō sunt in usu. Rasis in octauo Almanforis. in cap. de moribus uiperarū habet unam descriptionē troch. de eruo. i. de orobo, sed eadem non est de qua infra, orobus. i. eruū siue herba iudaica. de ipso uide supra in electuario de orobo. Rasis in lib. de experimentis, in ca. de medicinis quæ ornant faciem, dicit. qd robis dicitur carthena. Bulchasis docet modum faciendi amygd ex orobo.

XXIX.

DE GARTOPHYLLIS, in cap.

de foetore Oris.

R. Garyophyllorū, corticū citri, cyperis, spicæ, nucis musfucheleme. xyloalos, cinnamomi, macis, heil, cubebæ, añ. 3. i. musci chirat. i. fac ex eis trochiscos, cum aqua malorum, & teneat in ore suo super cibum.

COMMENTA. MANLII.

Isti trochisci non sunt in usu. Aui. in 3. cap. de cura foetoris oris habet descriptionem pilularum de garyophyll. de quibus infra. Garyophyllus uel charyllus est satis notus.

Suceleme. i. galliz muscare: sicut reperit apud Serap. in proprio cap. de gallia. Liber qui dicitur Bulchasis in tractatu. 2. inquit, modus faciendi trochif. de gallia, sed suis facere trochif. alios de fuch. i. gallia & sic arabes dicunt qd fuch est confectio ex qua fit gallia, uel ipsa gallia, græcis uocat focum.

Chirat est pōdus granorū. iiii. hordei: ut dictū fuit supra.

XXX.

DE VIOLIS, in cap. de Asthmate.

R. Foliorum uiolarum mediocriū in exiccatione & humectatione. 3. vi. turbich boni harundinei. 3. iiii. succi liquiritiz, tereniabi. i. mānæ. añ. 3. ii. scamoneæ. 3. ii. & fiat troch.

COMMENTA. MANLII.

Isti troc. sunt in usu, maxime scdm istam descriptionem. sunt uero ex hoibus qui faciunt troc. de uiolis secundum unam descriptionem, quam idē in cap. de turbich ponit ex autoritate Hamech: sed isti sunt nobiliores Raf. in lib. Diuisionum ca. de medicinis colicæ, habet duas descriptiones sed non sunt eadem, nec in usu sunt.

EX PETRO DE EBANO.

XXXI.

DE AGARICO, in cap. de Vomitu.

R. Agarici boni uigorati. 3. v. zingiberis. 3. i. salifigemæ. 3. i. s. maticis. 3. i. calami aro. 3. i. s. turbich. 3. ii. anisi. i. aceti. 3. ii. fiant ex eis trochisci, da cum aqua calida.

COMMEN. MANLII.

Isti troch. apud nos nō sunt in usu: maxime scdm istā descriptionē. illa uero descriptio qd est magis usualis est una descriptio quā describit Mesue in lib. de Consolatione medicinarū in proprio cap. de agarico, qui sic inquit. & Gal. dixit fiant troc. ex eo. i. agarico cū uino infusionis zingiberis, in quo pulvis ipsius sape submerget, & fiet opatio eius completa, & ex rebus sibi additis uigorantibus ipm est spica, &

aqua casei, & pprie sumpta ex capris. Gal. non ponit in ipsis saligēna, sed gualiter moderni addunt cū infusione zingiberis parū saligēna, & sunt inde trochisci, et ad minus debent fieri tribus uicibus, & si prædicti troc. sunt cum agar. prauo, tunc illi trochif. in colore efficiuntur nigri, & quando sunt cum agarico albo, leui. & frangibili, & dulci in primo gultu, tunc in colore sunt albi, & etiam sunt meliores. Dicunt quidam differentiam esse inter troch. de agarico, & agaricum trochificatum, sed medicorū modernorū opinio est uera, qd inter agaricum trochificatum & troch. de agarico nulla sit differentia: maxime si fiant secundum descriptionem quam dixi de mente Gal. Scias etiam si loco infusionis zingiberis addas oxymel, & facias inde trochiscos, sicut priores: tunc uocatur agaricum trochificatum cum oxymelle: cuius etiam est magnificata operatio. Democritus autem dicit qd agaricus est medicina familiæ, qd ad singulas partes corporis cōmoditatem affert.

EX FRANCISCO DE PEDEMONTE.

XXXII.

DE SPICA, in cap. de medicinis apostematum stomachi.

R. Florum squinanti, tapfia, ligni aloes, cinnamomi, rheubarbari añ. 3. iiii. croci, myrrhæ, apij, anisi, piperis, colli añ. 3. i. seminis calami aromatici, spicæ nardi, añ. 3. iiii. bellii, subalbid. 3. ii. maticis, storacis liquidæ añ. 3. i. armoniaci. 3. s. fiant trochif. in pondere. 3. i.

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. non sunt in usu. Rasis in 9. Alman. in cap. de dolore & apostemate stomachi: habet unam aliam descriptionem, & fere eadem est.

Spica. i. spica nardi, siue spica aromatica, siue spica auiū, ut dicit Auic. Macer inquit:

Esse gradu primo calidam siccamq; periti

Testantur spicam quæ dicitur indica nardus.

Isidorus: Nardus est herba spicosa, unde a Græcis nardos tacos appellata: quorum alia India, alia Siriaca uocatur non qd in Siria nascatur, sed qd mōs inuenitur alio latere Indiam spectat alio Siria. Gal. in 8. simpl. inquit: Nardostochos. i. nardus spiciatus, siue spica nardi celtica similis aliquantulum est secundum genus in uirtute prædictis. Nardus ora quæ in thalaricis & piricis nominatur, generatur quidem in Sicilia &c.

Tapfia dicitur quia primo in Tapso insula inuenta fuit: Arabes corrupte dicunt tessfia, ut apud Auic. in 2. can. & exponit quod est gūmi rutæ agrestis: & scdm Compositores est setragi, ut dicit in cap. de cura oppilationis plenioris.

Setragi uero, ut dictū est in triphera Saracenicā est hi beridos. i. nauturii agrestis siue fenatio. Rasis loco eius ibi dē hētylocastriz. i. calisiz lignez. Tu uero considera qd opinio Franc. est qd tapfia sit setragi, & opio Gentillid qd sit casia lignea. Credo qd de ipsa nō inueniat certitudo qd sit sed hodie sunt qui loco eius ponunt casiam lignē, quidā senation, quidam rutā agrestē, ut dictū fuit supra in confectioe anacardina conferris ad aggritudine nervorum.

Seminis calami puto qd uult dicere calami aromatici: nam loco eius habet calami aromatici.

XXXIII.

DE SILIQUIS, in cap. de teneismo.

R. Gallarum, siliquarū nabati, fructus tamarisci, turris, balautiz añ. 3. i. gūmi arabici, opij añ. 3. s. fiant troc. cū aqua plualij ponderis. 3. i. s. & usui referentur.

COMMENTA. MANLII.

Isti trochif. nō sunt in usu. Siliqua nabaria. i. septentrio nali pte sue regione, & est fructus lōgus ad similitudinē fabæ magnæ, sed magis sunt lōgiore & grosiores, intus hnt semē ad modū calisæ fistulæ, & hic fructus desērt de Lanua ad nos, & uocamus ipm carobas: quidem uocant bazianas marinas, & eius arbor est spēs darisaban. Idē inquit. Silicon quā latini corrupte siliquā uocāt ideo a Græcis tale nomen accepit, eo qd ligni eius fructus dulcis est: Seta uocat ipm xylocaractē. Dios. filiq. Gal. in 7. simpl. inquit: Cera tonia. i. arbor xylocaractē. Siliqua etiā est pōdus & ponde-

rat uigefima quarta pars solidi.

XXXIII.

DE ALVMINE, ibidem.

R. Gallarum, alluminis, acacia, balustiarum, corticis granatorum, succi hypoglossidis añ. partes aequales, terrantur & clysterizentur cum decoctione mediani corticis glandium, balustiarum, & rofarum, & fiant inde troch.

COMEN. MANLII.

Isti trochisci non sunt in usu. Rasis in libro diuisionum in ca. de medicinis solutionis uentris habet unam aliam descriptionem quæ eadem est.

Aluminis fm Diosco. species sunt multæ: sed medicinz tres sunt necessariae. f. rotundũ, scissum, & liquidum: rotundum dicitur propter similitudinẽ zucchari: scissum. i. iamenum dictum a vulgo de pluma, liquidum. i. de roccha vel hypparini: quando vero simpliciter reperitur alumen, de scisso intelligitur, vt dicit Matt. Syl. in cap. de alumine, & per alumen scissum intelligitur alumen dictũ de pluma, qd apud quoddam dicitur flos de preda: & quando ipsum ponitur in oleo facit lumen sicut bombix, & non consumitur.

XXXV.

DE DACTYLIS, in cap. de cura heclicæ febris.

R. Dactylorum immaturorũ. 3. ii. spodi armeni, aur. 3. iiii. rofarum. 3. vi. portulacæ, citrulli, cucurbitæ, charabæ añ. 3. iiii. fiant ex eis trochisci.

COMEN. MANLII.

Isti trochisci apud nos non sunt in vsu. Dactyli secundum Auic. & Petr. de Crescent. sunt fructus palmarum. Circa in stans ait: Oxyphenicia, i. phœnicon Indi vel dactyli: dactylus apud medicos Venetos significat vnum bolũ calsiæ.

EX NICOLAO.

XXXVI.

DIARHODON.

R. Croci. 3. ii. gra. viii. camphoræ † gra. xii. rofarum viridium * 3. iiii. spodi † 3. ii. sandali rubei * 3. i. s. gr. vii. sandali albi † 3. i. gran. xii. conficiantur sic in marmorea pila recentes rosæ sine intermissione terantur: deinde cæterum subtilissimus pulvis specierum superponatur, & cum sufficienti rhodomaste conficiantur, ad vltimum adhibeatur camphora: deinde troc. informetur, & ad vmbra exiecentur, & vsui referentur.

COMMEN. MANLII.

Trochiscus fm intentione Nicolai est rotunda confectio, vt dictum fuit. Isti trochisci, reperiuntur etiã in antidotario Mesue, sed non sunt idem, & propter id ambæ descriptiones debent fieri. Nam ista descriptio Nicolai nõ debet administrari, nisi solum in suis receptis, vt est in diamargariton, & in diarhodon: descriptio Mesue non debet administrari nisi in receptis suis, sed sunt quidam qui faciunt vnã pro alia: & non faciunt differentiam ponere troc. diarhodon descriptio Nicolai in receptis Mesue, & descriptio ne Mesue in receptis Nicolai: sed recte non faciunt.

Rhodosoma secundum Cõpositorem est aqua ros. quiddã dixerunt quod est mel rosfatum, sed non credo, quia idem in descriptioe pilularum de cinoglossa inquit: Temperentur cum rhodosmate. i. cum aqua ros. & sic est.

XXXVII.

DIAION, e violis, vulgo DIANI.

feu DIAVI.

R. Florũ violarum, albarum viridũ, 3. v. amyli † 3. iiii. feminis papaueris albi * 3. ii. & 3. i. balsami † 3. i. rheubarbari * 3. i. feminis plantaginis † 3. i. rhodomostomatis. i. aquæ rosæ quod sufficit, confice ad modum præcedentium.

COMMEN. MANLII.

Isti trochisci secundũ intentionẽ Nicolai dicuntur a violis albis quæ ibi ingrediuntur, & sic debent fieri de violis albis, & debet poni in diamargariton, & peditæ violæ apud Dios. vocantur leucis, nam leucos albus interpretatur.

XXXVIII.

HEDYCROI, vulgo IDIOCRI.

R. Amomi * 3. i. cinnamomi, croci, folij, myrrhæ, casis lig. añ. † 3. s. specij nardi * 3. i. popobalsami, colij, squinãti, cala-

mi aromatici, xylobalsami, affari, phu, ana. † gr. xv. maratri, masticis ana. * gr. x. camarici † gr. vi. vini alcalonis quod sufficit. hæc omnia tere cum vino albo, trochiscos informa, & cum fumo storicis sicca.

COMEN. MANLII.

Isti trochisci sunt in vsu, sed nõ multũ ingrediuntur in rubea trochiscata & in sotira. Gilib. de Angl. in cap. de cura arthritice secundum magistros habet vnã aliam descriptionem quæ eadem est, & dicuntur idiocria Cõpositore qui idiocritus dicebatur. Gul. Placentinus habet vnã aliam descriptionem quæ eadem est.

Vinum alcalonis secundũ Cõpositorem est vinũ optimum tendens parum ad rubedinem. Gilibertus eodẽ loco habet alcaloni. Gul. autem ait cõficiantur cum vino in quo dissoluta est stora sicca. i. calamita.

XXXIX.

CROCOCAGMATIS, vulgo corrupte

CROCIMAGNETIS.

R. Croci. 3. iiii. rofarum, ameos, myrrhæ, añ. 3. i. s. xyloaloes 3. ii. informetur cum aqua ros.

COMENTA. MANLII.

Isti trochisci sunt in vsu, quia ingrediuntur in rubea trochiscata & dicuntur a croco qui ibi ingrediuntur. Ifid. inquit: Crocũ magna expressus aromaticis crocini vnguẽti atq; informato sedimine in pãnuculos fit, & ideo sic appellat. Auic. in 2. cañ. inquit: crocoma est fex olei de croco. reperit etiã vna descriptio troc. croci magna, sed non est eadẽ, & ambæ debent fieri, sed vna ingreditur in rubea trochiscata, alia ingreditur in confectioe diaphrindinis, vt ostensum fuit.

XL.

DIACORALLIVS, vulgo DIACORALLI.

R. Coralli rubei, cinnamomi, myrrhæ, amomi, papaueris ana. 3. iij. squinãti, croci, ana. 3. ii. calami aro. xylobalsami, casis, folij, masticis, phu, poli motani, afari, pedis columbini ana. 3. i. de illis oibus factõ puluere cũ vino tempera, & troc. pefantes solidos singulos in forma, & in vmbra sicca.

COMEN. MANLII.

Isti trochisci sunt vsuales apud illos qui facere volũt theiac quæ fit de mète Gal. Andromacus loco troc. diacoralii hẽt troc. alindaracarõ ipse Gal. in tra. 7. meimir. in ca. de expunctione sanguinis habet vnã aliam descriptionẽ: sed nõ est eadem, nec in theriaca illa descriptio debet poni.

Amomũ semen est minutum, nigru, quod ab oriente defertur. Sera. in cap. de amomo dicit. aneuei. i. pes columbi, & est amomum. miror verbis Sera. nam in istis troc. ingredit amomũ & pes columbinus, ergo non sunt idem. Verum est quod pes columbini sunt species quatuor, de quarum vna illarum potest dici quod fit amomum.

Pes vero colubini fm Serap. est amomũ. secundum vero Modernorum opinionẽ est herba habens folia rotunda, parua, diuisa in magnis & paruis incisuris, stipites ipsius sunt subtilis coloris, subrubres, habẽtes nodos raros in gbus sunt duplicia folia, & femina tria vel quatuor vel quinque cõiuncta in medio eorũ sicut acus. Hæc apud nos nascitur in viis ac pratis. auerrois in 5. colidicit: Elnegat. i. pes colubinus e quatuor speciẽrũ et parũ diuersificat. vna ab alia.

Solidus est pondus secundum Cõpositorem drachmæ vnus cum dimidia, etiam exagium est idem, vnde exagium a solido differt in nomine solo.

XLI.

DE TYRO.

Inuenias tyros longitudine vnus palmi. oculos rubeos habentes, & linguã mobilẽ, & cornu in modum grani frumeti, caput & caudã tribus digitis mẽsuratis absconde mediũ, qd remanet excoria, & intestinis, pietis optime dulci aqua laua, & sic coque donec spine a cornibus separentur, & spinis pietis caro in marmoreo mortario terat & commisceatur tantundẽ de farina orobi, vel panis asis, & cũ iure ipsorũ tẽpera, & fac trochiscos pefantes solidos singulos & diligenter siccantur in vmbra, & vsui referuntur.

COMENTA. MANLII.

Hos trochiscos apud nos habemus in vsu.

* al. 3. ii.
† al. 3. i. s.
† al. 3. i.
† al. 3. s.

* al. 3. iiii.
† al. 3. i.
* al. 3. xii.
† al. 3. i.
* al. 3. viii.
† al. 3. vi.

* al. 3. xv.
† al. 3. iiii.
* al. 3. viii.
† al. 3. i.
† al. 3. xv.
† al. 3. iiii.

* al. 3. vi.
† al. 3. viii.

Tyrus autem est aial, cuius forma est, vt dicit Nicolaus: eius ip̄es sunt tres. I. tyrus, vi. pa. & idria. Andronicus inuenit istius aialis scriptit etiā de forma ipsius, & ait. q̄ theriacā non d̄ nisi a tyro serpente. Auic. in. 5. cano. ponit troch. de viperis, & ibi describit formā viperę, & idem est, de quo infra. Iſi. in cap. de serpentibus dicit: Viperā dictā quod vi pariat: nam cū venter eius ad partū inuenerit catuli non expectantes naturā naturę solutionem, corrosis eius lateri bus vi erūpūt cū maris interitu. Lucanus. Viperę coeūt abrupto corpore nati. Fertur aut quod masculus ore inferito viperę semen expuat. Ex viperā aut sunt palli qui the riaci vocant a gr̄cis. Nicolaus dicit. admisceat cum tyro panis affus Andromacus & Aui. habent tortellas. i. tortel las de sceni: de cuius modo infra apparebit.

EX R A S I.

X L I I.

DE ERVO, in. 8. Almanſo. cap. de morſi-
bus viperarum.

R. Seminis andachoche, aristolochiz rotundę, pigami, fa-
rinę añ. partes æquales: ex istis tritis, & cum aceto commix-
tis fiant trochisci, de quibus pondus vnus aurei cum vnica
vini veteris in potu tribuatur.

COMMEN. MANLII.

Isti troch. non sunt in vsu: supraposita fuit una descriptio
trochiscorū de orobo. i. erui, sed eadē non est. Eruum apud
Auic. est herba Iudaica, sed apud Diosc. eruum est orobum.

Andachochē vel andachocha, vt apud Auic. & Serap. est
trifolium: cuius alia est syluestris, & alia domestica, & alia
est ægyptiaca, & fit ex feminis eius panis.

Aristolochia rotunda dicit, q̄ radicem rotundā habet.
Iſid. inquit: Aristolochia dicitur q̄ mulieribus fœtis opti-
ma sit: nam super sessa post partum matricem beneficio va-
poris expurgat, & sunt duę species: vna est rotunda dicta
propter quod rotundam radicem habet: altera longa, quia
longam radicem habet. Dioscorides habet terciā speciem
quæ dicitur dermatica.

Peganon, seu pigamum fm Gal. in. 8. simpl. est ruta syl-
uestris. Macer in cap. de ruta, quasi in fine ait. Peganon in
græcā nostrā quia ruta vocatur, sine dubio pigamum est ru-
tā. Nam Græci peganon rutam dicunt. Item Circainſans
in cap. de ruta ait: Ruta duplex est maneries scilicet domestica
& syluestris quæ pigamum dicitur, & cum inuenitur,
R. pigami folia syluestris ponuntur cum semi. pigami semi-
na collecta per quinque annos seruantur.

X L I I I.

MVSCATI, in cap. de tremore cordis.

R. Malticis, spicę, nardi xyloaloes, cinnamonomi, garyo-
phyllorum, galliæ mulsatę, nucis mulsatę, cubebę, carda-
moni maioris, & ibelohe, corticis citri, oīum añ. pondus
vnus aurei, muci sextam. 3. i. ex istis omnibus cum vino re-
dolente confersis fiant trochisci.

COMMENTA. MANLII.

Hos trochiscos nō habemus in vsu: supra habita est cōſe-
ctio galliæ mulsatę Mefurę, et cōſectio galliæ mulsatę Ni-
colai, & secundum illas descriptiones facimus.

Ibelohe vel ibeleuche est cacula, vel cardamomū minus,
& est illa qua nos pro cardamomo magistraliter vtimur.

X L I I I I.

DE OLIBANO, in. 9. Almanſo. cap.
de passione cholera.

R. Boli corasceni. i. critensis infusa thuris ana. 3. x. cucubę,
cardamomi ana. 3. ii. s. camphorę, galliæ, garyophyllorum
ana. sextam 3. i. fiant trochisci pondere aurei vnus.

COMMEN. MANLII.

Hos trochiscos nō habemus i. usu. Rasis euius inquit: tro-
chif. de olibano, sed nō hēt olibanū: verū loco eius hēt thus,
quod id est: quidā admirantur dicētes: si trochisci de oli-
bano & trochisci de thure sunt idē: quare idem ponit etiam
troc. & de thure. Vnde ad hoc dico quod si doctor ordinat
trochiscos de olibano nō debent intelligi trochif. de thure:
si modo est ista interpilula de raued, & pilulas de rheu-
barbaro, sed moderni non habent cognitionem veram.

X L V.

DE AGNO CASTO, in cap. de dolore splenis.
R. Seminis agni casti, seminis tamaricif ana. 3. x. feminis en-
diuiz, seminis portulacę ana. 3. v. ex his fiant trochif. de qui-
bus quotidie detur vnus cum syrupo acetoso de zucchero
cuius pondus sit. 3. iij.

COMMEN. MANLII.

Isti troch. sunt in vsu multum apud nos. Franc. de Pede
mōtium in ca. de cura oppilationis splenis habet uuā aliam
descriptionem quæ est eadem.

Agnus castus fm Sera. ex religioſitate Diosc. sunt ei. duę
species, & dicit chistos, eo q̄ religioſi ſterunt hanc plantā
sub lēctis ad refrenandā libidinem, & noīatur login. ppter
duritiem virgarum eius, & est planta in magnitudine ar-
borū: nascitur prope aquas, et in locis aqueſtribus Gal. ait:
Id quod administratur ex hac arbore in medicina sunt folia
& semen est factum ad modū piperis, & propter id vo-
catur piperella. Auer. in. 5. coll. inquit: Pentafuer dicitur a
persis arbor Habraam, & in Latino dicitur agnus castus.

X L V I.

DE BALAVSTIIS, in cap. de fluxu ventris.
R. Gallarū, ſiliquarū nabati, feminis tamaricif, olibanis; bala-
uſtiis, oīum ana. partes æquales, opii, gūmi arab. amborū
ana. partē mediam, informantur troch. pondere. 3. iij.

COMMEN. MANLII.

Hos trochiscos non habemus in vsu. Aui. in. 5. can. habet
vnā aliam descriptionē, sed non est eadem. Idem describit
Alexander in cap. de troch. ad dysenteriam & dysenteria.

Balaustia vero apud Aui. in ca. 2. cañ. est flos mali gra-
nati syluestris Persici aut Aegyptii. Aliud de ipsiſ capitulū
facit i. litera haſce. Dio. in ca. de malo granato dicit: Agre-
ſtū aut malorū flores græci balaustii vocauerunt, sed Gal.
in. 7. simpl. dicit cōtra in ca. de iulinar, qui sic inquit: Iulinar
est flos mali granati syluestris, sicut balaustia est flos mali
granati domestici: nā iulinar apud Arabes est Balaustia. Ha-
lyabbas aut gñaliter scribit: sine dubio balaustia qua ap-
othecarii vtunt, & flos mali granati domestici ſeu vſuali.

Siliqua nabathia. i. illius regionis, & est faba marina vel
bazianz maritima, vel charobiz, vel charub, vel xylocara-
cta quæ idem sunt. Supra de ipsiſ dictū fuit diſſuſe.

X L V I I.

DE THVRE, in cap. de singultu.

Rec. Thuris. 3. s. enulę. 3. iij. mentaſtri, foliorum rutę siccę,
amylī ana. 3. ii. feminis nemē. 3. iij. s. informantur ex his tro-
chisci pondere vnus aurei.

COMMENTA. MANLII.

Hos troch. nō habemus in vsu. Diosc. in ca. de thure in-
quit: Thus est lachrimā arboris, qđ Græcē libanus dicit: qđ
aut de Gallariſ deferri candidū est: quod vero de India ſub-
rufum, sed vt rugin: masculū dicitur: est & terciū genus mi-
nutū valde & rufum: de quo mannis maxime fit: ergo opti-
mū thus quod masculū dicitur ſubalbidū & rotundum. Iſi
dorus thus masculum appellatur, eo quod si natura rotun-
dum in modum testiculorum generaliter. habetur opinio
quod olibanum & thus idem ſint, & sic est uerum.

Nemen secundum Sera. in ca. de serpillio dicit. quod nemē
est serpillū: sed Aui. vel trāslator ipsius errauit i. hoc in.
2. cano. vbi capitulū facit de nemen, & exponit quod est ſy-
mbriū, quod ſalsum est. Nam Ioan. Arculanus in ca. de cu-
ra cephalę tam calidę quam frigidę dicit. quod nemen est
serpillum & non est ſymbrium.

X L V I I I.

DE MYRRHA, in cap. de prouocatio-
ne menſtruarum.

Recip. Myrrhę. 3. iij. lupinorū optime tritorū. 3. v. foliorū
rutę, mētaſtri, pullegi, cimini, rubez, affz, serapii, opopa-
naci añ. 3. ii. informant troc. pōderates. 3. ii. ex quibus deſ
vnus in die cum aqua in qua semen iuniperi coctum fuerit.

COMMEN. MANLII.

Hos trochiscos habemus multū in vsu. Gul. Plac. in ſuo
tractatu de cōſectionibus hēt unam aliam descriptionē
quæ eadem est Bartholomæus Montagnana in ſuo anti-

dotario habet unā descriptionem troc. optimorum ad pro-
nucundum menstrua, & est eadē. Nico. Florentinus in ser-
mone. 6. in ca. de retentione menstruorum præternaturam
inquit dixit. Alman. troch. de myrrha, & ibi describit eius
descriptionem, quæ est eadem, nisi in una re, de qua infra
etiam Alman. in libro diuisionum in ca. medicinarum men-
struorum, & hæmorrhoidarum habet unam aliam descri-
ptionem, sed prima est nobilior.

Myrrha latinum est, græcus smyrna dicit. sed m. Auicēn.
myrrha est gummæ currens super arborem in iameni quæ
dimittitur donec congeletur. deinde colligitur sicut galba-
nū: & eius quidem alia est pura & alia adulterata. Melior
est illa quæ ad albedinem declinat & rubedinem: non com-
mixta ligno, & cuius arbor est boni odoris.

Lupinus in Sera. ex lupinis sunt quidam qui dicuntur re-
gales & quidā sunt doctifici, & doctifici comeduntur post
eorum elixationē, & infunduntur in aqua pluribus diebus.

Rubea. Rubra tinctoria: ita hñt alij doctores radix eius
herbe est id quod est iuatiū in medicina. Pli. ait. Erithro-
da nōs alijque erenthodanū nocit. nos rubea quia tinguntur
lanæ pelleq; perficiuntur in medicina vinam ciet.

Aliz. fælix foetida nā Bartholomeus loco eius habet as-
fæ foetida quod idē est: In hac descriptione codices Nico.
Floren. deprauati esse cernuntur. nam vbi debet dicere as-
fæ foetida scribitur aliz, quod est thymus, sed hic error ma-
nifeste comprehendi potest esse scriptoris male intelligenti-
tis. debemus aut ponere asfæm foetida, & non thymum. Ra-
fis non ponit cum quo liquore debeant fieri. Bartho. dicit
q; debent fieri cum decoctione suauis secundum artem. &
sic apud nos generaliter fit ex illa decoctione, etiam sunt q;
faciunt ipsos cum aqua decoctionis rubeæ tinctorum uel iu-
niperis, sed prima est nobilior.

XLIX.

DE TAMARISCO, vulgo de Alcarneficis,
in lib. diuisionum, cap. medicinarum splenis.

R. Seminis alfragadi, seminis tamaricis, feminis endiuiz
añ. 3. iij. foliis opolendrie quartam vnus. s. drachmz. fiant tro-
chisci. aure. ii. sumatur cum syrupo acetoso.

COMMENT. MANLII.

Hos trochisc. non habemus in vsu. Rafis noiat, troc. alcar-
neficis, sed ibi alcarneficis non Ingreddit, sed loco eius habet
semē tamaricis, q; idē est. Aui. in. 2. ca. inquit: Carmezij
est fructus tamaricis etiā Sera. in ca. de tamarisco idē dicit.
vnde trochisci de carmeis. i. de tamarisco.

Alfragadi vel alfragadi est semen agni casti sicut reperit
apud Galenū in sexto de simplici medicina in proprio cap.
de agno casto, & credo esse bene expositū, nam agnus cas-
tus in ista materia multum valet.

EX AVICENNA.

L.

ALINDARACARON, vel Alindaracon,
in 4. ca. anreos pāsim habet Avicenna.

R. Corticū radices darisfahā. 3. vi. supioris squinati. 3. xii. ca-
lami aromatici, colli, xylobalfami. i. affari, myrrha, amomi
mili, polii montani oium, ana. 3. xxiii. malicis. m. eruchil, &
est alacoe alba. phu. ana. 3. vi. aristolochie rotunde. 3. xx. rheu-
barbari, xylocalsiz. cinamomi ana. 3. x. spicæ indæ, folii. añ.
3. vi. croci. 3. xii. teratur totū & cribellet p se & cōficiat
q; uino odorifero antiquo de cluante ad dulcedinē, & fiant
trochisci, & exiccantur in umbra, & conseruentur sicut fit
in trochisc. de uiperis.

COMMENTA. MANLII.

Hos trochisc. habemus in usu maxime quādo facere volumus
theriacā quæ est de mente Andromachi. Aui. ibi habet
duas alias descriptiones, sed hæc est prima: & est nobilior aliis
nā Io. Sera. Rafis, Guliel. Pla. isti omnes habent primam de-
scriptionē, sed Lumen apothecariorum vel verius tenebra,
scriptis tenet descriptionē istius trochisc. qui in vsu non est.

Galenus alio loco troc. alindaracon. i. Andromachi ha-
bet troc. diacalli. supra in theriaca Aui. posuit auctores q;
scribūt istam theriacam, & in quo ca. describit Darisfahan,

est cortex radices arboris mali granati syluestris, sed nec
Aui. nec Gētulis cognouerūt certitudinaliter qd esset daris-
fahan. Ipse aut Aui. in. 2. ca. ponit loco darisfahan fructus
alienbuci. i. xylocaractæ, sed pilla uerba non cognouit quid
esset, & Gētulis creditur q; p darisfahan intelligere qd daris-
eni. i. cinnamomū, quod non est. nā Guliel. Pla. in pādis tro-
chiscis inquit, & intellige per darisfahan arborē habentem
spinas magnas quæ appellantur spinum alacoi. Præterea Se-
ra. in ca. de darisfahan dicit ibi quod est arbor granati sylue-
stris, & habet spinas. in fine cap. dicit, ingreditur in trochi-
scis theriac, & nominant eum in Barbaria alda. Lumen
male lucēs inquit, quod darisfahan est arbor cornuta vel ne-
spilli. quod est falsum, hæc arbor apud modernos dicitur cri-
spinus siue amiberberis. i. spina acuta.

Emeru Kit in intentionē Aui. est alacoe alba. Androma-
chus habet amaracū. Raf. habet cotillam alacoi. Io. Sera. ha-
bet coen rubē. Gul. Pla. habet flores cotillæ albae, & dicit
q; appellatur anetullū foetidū. Gal. hēt amaracū. Aui. in se-
cunda descriptione habet alacoe, in tertia habet amaracoi,
& dicit, quod est alacoe alba: hic possumus uidere si Andro-
machus cōpositor & Aui. uolūt quod ipsa sit alacoi, siue
uohen, ut apud ipm Aui. in. 2. cano. quid autem fit cōiter
ignorat. Lumen male lucēs hēt amaracū, & dicit q; est ma-
iorana, sed est falsum. Gētulis in tracta. de febrisus dicit.
Amaracū esse maioranā quæ dicitur uohen, sed non est ma-
iorana quæ dicitur sanfucius. Matt. Syl. dicit: Alacoi. i. pes
corinus, quod est falsum: nā pes corinus est solutius, & ala-
coen non: nec est camoinilla ut quidā putauerunt, sed ue-
ritas ē q; alacoi, siue uohen, siue partemō, ut apud Dio.
siue matricaria idē sunt: & qui mihi non credit uideat be-
ne ca. de uohen apud Aui. cū cap. de partemō apud Dios-
corid. & cap. de matricaria apud Sera. & uidebit q; idē sunt: præ-
terea uide q; Nicolaus Floren. in lib. 7. in ca. de apostemat
bus emunctoriū siue de bubonibus dicit: alacoi. i. ma-
tricarica, & sic est: & hæc est illa quæ a Lombardis cris-
pula uocatur, & sic ista in prædictis troch. debet poni.

LI.

S Q V I L L A E.

Oportet ut eligat de squillis humidis illa quæ est grauis,
& non est magna, & non linias ipsam cū luto, qm illud fa-
cit eam rancidam, & corrūpit ipsam. immo linias eam cum
fermento, & asia eam in olla, donec coquatur, aut in furno
iam calefacto, & extracto cinere eius, aut in patella de ter-
ra, super quam coquatur panis eius; cum ergo extrahetur
inde, tunc sumatur interius eius leue, & teratur optime, &
miscet cū eo farina orobi recēs secundū uirtutem squillæ,
& exitus eius. Andromachus uero miscebat cū parte una
squillæ duas partes farine orobi, & alij zqualē mensuram
cum ergo mixta est squilla cum farina orobi: tunc fac ex
troc. subtilis, & unge manus tuas, & facias ex ea troch. cum
oleo rosato, & exicca eos, & conserua eos sicut dicta infu-
rius in descriptione de uiperis.

COMMENTA. MANLII.

Isti troch. sunt in usu apud illos qui faciūt theriacā Squil-
la aut ēm Aui. est cape muris: eo quod interficat mures. Ra-
fis noiat prædictos trochisc. trochisc. squillicicos, & uult q;
matur squilla tpe messium, & oportet q; squilla non sit mi-
nima neq; paruissima. Raf. ac Gulielmus uolunt quod squil-
la sit pars una, & farine medie. etiā Aui. dicit quod medici
sui tps accipiunt trochisc. part. ii. & farine orobi partem
unam, sed Andromachus dicit contrarium. hoc est, q; squil-
læ addere debemus duplum farine orobi, & sic fit.

LII.

DE VIPERIS.

Accipiant uiperæ cū sit finis ueris, & incipit æstas, & si fue-
rit uer hyemalis, & dimittant usq; quod cōsequatur æstas, &
uiperæ quidē sunt serpentes capita habentes plana, quæ sunt
lata, pprie apud ppinquitatē colli minuti subtilis ualde,
quorū candz sunt cutzæ trepidz facientes, & sonitū in in-
cessu, & illis quidē trochiscis non conueniunt oēs uiperæ:
immo flauæ, & de flauis femineæ, & earū signū est quod ma-
sculi in omni latere habent unū dentem, & femineæ plures

SECTIO VIII.

vas, & oportet ut alienentur cornuta & varix, & aspidēs declinēs ad albedinē, & non capiant ex piscinis & littoribus fluuioꝝ & aquarum, & neq; petrosæ: qm̄ in eis sunt quercinæ faciētes scitissimo capiaūt in loco longinquo ab humorositate, et non capiant illæ q̄ sunt debilis motus: immo eligant illæ quæ sunt velocis motus habentes caput eleuatū, & oportet ut non moret cum capiuntur si posse est, & abiciantur a parte capitis eius quatuor digiti, & sit a parte caudæ ipsius, & ani eius: q̄ si cucurrit ex ea sanguis plurimus, & fuerit motus eius in illa dispoñe plurimus, & mors ipsius tarda, tūc erit electa. Et si fuerit parui motus, & pauci sanguinis, velocis motus, tunc erit mala, & de signis eius iterū est, vt sit motus eius velox & aspectus eius aspectus audacis & p̄sumptionis, & sit egressio fecis eius ex p̄stremo caudæ eius, cūq; mortua ē extrahant viscera eius, & p̄prie fel ipsius, & abluat cū aqua & sale ablutione exquisitissime facta, deinde decoquantur ī aqua & sale. Et si cū ea fuerit anethū non erit malū in decoctione discoquēte cū quā leuis fiat collectio carnis eius ab osse ipsius, mundificetur ergo caro ipsius ab osse, & p̄iciatur in mortario, & terat bene, & p̄cipiat illi qui facit illud ut odoret oleum balsami & sit inungat ipsum super digitos: cū ergo cōtrita ē miſceat cū tortellis fm̄ descriptiones diuersas, & nō eligat supra descriptionē Andromachi, deinde fiat ex ea trochi. minuti subtilēs, & excicent in umbra: & reponantur in repository aorio, & oportet ut non cadat super eos radius solis oīno, & neq; ante excicationem, neq; post ipsam, fol nanq; destruit, & expoliat eos a uirtute appropriata carnibus uiperarum interficiente uenena quæ sunt ex morſione, & ebibita.

COMMENT. MANLII.

Isti troch. sunt de uipera. i. de tyro: & sic p̄pter istam descriptionē istius troch. tyriacæ deriuat ab eis: quidā crediderunt q̄ trochisci de uiperis nō eēt troc. de tyro, sed errāt. Nam Andromachus uult q̄ uipera sit hmoi: & uult q̄ troc. de uiperis sint troch. de tyro: cuiusdē opinionis est. Haly. qui dicit q̄ tyria debet esse in ætate adoleſcens sexu fœmina nō mæculus, uide etiā supra ubi posita fuit descriptio trochi. de tyro quō d̄ sunt idem. Andromachus & Rasius melius oſendunt de forma viperæ, quā Auic. Rasius in tractatu tyriacæ inquit: fumantur uiperæ fœminæ: quæ in hoc discernunt, q̄ plures duobus habent dētes: mæculi uero sexus duos tantū hnt dētes, ex quibus eligant illæ tantū quæ rufo uicinantur colorī, & sunt cito mobiles caput frequēter agitates, et quæ sunt bonæ habitudinis, & pingues, oculos habētes rubeos & capita lata: quarū anus iuxta caudā inueniē: quæ ī tēpore ueris colligant in eius. medio ille tū qui in littoribus maris morant, aut in lacubus, uel in locis q̄ aquæ salis vicina existunt: nequaquā accipiantur. Iſtū ait Andromachus. Nicolaus Flo. in lib. 4. in cap. de speciebus serpentū inquit: ex eis est serpens paruus dictus tyrus uel tyria: cuius est quædam spēs, quæ etiā tactū occidit. unde Gal. de theriacā ad Casarē ait: dictū est regina AEGYPTI q̄ interficit seipsam p̄ inpositionē manus sup̄ tyriā, q̄ ipsa hora appositionis mortua, est & hoc uoluntarie fecit, q̄ rex qui inuaserat regnū mitebat eā capere, & dicit Gal. ego uidi hāc tyriā in Alexandria & interficere fecit eā sine mora, & postea iterū ait: De uiperis est malis reperit aliquæ apud nos, & ex istis sunt q̄dā curatæ, & grosse dictæ nostro idiomate scorizoni uel scurtii. Sias q̄ prædicti tyri spēs sunt tres. quarū una uulgarī noīe dicit uipera, alia d̄ tyrus, alia hydia, in nostris partibus bonæ raro reperiuntur, immo hodie reperitur serpens dictus scurtius q̄ tyro habetur, sed credo q̄ hodie finit est hominibus qui faciunt theriacā absq; tyro, uerum tpe quo p̄dicti tyri non reperiēbantur collegiū medicorū uenetoꝝ ordinauit unā descriptionem trochiforum qui possunt poni in theriacā loco troc. de tyro, sed melius ē si posse eēt ponere de tyro sed ad minus malū est ponere illos trochifos, quorū modus iste est. q̄ trocellarū de feni. i. p̄nsi. afsi. 3. iiii. s. fā ringe orobi. 3. xxi. s. tormentillæ, diptami, an. 3. iiii. fiant trochisci ex eis cū uino in quo infusum sit gummi arab. & sicentur & referuntur. Auic. dicit: Misceatur cū tortellis fm̄ descriptiones diuersas. Nicolaus loco eius habet panem

assum. Gul. Pla. habet ibi tortellas, & dicit. Per tortellas in telligas panem de frumento coctum, ut possit conteri, & in quo nō sit multū fermentū: immo uicinetur pani azimo, ita quōd nō habeat aliquid acetoſitatis in se: immo sit perfe & excicationis, teratur ille panis, vt alcohol. i. subtiliter & referetur. moderni non faciunt ipsum fm̄ illum modū: uerum est quōd oportet quōd ipse sit panis azimus, sed fit cū decoctione mælticis ac passularum, sicut ostendam infra in emplastro diaphoneonici, si Deus uoluerit.

LIII.

COCHION, administrati in mithridato.

Passularum rubearum enucleatarum 3. iiii. glutinis albotin. 3. iiii. squināri, myrrhæ. an. 3. xii. cinnamomi, bellii subalbidi, blactæ bizantiæ, spicæ romanæ, calsiæ, nelliloti, cyperi, baccaurum lauri an. 3. iiii. calami aromatici 3. ix. croci. 3. i. bituminis iudaici 3. i. s.

COMMENTA. MANLII.

Hæc descriptio est fabor filii sehel in qua est additū byrmen iudaicū, & in descriptione alia est additū byrmen iudaicum, & in descriptione alia est additum dariſahā: pondus 3. iiii. s. & in descriptione alia sunt additæ affari. 3. ii. s. Iſti troch. de cochion sunt in usu, apud illos q̄ facere uolunt mithridatum fm̄ descriptionem cōem. Rasius & Gulielmus loco eius habent theriacā diffusā, & idē est Auicē, uero inquit: q̄ hæc descriptio est sapor filii sehel, in qua est additum bitumen iudaicū: & in descriptione alia dariſahā. & in descriptione alia affarū. ista uero duo simplicia Rasius & Gulielm. non habent. Auic. non ponit modū ipsos conficiendi: sed Rasius & Gul. dicunt. conficiant sic. ea quæ molificari possunt in uino ueteri posita resoluatur donec liquida fiant. alia autē oia trita & cribellata cum eis iungantur, & cū melle desputato confecta & mixta reponantur. Gulielmus dicit: Medicinæ eius confectiois præter nēl & uinū sunt xiiij. hoc enim electuariū. fm̄mithridatum sic confectum ponitur in omni re loco auræ Alexandrinæ & Hadriani quæ ambz in antidotario Nicolai ponuntur.

Bitumen iudaicum. i. asphaltum. nālij habent loco eius asphaltū: quod idem est. Diof. autem inquit asphaltum. i. bitumen iudaicum, aliud aridum, aliud liquidum.

LIIII.

DE MEZEZEON.

R. Anis. feminis apii, calamenti hortulani, mentæ, petroselinæ, ameo ana. 3. vi. opii, castorei, piperis albi, macropiperis, silymbrii, myrrhæ, abſinthij ana. 3. iiii. corticum calsiæ 3. xii. conficiantur cum melle, & fiant trochisci.

COMMENTA. MANLII.

Isti trochisci non sunt in usu, ipse Auic. habet unam aliā descriptionē, sed hæc est nobilior. Sed dubitatur cur isti trochisci dicantur de mezezeon cū illorum descriptionē mezezeon nō ingreditur: Ad hoc potest dici ut quidā quōd ē nomen equi cum forsā. n. significat nomen cōponētis. Rasius aut in. 9. Almanloris in cap. de hydropſi habet unam aliam descriptionem, & ipse habet mezezeon.

LV.

DE RVBEA.

R. Rubæ. 3. xii. corticum radicum, capparis, aristolochiz longæ, radicum liquiritiæ, ana. 3. i. conficiantur cum syrupo acetoſo, & informetur trochif. ponderis 3. i.

COMMENTA. MANLII.

Hos trochif. non habemus in usu.

Rubea. rubea tinctoriū quidam uocant uenam tinctoriū, & d̄ rubea, quia radix eius est rubea uenæ & in colorando lanas adhibetur, Gal. in. 6. simplicium. dicit salma. i. rubea hæc medicina est rubea quæ utuntur tinctorēs. in seipſo dicit coccus baphicas. i. rubea tinctoriū. hæc medicina apud Lombardos dicitur roxa uel roxa.

LVI.

DE CVSCVTA.

Seminis citrulli, semi. portulæ, semi. alchæfbran, an. 3. iiii. suchahæ. a. achātis, arabicæ, bedoardi. i. spinæ albæ, fumiſtergii an. 3. iiii. dragātī, amyli, gūmi an. 3. i. s. i. podii. turbit. feni. cuscute, an. 3. iiii. tereniāni. 3. xxx. zuchæ. alhuſar. 3. xxx. croci

croci.iii.cōficiēti cū aq̃ & melle & fiat.tro.et administret̃.

COMMEN. MANLI.

Hos trochiscos nos habemus in usu.

Cuscuta uero ē herba quæ inuoluit̃. Circa alias herbas, sicut Croci linum, & ppter id a multis podagra lini d̃r. Serap.in cap.de culcure dicit, q̃ in latino uocat̃ thima. apud nos dicitur a uulgo grengo. eius forma est sicut epythimi, Allicehefabram uel fchehefabram. idem Aui.in.2.can. habet ca.in litera o, quod dicit̃ oalmara. sed nō declarat quid sit. Gētilis sup̃ isto uerbo dicit, quod est herba similis parietariæ: q̃ p id credo quod Gētilis cognouerit quid sit, sed uerum fefabran est ozimum carmenū, de quo supra est dictum in electuario quod dicitur l̃xificans.

Zuecharum albus apud eundem in.2.can. habet quod est manna cadens super albus, & est sicut frusta salis, & in ipso quidem est cum abstersione & resolutione pōicitas & amaritudo, & de ipso aliud est iamenum album, & aliud est agatium ad nigredinem declinans. aliud cap.facit de hauu rū, & dicit quod ē arbor arabica armena, & est unam de laticiniis, & quidam dixerūt quod desursum est quædam species interficis sedente in umbra eius, & hæc arbor uidet̃ habere similitudinem cuiusdam plantæ quæ apud Dios. uocatur taxus: sub cuius umbra si quis dormierit aut sederit statim superuenit periculum uitæ, sicut dicit Aui. Sera.in cap. de zuecharo describit formam zuechari albus.

LVII.

STELLÆ.

Myrrha, castorei, spica nardi, calisæ lignæ, terræ sigillatæ, corticū mādagoræ an.3.iii. opii, croci, costi, stellæ terræ an.3.v. papaueris albi.3.vi. dauci, anisi, fiseleos, feminis iusquiami albi, storacis liquidæ sentinis apii an.3.viii. infunduntur in uiuo odorifero, & tere medicinas, & cōfice cū eo, & fac troch. ponderantes.3.s. & excutitur in umbra.

COMMEN. MANLI.

Hos troch. habemus in usu, sed non multum. Io. Sera. in suo antidotario habet unam aliā descriptionem quæ eadem est. Etiam Bartho. Montanana in suo antidotario habet unam aliam descriptionē quæ eadem est, sed sua descriptio in uno loco est falsa: credo tamē q̃ hic fuerit error scriptoris, & infra ostendam errorem ubi sit. Ralis in l.b. Diuiso. in cap. medicinarum stomachi, ponit hæc eandem descriptionem. Dominus Mesue in cap. de tussi humida ait. Gale. trochisci cognominati assensum, & sunt trochisci stellæ, conserunt quæ uiuamentum sublime. Math. Syl. in litera r. ait. Trochisci stellæ, & antiqui medici nominauerunt eos alui role canex huiusmodi non permittunt uitam recedere.

Stella terræ apud ipsum in.2.can. uocat̃ lutum fassius, & ibi inquit ex autoritate Gal. nos urimus eo ex hoc, qd̃ nominatur stella famia. Ego autē dico q̃ hoibus ut q̃ illud sit talk: uerum de talk iam dixerūt ueridici q̃ ipsum inueniūt in terra Grecorum, in insula Cypri in.3.can. in cap. de cura spūti sanguinis: iterū ait lutum fassium, & existimauerunt quidam q̃ nominat̃ Græce stella terre, & uominibus noīatur pluribus, & ṽ q̃ sit nomen altalk, & hæc est q̃ Dios. uocat̃ gillamiam, & eligenda est alba ualde, & leuiss. & ligue adhaerens leuiss. & aspergens se super charā, & fragilis qua lis est quā multi colectiō dicūt: Duo sine gēnera eius unum quod p̃dictū est, & alterum quod dicit̃ alter placodes quod est laminosum: ambo uerū uirtutis sunt: alter uero placodes dicit̃ stella lata uel plana. Io. Sera. ibidem habet stel lam terræ sed Bartho. dicit troch. stellæ, sed nō debet sic dicere: mo debet dicere stella terræ, & hæc terra multo modè denū dicit̃ esse speciem gypsi, eius similitudo est ut aluminē fassiola, & hæc terra a multis a uulgo in Lombardia talch uocatur, & sic trochisci de stella terre sunt trochisci de talcho. idem Auertin.5.coll.dicit: Terra stellæ i. talch.

LVIII.

DE croco, lib.iii. seu. i. ca. de cura sodæ absq̃ materia aut additione solis, & reliquis ex m̃a calida, aut sanguinea. R. Croci aur. vii. myrrhæ aur. li. expressiois agrestis, calca dis an. aui. saluminis iamenti. i. scilicet siue de plumæ. auii.

colcothar. aur. v. medicinz istæ bene puluerizata cum uino pontico temperentur, & ex eis troch. informantur.

COMMEN. MANLI.

Hos troch. non habemus in usu. Alia descriptio reperit̃ etiam in antidotario: Bartholomei de Mōtagnana cum eadem non est. Idem dñs Mef. in sua practica iu. ca. de hemierauia calida inquit. Alexā. cōfideō troc. quibus fit linimētum ad hemiericiā idem sunt, nisi in una re. & hoc est quod Aui. nō habet gūmi ara. Mef. uero habet, in reliquis quos idem sunt. Sed. insurgit dubitatio ex eo qd̃ dñs Mef. dicit in prac. sua in cura sodæ frigidæ hæc uerba formalizata: dñs mō trochisci de croco dicti in antido. & tamen in antidotario nusquā reperio illorū descriptionē: tū igitur cōsidera. Math. Syl. in. ca. de chalcitis dicit. Io. Mef. in troch. de croco. ponit colcothar & calcadis. Gētilis in tractatu de febribus ait: Tro. de croco. i. si se de croco nō inuenitur propria descriptio, sed nescio cur hæc uerba protulerit.

Crocus. i. zafaran. l̃sq̃. inquit: Crocum dictum ab oppido Ciliciæ quod uocatur corium, quamquam & alibi nascatur, sed non tantum uel tale quale in Cilicia: unde & a potiori parte nomen accepit.

Agrestis autē fit ex uuis imaturis, et pōt appellari omphacium Dios. inquit: Omphacium est succus uuarum albarū imaturarum q̃ uix ante dies canalicules colligenē: fuit: Omphacium autē pōt capi multis modis: nā pōt dici q̃ omphacium est oleum quod fit ex oliuis imaturis, & pōt dici q̃ omphacium est succus expressus. uel liquor amarus et acerbus. unde Gal. in li. dinamidariū dicit: Omphacii sic fit acinis uix agrestis expressis: carnes ipsarū et nucleos in sole siccatos tūc, & fac puluere, & erit omphacii, & fit ex fructu uuis imaturæ: exprimit enim eius fructus aneque matura sit, et succus inde facius inspissatur et reconditur.

Calcadis apud ipsum in.2.can. in ca. de atramento est uirtutium album, quidam crediderunt calcadis et colcothar idem esse, sed non recte, nam in istis troch. possumus certifi cari, q̃ idem non sunt: uerum unum pro alio pōtē poni. Io. Sera. in cap. de eruptione sanguinis ex matrice inquit, q̃ calcadis est chalcantū: cuius color est uiridis, et quidam antiquatur calcadis fit colcothar. Io. Arculanus in ca. de ungula ait: Quatuor sunt species uirtutium. i. colcothar quod est citrinum chalcantū uiride, calcadis quod est album, alfurit rubeum: similiter ait in cap. de atramento.

Colcothar. i. uirtutium citrinum apud ipsum in cap. de atramento. Et idem dicit Nicolaus. Io. Arculanus in ca. de febel dicit, quod colcothar est uirtutium Romanum.

Vinum ponticum. i. forte uel acutum, non autem dicitur ponticu a ponto insula, sed hic dicitur ponticum in sapore et idem dominus Mesue loco eius habet uinum forte aut acutū, quod tantum ualeat.

LIX.

DE ELLEBORO, in.ii.iii. tertii cap. de eu

ra. opilationis accidentis in aure.

R. Ellebori albi, aur. iiii. nitri, aur. xvi. croci aur. iiii. constringantur, & reseruantur cum aceto, & fiant idem troch.

COMMEN. MANLI.

Hos trochiscos non habemus in usu.

Elleborus fm Mef. ē barba asfugi, et eius dux sunt spēs. nam alius est albus, alius niger, et niger incolumior est albus. Gal. in li. ad Partenianum dicit. veratrum. i. elleborus Auertin.5. coll. dicit. condit. i. elleborus. q̃ nō uidetur uerū sicut patet per Dios. & Aui. qui de vtroq̃ faciunt capitula. elleborus uerō apud ueneticos uocatur velax. si detur in potu de radice ipsius gallinis iterficet ipsas. de qua uide Sera. in ca. de elleboro nigro in fine ait. Mesarugie. elleborus albus est fortioris operationis quā niger, & timor ē ne ille qui sumit elleborū incurrat spasmodū, & ipse occidit colubos qñ infunduntur fabæ aut frumētum in aqua in qua infunditur elleborus, & datur columbis aut pullis ad comedendū.

LX.

DE BDELLIO, lib. iij. fen. xiiij. in cap. de

cura apostematum durorum.

R. Tritarū rosarū.3. x. spicæ aromaticæ.3. ii. myrrhæ.3. i. co

Lumi. Ma.

L

S E C T I O V I I I .

fl. 3. i. s. masticis. 3. i. amygdalarum amararum. 3. i. s. bdellii
3. i. i. teritur medicinz & dissoluatur bdellium cum vino,
& conficiatur cum eo medicinz, & fiant inde trochisci.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Hos trochiscos non habemus in usu. Raf. in li. Diuisionum
in cap. de agritudinibus hepatis habet unam aliā descriptionem
quæ eadem est. Bdellium uero est gummi, quod satis no-
tum est. Gal. in 6. simp. inquit mocholi. bdellium, dux sunt
eius spēs unum est sethylina: & est magna & mollior altera,
& eius uirtus ē mollificatiua. altera uero spēs ē arabica.

L X I .

DE CARTA combusta, lib. iiii. fen. xvi. cap. de

cura excoiationis intestinorum, et ulcerum.

Arfenici adulti. 3. x. corticis æris, aluminis iameni, galla-
rum, calcis quæ non est extincta, an. 3. xii. fiant ex eis trochi-
sci cum succo amogroszæ. i. plantaginis, quantum unusquisque
ponderet. 3. iiii. et parum ex eis admittitur.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Hos trochi. non habemus in usu, dicuntur aut trochisci
charta, licet illorum descriptionem charta non ingrediat. idē
uero in. 2. cā. de charta ca. facit. idem in cap. de papyro ait.
q. ex ipsa quidem fiunt chartæ, et ipsa quidem est in poten-
tia charta, et q. ex ea adustum est. est uehementioris exi-
cationis. Dios. inquit. Papyrus, unde charta Alexandrina fit,
utilis est. Sera. in ca. de burchdi est nori, et ex eo fiūt char-
tæ, et utuntur eo medici qñ uolunt dilatare orificia fistula-
rum. idem Sera. ait. et Kirtas quidem cōbustum est fortio-
ris operationis quā burchdi cōbusti. Etā dicit Gale. hæc
herba nō administrat in medicina sola. idem Sera. infra ait.
Burdī vis. i. iuncus. hæc uero planta est quædam spēs iunci
in aquis nascētis, nō autē intelligitur de charta in qua scri-
bimus quæ ex pānis lineis fitis, sed lapietes credunt q. hæc sit
quædam herba in qua Arabes faciunt sextariola in quibus
inoluunt species, & quæ est quædam herba uiscosa nascens
in paluibus, unde Auic. prima quart. trac. 2. cap. x. de cu-
rationibus febrium acutarum, sic inquit. Et si domus est. p-
ximi iēporis ex quo linita fuerit locus, et pprie illo in quo
ponitur loco paleæ cottum, papyri tunc est melius.

Aes apud ipsam Aui. in 2. can. aliud est rubēū ad citrinatū
declinās, & est albacrū, quod est melius, & aliud est
rubeum clarum, & alium rubeum ad nigredinem declinās,
& est genus æris q. dicit talacem. Dios. Aes utrum q. ali cal-
ceum cemenon uocat. Serap. inquit. in cap. de ære. Dicit
P's quidam faciunt ex ære usā ad comedendum & bibē-
dum in eis, & nocent eis ualde, & hoc notum est.

Troch. de cineribus descriptio hōy ab autoribus non re-
peritur, sed nostri medici clarissimi faciūt ipsos cōponere
cū spēs electuarii de cineribus, quorū descriptio est posi-
ta ex autoritate Aui. & sic ordinant. R. spērū completa-
rum el. ctuarii de cineribus. 3. i. cum uino albo odorifero q.
tum sufficit, fiant trochisci & siccantur: & usui referua.

E X D I N O F L O R E N T I N O .

L X I I .

ALCADICON, in suo tract. de compositionibus.

Ar. Calcis uiuæ. 3. i. arfenici rubi, & citrini. chali. acaciæ an.
3. s. omnia hæc trita cōficiantur cum aqua quæ uocatur pri-
ma & in usu referua.

C O M M E N . M A N L I I .

Hos trochiscos non habemus in usu. ipse Dinus inferius
describit unā aliam descriptionem, sed eadē nō est eadē
ut dictum fuit ex autoritate Ioan. Sera. sunt troch. facti ex
arfenico: & est Almanforem dicuntur a chali quod recipit
Nicolus Flor. in lib. 7. in cap. de medicina diminutiua, car-
nis, siue corrosiua eius. habet unam aliam descriptionē que
est ex authori. Gale. quæ eadem est.

Arfenicū rubēū. i. arsinagal. Niculus loco eius habet au-
ripigmentum rubeum, credo q. idem est, & per arfenicum
citrinū intelligitur auripigmentū citrinū, seu uisuale: et per
arfenicum rubeum intelligitur arfenicum dictū arsinagal.

Kali. uel alkali, u. habet Niculus est quedā planta quæ
in litoribus maris nascit similis uermiculari. i. semper uiuæ
minori, pinguis & salia, & de cinere ipsius fit uitrum. Sera.

in cap. de usnen inquit. Vfen est herba chali. Aui. in 2. can.
de usnen cap. facit & dicit. quod est plurimū specierum, &
subtilior earum est alba, & nominatur sterus passerum, nō
est usnen, ut quidam crederentur. nam usnen est res colle-
cta super arbores glandium, & alias arbores.

Acacia fm Aui. est succus alcharisti exiccatus, deinde in
troch. mutatus, & melior ex ea est quæ est melioris odoris
uiridis declinās ad nigredinem, pōderosior & durior. Me
sue loco eius habet chachie, quod idem est.

Aqua prima secundum intentionem Compositoris sic fit.
R. Calcem uiuam & chali. i. herbā usne an. partes æquales,
& terantur, & septulum præcedēs ipsorum ex aqua eius ad
misceatur, & sepulū præcedens ibi moretur quotidie agi-
tando, & postea coletur & ex ea conficiantur. & fiāt troch.
& referuentur. Niculus loco eius habet capitellū cōmune,
quod fit ex cinere fibarum, & stipitibus eius, & calcis ui-
uæ, & coletur ad modum lixiuii.

E X A N T I D . B A R T H . M O N T A G N A N A . L X I I I .

DE CHELIDONIA, pro ruptorio
leui, est bonum.

R. Succū radicū chelidoniz, urinz pueri an. 3. iiii. calcis ui-
uæ. 3. iiii. arfenici citrini. 3. i. ruptorii de capitello, bulliant si-
mul succus, & urina: deinde super addatur calx, & coquat
ad ignem lignorum, usque ad consumptionem succi & uri-
nz, et reliqua addantur cum calce, & fiant trochisci.

C O M M E N . M A N L I I .

Hos trochiscos nō habemus in usu. idem inferius descri-
bit unam aliam descriptionem quam uocat trochiscos de
chelidonia cauterizatiuos, sed idem non fuit nec in usu.

Chelidoniz uero fm Sera. in cap. de curcuma dux fuit
species. i. maior & minor, & dicit q. nominatur hoc nomi-
ne eo q. incipit apparere ante aduentum hyrundinū, & de-
siccatur quando recedunt: putant aliqui etiam q. sic nomi-
netur, propterea q. quando excecatur pulli hyrundinum,
desert eis mater hanc herbam, & dat eam illis in cibum, &
redit usus hyrundinibus: de qua etiam Io. Anglicus in ca.
de sterilitate inquit: Et est hic notādū q. chelidonia dici-
tur quasi cœli donum, quia ipsa aufert maculam oculorum:
et ideo hyrundo querit eam quando pulli eius non uident,
et matricē mūdificat, cōceptionē pparat, histericiā curat,
et scabiē succus eius suppositus curat et aufert. unde uersua

Histericos per se sanat chelidonia succus.

Inieciū oculis maculas disrumpit eorum.

Aufert, et cancos qualicunque capiatur.

Maiores uero chelidonia est nota, minor est illa q. apud Ara-
bes memitē apud memite dicitur. Leonar. de præd. palea
in cap. de fornicia ait: Foliorum domini Dei. i. chelidoniz.

Capitellum uero apud nos uocatur aqua forris saponi-
riorum, lixiuum est de quo fit sapo, et eius corpō est diuer-
sas sed illum capitellū quod ibi ingreditur fit hoc modo. R.
aquæ primæ saponis lib. iiii. bulliant longa ebullitione usque
ad consumptionem tertie partis: deinde addatur calcis uiuæ
3. i. opii. 3. s. et decoquantur: deinde addatur auripigmentū,
3. s. et referua, et de hac faciās trochiscos de chelidonia.

E X A N T I D . G U I E L M I P L A C E N .

L X I I I .

DE CALAMETO.

R. Eris usti. uitrioli de quo fit encaustum an. 3. vi. floris
æris. 3. ii. salis armoniaci, baurach. i. salis rubei, flos aphroni
tri. arfenici sublimati an. 3. i. s. terantur et dimittantur sic p
hebdomadam et fiant ex eis trochisci cum succo rutæ.

C O M M E N . M A N L I I .

Hos trochi. in usu nō habemus. Gulielm. noiat istos trochi-
scos de calameto. i. calcarū q. est uitriolum, de quo fit en-
castrū, sed nō recte: nā hæc cōfectio est siēs de chalcanto si-
cut apparebit infra ex autoritate Raf. & uidebis q. idē ē.

Flos æris non est uiride æris secundum Simonem Ianuē
sem: uerum multi modernī loco eius ponunt uiride æs. Ra-
sis loco eius habet zinari. i. uiride æs, sed opinio Gulielmi
est quod flos æris & zinari uidentur.

Arfenicum sublimatum secundum quosdam est argentū
sublimatum.

sublimatum. Liber qui dicitur Bulchasis in lib. i. docet modum sublimandi arsenicum uide ibi.

EX NICO. FLORENTINO.

LXV.

DE SCOLEPENDRIA, in v. can. de oppilatione plenis.

* Scolopendria, hyssopi, prasi, fructus, tamarisci, corticū radicū caparis an. 3. s. semini. agni casti, feminis rutæ, gētiæ, aristolochiæ rotundæ, florum genestæ ana. 3. i. s. armoniaci dissoluti in aceto 3. i. s. cum quo reliqua componatur, & siant trochisci.

COMMEN. MANLII.

Isti troch. in usu nō sunt. Ioan. Serap. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem, sed eadem non est.

Scolopendria ut pluries dictum est: est lingua ceruina. Genestra est frutex oibus uota. existimant quidā q̄ hæc apud Diosd. dicitur spartus. eius semen affertur in folliculis sicut fœculis. Gal. in 3. simpl. ait: Spargamum. i. genestræ in fra de ipsa apparebit melius in unguento genestrato.

Armoniacū gūmi est saxis notum. Gal. in 3. simpl. inquit: Armoniacū est gūmi daltala, quod est uinum ex gummis arboris, idem in lib. ad Parthenianum ait: Armoniacum ē quasi lachrymum herbe, quæ Græce alsius appellatur.

LXVI.

DE CICADIS, in v. cap. de cura lapidis. per portionem.

R. Milii foliis, pentaphyloniis, feminis urticæ, nucleorum ce-
raforum, feminis nallurtii, petroselinis, Alexadrii, macedoni-
ci tartari uini albi an. 3. s. sanguis hirci, cicadur an. 3. iiii.
galagæ 3. i. olei muccellini, & nardini. i. de spica nardi, et bal-
sami ana. 3. i. succi saxifragiæ 3. iiii. misce, & siant trochisci,
& siccantur in umbra.

COMMENTA. MANLII.

Hos trochiscos non habemus in usu. Cicadæ sunt quædā animalia de quibus supra dixi: ex intentione Isidori ac alio-
rum. Hic uero uolo dicere de mente Plin. q̄ cicadæ non na-
scentur in raritate arborum, ideoq̄ nō sunt Cirenæ circa
oppidum, nec in cāpis, nec in frigidis, aut umbrosis nemo
risc. Est quædam & his locorum differentia in Miletia re-
gione paucis sunt locis, sed in Cefalonia nimis: quidā pen-
nam earum, & copiam dirimit: at in regio agro silent oēs:
ultra flumen in locis canunt pennarum illis natura quæ api-
bus, sed pro corpore ampliores.

Vrtica est herba satis nota. Diosd. dicit: Acalyphen siue ut
alii ignida latine dicitur. Vrtica eius altera maior quæ
& uulgaris est, & simplex cū tenui semine ac foliis minutis aspe-
ris: altera agrestis est densioribus foliis atque latioribus ni-
grioribus. Etiam Auic. in 2. can. ait: Calice. i. urticæ: est etiā
alia urtica dicta mortua: & hæc apud modernos dicit Ange-
lica seu archangelica, & est alia dicta urtica mora: cuius fo-
lia magna ac nigriora sunt, & hæc dicitur milemorbia siue
herba hircaria, sed a latinis dicitur serofularia.

Tartarum generatur in uino in fundo: & lateribus vege-
tis: & est fax vini uel aceti. Concogere in cap. de sordita-
te in speciali, inquit: Tartari quod adheret in parietibus ve-
getis intrinsecis: hoc notum est.

Sanguis hirci, de ipso dictum fuit: Niculus nō dicit hic
si debet esse pparatus aut non: sed in hoc est regula q̄ ipsū
nō oportet administrari in aliquibus medicinis si pparatus
non fuerit, & modus eius est multiplex: supra dixi de ipso i
electuario de cineribus fm intentionē plurium doctorū, & t
hic iterū uolo ostendere de modo ipsius ex auctoritate Io.
Sera. in ca. de illis in quibus generatur lapis, & magnificat,
quæ inquit: Medicamē cum sanguine hirci ad dolorē reu-
m & lapidem & non est ei simile, & est mirabile, & mo-
dus eius iste est: q̄n incipit uia denigrari sumat olla noua
a figulo, & fundatur in ea aqua, & ferueat donec auferat ab
eateret treitas, deinde decolletur hircus, & accipiat ex
medio sanguis qui currit ex eo in ollam, & nō accipiat pri-
mus sanguis neq̄: postremus eius, & dimittamus ipsum do-
nec coagulet, deinde incidamus ipsum in paruas partes eo
existente in concanitate ollæ, & cooperiamus ipsum cū reti

stricto, aut cum pāno subtili raro, & dimittamus ipsum sub
cœlo donec recipiat radios solis & lunæ, & dimittamus ip-
sum donec exsiccat bene, & caue ne ueniat ei humectatio
ex rore, deinde teratur multum, & feruetur, & detur ex eo
coctlearium unum cum decoctione dulcis aquæ. Idem Ioā.
Serap. ait: Et fm illud quod dixit Filagrius in. i. sermone
suorum necesse est ut sit hircus iuuenis in ætate sua ex eis
quibus aduenerit quasi quatuor anni, & piciamus in hoc
medicamen folium indum, & amomum, & spicam, & quæ
sunt illis similia donec aromatizetur odore eius.

Oleū muccellinum a musco dictū est, descriptio uero ip-
sius fm quoddam sapientes reperitur in antidotario Gal. qd̄
apud nos non est, tamen descriptio infra apparebit. quidā
modernorum crediderūt: quod oleum balaninum. i. de gra-
nis de been esset oleum muccellinum, sed non recte.

LXVII.

PHODILLORVM, in. vii. cap. de medicina
diminuitia carnis, siue corrosio eius.

R. Succi radicū aphodillorum. 5. s. calcis uiuæ 3. iiii. auripig-
menti. 3. i. conficiant & exicentur ad solē in mēse Augusti.

COMMEN. MANLII.

Hos trochiscos in usu non habemus. dñs Magister Pet.
Argilla. in cap. de medicinis corrosiuis habet nram aliā de-
scriptionem, & idē est Aphodillus. Circinians phodillus
est centum capita, cuius radix competit uili medicis, idē
dicit Pet. de Cresc. sed uterq̄ fallum dicit dicit q̄ apho-
dillus sit centum capita. nam si uis uidere certitudinē uide
in antidotario Gal. in quodam antidoto, quod incipit. Anti-
dotum quod facit epileptis. & ibi habet ceterum capita &
aphodillos, quod nō essent si essent idem. ueritas autem est,
aphodillus est herba dicta apud nos porrage propter simi-
litudinē foliorū, & secundū Papiam aphodillus herba: quam
latini albuciani vocant, & centum capita est una species ir-
ringi: sicut patet apud Serap. in suo cap. de irrigo.

LXVIII.

DE CALCE, ibidem.

R. Calcem uiuam puluerizatam, & commisce cum melle
& commixta in olla noua, pone in clybano, & dimitte do-
nec comburatur, & uisū referetur.

COMMEN. MANLII.

Hos trochiscos non habemus in usu. Petrus Argillata in
capitulo de medicinis corrosiuis, habet unam aliam descri-
ptionem quæ eadem est.

Calx scdm Gulielmum Placen. per calcem significatus
cincereatam corporum lapidoformem, & ostracorum extrin-
ctam: & non extinctam. Auer. in 5. colligit. inquit: Almuria
id est calx uiuæ, & est calx lapidis decoctus.

Peroratio in. viii. sectionem.

Superno numine ducti cōpleuimus sermonē in sectionē
trochiscorum proximam aliquantisper uerum cōpendiosam
supra posuimus. Erat uero nunc sermo noster circa distinctio-
nem. Sief secundum mentem diu Ioan. Mesue, & Rafis.

LVMIN. MAIORIS SECTIONI NONA.

ARIDA COLLIRIA, uulgo SIEF, continens.
EX MESUE.

I.

CITRINVM, in Practica, cap. de Ophthalmia.

RECIPE Climæ lotæ, deinde adustæ & extinctæ
in lacte mulieris. 3. viii. ceruæ lotæ. 3. xvi. cro. 3. iiii.
opii. 3. i. dragachanti. 3. ii. aquæ pluuialis: quod suffi-
cit, utere cum albumine oui.

COMMEN. MANLII.

Sief uero apud nos est cōfectio ocularis formata ad mo-
dū nuclei datyli quæ fricat super eodem cū aliquo liquore
conuenienti. hanc medicinam quidam collyrium uocant.

Clinia seu cadmia, ut apud Diosd. dicit q̄ bona est cyprya
Lumi. Ma. L 2

SECTIO IX.

& boryriades, & quæ spissa fuerit Serap. cap. de climia inquit. Quod eius species sūt duæ, ē lapis repertus in cypro in carbibus aquarum, & est petrosa, & melior aliis speciebus climia, & alia generatur in fornacibus, & aggregatur in recto fornacis qñ purgatur æs, & generatur ex ære quando ponitur in fornace, & liquefactam resolutum fumus ab eo, & adhæret parietibus fornacis in tecto eius &c. secūdū modernorum opinionē climia est fuligo, uel fumus qui adhæret superioribus partibus fornacis in purificatione auri uel argenti, uel aliorum. unde dicitur climia auri uel argenti de qua uide in .a. can. Aui. qui cap. de utraque facit. ille lapis quem dicit Sera. credo quod sit lapis dictus a uulgo calamina, seu calaminaris, de quo tingitur æs.

Modus aut lauandi climiam. & adurēdi habetur in libro qui dī Bulchasis in lib. i. in cap. de modo præparandi Katimiat. i. thutiam. nam climia est species thutiz, & pparatur sicut thutia: etiam Serap. in cap. de thutia habet modum lauandi thutiam, & dicit. Abluitur sic climia, lauatur etiā thutia similiter, & in ista materia lauatur ipsa cum aqua rosa.

Cerussa. i. biaccha quæ satis est nota. de modo abluendi docet Seruitor in suo li. & eius modus iste est. tere cerussā in aqua sepe, & proice supra aquam sepe, & fiat hoc sepe tandū q non appareat super aquam aliquid putredinis. de inde collige, sicca & referua, & bona cerussa est, quæ multū est candida, & partes eius sunt de se clare, & quando tangis eam digito inuenies partes eius leues sine asperitate.

II.

ROSATVM. ibidem.

Re foliorum rosarum rubearum. 3. x. croci. 3. viii. opii. 3. ii. spicæ indx. 3. ii. gummi arab. 3. x. uide pluuialis quā tum sufficit.

EX RASI.

III.

ALBVM, in .9. Alman. cap. de ophthalmia.

Re. Cerussa ablut. 3. x. sarcocolla. x. grossæ. 3. iii. draganti. 3. i. opii. 3. s. fiant ex eis formæ lentis similes.

COMMENTA. MANLII.

Istud sief apud nos non est multum in usu: & eius modus est duplex, uidelicet q ipsum possimus facere cum opio & sine opio, si cū opio facere uoluimus addat de opio in pōdere, ut dicit Compositior: sin aut sine opio facere uoueris non ponit aliquid opii. Mesue in cap. de ophthalmia habet multas descriptiones: quarum una est descriptio filii Zachariæ quæ eadem est nisi in una re & hoc est quod Mesue habet amyllum. Rasis uero non: in reliquis sunt idem.

Sarcocolla sū Auic. est gummi arboris spinosæ, & in ipsa est amaritudo: & melior ea est illa quæ ad citrinitatē declinat & est similis olibanō. i. thuri: medici nostri dixerūt q hanc medicinā in collyriis non oportet ponere si nutrita non fuerit in lacte asinæ. Et eius modus iste est. Accipe de sarcocolla bona alba grossa, & pone eam in uase uitreo amphoris orificiū, & mulge super eam lac asinū in quāitate pauca ne infundatur in ea, & liquefat, sed remanet sic, & pone subitō in sole, ut citō desiccetur, & quando erit sic ea, oportet ut iterum mulgeas secundum quantitatē prioris, & semper caueas ne cooperias ea lacte, ne accescat lac antequam desiccetur & destruat, et fac ita quater: & cū hoc feceris sicca bene, & cōserua: et si nutrire uoueris in lacte mulieris eadem forma & modo facias.

III.

DE THVRE, in .9. Almanfo. cap. de

ulceribus oculorum.

Re. Armoniaci, sarcocolla. an. 3. s. thuris. 3. x. croci. 3. ii. cōficiantur cum mucillagine fœnugræci & fiant ex eis sief.

COMMENT. MANLII.

Istud sief non est ualde in usu. Mesue in cap. de uulneribus & ulceribus oculorum habet unam aliam descriptionem quæ eadem est.

Thus uero est olibanū de quo supra in troc. de olibanō.

V.

DE PLVMBO, ibidem.

Re. Plūbi adusti, antimonii, thutiz ablut. calceucemenō,

gummi arabi. draganti an. 3. viii. opii. 3. s. terantur & cum panno sericino. i. de serico qui sit subtilissimus cribellatur & conspergantur ex aqua pluuiali, & fiant ex eis sief.

COMMENT. MANLII.

Istud sief in usu non est. Mesue in cap. de uulneribus & ulceribus oculorum habet unam aliam ex auctoritate filii Zachariæ. i. Rasis quæ eadem est.

Plumbum species est antimonii. Plini. uocat plumbum quandam ægreditudinē oculi quæ curatur cum quadā herba quæ Græcè dicitur molēdina: quod est dictū plūbago. Aui. in .2. dicit, Ala uenoch & alahab utrumq; est plumbum nigrum: in quo est substantia aquosa multa: quam congelauit frigus. Modum autem adustionis eius docet Bulchasis in li. 1. qui est iste. Re. Laminas plumbeas, & pone in olla scitili, et p roice super eas parū sulphuris radendo ipsum sulphur super eas: deinde accipe alias laminas plumbi, & pone sup primas, & iterum radas super eas de sulphure: & iterū alias laminas super pone, & sulphur rade: & fac ita quousq; olla sit plena: deinde accende super eas ignem: & quando uide ris plumbum inflammari oportet q commissceas cum uirga ferrea donec plumbum cōuertatur in cinerem: ita q nī hil remaneat de substantia plumbi quin sit totam in cinerē conuersum: & quando erit ita aufer ab igne, & dimitte in frigidari, & oportet quod ille qui hoc facit cooperiat faciē suam, nam odor multum nocet, & sic utere.

Antimonium uena est terræ similis plumbo, sed antimonium teritur & non funditur: plumbum uero funditur & non teritur. Dio. uocat ipsum stibium, & inquit. Stibius for mosus est & lucidus, & qui radiosus apparet cum fractus fuerit, & gustu salis, & fragilis nihil habens terosum aut fordidum: hunc multi ophthalmion nominant. Hæc est medicina ocularis quæ satis est nota.

Thutiz uero nomen cadit super tres res. primo super id de quo Aui. in .2. can. proprium cap. facit sub nomine thutiz. & Diof. sub nomine pompholix, cui sunt duæ spēs: una quarum dicitur pompholix a Diofco. alia spodium: quæ ab Auic. dicitur succodus, & amba sunt fuligo ex fumo eleuato in fornace in qua fit auricalcum, & eleuatur ille fumus a lapide calaminario: quo æs tingitur, & fit auricalcum. Moderni generaliter loco spodii utuntur: esse elephantis cum busto. Gal. in .8. simpl. dicit: Cadmia. i. thutia, de modo: ipsam abluendi uide Albulchasin in lib. primo.

Chalceucemenon. i. æsustum: & est nomen compositū a chalcos: quod est æs cecamenon incensum. Diof. in cap. de ære dicit: Æsustum quod alii chalceucemenon uocant. Circa instans, æsustum. i. chalceucemenon. Auerr. in .5. col. ait: Chalceucemenon. i. æsustum. idem ait Leonard. de predapalea in ca. de ulceribus putridis: & sic est secundum ueritatem: modum adustionis eius docet Diof. in proprio cap. de ære: & idem facit Sera.

VI.

RVBEVM, in .9. Almanf. cap. de scabie, & sebel.

Re. Hæmatitis, colcoatar combust. i. uitrioli citrini an. 3. iii. æris usti. 3. ii. myrrhæ, croci, ana. 3. i. piperis lon. 3. s. cōspargantur ex uino ueteri, & fiant ex eis sief.

COMMENTA. MANLII.

Istud sief in usu nō est, & dī rubeum a colore ipsius propter lapidem hæmatitem. i. sanguinariū: qui ibi ingreditur. Mesue in cap. de scabie oculorum habet unam aliam descriptionem, & loco hæmatitis habet sedenegi. quod idem est.

VII.

VIRIDE, in .9. Almanf. cap. de ungula.

Re. Ziniar. 3. iii. colcoatar usti. 3. vi. arsenici rubri, baurach, spumæ maris an. 3. i. salis armoniaci. 3. s. armonia. i. gummi 3. ii. armoniacum in succo rutæ dissoluatur: & species ex eo conspergantur, & fiant ex eis sief. est enim mirabile.

COMMENT. MANLII.

Istud sief apud nos nō est in usu. Mesue in cap. de scabie oculorum habet unam descriptionem, & eadem est.

Ziniar. i. erugo æris Liber q dicit Bulchasis in lib. i. docet modū faciēdi ipsum, & abluendi, & colligēdi ex eo q est bonum. Aui. in .2. can. de ziniar ca. facit, & dicit spēs faciēdi

ciēdi ziniar sunt cum exasperatione xris in facie acceti, & ratione limaturq; eius cum aceto, & sepultura ipſus in loco humoroso, & inclinatur uas xreum super uas in quo est acetū, & dimittatur quousq; in ipſo fiat ziniar. Auer. in .f. coll. dicit: Ziniar. i. uiride q̄s, & sic est secundum ueritatem. Mes. loco eius habet florem xris, & idem non est: ut dicit Simon Ianuensis. nerum hodie unum pro alio ponitur.

Spumæ maris fm Aui. & Sera. sunt quinq; spēs. Idem dicit Diof. q̄ ipſam uocat Alcioniū, secundum Pli. qui, simili ter uocat. Quatuor species tātum describit. Gal. in tract. 1. de meimr. in cap. deſcripsit in alopecia &c. ait adarcham, & in medio eorum est uocata spuma maris. Dinus Flo. in li. 2. in cap. de cura ſcrophularum dicit: Pumicis. i. spumæ maris ſed non mihi placet. nam uerā spuma maris est ipſa, ſolida, grauis, habens odorem piſcium putridorum, ſimilis ſpōgię, & inuenitur in litoribus maris.

VIII.

DE CALCANTO. ibidem.

R. Aeris uſci, chalcanthi an. 3. ziniar. 3. ii. ſalis armoniaci, baurach, aſenſci ſublimati 2. 3. i. terant, & per hebdomadā unā dimittant, deinde ſiāt ex eis ſieſ, & fricet ungula cū eis.

COMMENTA. MANLI.

Iſtud ſieſ in uſu non eſt. Gulielmus Lombardus (ut dictū fuit) deſcribit trochi. de calamentho. i. de calcanto, & idem ſunt cum ſieſ de calcanto ſed non recte. Nam aliud eſt ſieſ, aliud eſt trochiſcus, ut oſtenſum fuit.

Chalcantum apud Aui. in ca. de atramento eſt uitriolū uiride. Idem facit aliud capitulum de chalcātho. Ioā. Arcu. in ca. de ungula dicit: Chalcantum. i. uitriolū uiride. idem dicit Gal. in 8. ſimp. & idem Gal. dicit. calcantos. i. xris ſlos & eſt nomē cōpoſitū a chaleas græce quod eſt x̄s, anthos uero ſlos, uide calcathos. i. xris ſlos, ſed calcantum eſt uitriolum uiride de quo fit encauſtrum.

IX.

DE FELLIBVS. in 9. Alman. cap. de aqua
deſcendente in oculum.

℞. Fellis gruis, fellis faboth, fellis hircinis, fellis accipitris, fellis auiſ, fellis perdicis omnium ſiccorum unum aut plura ſumantur quoq; pro omnibus .3. x. iſtorum ſiccorum euphorbi, colloquintide, raparini omnium an. i. xtria aggregetur ex ſucco fœniculi teneri, & mittantur in oculos.

COMMENTA. MANLI.

Iſtud ſieſ non eſt ualde in uſu, & hoc uenit quia ſimplicia quæ in eo ingrediuntur diſſicilia ſunt inueniri tempore debito, aliter magis in uſu eſſet. Meſ. in ca. de debilitate uiſus ait. inquit. Gale. ſella omnia abſtergunt oculum, & clarificant uſum, & elegantur ex animalibus. ibi dominus Meſ. allegat quendam ſimplicia, quæ etiam in iſto ſieſ ingrediūtur, de quibus infra.

Grus eſt auis uolatilis, cuius forma omnibus nota eſt.

Saboth ē piſcis, nā Meſ. dicit, & ex piſcibus eſt ſel faboth quid ſit generaliter ignorat. Bartho. Montagnana in ſuis cōſiliis in conſilio de medicinis cōis iuuentum ait. nocumēta ſtomachi uſus & auditus, in quodam collyrio bono habet fellis faboth, & inquit. quod eſt piſcis nominatus lucius, idō in conſilio ad malam complexionem frigidam & humidam ſtomachi &c. dicit fellis piſcis faboth, & eſt lucius uel uarolus. iſta uerba non conueniunt eſſe idem, nā aliud eſt lucius aliud eſt uarolus, uerum autem eſt q̄ ipſe eſt uarolus, & eſt piſcis nominatus labrax, & habet plura nomina ſecundum provincias nam faboth apud Romanos uocatur ſpinula, a Venetis uariolus, & ab aliis louacius.

Accipiter auis eſt q̄ nos in manu portamus in ciuitatib. acaliſ locis. Iſd. ait: Accipiter dicit accipitris a capiēdo ē. n. auis rapies alias, auis auida. ideoq; uocat accipiter hoc eſt raptor. quia rapit. ſiquis accipit ipſum, ſeruat aut accipitres circa pullos ſuos impios eſſe. nā dū uiderint eos poſſe tentare uolatus nulla eis pōnt eſcas fed uerberant pennis: & auido præcipitant: atq; teneris compellunt ad prædam: ne forte adulti pigreſcant. uide hæc auis ſaris nota eſt.

Aquila eſt auis ex uolatilibus, q̄ dñi Italici pro ſigno uictoriz portant. Meſue idem laudat, hæc uero auis reperitur

in partibus Indiæ, & iuxta litora oceani. etiā inuenit apud nos, tamē raro. Sera. facit capitulum de lapide auiſ, & inquit, q̄ eſt lapis indus qui quando agitur auditur intra ipſum lapillum alius, & minera eius eſt in montibus Indiæ inter chinos & ſaradin, & græci nominant eum antarront, & expoſitio eius eſt alleuians partum.

Perdix auis eſt quæ genere eius contornix nūcupatur. ē enim auis q̄ ſatis nota eſt. hæc apud Aui. in 2. can. uocat cubugi. Gētilis ſuper 3. can. in cap. de cura lubricitatis ſtomachi ait: Cubugi. i. pdix. Simō Ianuē. ait: Cubugi dē perdix & algel. Itē Matt. Sylua. in litera c. ait: Cubugi. perdix Io. Anglicus in cap. de debilitate uiſus, & cæcitate accideri inquit. & fellis galli, aut perdicis, aut faſiani q̄ uocatur alcu bugi a Meſ. & q̄ cubugi ſit capō ſeu gallus, & ex hoc colligi uidetur. nam Aui. in 2. can. in cap. de harmel allegat uerba Diof. dicit q̄ ipſa trita cū melle & uino, & ſelle alcu bugi & gallinarum, ſed patere pōt legenti q̄ Diof. in loco allegato non habet ſel alcu bugi, ſed caponis Serap. uero etiā eodē loco ex uerbo Diof. habet fellis galli. Item Diof. in c. de ſelle laudat ſel cubugi. Serap. eodem loco auc. Diof. laudat ſel galli ex quibus poſſimus comprehendere intentionem Aui. fuiſſe q̄ cubugi ſit capō, & Serap. q̄ ſit gallus, ſed intellexit ut opinor de gallo ſylueſtri, qui ſiſianus appellatur, quem aliqui dicunt eſſe cubugi, licet uelit Simon q̄ non ſit capō, & Meſue quod nō ſit gallus, nec perdicis. Nā Meſue in capi. allegato ſcripſit cubugi, & galli, & perdicis, ex quo apparet quod ſecundum eum idem non ſunt. tamen intentio Arabum eſt quod cubugi, eſt algel aut perdix.

X.

MEMITHE, in Synonymis.

Fit hoc modō. exprimitur ſuccus memithe, & in ſole deſiccatur, & ex eis informantur pilulæ in modum nuclei cælyſtorum, uel informantur magdaleones parui.

COMMENTA. MANLI.

Iſtud ſieſ non eſt in uſu: tamen eius compo in alijs collyrijs multum operatur. Memithe uero ſcđm Sera. ex authoritate Diof. eſt ſuccus herbæ eiufdem nominis quæ eſt ſimilis in folijs ſuis herbæ ſpēi papaueris dicti ceratides. i. cornuti, niſi quia eſt in ea humiditas adharrens manu, & poſt propinqua terræ: & habet grauem odorem, & habet multū ſuccum & color ſucci eius eſt ſimilis colori croci. hæc apud Diof. ſub iſto nomine non reperitur. uerum eſt q̄ Diof. de ipſa facit cap. ſub nomine glaucium; quod idē eſt: quid autē ſit cōmuniter ignoratur, ſed ſcđm eſtimationem modernorū eſt ſpecies chelidonia, & ſine dubio hoc ſonat. Nam Serap. in cap. de curcuma. i. chelidonia inquit: Minor chelidomon, & eſt memithe. Nicolus. Floren. in lib. 5. in cap. de hydropſi in ſpeciali dicit memithe. i. uolubilis minor, ſed nō bene ſonat hic textus. nam idem in 7. libr. in cap. de apoſtematibus emundiorum ſiue de bubombus ait. Memithe. i. chelidonia, quod recte dicit Io. Arculanus in cap. de cura cephalæ, tam calidæ quam frigidæ dicit: Sieſ memithe. ſuccus memithe, per decoctionē inſiſſatus uel ad ſolem, & eſt herba ſimilis papaueri dicta glaucium, & eſt ſpecies chelidonia. Ille autem ſuccus ſit inſiſſatus dicitur ſieſ, uidelicet ſieſ memithe, & eſt medicina ocularis. Itē Ioan. Anglicus in cap. de ſurditate & debilitate auditus ait: Succus memithe, idēſt chelidonia agreſtis.

Guliel. Placen. ait: Memithe eſt ſimile gladijs coloris citrini, & eſt fructus cuiusdam herbæ quæ naſcitur in litoribus aquarum. Idem dicit Aui. in 2. can. bulchafis in li. 2. docet modum exprimiendi ſuccum ex memithe, & ignorat de ipſa inuenire ueritatē quid eſſet. Moderni uero hñt ipſā p cognitionē uerā nā ut dictum fuit de mente Sera. ipſe uoluit q̄ ſit chelidonia minor, & ſic hodie gñaliter habet opinio q̄nis aliqui cōtradicti dicentes q̄ memithe non eſt chelidonia nā: nā chelidonia eſt calidę cōplexionis, memithe, uero frigidæ, quibus reſpōdetur, quod & ſi chelidonia ſit calidæ cōplexionis, ppter hoc tñ non tollitur quin memithe ſit ſpēs chelidonia uidelicet chelidonia minor. nā qui dicit q̄ chelidonia eſt calidæ cōplexionis forte intelligit de chelidonia

SECTION X.

donia maiori,uel de eius succo uel radice, sed hoc nulli in cludit repugnanti, & chelidonia minor non fit frigide uirtutis: non.n. repugnat in eade spē esse indiuidua seu simplicita diuersæ complexionis: & hæc apud Lombardum reperitur in horticis hæc locis aquosis , & est quam angelicam uel archangelam uulgo uocamus. Et sic fit legis bene illa ca pi. uidebis q̃ angelica est memite in foliis, in colore, in radice, & in reliquis. Præterea in foliis multū simular chelidonia maiori.

Peroratio in.ix.sectionem.

Habita sectione de his consequenter elucubrabitur sectionem de pilulis secundum mentem diui Mesue & aliorum doctorum clarissimorum. Si modo tenues uires nostras paululum refocillauerit ipse Deus bonorum omnium largitor sine cuius nutuque sunt omnia casta atque irrita extant. Is igitur adiutor ac protector noster adsit.

L V M I N. M A I O R I S
S E C T I O D E C I M A.

CATAPOTIA, SEV PILVLAS
CONTINENS.

EX MESVE.

I.
AL EPHANGI NAE, quarum interpretatio est de Aromatibus.



ECIPE cinnamoꝝ cubeꝝ, li-
gni aloes, calami aromatiꝝ. ma-
cis, nucis mulcaꝝ, cardamo-
mi garyophylli, zari, masticis,
sq̄uinati, spicæ, carpobalsami,
añ. ʒ. i. abanthii, fucci, rofari,
añ. ʒ. v. terant cōtitione grof-
fa, & fundant ſuper ea quæ li-
xii. & coquantur uſq; ad con-
ſumptionem duarũ partium:
deinde fricent manib; & co-

lētūr, et exprimat aquositas eius. Et recipi aloes succotri-
ni boni ʒ lib. i. et laetatur in feutella lapidea vitrea, cum a-
qua pluviali lauantibus ꝑ pluribus: deinde excutitur &
fundatur super ipsum expressiois predictae circiter lib. ii.
et terantur in sole deinde admiscantur cum alois, myrrhe,
malicis añ. 3. v. croci. 3. ii. i. tere contritione bona: deinde ꝑ
dicta expressiois reliquum super ea fundatur, et contera-
tur ulque dum siccetur, & fiat ex eis pillulæ in modum
ciceris. & de eis añ. 2. ii. ulque ad aur. ii.

COMMENTA. MANLII.

Itæ pilulæ apud medicos nostros sunt nobiles, & ipsi
utuntur multum sub nomine pilularum aplephaneuræ,
& de aromaticis quod idem est. Pilula autem a rotunditate
diciuntur: hæc forma est ut pilula quæ luditur, etiam pot dici
quæ dicitur pilulæ a pilando: nam ipsæ fiunt cum pitello in
mortario cum multo labore: in aliquibus libris inueniuntur pilu-
læ, p. cataputia. Papias catapodia dicit, eo q. modica pote-
tur uel inglutiat: & est pilula in libris de Græco translati
reperitur quæ catapodia p. cataputia. Sunt ex herbis quæ
forte quæritabunt, quare inoleuit usus q. pilulæ duntur in
numero impari laxatiuæ. Ad hoc ridet Conciliator differre-
tia. 49. circa medium dicit dicens, q. illæ pilulæ debent esse
actionis alii ratio fimitur a forma tanquam ab eo quod
ipsius est principium sustentatiuæ & non a materia. Impar
uero habet rationem formæ, & multa alia dicit q. uidet.

Aloes succotrinus fm ipsum Mesf. est nobilior aliis speciebus aloes, & dicitur succotrinū, quia fit in Succutri provincia, et hæc plaga apud Arabes uocatur zambaba. Isid. in ca. de herbis ar. ait. aloes herba amarissimi succi panacea. Papias, aloes spēs aromatica amarissimi succi herba refertēs uermib⁹, & purgedini, si abluere uis aloem, qui ibi ingredit fac fm formam, quam tradit Meseus ibi. fm quoddam præ-

dictus aloes lotus debet poni in hiera. Gal. ac in aliis locis. sed supra ostendi per aliam niam in hiera. Gal. ut docet Bulchasis in tractatu 2. qui inferius in cap. allega. inquit. & ut re in medicinis laxatiuis, & in speciebus hieræ, & in aliis medicinis, in quibus aloes ingreditur.

II.

STOMACHICÆ, vulgo Stomaticæ.

℞. Hieræ picæ. s. hieræ simplicis Gal. 3. viii. triū myro. an. 3. iii. agari. 3. ii. turbith boni. 3. x. epithymi cretēsis, 3. 3. ii. s. falis indi. 3. ii. absinthij, scammonæ a. 3. iii. penidiarū. 3. iij. & fac pilulas cum succo scariolarum. dosis eius est. 3. ii.

COMMEN. MANLII.

Itæ pilule in quodam sunt ille quibus utimur. Mesæ autem in distinctione de pilulis habet multa descriptiones sub nomine pilularum stomachicarum, et omnes differit inter se, ærum omnes stomachum mundificant, et propter id sicut qui faciunt unum descriptionem per alia. Moderni uero doctores laudant primam descriptionem et penultimam, ex his quæ in hac distinctione ponuntur, et sic infra apparebit alia descriptio. Mesæ habet trium myrobalanorum qui sunt isti, citrini, chebuli, et indi. nam bellerici et emblici non computantur inter species myrobalanorum, quare idè et Serap. de illis tribus in uno capitulo loquuntur et de aliis separata faciunt capitula.

quit in

III.
AGGREGATIVAE, ex inventione nostra.

Fr. Myrobalano, citrino, raudesni. añ. 3. iiii. succi eupato-
ritici, succi abnthii añ. 3. i. camonez anthio. coctz in pomo-
3. v. chebulori, indori, agarici, colloqui daz, polypidii, añ.
3. ii. turbithi boni, aloes añ. 3. vi. masticis, rofarum, salis gem-
mae, epithymi, anisi, zinzib. añ. 3. i. electuarii. rofati. q. f. ad
aggregationem, fiant pilulae prolixae. da 3. i. uel aur. vnum.

COMMENTA. MANLI.

Itæ pilulæ sunt ex inuentione Mes. & sic fm istam descriptionem sunt apud quoddam in ususf. medicj moderni laudat. dat magis aliâ descriptionem quæ dr descriptio pilularum aggregatiarum maiorû, & sic describam ipsas. Auic.in.5. can.habet unam descriptionem, & dicuntur pilulæ aggregatiæ filij Hileben. sed idem non sunt: nec sunt in usu.

Scamonea anthiochena. i. illius provincie. idem in e. de
scamonea magis laudar Anthiochenam & Armeniam, &
laudar illam quæ est in colore clara sicut gummi subalbida,
& sit tangatur cum aqua vel salina fiat sicut lac: & sit tenera
ad frangendum & pulverizandum, & in pondere sit levis.
& sit in odore bona non grauis. remota uero ab his proprie-
tatis non est bona. Coleratur quoque per annos. xx. uerū
quanto antiquior, tanto nobilior.

III

AGGREGATIVAE MAIORES.

3. Bdellii, myrobalā, nigrorū, belliricorū, emblicorū an.
3. iiii. turbitū boni & electi. 3. xiii. feminis apii, fœnic. anifi,
carui, ameos, organi, rofarū, seitaragū idi, harmel, hermoda
cisti, salis indi, mathicis, arman. pice, acori, añ. 3. i. zingibe.
cinnamomi, cardamo. croci, colloquidæ. 3. iiii. calsiñ añ. 3.
sferapini. 3. iiii. penidiarū al. 3. iiii. alios succotini. 3. xv.
ciferacū & suc. calui, et iunge manū, tuas cū oleo sūpūcino.

OMMEN, MANLII.

Istæ pilulæ apud nostros physicos sunt usuales. dicuntur autem maiores ad differentiam minorum, eo q̃ plura simplicia ingrediatur. Supraposita fuit alia descriptio pilularũ ex inuentione sua, quæ etiam sunt laudatæ.

Seitaragi inuū uide de ipfo in cōfēctiōe tryphæ sara
cenicæ. Hæc est plā Diolepidum uocat, & fm Paulum est
hyberidos, secundu Quiniū hyberidici, qđ ſcīto nomine in-
uentio nī ei' assignato carmine nāſcitur maxime circa uete-
ra monumenta parietesq; & occulta iterum flores ſemper
folio naturcū, caulz cubitali, ſemine tamen paruo ut uix
apici poſſit, radici odor naturcū, uſus zltate efficacior. .cc
recenti natū. Hæc est qđ Lombardi crifonem uocant.

Harmel. i. tertium genus rutæ, fm Matthæum Sylu. harmel scriptum cum h. est semen cicutæ, & armel scriptum sine h.

* aliis po-
tius augē-
da quā mi-
nuenda vi-
dēt aloē.
† Multi
nunc aloē
lauūt cum
aqua in
qua rheō
herbarum
longo tē-
pore ma-
duerit, a-
lii cū bras-
sicæ succo

ne h. est genus rutæ, eandem habet opionem Lumen tenebrosū, quod harmel sic cicuta, sed falsum est. sed harmel cū h. & sine h. est tertium genus rutæ. nam Diosc. in cap. de ruta quasi in fine ait. Alteri genus rutæ quod nascitur in Macedonia & Galatia: quam moly n ciues appellat. Idem in fine ait. rutā multi armolam uocant, Sirij belsa, nascitur locis cultis. Aui. in. 2. can. inquit. ruta syluestris uehemētioris est nigredinis quā alharmel cū h. itē luge capitulum de harmel scriptum cum litera h. apud eundem est idem cum cap. de armola apud Diosc. idem. in. 4. can. in cap. de curatione morbus uiperarum cum eo quod est sicut Canon ait. ruta syluestris, & non est alharmel fm quod existimauerunt quādam: immo est species rutæ ipsius, & sic est sine dubio, sed Auer. in. 5. col. ait: Alharmel. i. cicuta, quod falsum est nam fm plures sapientes creditur quod harmel cum h. & sine h. idem fit. & possibile non est quod harmel cum h. sit cicuta. nam Sera. de harmel cum h. capituli facit, cuius formā hic uolo describere. ut magis appareat ueritas. & hæc est. harmel fm Serap. nominatur moli, & nominant eam multi rutā syluestrem & est planta quæ egreditur ex una radice cum multis ramiuiculis, & habet folia longiora foliis rutæ alterius & meliora habentia grauem odorem, & habet florē album, & capitella maiora facis quā capitella rutæ domesticæ diuisa tribus diuisionibus, in quibus est semen amarum: cuius color est ad rubedine decliuis habet tres angulos, & est id quod de planta uenit in usum medicæ, & ipsum maturat & colligitur in autumno, & sic fit si aggregaueris rutā syluestrem, quia uidentur moderni eadem cum illa.

Sambac siue zambac. i. iefeminum, & sic oleum ex eius floribus sicut infra ostendam, si Deus uoluerit.

V.

DE EUPATORIO MAIORE.

R. Myroba. citrinorū, succi eupatorii, succi absinthii ana. 3. iiii. raucedfeni. 3. iiii. masticeis. 3. i. croci. 3. s. aloes boni. 3. v. confice cum succo endiuicæ. dosis eius. 3. ii. cum aqua cæci.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas apud nos nō habemus in usu: maxime scdm istam descriptionem: idem describit unam aliam descriptionem pilularum minorum, sed in usu non sunt. Aui. in. 5. can. habet unam aliam descriptionem, fed eadem non est.

Eupatorium. i. gasti. Plin. eupatorium regiam habet authoritatem caulis lignosi nigricantis: hirsuti cubitalis: aliqñ & ampliōribus foliis per interualla quinq; ut canapis per margines incisus nigris, et ipsis plumosis radice superuacua.

VI.

DE RHEVBARBARO.

R. Raucedfeni. 3. iiii. succi liquiritiæ, succi absinthii, masticeis ana. 3. i. myrob. citrinorū, 3. iiii. s. feminis fœniculi, apii ana. 3. s. et oc. diarhod. 3. iiii. s. hieræ picræ. 3. x. confice cū aqua fœniculi, & da. 3. ii. cum aqua calida in sero.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. Mesue inquit quod sunt pilula de rheubarbaro, sed loco rheubarbari habet raucedfeni, quod idem est. Ergo possūmus dicere qđ pilulæ de rheubarbaro, & pilulæ de raucedfeni sunt. Et sic meo tpe uidi apo che carios dare pilulas de rheubarbaro pro pilulis de raucedfeni, sed errant multum. nam si uides bene Mes. in hac distinctione de pilulis habet descriptionem pilularum de rheubarbaro quæ cōferunt ad febres antiquas: & pilulārū de raucedfeni quæ cōferunt ad oppilationes splenis, quæ nec in uirtute nec in aliis cōcordant, & sic apothecarij, & etiam medicus debet scire differentias quæ sunt ipsis, & sic in multis aliis.

Rheubarbarum secundum Ildo. est rheuponticum, sed non recte, uide de eo in contestatione de raucedfeni.

VII.

DE HALICACABO, uulgo de Alchechengi, ex inuentione nostra.

R. Absinthij & succi eius, & succi eupatorii, aloes, myroba. citrinorū, masticeis, croci, raucedfeni, lacce ablutæ, anisi, asariacis fistulæ, feminis fumiteræ ana. 3. ii. hieræ picræ. 3. iiii. confice cum aqua solatri, & est tussis cum febre pone uenarum liquiritiæ, sunt enim sanæ & expertæ.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, sed non multum. Occurrit hic dubitatio similis ei quæ occurrit in diacurcuma. in quā licet dicatur curcuma, non tamē ingreditur curcuma, sic & in his pilulis licet non ingreditur alchechengi: dicitur tamen pilulæ de alchechengi, sed scdm quosdā possunt dici a Compositore, uel quod utio scriptorum descriptio non est integra, uel potius quia cōficiuntur cum aqua solatri, quod est species alchechengi.

VIII.

INDE HALY.

R. Miroba. nigrorum, ellebori nigri, polypodij, ana. dra. v. epithymi, stœcados ana. dra. vi. agarici, lapidis lazuli, loti. i. ablutæ, colloquintidæ, salis indi ana. dra. iiii. succi eupatorii, spicæ ana. 3. ii. garioph. 3. i. hieræ picræ. 3. xii. fiant pilulæ cum succo apii, dosis eius ana. 3. ii. uique ad aur. ii.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas habemus in usu: dixerunt quidam quod dicuntur, indæ, quia in partibus Indæ sunt magis in usu quam in partibus aliis. Alii dixerunt quod dicuntur indæ propter sal indum quod recipiūt, & per sal indum intelligitur sal nigrum: sed cū careamus eo, sapientes uolūt quod loco eius ponamus sal rubeum quidam ponunt zuchcharum candidum, sed non est ei proximum ut est sal rubeum.

IX.

DE SARCOCOLLA, albæ sunt.

R. Sarcocollæ. 3. iiii. turbith. 3. iiii. colloquintidæ, 3. i. s. zingiberis, 3. i. s. salis gemmæ, 3. i. s. dissolu. Sarcocollā in aqua ros. & confice alia cum ea, & fiant pilulæ, sunt enim, sanæ & expertæ, dosis. 3. i.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. ipse Mes. in cap. de sarcocolla habet unam aliam descriptionem ex autoritate Halifenis, & idem sunt. Sarcocolla est gummi arboris quæ est sicut frutex & est spinosa: cuius rami sunt nodosi: & colligitur ex ea gummi: & est eius aliud album sicut thus et aliud subcitrinum. Electio, fortius est subcitrinum albo, & quod est amarius melius. Et modus nutriendi ipsam est quod infundatur in lacte alinæ per quatuor uel quinq; dies, & semper infundendo lac super eam: & hoc facias in scutella lapide supra de hoc in quodam sesc melius ostendi.

Sal gēma. i. sal Cappadoc. Mes. in cap. de spēbus salis dicit: qđ sal gēma est sicut crystallus scindibilis. Idē dicit Aui. in. 2. can. in cap. de sale. quidam dixerunt quod sal gēma dicitur: quia est clarū ut gēma, & est uena terræ, & habet effectum salis armoniaci: de quo. Circa instans ait: Sal gēma dicitur, quia gēma æsimilatur, uel quia clarum est ut gēma, & de eo sunt suppositoria, ut est notum omnibus.

X.

FOETIDÆ MAIORES.

R. Serapini, armoniaci, opopanax, bdellij, colloquintidæ, harmel, aloes, epithymi ana. 3. v. hermodactylos, althebran ana. 3. ii. scamoneæ. 3. iiii. cinna. spicæ, croci, castorei ana. 3. i. turbith. 3. iiii. zing. 3. i. s. euphorbiæ. 3. i. partes. ii. dissoluatur gummi in aqua porri, & fiant pilulæ. da. 3. ii.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. Foetidæ aut dicuntur, quia foetidas & corruptos humores educunt uel dicitur foetidæ, quia ingreditur quæda foetida. Idē in ca. de ægritudinibus neruorū habet quatuor descriptiones: quarum una est maiorum, & hæc est ex autoritate Gal. alia est minorū, & credo qđ non fit ex autoritate eiusdē: postea alia duæ descriptiones sunt ex autoritate filij Zachariæ siue Rafis, & sic sine dubio Rafis in. 9. Alman. in ca. de paralyti posuit pilulas foetidæ quas ipse composuit, sed non sunt in usu. Idē in lib. diuisio. habet unam aliam descriptionem. Aui. in. 5. can. habet quatuor descriptiones quæ in usu non sunt.

Althebran. i. fœcebran. Aui. in. 2. can. dicit: Sebran quidam oritur in hortis his cannam subtilem æqualem & habet pilos & folia sunt sicut tarcon fm qđ existimo, & habet lac, si ne dubio fœcebran habet lac, & est spēs lacticiniorū, sed non computatur inter septem spēs tichymalorum quæ a Diosc.

¶ Sera. describuntur. Mes. ait : Alsebram est spēs lacticinio-
rum & ē solutium rusticorum, & eius aliud est magnum habēs
radices rotundas & grossas, & aliud est parum habēs
radices subtilis, & est tenuis corticis: magnum est malum,
parum uero est illud quod eligitur, & melior pars plantæ
ē cortex radicis eius, & lac eius est acutius & fortius. Hæc
est quam nos esulā uocamus. nam Arabes uocant ipsam xer-
bram, nos uero esulam. hæc apud nos in pratis ac aliis locis
inuenitur & similis linariæ, sed ipsa nō habet lac. unde dicit.
Esula lactescit, sine lacte linaria crescit. Est et medicina rusti-
corum: ut supra dixi. Differentia autem est inter scebram et
secebram. Nam scebram est esula, & scecebram est ozi-
mum carmenum, de quo uide supra in dianasturtio.

XI.

SAGAPENI, uulgo de SERAPINO.

¶ Serapini, armoniaci, bdellii, opopanaci, aloes, casto-
rei, harmel ana. 3. ii. colloquintide. 3. iii. fiant pilulæ cum
aqua porri.

COMMENTA. MANLII.

Hæ pilulæ raro habentur in usu, illa uero descriptio quæ
est magis in usu, est una alia quæ idē inferius describit. Auic.
in. 5. can. habet unā aliam descriptionem, sed non est in usu.

Serapinum apud Dios. uocatur sagapenum, & est lachry-
mum ferulæ nascens in India. Eligendum est limpidum for-
is rufum intus album, odorem siliipi. i. asæ foetide & gal-
bani habens gustum uiscidum. Mesue autem ait: Serapinū
est gummi alefchundeg, & est arbor similis oleandro. i. ne
reum montano, & melius est cuius intra subrubrum & sub
albidum, & quod habet odorem porrorum, & quod est faci-
le resolubile in aqua, & quod est clarum, ibi Mesue docet
de modo preparandi ipsū duobus modis.

XII.

DE EVPHORBIO.

¶ Euphorbi, colloquintide, agarici, bdellii, serapini ana. 3.
ii. aloes, succotini. 3. v. fiant pilulæ cum aqua porri, potio
est ana. 3. s. usque ad. i.

COMMENT. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, maxime sū illā descriptio-
tionem. Auic. in. 5. can. habet unam quæ eadem est in sim-
plicibus, sed differt in uno uidelicet quia Mesue uult q̄ con-
ficiantur cum aqua porri Auic. uero cum aqua caulium.

Euphorbium secundum Mesue est gummi excedens om-
nia genera gummi in calefaciēdo, & subtiliando, & melius
ex eo est leue fragibile habens colorem palearem et cla-
rum, & quod est uehementis ac edinis & odoris ualde acu-
ti, & quod est recens, super quōdā iam præterit annus. recens
uero anni fui est sicut uenenum & ignis.

XIII.

DE RAVEDSENI.

¶ R. Raueseni. 3. vii. armoniaci, serapini, bdellii ana. 3. x. lac
cæ. 3. viii. opopanaci. 3. iiii. mezereon, gummi ara. ana. 3. iiii.
turbit. 3. x. spicæ nardi, polii montani, aloes ana. v. malthi-
cis. 3. ii. myrobala. citrinorum. 3. x. dissolue in uino gūmas,
& fac pilulas, dosis eius est. 3. ii. cum aqua caferi.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ ab apothecariis tenentur confectæ: & sunt in
usu, sub noīe pilularum de raueseni. non aut ista descriptio
debet dari pro pilulis de rheubarbo, quia licet raueseni
sit rheubarbū, tamen pilulæ de rheubarbo non sunt eg-
dem ut dictum fuit supra. Rasis in. 9. Almanf. habet unam
descriptionem. in cap. de hydropis. sed non est in usu.

XIIII.

EX THYMELE A, uulgo de MEZEREON.

¶ Fol. mze. infusorium in aceto & exiccato. 3. v. myro-
citrinorum. 3. iiii. chebulorum. 3. iiii. cōfice cum renenabin. i.
manna, & tamarindis dissoluit in aqua endiuiz.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, dicuntur autē de mezereon,
quia ibi magis ingreditur mezereon quam aliud simplex.
Christophorus de honestis inquit: Pilulæ de mezereō. i. de
laureola, sed falsum est. nam mezereon ut dictum fuit in cō-
fessione almezereon non est laureola.

XV.

LVCIS MAIORES.

¶ R. Rosarum, uiolarum, absinthii, colloquintide, turbit. cæ-
bebe, calami a. r. o. nucis muscatæ, spicæ, epithymi, carpobal-
sami, fileris, feminis rutæ, squinati, asari, malthicis, garyoph.
cinnamomi, anisi, fœniculi, apii, casisæ, croci, macis ana. ii.
myrob. citrinorum, chebulorum indorum, emblicorum, bel-
lericorum, raueseni, ana. 3. iiii. agarici, senæ, ana. 3. v. euphra-
giæ. 3. vii. aloes succotennis, ad pondus omnium, confice
cum succo fœniculi, dosis eius est ana. 3. ii. usque ad. iii.

COMEN. MANLII.

Istæ pilulæ apud nos sunt in usu, dicuntur aut lucis, quia
ualent ad oculos medēdos, uel dicuntur lucis: quia obscuri-
tatem oculorum, put sol noctem remouent, & de ipsis repe-
riuntur ibi maiores & minores, sed maiores sunt illæ quas
nostri medici laudant. uerum sunt ex hominibus qui faciūt
unam descriptionem pro alia, eo quod in minoribus pau-
ciores res ingrediuntur, & propter id ambas describam.

Euphragia est herba quæ apud nos in pratis reperitur, et
est minuta herba mirabiliter medetur agritudinibus oculo-
rum, & propter id Mesue in sua practica in cap. allegato, uo-
cat ipsam herbam adhi: fœniculus similiter ualet in illa ma-
teria. unde uersus.

Fœniculus, uerbaena, rosa, chelidonia, ruta.

Ex istis fit aqua quæ lumina reddit acuta.

Et non est completus uersus nisi addatur capillus ueneris
euphragia & betonica.

XVI.

LVCIS MINORES, in intentione maiorum.

¶ Xylobalsami, carpobalsami ana. 3. i. chelidoniæ. 3. v. rosa-
rum, uiolarum, absinthii, euphragiæ ana. 3. iiii. senæ, epithy-
mi, myrobala. citrinorum, chebulorum indorum, bellericorum,
emblicorum, agarici, colloquintide, quinanti, licii, la-
pidis lazuli ana. 3. ii. s. aloes boni ad pondus omnium con-
fice cum succo fœniculi aut chelidoniæ.

COMEN. MANLII.

Chelidonia sū Plinium genera fuit duo. Maior frutico-
so caule folio paltinacæ erraticæ amplior ipsa altitudine
duorū cubitorū, color albus, flos luteus, minor folia hederæ
rotundiora, minus candida, succus utriusque croceus, mor-
dash, semen purpureum, florem aduentu hyrundinum discit
su marcescunt.

Licium. Dios. est eligēdum intus colore rufō, & desoris
nigro, quod diuisum brunum habet, stypticum est & colo-
ris rufi & crocei apparet cum gustu amaro fuit indicū
quod et melius arbor: unde fit est lithos appellata, siue ex
canton folia buxo similia atq; spicatos generans: nascitur in
dumosis locis cuius folia & grana, & radix in unum con-
tunduntur, & ex aqua dulci coquantur usq; ad crassitudi-
nem. Apud Sera. uero sunt folia spinosa, & habet ramos lō-
gitudine duorum brachiorum. Pli. autem ait: Fit ex arbore
spinosa fructu simile piperi sc̄ipue amaritudinis foliis par-
uis. Auic. in. 2. can. de ipso dō facit cap. unum quod incipit
feluzerai aliud quod incipit licium. Io. Sera. in antidotario
in cap. de epithematibus ait: Licium. i. felneragi. Liber qui
dicit Bulchasis in tract. 2. ait: Sūt qui faciūt licium ex radi-
ce arboris quæ dicitur curtan. & species eius licii nominat
cohaculum: & est quoddam quod assertur ex aliemem, &
sunt qui faciūt licium sū hunc modum, ut ibi docet, neque
per id cognouit quid fit. Gentilis super quintum Auic. in fine
inquit: Bel est herba de qua fit licium, in uno alio loco
super quodam passu quarti ait: Licium fit ex arbore spinosa
quæ uocatur azarash siue oxianthus, quod est notum. Gu-
lielmus Placen. ait: Licium est succus granorum cabrosie uel
cornastrelli. Nicolaus dicit: Licii est succus de floribus ca-
prifolii uel oculi lucidi. Idē in litera o, ait: Oculi lucidus
.i. caprifolium uel matris sylua. uide ergo si bene considere
tur capitulum Dios. de licio quod eius arbor est exacanthos,
& sū Gentilem est azarash, siue oxianthus. i. spina acu-
ta: ergo licium fit ex arbore spinosa, quæ apud nos berberis
uocatur: nam sine dubio est consonum, quia ut dictum fuit
Gentilis. in uno loco allegato dicit quod bel est herba, sed

T. 3. 14
p. 116.

debet dicere arbor de qua fit licium. Bel uero apud Sera. ē arbor granati syluestris quod idem ē. & sic meo tempore uidi facere licium ex fructu arboris granati syluestris quæ proprie est berberis, quod apud Diosc. oxiacanthos dicitur, & hoc licium est optimum: uerum sunt ex hominibus qui faciunt licium, ut dicit Nicolaus de quadā herba quæ mater sylvarum uocatur, & hæc apud nos iuxta hortos nascitur: cuius folia sunt ex uno latere subalbida, & ab altero uiridia se adherens, & inuoluens sæpius super alias plantas: & hæc a nostris rusticis dicitur scizo, sed est debilius priore: etiam sunt ex hominibus qui faciunt licium ex fructu nigro cuiusdam arbuti; quod quidam lustragū uocant: cuius folia sunt similia folijs buxi, ramuli recti quibus cauez auricularum sunt succo granorum expresso, & cocto: in quo etiam inuenitur idonea efficacia, ut habet licium primum &c.

XXVII.

STOMACHICAE NOSTRAE, stomachum, & caput mundificant, & accipiuntur omni tempore.

R. Turbith. 3. x.

Rosarum. 3. iiii.

Aloes optimi ad pondus ouum, confice cū succo zbinthii.

COMMEN. MANLII.

Iste pilulæ cum alia descriptione supraposita sunt illæ quibus utimur.

XXVIII.

EX TROCHISCIS COLOCYNTHIDOS

vulgo pilulæ ALANDAHAL.

R. Troch. alandahal. 3. x.

Salis gentianæ. 3. i.

Ladan. 3. xii.

Olei rosati, quantum sufficit, & sunt expertæ.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu sub nomine pilularum alāda hal siue Hermetis, & non debemus uti sub nomine pilularū alandahal, ut quidā credunt: nam uide quod Mesue in sua diuisione de pilulis habet pilulas alandahal Hermetis: & pilulas alandahal siue Hermetis, ergo differunt inter ipsas, & per trochi. alandahal intelligitur trochi. de colloquintida: quorum descriptio superius est posita.

XIX.

DE AGARICO.

R. Agarici,

Hieræ picre. 3. iiii.

Masticis. ana. 3. iiii.

Colocynthidos,

Radices lilii coelestis,

Sarcocollæ. ana. 3. ii.

Pralsii, ana. dra. i.

Myrrhæ. 3. i.

Turbith dra. v.

Confice cum robur, & est mustum coctum.

COMMEN. MANLII.

Iste pilulæ sunt multum in usu. Idem Mes. in ca. de asthma habet unam aliam descriptionem quæ eadem est. Aui. in. 3. can. in fen. 10. in c. de cura asthmatis habet unam aliam descriptionem, quæ eadem est.

Agarici autem uirtus est magnificata ut docet experientia: non solum in euacuando phlegma quod a prædominio euacuat, uerum etiam alios humores pharmaco educibiles.

Lilium coeleste apud Aui. est ireos. Mesue in alia descriptione habet ireos, quod idem est.

XX.

DE TURBITH, & dicuntur AVREAE.

R. Turbith boni. 3. xvi. aloes. 3. i. s. masticis, rosarum, ana. 3. vii. myr. balanorum citrinorum. 3. x. croci. 3. iiii. confice cum succo zbinthii.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas habemus in usu sub nomine pilularum turbitarum, etiam sunt in usu sub nomine pilularum aurearū Mesue: tamen quando medicus ordinat pilulas aureas inteligitur secundum descriptionem quæ est de mente Nicolai. Ioannes Serap. in antidotario ait: Pilulæ albeæ, & dicuntur pilulæ auri, sed non sunt in usu.

XXI.

DE LAPIDE LAZULI.

R. Lapis lazuli abluti. 3. vi. epithymi, polypodii ana. 3.

viii. camoneæ, ellebori nigri, falis indi ana. 3. ii. s. agarici. 3. viii. garyophyllorum, anisi, ana. 3. iiii. hieræ picre. 3. xv. confice cum succo endiuæ.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. Lapis lazuli secundum Serap. oportet quod eligatur color cuius est coelestis multus, & est lenis sine asperitate & sine mixtione alterius lapidis, & qui non frangitur facile: & cuius frusta sunt magna. Mesue de ipso loquitur in cap. de lapide stellato. Modus autē abluendi eum dicitur est supra, & sicut abluitur lapis lazuli: sic etiā abluatur lapis armenus.

XXII.

DE LAPIDE ARMENO.

R. Lapis armenii loti & preparati, hieræ picre ana. 3. v. epithymi, polypodii ana. 3. viii. * camoneæ coctæ in citronio. 3. iiii. garyophyllorum. 3. ii. falis indi. 3. i. s. confice cum succo solatri, idest herbe moræ uel morellæ.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, sed raro. Idem Mesue in capitulo de soda frigida ab humore melacholico habet unam aliam descriptionem quæ est ex auctoritate Alexandri: sed non idem est.

Lapis armenus sive Mesue: melior est habens colorē medium inter uiridem & obscurum terreum & indum: & habet macularum distiones uirides & nigras. Aui. ait: In ipso est aliquantulum azuli coloris, & non tamen est in colore azuli, & non est in eius soliditate. Modus abluendi ipsum est sicut abluatur lapis lazuli, cuius modus supra fuit positus.

APPENDIX.

Catapotia ex armeniaco lapide. Actuariis, nihil fere euarian & si pro polypodio agaricum habeat, ac pondera aliquantulum immutet, iis uerbis pulcherrime pingit.

Hieræ amaræ. 3. s.

Epithymi. 3. s.

Agarici. 3. iiii.

Armeniaci lapidis. 5. s.

Scammonii. 5. s.

Garyophyllorum. gra. viii.

Tritæ accipiuntur citrinorum succo, ac rosaceo melle, uel rhodomelle, modus est scilliquus.

XXIII.

AD OMNES MORBOS catarrhis, coryzæ,

& tulsis catarrhalis.

R. Myrrhæ puræ. 3. vi. olibani. 3. v. opii, iulquiami ana. 3. iiii. croci. 3. i. s. radicem lingue canis. 3. iiii. s. fiant pilulæ & administrentur.

COMMEN. MANLII.

Iste pilulæ apud nobiles medicos sunt multum in usu sub nomine pilularum ad omnes morbos catarrhales, etiā sunt in usu sub nomine pilularum de cynoglossa, sed hoc est ex secretis medicinx, & a multis cognitæ non sunt. Nicolaus habet unam aliam descriptionem, sed sue proprie uocatur pilulæ de cynoglossa: sed non sunt in usu, tamen infra apparebit earum descriptio. Etiam infra apparebit una alia descriptio pilularum quæ dicuntur pilulæ de alchaiber. i. de cynoglossa, sed non tenentur confectæ.

Lingua canis. i. cynoglossa, & componit a cynos quod ē canis, & glossa quod est lingua idē cynoglossa. i. lingua canis: Ioan. Angli. in ca. de scissuris laborum inquit cynoglossa. i. lingua canis. Mes. nō ponit cum quo liquore debeat fieri, sed uidi ipsas confici ex succo radicis ipsius cynoglossæ.

XXIII.

EX SAGAPENO, vulgo de SERAPINO.

R. Serapini, armoniaci, opopapani, bdellii ana. 3. ii. s. feminis apii, ameos, t. armel, anisi ana. 3. i. acori, * scitaragi indi calamenti, folii, centaureæ, polii, colli, falis gemmæ ana. drac. s. aloes, drach. vi. colloquintidæ drach. v. fiant pilulæ & administrentur.

COMMEN. MANLII.

Iste pilulæ sunt illæ quas nostri doctores laudant, supraposita sunt alia descriptio ex auctoritate eiusdem: sed non sunt ita laudatæ.

*Diagrydion uocant.

*Apud nos multos, expositi: rei non sine mendæ delectat.

† Rusi syluestre uolunt. * Lepidiiu appellat.

S E C T I O X.

Armel uero scriptum sine litera h. fm Matthæum Syll. est tertium genus rutæ, sed harmel cum h. est cicuta, sed falso. nam harmel tam cum h. quam sine h. idem importat ut dictum fuit supra, de forma ipsius in confectioe pilulari aggregati. maiorum apparebit.

Folium. i. malabathrum, loco eius a modernis multis macis ponitur, aut spica nardi.

Centaurea. f. centaurea minor. sunt enim duæ species fm Mesue, maior. f. & minor, inter quas distinguunt proprietates notæ. Electio minor melior est in omni re, cuius flores & crura colorē habent citrinū palearē, & melior pars plantæ sunt flores & semina ipsius, & melius tempus collectionis ipsius est primum zizatis.

XXV.

DE BDELLIO MAIORE.

¶ Bdeilli. 3. xii. ameos. 3. iii. chebulorum indorū, belle. embli. venarum adustarū, charabæ ana. 3. ii. s. infundatur bdeillum in succo porri, & fac pilulas in modum ciceris.

COMMENT. MANLII.

Istæ pilulæ sunt illæ quibus communiter utimur. dicuntur autem maiores ad differentiam minorum, eo quod plurā simplicia ingrediuntur. idem habet unam aliam descriptionem, & sunt ex inuentione sua, & hæc sunt apud quosdā in usu. Io. Serap. i. suo antidotario habet tres descriptiones, sed non sunt in usu. Rasis in. 9. Alman. in cap. de hæmorrhoidibus & fistulis & rhagadiis quæ in ano fiunt, habet unam descriptionem, sed idem non est.

Bdeillum fm Plin in Britania nascitur, cuius arbor est nigra magnitudinis oleæ foliis arboris &c. Diosc. autem in Armenia illud nasci dicit. & laudat illud quod lucidum est & subalbidū, lenē, æqualiter cerēū, & quod facile molliſt etc. Aui. distinguit, in iudaicā & mechiū, & dicit quod ambrosunt ex palmis syluestribus. laudat autem illam speciem quæ est clara & amari saporis, & est munda a lignis, & est facilis resolutionis, boni odoris, cuius fumus, habet odorē picis, & cum antiquæ bdeillum iudaicā egreditur a lemnificatione ad exiccationem. Dinus Floren. in li. i. in ca. de cura serofularum ait: Almugathi. bdeilli, quod sal u n est, nam alagathi siue mugathi est radix granati syluestris de qua Auic. in. 2. can. speciale facit cap. & redarguit, sed male eo quia dicunt qd est radix granati syluestris.

Venarum adustarum notandum quod uena per varias intentiones accipitur, de qua Gentilis in. 3. can. super cap. de canonibus generalibus curationis ægritudinis oculorum inquit, quod uena aliquā accipitur pro uena tinctorum. i. rubea tinctorum, aliquā pro uena chelidonis, aliquā pro mineralibus terræ, aliquā sumitur uena pro uermibus terrestribus, alii uero per uenas intelligūt radices fœniculi & petrosellini &c. sed in isto loco per uenam alii intelligitur: est enim littera corrupta. nam debet dicere auellonarum adustarum: sicut testatur Matth. Syl. in littera uena. ubi sic ait: uena est radix plantarum: vel uena corporis uerum est quod in antidotario Damasceni. i. Mesue in receptione pilulari de bdeillo, posuit uenarum adustarum: quod contingit ex errore scriptoris: quia debet dicere auellonarum adustarum: quæ omnia notæ sunt. Lumen apothecariorum dicit qd debet dicere ueneriarum adustarum. i. radicū acori, sed hoc falsum est ut patet ex sententia Matthæi Syl. qui aliter est autoritatis quam istud fuscum. Lumen, uel adhuc uerius tenebra.

XXVI.

DE BDELLIO, ex inuentione nostra.

¶ Myrobalanorum nigrorum, emblicorum, bellericorum ana. 3. v. bdeilli. 3. x. scoræ ferri, feminis porri ana. 3. iii. coralli adusti, charabæ, conculæ adustæ ana. 3. i. s. margaritarum ana. 3. s. confice cum aqua porri.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu sed non tantum ut maiores. Corallus fm Diosc. arbor est quæ in fundo maris nascitur, qñ autem simpliciter reperitur corallus de rubeo intelligitur. Modus autem adustionis ipsius talis est: oportet quod teratur grosso modo, & ponantur in olla terreæ, & ponantur in

furno per noctem: si bene comburitur bene est: si non iterū ponantur donec comburantur, & melior corallus est qui est ueræ rubedinis, & qui nulla aut pauca foramina habet.

XXVII.

EX COLOCYNTHIDE, vulgo

de colloquintida.

¶ Colloquintidæ. 3. vi. myrobala. nigrorum, citrinorum, serapini bdeilli, farcocolæ ana. 3. v. aloes. 3. vii. nigellæ. cymini carmen origani perſici, nasturtii albi, salis gemæ, & uisci Romani ana. 3. i. infunde gūmas in aqua porri, & fac cū cæteris pilulas.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, sed non multum Colloquintida fm intentionem Mesue est fel terræ, fm uero intentionem Isid. fel terræ proprie est centaurea. Idem sentit Simo Ianuen. Circa instans autem ait: Colloquintida pomum est cuiusdam fructus in transfmiriis partibus nascēis circa regionem Hierusalem, & cucurbita Alexandrina dicitur, & nota quod tam pomum quā fructus dicitur colloquintida.

Nasturtium album. i. nasturtium babilonicum. Auic. in 5. can. in mithridato inquit: Alſeis. i. nasturtium Babilonicum: & scdm Matthæum est nasturtium orientale: de eo dictum fuit supra in confectioe mithridati.

Viscum Romanum. i. glutem Romanum, & glutem Romanum apud Sera. est mastix. Aui. mastix alius est Romanus albus: & alius ennabati ad nigredinem declinans: & melior est ille qui est albus mundus & magnus.

XXVIII.

EX OPOPANACE, vulgo de opopanaco.

¶ Opopanaci, hermodactyli, serapini, bdeilli, armoniaci, colloquintidæ ana. 3. v. croci, castorei, myrobala, zingiberis, piperis, macropis, calsis, myrobala, citrinorum, indorum, bellericorum, emblicorum ana. 3. i. scamoneæ. 3. ii. turbiturbi, drac. iii. aloes. 3. xii. infundatur gummi in aqua caulium, & fiant ex eis pilulæ.

COMMENT. MANLII.

Has pilulas habemus in usu: maxime scdm istam descriptionē: ipse in c. de paralyſi habet aliam descriptionem, sed non est eadem, & Auic. in. 5. can. habet aliam: & est eadem.

Opopanacum fm Mesue est gummi plantæ cuiusdam similis ferulæ: cuius stipites eleuantur super terram circiter cubitum uel duos: & melius ex eo est quod est citrinū extra, & subalbidum intus: & quod est amara. Aui. ait, opopanacæ arbor hoc non eleuatur a terrâ, & simulant ipsius folia foliis ficus idem in ca. de chemicis ait: quod est in dispositione nibus alieuiſi. i. opopanacis, & aliquando uocatur alſofur.

XXIX.

DE HERMODACTYLIS MAIOR.

¶ Hermodactylorum, aloes, myro. citrinorum, turbiturbi, colloquintidæ, bdeilli, serapini ana. 3. vi. castorei, farcocollæ, euphorbii, opopanacis, harmel, apii ana. 3. iii. croci. 3. i. s. confice cum succo caulium & fac pilulas.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ sunt illæ quibus utimur: dicuntur maiores ad differentiam minorum: eo quod plurā simplicia ingrediuntur pilulas maiores quam minores: & ambæ sunt in usu. & ex inuentione sua sunt in usu. Rasis in. 9. Alman. habet unā aliam descriptionem: sed apud nos non est in usu: tamen infra descriptio sua apparebit.

Hermodactylus secundum Mesue est radix herbæ montanæ & eius alius est longus sicut digitus: & alius rotundus est. ille de quo ipse intelligit est alius albus: alius rubeus, & alius niger melior ex eis est ille qui habet proprietates tres bonas. i. qui est albus & ueræ albedinis intra & extra: & qui est grossus & qui est duritie mediocris. Aui. in. 2. can. duo facit cap. unum de flore qui dicitur digitus Hermetis, aliud de hermodactyl. hæc apud nos in locis aquosis nascitur: sed non est ualde utile. ille uero qui in montibus reperitur est nobilior. hæc radix utilis est quidem ægritudinibus iuncturarum. Gale. autem in cap. de medicinis Zenonis in suis experimentis in electuario de centaurea pro hermodactylo scripsit zurugen, quod idem est.

XXX.

DE HERMODACTYLIS MINOR.

℞. Hermodactylorum. 3. v. scamoneæ. 3. ii. s. myrobalo-
rum citrinorum. 3. iii. rolarum. 3. ii. aloes. 3. x. confice cū ca-
thartico rosato.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilule sū istam descriptionem non sunt in usu. po-
test autem dici q̄ dicuntur minores, eo q̄ pauciora simpli-
cia ingredientur ad differentiam maiorum, uel dicuntur mi-
nores quia habent minorem efficaciam.

Catharticum uero apud Græcos est purgatiuum. & ideo
hic Mef. docet conficere prædictas pilulas cū cathartico ro-
sato. i. cum purga- iuo facto cum succo rosarū, quod uocatur
electuarium rosarum ex autoritate ipsius, sed electuarium
de succo rosarum est ex auctoritate Nicolai, sed hic de illo
quod fit de mēte Mefue debet intelligi & poni, & nō aliud.

XXXI.

DE HERMODACTYLIS ex inuentione sua.

℞. Hermodactylorum, aloes ana. 3. v. myrobala. citrinorū,
turbith ana. 3. iiii. zingiberis. 3. ii. fac pilulas cum electuario
rosato, da 3. ii.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ quæ sunt ex inuentione Mef. apud nostros me-
dicos sunt multū in usu sunt. n. experte ad ea quæ dicit Mef.
& sic etiam maiores sunt experte, sed minores non tātum.

XXXII.

SEBELLIÆ.

℞. Spicæ indæ. 3. v. spicæ Romanæ. 3. ii. raudæ, agarici, epi-
thymi ana. 3. iii. croci. 3. ii. myrrhæ, cinnamomi, garyophyl-
lorum, squinanti ana. 3. i. aloes. 3. x. fac pilulæ cum uino an-
tiquo, & da. 3. ii. cum uino permixto.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus aliquando in usu: secundum quos-
dam d. cunctur sebeliæ a Compositore.

Spica Romana apud An. est spicæ celtica idē ait Sera. in
cap. de spica. uide de ipsa in confectioe de spica Romana.

EX PRACTICA MESUE.

XXXIII.

BECHICÆ, vulgo BICHICHIAE.

in cap. de tufsi fica.

℞. Succiliquiritiæ, zuechari tabarzi. aur. aur. vi. siue. 3. ix.
amylī, dragacanti, amygdalarum dulcium ana. 3. iiii. confice
cum mullagine psylli uel cythorūrum.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, maxime secundum hanc de-
scriptionem: idem in cap. de raucedine uocis habet unā aliā
descriptionem sed non est in usu. Rasis in nono Almanforis
in cap. de tufsi habet unam aliam descriptionem, & eadem
est. Aui. in 3. can. in fen. x. in cap. de cura tufsīs & spūto san-
guinis, habet unam aliam descriptionem sed nō est eadem.
Lumen maius lucēs describit unam descriptionem ex autho-
ritate Mefue, sed falsa est descriptio fua in pondere, & non
debent fieri.

Pilulæ autem bichichiz uel bechias est compositio ad
tufsīm, & earum forma est ut lupinus aut trochiscus, & te-
nentur sub lingua lambendo.

XXXIII.

DE CROCIS, in cap. de Raucedine uocis.

Rec. Croci. 3. iiii. cubebæ dra. s. succiliquiritiæ, olibani, an.
3. i. fac pilulas cum rob. uino cocto & sint pilulæ magnæ,
& teneat patiens unam sub lingua, & glutiat saluam eius,
& sint experte.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Crocus. orientalis qui
uulgo dicitur zaffarum. Ioan. Sera. in suo breuiario in cap.
de ægriudini bus quæ generantur in auribus ait: Zaffarum
& crocus orientalis idem dicunt Arabes.

XXXV.

Cōferentes ad omnes rheumaticas passiones, & sunt de
lib. Alexandri medici, & eas descriptio Mefue in ca. de cura
catarrhi, quantum hæc est permixtio.

℞. Myrrhæ. 3. iiii. thuris masculi. 3. ii. s. opii, iusquiami, radi-

cum, alcalchar sicce ana. drach. ii. confice cum succo alcha-
zaber humidæ. da ex eis a tribus usq; ad. v. in sero, sunt enim
mirabiles.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ sēd in intentionem Mefue sunt ex autoritate
Alexandri medici, & sic credo, quia idem in cap. de tufsi ait
Alexander. confectio pilularum ad tufsīm catarrhalem: et
ex medicinis benedictis, & est ex fecretis artis, & confertur
ad omnes ægriudines catarrhales, & uocatur pilulæ al-
chaiber: & dicitur sunt in cap. de catarrho. & sic est quod hæc
est descriptio pilularum de alchaiber, & quid fit alchaiber
generaliter ignoratur. Io. Arculanus in ca. de catarrho ait:
Pilulæ alchaiber sēd in descriptionem Alexandri medici apud
Mefue in fine cap. de catarrho sunt præstantissimæ. Et per
alchaiber intelligitur cynoglossa siue lingua canis: sic est
secundum ueritatem, quod hæc est descriptio pilularum de
cynoglossa: sed apud nos nō sunt in usu. illa uero descriptio
qua uirum est illa quod superius scripsi sub nomine pilula-
rum ad omnes morbos catarrhi.

Alcalchar siue calchar est lingua canis siue cynoglos-
sa & compositur a cynos græce quod est canis. & glossa
quod est lingua. Et nota quod mēo tempore uidit multos her-
baticos uidentes ignorantibus apothecariis quinquenaria
sententiæ plātaginem minorem pro lingua canis, sed aliud
est, hic uero per alcalchar siccam intelligitur radix ipsius
puluerizata ac contrita.

Alchazaber humida, i. recens, & est lingua canis seu cy-
noglossa, sed generaliter dubitant aliqui an alcalchar &
aleazaber sint idem, sed sine dubio idem sunt, uerum est q̄
per alcalchar intelligitur radix ipsius, & per alchazaber
intelligitur succus ipsius, similiter i antidotario Nicolai
in confectioe pilularum de elaterio. Nicolaus dicit de elate-
rio quantum de pulueribus hæc est de puluere radicū elate-
rii: & est radix cucumeris asinini: postea ait: Confice cum
succo scydalis. cum succo cucumeris asinini, tamen idem
debet intelligi.

XXXVI.

DE STORACE, in ca. de tufsi.

℞. Storacis liquidiæ albæ, olibani, myrrhæ, succi liquiritiæ,
opii ana. 3. iiii. fiant pilulæ sicut cicer. dosis eius est. ii. aut. iij.

COMMEN. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu Rasis. q. Almanf. in ca.
de tufsi, habet unam aliam descriptionem quæ eadem est
ide. n. in lib. Diuisionum in ca. medicinarum tufsīs, asthma-
tis: & sanies, habet unam aliam descriptionem.

Storax liquida est satis nota.

XXXVII.

DE HIERA simplici Galeni.

℞. Specierum hieræ picre. Gale. 3. i. conficiantur cum melle
dicto geleniabin quantum sufficit, & fiat magdaleon.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ sunt multum in usu: descriptionem uero spe-
cierum uidet supra in tractatu de electuariis, in loco ubi est
hiera picra sicut dictum fuit de speciebus hieræ picre, sit cō-
fectio hieræ picre cum melle secundū artem, & hæc dicitur
a doctoribus hierapicra Gal. & quandoq; de prædictis spe-
ciebus completis cum geleniabin fit pasta bona: & tunc
a doctoribus uocatur pilulæ de hiera Gale. seu de hiera sim-
plici, & de istis debet intelligi quando simpliciter descri-
ptionem ordinat hieram, infra apparebit una alia descriptio pilularū
de hiera composita, quæ etiam sunt in usu.

EX PETRO DE EBANO CONCILIATORE.

XXXVIII.

MASTICHINAE, in cap. de indigestione stomachi.

℞. Mastichis. 3. iiii.

Aloes electi. 3. x.

Agarici. 3. iiii.

Confice cum succo altizæ, & fiant.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ sunt illæ quas nostri doctores laudauerunt in
multis proprietatibus. Francisc. de Pedemontium in cap. de
medicinis appetitus corrupti, ponit hæc eandē descriptio-

*Mendosc
prius. iiii.
legebat.

ne. Idē Franciscus i cap. de nouementis digestionis, ex qui b^o est debilitas destructio & corruptio, & cura ei^{us} hēt aliā, Mesue i suo grabadin in ca. de caputurgis conferentibus sodz frigide, habet unam aliam descriptionem, & dicit q^{uod} mundificant stomachum, & caput, & accipiuntur oī tempo re, & dicuntur pilulæ de masticæ, sed non sunt in usu.

Altillia aut altimilia idē est. O quāta differētia reperitur ihac maxime ab ignoratib^{us} apothecariis ac iudicis ut est Lumen male lucens nam ipse dicit q^{uod} altile est unum uel sa pa uel rob^{or}; falsum est. uerum si Conciliator diceret: con ficiantur cum rile esset unū cōtū, sed ait cū succo altillie, idēst artēmisie. nā istud uocabulum (sicut dictum fuit mihi) est quasi uulgare q^{uod} i partibus Hyspaniæ dicunt altimilia. i. artēmisia. Præterea Auic. in. 5. can. in tyriaca Eldra inquit: Succū altillia & est abelengeff, & dicitur a broctanum sylue stre. ergo est artēmisia: nam belengeff apud Gal. in. 6. sim pli. est artēmisia. Præterea Conciliator fuit Petrus de Eba no dicit quod cōpositio harum pilularum est medicina ma triciis uitiois & uiscerum interiorum Artēmisia ad idē mi rabiliter ualet, & sic est q^{uod} altillia est mater herbarum siue artēmia, loco eius potest poni syrupus de floechados.

EX FRANCISCO DE PEDEMON.

XXXX.

De quatuor rebus, in cap. de dolore intestinorum & medi cinæ eius, & sunt expertissimæ.

*Trochi scos aliā bal. eius lo co pa ssm substituē dos studio si nō igo rentur.

R. * Colloquintidæ, Sagapeni, Salis gemmæ, Diagndii cocti,

} ana. 3. iij.

Terantur & conficiantur cum succo porri.

COMMENTA. MANLI.

Istæ pilulæ non sunt in usu apud nos, dicuntur autem de quatuor rebus a quatuor simplicibus quæ in ipsis ingrediuntur sine liquore.

XL.

DE BENEDICTA.

R. Species benedictæ simplicis completarum. 3. vi. Fiant ex eis pilulæ cum geleniabini. i. melle rosato.

XLi.

DE SPICA, in cap. de hydrotissi.

R. Spica. 3. iiii.

Agarici, Anomi, R. Rauced, Epithymi, Masticis, Costi, Chamædrios, Myrrha, Cinnami, Squinanti, Garyophyllorum, Aloes. 3. viii. Fiant pilulæ,

} ana. 3. iiii.

† Rhabar barum uo cant.

} ana. 3. i.

COMEN. MANLI.

Istæ pilulæ non sunt in usu. Spica. spica nardi. Diosnar dus herba est spinosa: nam a Græcis nardostachios appella tur, eius genera sunt duo: unum Indicum, & aliud Syriacū, & non quia in Syria inuenitur: idē nōmē accepit, sed quia mons ubi nascitur, pars eius in Indiam porrigitur &c.

EX NICOLA O.

XLII.

Sine quibus esse nolo.

R. Aloes optimi abluti & odoriferi. 3. xiiii. quinque myro balanorum, rheubarbari, masticis, abstinii, rose, uiolarum, senæ, agarici, cuscute, ana. 3. i. temperentur cum succo foeni culi, in quo sint, scamoneæ bene tritæ. 3. vi. s. admisceantur ita tamen quod pulvis scamoneæ per pannum in ipso succo sit expressus, & sit tantum succi quod sufficiat ad confectio nem pilularum ad modum cicēris informetur manibus cū oleo uiolato unctis, uel oleo communi abluto secundum,

doctrinam, & usui referui.

COMMENTA. MANLI.

Pilulæ a rotunditate dicuntur: sine quibus esse nolo pro pter magnam efficaciam & uirtutem quam habent ad pur gandos humores: etiam ualet ad obscuritatem oculorum. Giliber. de Anglia in cap. de scotomia & uertigine, habet unam aliam descriptionem quæ est conformis huic. Quing; myrobalani sunt proprie citrini, chebuli nigri. i. indi, embli ci, bellerici, & sic iste quing; spēs debent intelligi per quin que myrobalos: fm enim quosdam sapientes. species my robalanorum sunt tantum tres. Citrini, chebuli, & indinā alias duas species non computant inter myrobalos, quæ re Mesue separata de ipsis facit capitula. Moderni uero ad diderunt bellericos & emblicos, & sic per quinque myro balanos, & de istis quinque intelligitur. ande uersus. Myrobalanorum species die quinque bonorum, Citrinus, chebulus, bellericus, emblicus indus.

Scamonea est solutium nungum anōmōmāscæ. fm in tentionē Nicolai in istis pilulis debet esse bene trita, sed fm opinionem aliquorum doctorum debet esse grossa, dum po nitur in pilulis ac electuariis, & inquit q^{uod} ratio hæc est pri mo quod scamonea est uenenosa & est ualde nocua stoma cho & turiofa. unde si bene trituraret intraret, porositates stomachi & longo tempore ibi maneret: apothecarii uero moderni sic faciunt, sed loco eius ponunt diagrydium. i. sca moneam præparatam coctam in pomo cytonio. Antiqui dicebant diagrydium uel acyrydium: moderni diagrydium.

XLIII.

A V R E A E.

R. Aloes, } ana. 3. v.
Diagrydii, } alias. 3. x.
Rosarum, } ana. 3. iij. s.
Seminis apii, } alias. 3. v.
Foeniculi, }
Anisi, } ana. 3. i. s.
Masticis, } alias. 3. iij.

Crocis, } ana. 3. i. s.
Colloquintidæ interioris, } alias. 3. iij.

Informentur ad modum cicēris cum aqua infusiois tra gacanthæ.

COMMEN. MANLI.

Has pilulas habemus in usu. dicuntur aut aureæ, quia si cut aurum inter omnia metalla preciosius est, sic istæ pilulæ, inter omnes alias preciosiores habentur. Giliber. de Anglia. in c. de scotomia, & uertigine, habet unam aliam descriptionē quæ eadem est. supraposita fuit una descriptio sub nomine pilularum de turibith, & sunt de mente Mesue, quæ dicit q^{uod} sunt pilulæ aureæ, sed non sunt tantæ dignitatis ut istæ.

XLIII.

DE CASTORE O.

R. Castorei, pyrethri, opii, croci, zingiberis, euphorbiæ, elat erii, mabatemaricon, leucopiperis, nigellæ, saxifragiæ, epi thymi, spica nardi, ellebori albi, ana. 3. i. conice cum succo bleæ, in forma ad modum piperis.

COMMEN. MANLI.

Istæ pilulæ non sunt in usu. Castoreum autem est animal q^{uod} apud Serap. castor uocatur. Auic. autem ait: Castoreum est testiculus animalis marini q^{uod} submergitur, & inuenitur par suspensionem ex radice unāficis duo testia uaccina exicca ta, & habet corticem subilem qui quolibet tactu fragitur. Electum ex eo est quod duo testiculi sunt simul adhaerentes partes: illud enim non adulteratum est, eius quidem adul teratio fit ex opoponaco, & gummi confectis cum oleo & pauco castoreo, & defecatur in uetsica.

Elatarium est succus cucumeris asini secundum Com positorē. idē dicit Diosc. in fra in pilulis de elaterio nes lius ostendat.

Mabatemaricon. i. succus cauliculi agrestis fm Nicolau caulis uero agrestis fm Diosc. nascitur in locis maritimis et desertis, albidior & longior domesticis: & amarū quidam putant, sed non recte ipsum esse conditi seu structum, de quo Circassians tractum, est cauliculus agrestis, sed falsi sum

sum dicite idem ibi ait ubi invenitur. R. mabate maticon succum ponitur qui sic appellatur, veritas tamen est, quod mabathematicon id est succus cauliculi agrestis, sed non est struthium idest confidit.

X L V. HEPTAMERAE, vulgo quam corruptissime OPTOMERAE.

R. Aloes, } ana. 3. ii.
Diagrydij, } alias. 3. iiii.
Colloquintidæ interioris,
Epithymi cretici,
Agarici,
Chebuli,
Masticis,
Absinthij,

Temperantur cum succo strychni, & in modum ciceris informantur.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. dicuntur autem optomæ idest de octo rebus.

Strychnum secundum Dioscorum species habet quatuor. quarum prima est hortulana, odoris iocundi, hæc comeditur, & hæc est quam nos solatrum vocamus, aut morellam vulgo. Mace Herbarum quam greci strychnum dixere, latini Maureolam dicunt, secundum Sera. solatrum est uva vulpis. secundum vero Mesue uva vulpis aliud est ut apparet apud ipsum in cap. de alseclera, sed maior pars sapientum tenet hanc opinionem quod uva vulpis sue uva canina sit strychnum seu solatrum.

X L V I.

STYPTICAE, valent contra fluxum ventris.

R. Myrtillorum, balauftæ, psidæ, symphyti, sanguinis draconis, boli ar. acaciæ, rosarum, tartari, hypoquistidos, sumach, croci, gallæ masticæ, galangæ, cinnamomi, spodiæ, macis, gummi ara. ana. 3. i. opij thebaici. 3. s. temperantur cum succo cimarum myrtæ, uel lentiscis, vel plantaginis, & fac pilulas in modum ciceris.

COMMENTA. MANLII.

Non sunt tamen in usu apud nos. Psidia. i. cortex granatæ, psidia vero est thorax liquida.

Symphitum. i. consolida maior, seu anagallicum. Auic. in. canon. scribit succurum, sed & symphyrum, dicit quod est semperuiva. & dicit quod est species feminis mandragoræ idem in 3. ca. in fen. x. in ead. cura sputi sanguinis ait succurum & est semperuiva & dixit Vir in quibusdam quæ aggreavit quod est species talamenti nascens inter lapides quæ teritur & commeditur cum sale, & nominatur nimul albus sylvestris, & in hoc est consideratio: neque per id Auicenna cognovit quid esset.

Lentiscus arbor est nora. Isid. in cap. de proprijs nominibus arborum ait: Lentiscus dicitur quod culpis ipsius lætus sit & mollis nam lentus dicitur quicquid flexibile est. vnde & lentum uimen & uites. Virgilius & lente uites. i. flexibiles, cuius fructus oleum defuscat cortex refinam quæ masticæ appellatur, cuius plurima, & melior in Chio insula gignitur.

X L V I I.

De quinque generibus myrobalanorum.

R. Omnium myrobalanorum, agarici, diagrydij, colloquintidæ, fenæ, ana. 3. s. epithymi, turbi, anili, marathi, masticis lapidis lazuli ana. 3. iis. græ. v. aloes. 3. i. conficiantur cum succo absinthij.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Bartheo. Monta. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem & eadem est. Nicolaus dicit quod sunt pilule de quinque generibus myrobalaorum, postea ait. R. omnium myrobalanorum quod non est sic dicendum nam per quinque myrobalanos intelliguntur citrini, chebuli, indi, emblici, & bel i. iei, & per omnes myrobalano. intelliguntur sex. nam Serap. ponit feni quod non reperitur apud Mesue. uerum hodie per omnes myrobalanos quinque myrobala. intelligi volunt. f. citri chebuli, indi, emblici, & embli.

X L V I I I.

ARTHRITICE, valent contra arthriticam, & podagram.

R. Hermodactylorum, turbi, agarici, ana. 3. iiii. casie, spicæ garyoph. xyloballami, caroballami, zingibe. masticis, foeniculi, anili, laxifragiæ, feminis sparagi, brusci, rosæ, granorum folijs, salis gemmæ ana. 3. s. aloes ad pondus omnium conficiantur cum succo foeniculi, vel iux.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. dicitur autem arthritica, quia valent ad arthriticam passionem. i. ad passionem iuncturarum, non autem dicitur arthritica ab herba quæ arthritica dicitur cuius forma est sicut cõsolia minor cum osculo coelesti, iuxta uias hæc nascitur. Gilib. de Ang. in ca. de cura arthriticæ secundum magistros ait: Pilulæ arthriticæ magistrorum Salernitanorum, & idem sunt. Nicolaus Flo. in lib. 7. in cap. de præseruatione a doloribus iuncturarum ait: Pilulæ Salernitanorum quæ uocantur pilulæ arthriticæ, & idem sunt. Iua. i. ziniam. Mes. laudat ipsam in cap. de ægritudinibus neruorum, generaliter apothecarij faciunt ipsas pilulas cum succo foeniculi, sed Gilibertus ac Nicolaus laudat magis succum iux, & est chamæpityos, sed hæc a multis cognita non est.

X L I X.

Ante cibum, & post.

R. Masticis, granorum folijs, croci, spicæ nardi, nucis muscatæ, garvophyllorum, macis, zingiberis, galangæ, iuniperi, apij, petroselin. foeniculi, sparagi, brusci, cyperi, carui, cubebæ, xyloballami, chamædrys, chamæpityos, thymi, epithymi fenæ, costi, laxifragiæ, lapidis lycinis, pulegij, sileris montani, turbi, ameos, amomi. feminis anethi, portulacæ, & lactucæ, zedoariæ ana. 3. i. rheubarbari ad pondus omnium, aloes ad pondus rheubarbari, & omnium aliorum, conficiuntur cum uino veteri rubeo.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ apud nos non sunt in usu, sed secundum intentionem Luminis tenebrosi sunt in usu sub nomine pilularum imperialium, sed non rectè: nam istæ non sunt pilulæ imperiales quibus generaliter utitur, ut est notum doctores apud apothecarios: illam uero descriptionem pilularum imperialium quibus utitur inferius subiungam.

L.

ECELATERIO, idest, ex succo cucumeris syluestris, vulgo quam mendofo de ele.

ctuario, seu elactero.

R. Aloes. 3. ii. masticis. 3. i. elaterij quantum de pulueribus. 3. s. iiii. confice cum succo siccydi, vel cum succo actus uel chamæactis, & da. 3. iiii. vel. v. suauiter enim solunt, & principaliter melancholiæ & phlegma purgant, secundario cholera.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu: non multum sub nomine pilularum de cucumere asinino, nã elaterium est succus cucumeris asinini sicut apparet apud Dioscorum in proprio ca. de elactero. Præterea Sera. cap. de cucumere asinino ait: Elaterij fit ex fructu cucumeris amari in hunc modum. Accipe de cucumeribus istis anteq̃ ueniant ad plenam maturitatem & coacerua eos, & dimitte sic nocte una: postea in meridie pone coram te uas, & pone super cribrum non spissum & resupina super ipsum cutellum & fac sicut docet ibi Sera, & melius elaterium est illud quod uergit ad colorem albi leuè, amarum, humidum, & quando appropinquatur luminis accenditur. Petrus de Cre. ait: Cucumer agrestis est herba nora: ex cuius succo fit elaterium. idem ait Circinsians, lacterides autem aliud est, ut apparet apud Dioscorum & est catrapatia. Sicydis. i. cucumeris Asinini, & hic intelligitur de radice ignorantes apothecarij mirantur quod elaterium fit succus cucumeris Asinini, & siccydi fit radis ipsius, & dicunt quod possibile non est quod in istis pilulis ingrediatur succus fructus cucumeris & radix ipsius, sed tales ignorant: nam experientia reperitur eadem in pilulis alchaibæ. i. de cynoglossa: ut dictum fuit supra.

Actis. i. sambucus: chamæactis. i. ebulus quasi infima seu humilis actis ac chamæ g est infimû, q̃ aut dicitur: Ebulus est

Lumi. Ma.

M

*Nec. non
hic. uerò
hoc. quam
mendofo
addide-
runt. ut
fo. li. copo-
sitione
bar-
bare. in-
scrip-
tione
facilius
a-
parent.

actis sambucus est chāmæactis non dicit ueritatem, & hæc apud nostros rusticos lores dicitur.

L I.

CYNOGLOTTICE, uulgo de cynoglossa.

R. Cynoglossæ, opii, eminis, iulquiami, ana. 3. iij. myrrhæ, trogloditici. 3. vi. olibani. 3. v. gario. 3. ii. cinnamomū, cozū bri ana. 3. ii. confice cum rhodostomate. i. cum aqua rosata, & fermentur inde pilulæ admodum piperis, ex quibus .v. aut vii. eunti dormitum exhibeantur.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ apud nos sunt in usu, sed nō utimur ipsis scdm istam descriptionē: illa uero descriptio quæ utimur fuit posita supra sub noīe pilulæ ad omnes morbos catharrales: etiā supra habita est una alia descriptio de mente Alexandri ut supra ostensum fuit. Gilibertus de Anglia in cap. de causis tulsis, habet unam aliam descriptionem & eadem est.

Cynoglossa est herba dicta lingua canis similis cynoglossæ. i. plantaginis maioris, nisi quia non sunt ei costæ apparentes in foliis eius, sed sunt leuia fatis. hæc apud nos in pratris ac iuxta uias nascitur cum flore purpureo, tendente aliquantulum ad rubedinem. falsi autem herbatici ignorantibus apothecariis uendunt pro lingua canis quinque neruiā seu lanceolam, sed ignorantia est in utrisq;

Cozumbrī. i. fæx stioracis liquida, secundum Compositore est stiorax rubra, seu timiama, seu thus Iudæorum in medio stioracis calanitzæ, aliquando cozumbrum inuenitur ei adhzrens.

Myrra trodytica. i. myrrha troclites, siue simira, siue myrrha rotunda minuta optima ac odorifera. Circa instans ait: Myrrha gūmi est cui usdam arboris: cuius eligenda est clara & citrina, uel subrufa, interius aliquantulum lucida et grossa, & alia est myrrha minuta, alia est crassa: et illa myrrha troclitem dicitur uel a loco, ut quidam dicunt dicitur myrrha troclidem, potest seruari per centum annos.

L II.

A R A B I C E.

R. aloes. 3. v. brioniz, quinq; myrob. masticis, diagrydij, asari, rosarum ana. 3. viii. confice cum succo caulium, uel absinthij addendo croci. 3. i. castorei. 3. iij.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. Gilib. de Angl. in ca. de cura arthritice scdm magistros habet unā aliam descriptionē, & eadem est: illa uero descriptio quæ scribit Lumen malelucens non est fienda, quia desicit crocus in pondere.

Brionia. i. cucurbita agrestis. hæc apud Dios. uocatur am pelos leuce, uide de ipsa in confectione de alsefiera.

L III.

DE HIERA MAGNA.

R. Specierum hieræ picræ magnæ. 3. iij. cum mellæ rosato fiant pilulæ aut cum succo absinthij.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ sunt in usu sub noīe pilularum de hiera magna: quidā uocant ipsas de hiera cōposita: cuius descriptio fuit supius posita sub noīe hieræ picræ magnæ, & istæ omnes pilulæ supradictæ sunt de mente Nicolai.

EX ANTIDO. IOAN. SERAPIONIS.

L IIII.

AD febrem quartanam.

R. Costi amari, spicæ, aromatica, chamedreos, cinnamomi, croci, asari, cimarum, squinatī, carpobalsami, amomi, scordeonfolij, aristolochiæ rotundæ, polij, masticis, garyophyllorū, gentianæ, ellebori nigri ana. 3. s. epithymi cretensis, agarici, polypodij, myrrhæ, ana. 3. iij. aloes abluti. 3. ix. terantur & conficiantur.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu: & ualēt mirabiliter contra quartanā. idem Io. Sera. habet unā aliam descriptionē: sed hæc est nobilior dixerunt quidā experimentatores, si accipiatur cū uino albo quatuor folia pentaphyllonis puluerizati, iuuat & destituit quartanam in matutinis tribus aut

quatuor. Et si dentur de ipsis foliis tria ualent tertianariis, infra apparebit una alia descriptio harum pilularum, quæ etiam sunt optimæ.

E X R A S I.

L V.

COMMVNES, in. 4. Almanf. cap. de pestilentia, & in. 4. cautela.

R. Aloes. 3. iij.

Croci,

Myrrhæ,

3 an. 3. ii.

Dentur ex eis in principio pestilentie.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ apud nos sunt in usu sub noīe pilularum cōiū. etiam sunt in usu sub noīe pilularū sine custodia. Aut. in lib. 4. in cap. de præseruatione a pestilentia habet unam aliam descriptionem, sed ipse non ponit dosim specierum. Franciscus de Pedemontium in cap. de cura pisionum cordis ex ære pestilentiali habet unam aliam descriptionem sic dosando. & aloes, croci, ana. 3. ii. myrrhæ. 3. i. s. moderni generaliter faciunt ipsas ut docet Rasis, & debent confici cū uino albo claro subtili & odorifero Francisus autem uult quod conficiantur cum acetate.

L VI.

CEPHALICE, uulgo COCHIE. in. 9. Almanf. cap. de cephalæa, & hemierania.

R. Pulueris Picræ. 3. x.

Colloquintidæ. 3. iij. & tertiam.

scamoneæ. 3. i. s.

Turbith,

Stœcados

3 an. 3. v.

Misce, & fiant pilulæ. & sunt doses decem.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu maxime scdm istā descriptionem, dicuntur autē cochig. i. capitales cochos græce q̄ est caput eo, quod mundificat caput. apud Haliabatem pilulæ cōiā sunt pilulæ cochiz. Mesue in suo gradadin in cap. de cura purgijis conferentibus sode frigide habet unā aliam descriptionem quæ sunt ex autoritate filij Zachariæ, & est eadem in simplicibus, sed in pōdere nō ipse Mesue adiungit pōdus stœcados & turbith. idē in ca. de soda ex aggregatione cholæræ, & phlegmatis habet unā aliam descriptionem: quæ est ex autoritate Gal. sed eadē nō est. Nicolaus habet unā aliam descriptionem quæ est de mente Rasis quæ in simplicibus eadem est, sed in pōdere adiungit ut Mesue. idē habet unam aliam quæ est de mente Gal. sed non est in usu. i. uero intentio medicorū est quod ipse debeant fieri scdm intentionē Rasis. nō oportet addere nec minuire dosim specierum si uero intentio eorū sit aliter facias ut præcipiunt.

Picra. i. amara. o quanta diuersitas opinionū inuenitur in hac puluere picræ uidelicet quia est illæ puluis picræ quæ intelligit Rasis gñaliter habetur opinio quod ipse sit puluis specierū hieræ simplicis Gal. & sic uult Lumen malelucens sed non recte: quia Rasis in. 9. Alman. in cap. de dolore & apostemate stomachi habet unā descriptionem pulueris picræ, & hic est qui administrari debet in istis pilulis, & descriptio hæc est R. pulueris rosarū rubearū, spicæ, masticis, xylobalsami, carpobalsami, cinnamomi, xylocasie, asari, ana. 3. s. aloes succotrensis ad duplū pōderis oīum, quod bene tritū cum alijs misceatur medicinis tritis, & hic est puluis de quo intelligitur. uerū est q̄ ipse descriptio nō differunt nisi in una re. uidelicet quod Rasis habet rosas. Gal. non, G. habet crocum. Rasis nō in reliquis cōcordat.

Colloquintida. i. cucurbita deserti. Mesue loco eius habet trochiscos alandahal. 3. viii. Scamonea est succus cuiusdam speciei uolubilis. Rasis autē scamoneam. Mes. habet scamoneam antiochenam cōctam in cytonio. ergo est diagyrdion, & prædictæ pilulæ secundum plurimum debent fieri cum succo absinthij, aut cum uino albo.

L VII.

DE HERMODACTYLIS, in. 9. Almanf.

cap. de podagra, & sciatica.

R. Hermodactylorum, satyrion, meizara ana. 3. v. hieræ picræ

pitrac. 3. x. colloquintidz, cetaurez minoris, an. 3. v. euphorbii, 3. ii. turbith. 3. x. feitaragi indi. zingiberis, sinapis, piperis calforei, ana. 3. i. informetur ex eis pilulæ ex quibus a duabus. 3. & s. ad tres sumantur.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pilulæ apud nos nō sunt in usu, s̄m istam descriptionem. idem in libro diuisionum circa huius habet unam aliam descriptionem quæ quasi eadē. est illa uero descriptio qua utimur est de mente Mesue ut ostensum fuit. Hermodactylus græce est dictus Hermetis digitus. Diosc. de ipso uidet loqui sub noīe coltico sicut apparet apud Serapion. cap. de hermodactylo. Satyrion est radix dicta ab Auic. testiculis uulpis Pli. ait Satyrionis duo sunt grā unū longioribus foliis oleæ, caule quatuor digitorum, flore purpureo, radice gemina ad formam hominis testiculorum alterum uide apud eundem, de quo etiam dictum est in diastatyrion.

Mizaran. i. meizara, & dicunt quidam quod est taspia, ab aliquibus dicit esse mezerion, quod etiam uoluisse Raf. nā in descriptione pilularū de hermodactylis in fine libri diuisionū loco meizahara posuit mezerion. Auic. in. 2. can. uocat ipsam mehezeregi, & dicit. est arbor sicat arbor scabrā. i. esulæ uerum tñ est lōgior, in cuius colore est cine reitas ad cernitatem declinans, quidam uero hoies nūme rauerunt ipsam inter lacticinia. Sera. de hac dicit quod confert doloribus iunctorum & articularū, & addit: & dixerunt quidam quod uiderunt in foliis huius plantæ id quod dixi in arbore agie. & hoc est quod quā ponitur in fluuiis inebriat pisces, neque per id cognoui quid sit. Io. Arculanus in cap. de podagra dicit. Meizara. i. fenæ quod Deus scit.

Sataragi indi. i. agricardamum agreffe. Rafs. in lib. diuisionū, ubi ut diximus scribit aliā descriptionem pilularū de hermodactylis, loco feitaragi indi. posuit taspia indā: ex quo apparet ipsum uelle quod feitaragi indi sit taspia inda. eandem opinionem habuit Francisc. de Pedemontiu in descriptione trochiscorum de spica ut ostensum fuit supra.

EX AVICENNA.

LVIII.

DE TAPSIÆ, in 5. can.

3. Serapini, armoniaci, euphorbii, bdellii, opopanacis ana. 3. i. aloes, epithymii, agarici ana. 3. i. s. aristolochiz rotundæ. centaurez minoris, calforei, an. 3. ii. macropiperis, zingiberis, cymini, ameos, feminis anisi, apii, mirrhæ, croci, ana. 3. i. myrobal. citrinorum, hermodactylo rum, almeheizhengi. an. 3. ii. sinapis, taspia, pulueris colloquintidz, ligni aloes, acori, falsi indi. an. 3. i. confice cum aqua alchechengi. i. solatri minoris, & fiant inde pilulæ.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Dicuntur de taspia maiores ad differentiam minorū, & eo quod plura simplicia ingrediuntur: taspia autē est feitaragi, & est quam Diosc. lepidium uocat & scdm Gal. est genus erucæ, & est agricardamum agreffe. i. nallurtium aquaticum seu fenation, ut ostensum fuit supra in triphera faracenica.

LIX.

DE DENDE, ibidem.

3. Cinnamomi excorticati, acortice suo superiore: de quo proijciantur linguæ repetz inter duo frusta granorū: dein de succi liquiritiz, agarici, albi, alcheiati, & herbæ eupatorii, absinthii, aloes, an. partes æquales: tere & confice cū aqua apii, & informetur pilulæ paruz, & ille qui de eis facit pilulas inungat manum suam oleo balsami odorifero.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Fran. de Pedemont. in cap. de dosi habet unā aliam descriptionem, quæ eadem est. Dende uel denden. scdm Auic. in. 2. can. est quæ est sceni. ex ea est sicut fistici, alcestriz est fistis alcherua rubea habens puncta nigra. & inda est minor alsceni, & maior alcestriz, eius medulla est cineritia declinans ad citrinitatē. idem ait Serap. sed dicit: Aliud est sceni, & aliud non quidā amicus fideliter dixit mihi quid huiusmodi graui reperitur in Hispania super arbore dicta scortani, & ipso ligno utitur tinctores.

ad tingendum pannos: tamen Deus scit, scdm Franciscū est. species graminis uel cataputia quod ignoro: uerum aliquā reperit: deinde p. cataputia. i. cherua. Alcheiati alias cheia ti. Franciscus loco eius hēt alchehēgi: ergo est solatrū minus, sed Gētilis sup hoc canone dicit: Alcheiati. i. galbana.

LX.

DE GARYOPHYLLIS, in 3. fen. vi.

cap. de cura foetoris oris.

3. Garyophyllorum galangæ an. 3. s. musci camphoræ ana. danc. i. pyretri. 3. i. aloes. 3. iii. sinapis. 3. i. fiant pilulæ cum uino.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Mesue in eodē cap. habet troch. de garyophyllis Nico. Flo. in lib. 3. in cap. de foetore oris habet unam aliam descriptionem, & eadem est huius. Danc. est pondus octo granorum hordei.

LXI.

DE SANDARACHA, in 3. fen. xvii. cap.

de liquidis quæ ponuntur super eas, & quibus embrochantur.

3. Sandarachæ, corticis ouorum, fumiteræ, feminis porri an. 3. iii. falsi armoniaci. 3. ii. scoriz ferri. 3. iii. fiant ex eis pilulæ sicut nabac.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Franciscus de Pedemont. in cap. de hæmorrhoidibus & medicinis eius habet unam aliam descriptionem quæ est similis huic. Sandaracha uero secundum modernorum opinionem est uernix: non est autem auripigmentum rubeum ut dixerunt quidam, & arbor ferens uernicem iuniperus uocatur.

LXII.

EFFVMARIA, uulgo de FVMOTERAE.

in 4. fen. 7. cap. de cura scabiei, & pruritus.

Citrinorum,

3. Myrobal. Chebulorum,

Nigrorum,

Aloes succotrensis, 3. vii.

Scamonez. 3. v.

} ana. 3. v.

Sine cessatione conficiantur cum aqua fumiteræ, & dimittantur donec exsiccetur, & imbibantur uice altera, & dimittantur donec exsiccetur, & fiat illud tribus uicibus, et in omni uice fiat sicut forbitio: deinde dimittatur donec inspissetur, & compactum fiat & fiant inde pilulæ.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu. Nicolaus in suo antidotario habet unam aliam descriptionem quæ uidetur quasi esse eadem, sed hæc est qua utimur. Fumiteræ est herba quæ habet folia similia danco, nisi quia sunt magis minuta & amariora, & habet radicem: cuius color uergit ad albedinem, hæc apud nos in uis ac pratis & in rupibus inuenitur. Gal. in 6. simp. dicit: Xeitrig. i. fumisteræ sicut in sapore xeitrig Arabes uocant ipsum scetheterig.

EX PETRO TVSSIGNANA.

LXIII.

DE OPIO, in cap. de phrenesi.

3. Opii,

Croci,

Cassiz lignæ,

} ana. 3. iii.

Fiant pilulæ cum uino albo.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. Opium est succus satis noster. Sera. in cap. de papaueri ait: Gūni uero papaueris nigri est opium. Liber qui dicitur Bulchasis docet modum ipsius: & dicit quod sit ex lacte papaueris nigri: Opium uero ab opos quod est lachrimum nomen extrahit.

EX BARTH. MONTANA.

LXIII.

DE RHEPUTITICO, in Ant.

3. Succi cucumeris asinini, arthanite an. 3. i. s. rheuponti. 3. ii. aloes succotrensi. 3. i. diagridii. 3. i. o. rob. i. siccleos. spicz, ligni aloes ana. 3. s. fiant pilulæ cum succo apii.

Lumi. Ma.

M 2

COMMENTA. MANLII.

Iste pillulæ apud nos non sunt in usu. Rheuponticū uero est barba fristā, & est radix similis rheubarbaro, & propter id multi mercatores ignorantibus apothecariis uendunt mixtum unum, cū alio, sed potest cognosci: quia rheubarbarum optimum quando masticatur causat saluam rubeam similem tincturæ croci. rheuponticum uero habet cōtrarium dicitur autem rheuponticum a rheu, quod est radix, & ponticum, quia in pontico insula reperitur. Diosc. aut ait: Rheuponticum nascitur in Bosphoro, & est radix similis centaureæ maiori. Sera. nec de rheupontico, nec rheubarbaro facit ca. uerum facit cap. de rheu. & dicit raved. i. rheu. & dicit idem quoddic Diosc. de rheupontico, sed moderni per raved nō intelligunt rheupōticū, immo rheubarbarum, de quo uide Melle in ca. proprio de rheubarbaro. Credo quod antiqui utebantur per raved rheupontico. Arthanita idest panis porcinus de quo infra in unguento de arthanita.

LV.

DE DIAMVSCO.

R. Musci, myrrhæ an. 3. iiii. itecados, rubæ tinctorum, pullegii, corticis citri, piperis longi, corticum casia lignæ, corticum casia interioris, granorum pæonia, calami aro. an. 3. vi. spicæ. 3. s. fiant pillulæ cum succo artemisiæ, idest matris herbarum uel altitiz.

COMMENT. MANLII.

Has pilulas non habemus in usu. idem in suis consiliis in consilio de præfocatione matricis ex uocamento ipsius habet unam aliam descriptionem, sed differt ab hac mater herbarum adoptata herba quæ antepetmis uocatur.

LVI.

ASSAIARET.

R. Hieræ picræ. 3. i. Mastiches, Myrobal. citrinorum, } ana. 3. iiii. Aloes hepatici, * 3. ii. Fiant pillulæ cum syrupo de stœcade.

COMMENTA. MANLII.

Has pilulas habemus in usu, & sunt ex autho. Auic. sicut reperitur in 3. can. in sensu in ca. de canonicis utilibus curationis. nam ibi inquit. solutina uero facilia ad purgandū caput uel afeiciat sunt. ex quibus sumatur pillula magna ut paruum pondus operationem efficiat sufficiens cum mora, & uo noceat propter paruiteratū suam iteratio, & dormiat super ipsa ne destruant motus & uigilæ eius operationē, & canon quidē in eis est aloes & hiera, deinde cadit in eis mastix ad confortandū stomachū, & recipiuntur in eis myrobalani ut prohibeant uaporē acutum & ec. ipse Auic. nō ponit dosim ipsarū rerū, sed fecit Gentilis loco allegato ponit dosim ipsarum rerū, & est sicut est dosim Bartholomæi, & sic generaliter secundum istam descriptionem. consueiuntur.

LVII.

DE HIERA composita.

R. Aloes hepatici. 3. xiii. cinnamomi. spicæ nardi, costi, squinanti, xylobala, xylocastis, masticis, alari, rosarum, cinnamomi, absinthii an. 3. i. agarici, colloquintidæ, turbitich, bdelli mollis an. 3. i. fiant pillulæ cum syrupo de stœcade.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pillulæ sunt in usu, tamē non ualde. Quidā apothecariorum dant pilulas de hiera magna pro pilulis de hiera composita, sed non sunt idem secundum intentionē Bartholomæi: ut patet si legis istā descriptionem de hiera composita cum descriptione de hiera magna quæ superius posita est. Cinnamomi. i. cannella fina subtilis & electa: ut est notū hic Bartholomæus in ista descriptione pilularum de hiera composita ponit bis cinnamomum, cuius cām ignoro, sed secundū quosdam debet dicere cinnamum. i. cinnamomum grossum, aut potest dicere amomum, ut uolunt multi.

EX OFFICINIS, uulgo MAGISTRALES.

LVIII.

IMPERIALES.

R. Cinnamomi, amomi, anisi, masticis, cārdamomi, zingiberis, zedoaria, macis, nucis muscatæ, garyophylorum, eroci, cubebæ, ligni aloes, turbitich, tereniabin. i. mannæ puræ, agarici, folliculorum senæ, spicæ nardi, quinq; myrobalanorum. an. 3. i. rheubarbari ad pondus omnium, aloes succotrina ad pondus supra scriptarum receptarum, conficiantur cum syrupo rosato & uiolato quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Istas pilulas apud nos habemus in usu, maxime secundū istam descriptionē, secundum quosdā dicuntur imperiales quia inuenta fuerunt a quodā imperatore, uel dicuntur imperiales, quia sunt in usu multū, apud reges tamen eius descriptionē ab authoribus non repperi. uerū secundū quosdā istæ pillulæ dicuntur describi a Rainaldo de uillanova, sed ego in practica Rainaldi qua utimur non repperi. Christophorus aut de honestis posuit pilulas magistrales pro regi bus inuenta, nec reperit a quo autore sit descriptæ, tamen ibi describit suam descriptionē, & est eadem cum ista uisi solum in una re, & illa est spica nardi. secundū aut Lumen malelucens, pilulæ imperiales inueniuntur in Nicolo. sub nomine pilulæ aliz ante cibū & post cibū, sed uidetur eē falsus textus. nā illæ pillulæ quas describit. Nicolaus sub nomine pilulæ aliz ante cibū & post cibū non sunt pilulæ imperiales quibus utuntur medici. Et si tu legis descriptio nē pilularum imperialiū uel pilularū ante cibum, apud Lumen apothecariorum non sunt pilulæ imperiales, pilulæ ante cibum, nec post cibum, sed istam descriptionem aggregaui cum multis aliis descriptionibus, & inueni eam optimā. Et sic secundum istam consuei uolunt nostri medici.

LIX.

AD QVARTANAM.

R. Sagapeni bene gummosi, colloquintidæ an. 3. ii. diagrydii. 3. ii. falsi gemmæ. 3. i. fiant pillulæ cum uino albo ad modum ciceris, capiat unam singulo die ad uiginti dies, saluo quod non capiat illa die qua febris uentura est.

COMMENTA. MANLII.

Istæ pillulæ ualent multum ad quartanarum uerum eius descriptiones sunt diuersæ & differunt inter se. Supraposita fuit una alia descriptio quæ est de mente Ioan. Sera. sed ille non sunt ualde in usu Ioan. Mattheus gradi in sua practica habet unam aliam descriptionem, sed non est eadem.

Peroratio in x. sectionem.

Aggregauimus in hac dissectione diuersarum descriptionum pilulas ex illustrium medicorum libris excerptas quæ deseriui possunt intentioni cuiuslibet practicanis. Transibimus nunc ad sectionem de suffus & pulueribus si nos direxerit ille quæ cæli condidit ornamenta.

LV MIN. MAIORIS. SECTIO VNDECIMA.

PVLVERES, uulgo SVFFVS continens.

EX ANTIDOTARIO MESVE.

I.

DE LIGNO ALOES.



RECIPE ligni aloes. 3. iiii. cārdamomi, mentz sicce, spicæ, marmacur, cyperi, corticis citri, ana. 3. ii. galliz, squinantii, an. 3. i. masticis, anisi, apii, an. drach. ii. zuechari ad pondus omnium, da cum miua.

COMEN. MANLII.

Suffus autem istud in usu non est: ualeat autem tantum dicere suffus quantum pulvis subtilissimus sicut alcohol.

Marmacur apud Auic. uocatur maru, & ibi distinguitur plures species, & secundū opinionē Iudei est marubiu, sed si diceret

• Alii. 3. ii. mēdo. se corri. gunt.

diceret marmacor esset mellis siue citraria.

II.

AROMATICVM.

R. Anisi aur. xii. seminis feniculi au. iiii. liquiritiz, zingiberis an. aur. iiii. garyophyllorum, macis, cinnamomi, galangæ an. aur. ii. galliz mulfatæ aur. i. ligni aloes, corticis citri an. aur. i. s. musci boni. j. quartam, zucchini tabarzethi. i. albi ad pondus omoiuni, zucchari nabet, id est zucchari candi di medium pondus omnium.

COMMEN. MANLII.

Non est in usu.

III.

IMPINGVATIVVM BONVM.

R. Farinz cicorum infusorum in lacte dulci & exiccatoru, & iterum infusorum in lacte & exiccatorum, & sic fiat tertio: deinde coctorum j. vi. rizi ablutit multotiens j. ii. tritici, & hordei exccoriatorum & ablutum multotiens exiccatoru, & multotiens infusorum in lacte & exiccatoru an. j. iii. amygdalarum dulcium j. v. papaueris tortellarum de sem. i. panis asii. an. j. iiii. zucchari tabarzethi lib. iterantur & da ut orbeat omni die mane j. iiii. postquam decoquitur cum lacte, aut cum aqua cicoris.

COMMEN. MANLII.

Rizum semen est notum. Græci uocant ipsum oriza granum. Auic. in 2. cano. uocat rizon: idem in 4. can. in Fen. 6. inquit cum alicui datur in potu cortex rizi: secundum quod dixerunt quidam primorum accidit statim dolor in ore & in lingua, & apostematatur lingua eius: deinde extenditur dolor in umbilico & stomacho & intestinis eius & inflammatur totum corpus eius, & nominat est in uenenis, de cura uide ibi.

Triticum. i. frumentum. Iudaici: Triticum uel a rritura dictum q̄ purissimum horreo condatur, uel quia granum eius commolitur & teritur.

III.

DE GRANIS MYRTI.

R. Granorum myrti, granorum granatorum acetosorum tostoru, an. j. xx. cimini carmeni infusi die ac nocte in aceto, & exiccati, & coriandri sicci similiter infusi & exiccati, & torrefacti, & sauch, anabac, charub de spinis, sumach, glandium an. j. x. curti, & tarathit an. j. v. confice & da.

COMMEN. MANLII.

Cyminum carmenum; secundum Serap. ex auctoritate Rasis est cyminum agreste: & secundum Auic. est nigrum: & secundum Mattheum Syl est sileosus, sed non recte: uerum hodie loco sileosus ponitur.

Sauch. i. hordeum, & secundum Rasin est hordeum uel triticum fractum in parua frusta. Auic. in 2. inquit Sauch id dictum est in cap. tritici & hordei, in ca. uero de hordeo dicit. Aqua hordei est nutritior sauch. Auer. in 6. coll. frumentum fractum post lotionem in aqua infusum: deinde coctum sauch uocatur. hæc est polenta. Nā ubique: in Dios. habetur polenta. Serap. eodē loco ex uerbo Dios. habet sauch, & hoc nomē cadit super multas res: nā pot fieri sauch ex filigine & ex cucurbita. Vnde Circa instans in capitulo de hordeo narrat. ex hordeo multa sunt quæ cōpetunt usui medicinz scilicet polenta, far, & farina, & aqua polentæ fit ex farina & aqua, & sic de singulis. Moderni per sauch simpliciter uolunt intelligi hordeum immaturum.

Anabac siue nabach est fructus arboris dictæ apud Dios. agrifolus, & apud Auic. est fructus arboris dictæ fadar, & hic fructus plura nomina habet nam Dios. uocat ipsum agri folium & locos. Plin. lotosus fabam græcam. Isidor. ait: Mella quam Græci loton appellant que uelgo propter formam & colorem faba Syriaca dicitur, quidam uocant ipsum granum anseem, & est fructus rubicundus quem nostri barbarici laurum syluestre uocant quidam uocant iubas, syluestres, sed prima expositio est melior. uide de ipso in synopo de fructibus.

Charub apud Arabes dicitur xylocacta: ergo est siliqua siue bazania q̄ in maricinis partibus inuenit. Auic. in trochiscis alindacarcon. i. andromaci putauit, sed non recte ipsum

esse darisfahan: & posuit xylocactam ibi loco darisfahan, q̄ est cortex buzee quod non creditur.

Cart. i. gummi arabicum, & eius arbor secundum Sera. est arbor acaciæ. Gentilis super tertio canonis in cura lubri citatis stomachi dicit. Alchotti. i. acacia. uerum moderni coarentes ueram acaciā faciunt ex fructu prunellorum syluestrium, & inuenitur idonee uirtutis.

Tarathit est similis fungo quæ in radice plantæ dictæ barba hircina siue rosa canina nascitur: & fit ex eo hypoquiltidos. apud Auic. uocatur henstifides Ioan. Sera. in suo breuiario in cap. de egritudinibus quæ accidunt in naso dicit q̄ hypoquiltidos est barba hircina.

EX ANTID. BART. MONTA.

V.

CAPITALIS.

R. Pulegii, calamenti, corticis citri, moioranzæ, stœcados, betonice, sandaracæ, garyoph. an. j. iii. misce & fiat puluis, et ponatur super caput in loco commissure agrotantis.

COMMEN. MANLII.

Sandarax siue sandaraca secundum Moder. est urnix scriptorum, ut inquit Serap.

VI.

PRO OCVLIS.

x. Sifeleos, euphragiz, fenicoli, cubebaram, an. j. s. grano rum paradisi, macis, an. j. i. cinnamomi cimini, an. j. ii. folio rum rosifmarini. j. s. anisi. j. s. misce & fiat puluis subtilis.

COMMEN. MANLII.

Grana paradisi est nux sarta, quæ alio nomine melegeta uocatur, & est quam Auic. in 2. can. uocat cobzbague, & dicitur melegeta, eo q̄ habet grana ad similitudinem grani melicæ hæc apud modernos uocatur heil & est cardamomum maius, ut ostensum fuit supra in electuario de gemmis.

EX RAINALDO DE VILLA NOVA.

VII.

PRO BOTIO, in lib. 2. cap. de botio gule.

R. Spongiz marinz, paleæ marinz, osis sepiz, pipenis longi, & nigri, zingiberis, cinnamomi, salis gemmæ, pyrethri boni, gallarum, spinæ rosarum an. omnium j. ii. hæc omnia puluerizentur excepta spongia marina, & palea quæ debet comburi, & cinis ex eis factus cum prædictis debet admisceri, & omnia debent cribrari, & da hoc puluere pluries in die teneat in ore, & in nocte.

COMMEN. MANLII.

Iste puluis debet leuari in pisfide ligni, uel in sacculo decorio, & debet cooperiri ne uirtutem eius amittat.

Iste puluis per me fuit expertus mirabiliter in illa materia ualere, & egomet de ipso feci plura experimenta. Verum iste puluis inuenitur etiam in antidotario Bartholomei de Montagnana, sed non ualet tantum. idem inuenitur in antidotario Dini Florentini qui minus ualet.

Palea marina secundum modernorum opinionem est balla marina cuius forma est rotunda prout balla, & eius similitudo est sicut botra. & hæc inuenitur in partibus Ianuæ citra mare, & inuenitur super quadā planta quæ folia habet longa ficut corrigia & in fundo ipsius plantæ inuenitur quedā tuberositas grossa facta in modum fungi, & hæc apud multos mercatores spuma maris uocatur, & supra hæc plantā nascitur qui dam globus in modū pile rotundæ factus in colore supradicto, & hæc est palea marina seu balla marina: & est id quod de illa planta administratur, hæc quidā mercatores Ianuenses algam uocant, & hæc est quā Dios. alofathne insidens uocat, & modus adfusions ipsius est iste, incide eam minutim cum manibus in quantitate quā uolueris: deinde pone ipsam in olla terrea & ponatur in furno panis per duos dies & totidem noctes tantum quod in colore efficiatur nigra uerū nigredinis, postea depone & usui referua, & eodē modo fit de spongia, uerum spongia non efficitur tam nigra in colore, immo parum ad rubredinem declinans.

Os sepiz est os q̄ inuenitur in corpore cuiusdā piscis sic Lumi. Ma.

M 3

vocati. Iſid. in cap. de piſciſibus inquit ſepia dicitur, quia ſepi-
bus intercluſa faciliſ capitur. in cocundo obſcenum ge-
nus. ore enim concipit ſicut uipera. Circa inſans ait: oſeſe-
pia inuenitur in uentre ſepie.

Spina roſarum, ſecundum modernorum opinionem eſt
quædam res ſimilis ſpongiæ quæ naſcitur circa hortos ſuper
quædam planta quæ apud Dioſ. uocatur cynoſbatus, & hæc
eſt ſpongia quæ utitur aliquando in ecleſiis ad aſpergen-
dum aquam & eſt illa quæ a multis bedeguard uocatur, ſed
non recte. Dinus Florentinus loco eius habet bedeguard,
quod credit eſſe idem ſed non recte, etiam multi medicor-
um putant quod bedeguard fit illa ſpongia, ſed errant ut
oſtenſum fuit in ſyrupo de eupatorio.

EX NIC. FLORENTINO.

V I I I.

CORDIALIS, confortans cor. in. iiii.

capit. de ſyncopi.

R. Lapidum pretioſorum iam pluries dictorum. ana. 3. 5.
amborum corallorum. an. 3. ii. oſis de corde cerui, ſpodii,
limaturæ auri & argenti, charabæ, ana. 3. ii. croci, xyloaloes
ana. 3. i. cinnamomi electi drac. iiii. & ſunt qui addunt cry-
ſtalli & ambræ ana. dra. 5.

COMMEN. MANLII.

Iſte pulvis ſecundum intentionem Nicolii eſt expertus
ad confortandum cor. Hodierniſ tamen temporibus diuerſi-
ſimode fit iſte pulvis ſecundum diuerſitatem regionum &
deſcriptionem, per lapides uero præſtitoſos intellige fragme-
ta quinque lapidum pretioſorum poſitorum a diuo Meſue
in electuario de gemmis.

EX OFFICINIS, uulgo magiſtralis.

IX.

ADPROVOCANDVM.

R. Seminij paſtinacæ, ſeminis napi, ſeminis raphani, ſe-
minis aniſi, ſceniculi, apij, anethi, an. 3. ii. rutæ ſarigæ, cice-
rum, cinnamomi, ſinapis, albæ, ana. 3. i. cryſtalli. 3. iiii. ſalis
gemma, 3. ii. ſacchari. 3. i. puluerizentur hæc omnia ſubtili-
ter, & utatur ſæpius cum brogio cicerum, & eſt expertus.

COMMEN. MANLII.

Paſtinaca alio nomine baucio uocatur, eius ſemen uſui
medicæ competit. Macer eſt paſtinacæ uirtus in ſemine
tantum & radice ſua.

Napus ſcilicet napus domeſticus qui alio nomine nauo-
ni dicuntur. Pli. naporum duas differentiâs in medicina græ-
ci ſeruant anguloſo foliorum caulibus florescentes & quod
bumon uocant. Dioſcor. autem in cap. de bumas inquit bu-
mas id eſt napicum & eſt ut rapæ radix quæ elixa comeditur
ut eſt notum apud omnes ſecundum Bartholomæum
Montaganani in ſuo antidotario.

SACCVLVS temperatus pro corde calido.

R. Sandalorum amborum, roſarum, corallorum amborum,
ſpodii, camphoræ, foliorum myrti, boraginis ana. 3. i. been
albi & ru. corticem citri, nucis muſcatæ, letæ, combuſtæ, ſpi-
cæ, oſis de corde cerui, granæ tinctorum, foliorum lauri,
garyophyl. zedoariæ, ligni aloes, ozimi, roſiſmarini, cubebæ,
barum, meliſſæ ana. 3. i. mulci gra. iiii. ambre, croci, ana. gra.
iii. contundantur, & fiat ſacculus.

COMMEN. MANLII.

Iſte ſacculus apud nos non eſt in uſu, tamen noſtri docti
laudant iſum: nam ſcias quod ſacculorum funt plura gene-
ra ſecundum diuerſitatem inſumitum, & propter id gene-
raliter medici ordinant eos ſecundum ſuam uoluntatem, di-
citur autem ſacculus, quia illæ res in uno ſacculo ponuntur,
& ſuper dolore apponuntur.

Grana tinctorum ſunt grana dicta chermes, & ſunt grana
quibus inuunt tinctorum ad eingendū ſcarlatum, & hoc eſt
quod apud Dioſcor. coccus infectiuus uocatur. inde de Domi-
no dicitur q̄ habebat ueſtem coccineam. i. de ſcarlatto.

XI.

Sacculus frigidus pro corde.

R. Roſarum, bugloſſæ, ſtorum boraginis ana. 3. ii. s. corici
citri, fol. myrti, corallorum amborum, coriandri præparati. an.

3. i. s. camphoræ 3. ii. ſandalorum, utriuſque ana. 3. i. s. mi-
ſcæ, & fiat ſacculus.

XII.

Sacculus carminatiuus pro ſtomacho.

R. Seminis apij, aniſi, ſiſeleos, ſcenicoli, apij macedonici, ru-
tæ. ſ. ſeminis iſpſus ana. m. s. origani, calamiti ana. m. i. s. hyl-
ſopi, pulegij, ſtorcadus, rutæ, ſiccæ, chamædij, os, chamæpi-
tyos an. m. i. abſinthij. m. ii. calami aromatici, cinnamomi,
fruſtorum garyophyllorum ana. 3. ii. macis 3. iiii. contundan-
tur omnia & fiat ſacculus.

XIII.

Sacculus pro ſtomacho frigido.

R. Pulueris mentæ, abſinthij, lambrule, calamiti, pulegij,
an. 3. ii. garyophyllorum. 3. iiii. nucis muſcatæ, maſticis, ma-
cis an. 3. ii. galangæ. 3. s. roſarum rubearum, coriandrorum
præparatorum ana. 3. ii. galliæ muſcatæ. 3. i. miſcæ.

COMMEN. MANLII.

Menta eſt herba ſatis nota, maxime hortulana ſue cois.
Pli. ait. Menta planta uel ſi nondum germinat ſpongia mi-
nuſ hæc humido gaudet, æſtate uiret, hyeme flauſcit, ge-
nus eius ſylueſtre mentaltrum eſt mētæ nomen ſuauis odo-
ris apud græcos mutauit: cum alioquin mintā uocaretur.

XIII.

Sacculus pro ſtomacho.

R. Ligni aloes, abſinthij, calamiti betonicæ, maſticis, thu-
ris, cyperi, coſti, cymini, ſcenicoli, roſarum uiticellæ an. 3. i.
cubebæ, maſticis, cinnamomi, garyophyllorum, ſpicæ,
nucis muſcatæ, piperis albi & longi ana. 3. s. calami aroma-
caſiæ lignæ corallorum rubeorum an. 3. ii. ex his pulueri-
zatis fiat ſacculus in forma ſcuti.

COMMEN. MANLII.

Viticella ſecundum Math. Syl. eſt ſeſclera ſue ſeſire; ergo
eſt bryonia quæ apud Dioſcor. Ampelos leuce uocatur; ſed
ſecundum Simonem Ianu. eſt ſeſclera ſin. i. uitis nigra, ſue
ampelos melaniæ ut apud Dioſcor. in hac diſcordia neliçio quid
dicam, quia ſecundum intentionem Math. Syl. eſt bryonia
ſue uitis alba; & ſecundum Simonem eſt uitis nigra, ſed
igitur concordant uerum ſecundum plures uiticella eſt uitis
nigra, & eſt planta quæ iuxta hortos naſcitur; & eſt quā
Lombardi. Tanero uulgari nomine dicunt.

XV.

Sacculus ad fluxum uentris, ſuper quo inſir

mus federe debet.

R. Originis ſumach, myrrillorum, coriandri, camemillæ. i. be-
bonig. an. m. i. s. balauitiorum, corticum granatorum, hypo-
quiſtidos, ſeminis roſarum, ana. m. i. radicem taſſi barbaſi,
cardonis, corticis & radicis mori, an. m. ii. cōtundantur cō-
tundenda & reliqua inciduntur, & bulliant in uino nigro;
deinde deponē in ſacculo, & ſacipſum federe ſuperius.

COMMEN. MANLII.

Taſſus barbaſſus eſt planta omnibus nota hæc apud Dio-
uocatur phoſmos, ſed apud Auic. in 1. cano. uocatur buſiri.
Iſidorus phoſmos, quam Latini herbam lucernarem uocant
ab eo quod ad lycinia proficiat. hæc planta apud nos
naſcitur ſuper muros & in campis, & uocant eam ruſticis
Auidon ſue Auion.

Cardo ſicardus qui apud Dio. uocat diſpacus: cuius fru-
tex eſt ſpinofa, & iſte frutex gerit quandā rē quæ uritur, ſul-
lones ad garzandū pannos & biretas. Gal. etiam in 6. ſimpli.
pharmacorū dicit Diſpacus. i. cardo Per. de cre. inquit. Vir
gapaſtoris. i. cardus, ſed falſum dicit, quia uirga paſtoris
eſt herba quæ uocatur corrigiolla & diſſert multum, ſicut patet
apud Dioſcor. de diſpacis, & apud Ser. ca. de uirga paſtoris.

XVI.

Pomum ex Laudano ſecundum Ioan. Conco-

regium, in cap. de Catarro.

R. Laudani. 3. i. ligni aloes, ſtoracis, calamitæ, coſti, ſpicæ,
olibani, an. 3. s. nucis muſcatæ, nucis cypreſſi, ſandaracæ, an.
3. i. nigellæ, cinnamomi, garyophyllorum, an. 3. ii. galliæ mu-
ſcatæ, myrrhæ, an. 3. s. ambræ. 3. i. mulci gra. iiii. uel. iiii. pulue-
rizen tur puluerizanda, & cum aqua roſata & uino odorifera,
& modico ceræ fiat pomum.

COM-

COMMEN. MANLIY.

Istud pomum est in usu, sed non ualde, Laudanum autem secundum Serap. colligitur ex una specie cussus. i. haderæ, & inquit, ex hac quidem sp. accipitur laudnum, quoniam quando capræ pascuntur ea, adhæret humiditas eis pilis earum, quia est sicut uiscus, quare apparet in costis earū & in barbis & ideo sunt homines qui colligunt illa humiditate, mundificant eā, & faciunt trochiscos & repouunt, & sunt homines qui accipiunt fucus & trahunt super plantam itam, & quod adhæret eis de illa humiditate emungunt a fuce & colligunt & faciunt trochiscos, & fortius ex laudano est illud quod est boni odoris coloris uergetis ad uirorē sub molli tactu, & quandoq; malaxatur adhæret manibus, & nō ē in eo sabulū, & non assimilatur resinæ pini, & cyprense ē huiusmodi, & qd fit in terris Arabū & alibi est grossus &c. Gale. autem in libro secretorum in cap. ad omnes ægritudines inquit, Glutinis pilorum barbæ hirci, laudani, hæc herba in cypro inuenitur & uocant eam Ladam.

XVII.

Pomum odoriferum contra pestem secundum Barcho. Montagnana in uo. antidotario.

R. Storacis calamitæ, storum buglossæ, an. 3. ii. garyophyllorum 3. i. ben albi & rubei, an. 3. i. ligni aloes 3. ii. myrrhæ, calami aromatici, nucis muscatæ, spicæ, thuris, uernicis, masticis, an. 3. i. ambræ, musci, an. 3. s. charabæ, croci, an. 3. s. acedulæ 3. iii. camphoræ, 3. ii. crisandalorum an. 3. i. rosæ, rubeæ, an. 3. iii. suc portulacæ, succi orallii, an. 3. iii. nenupharis, corticidni torrefacti, an. 3. ii. corallorum rubeorum, spodiis, an. 3. s. fyrupi de citro, boli armeni. an. 3. iii. terræ sigillatæ 3. ii. misce omnia quæ puluerizanda sunt præter ambram & muscū quæ duo de per se puluerizentur, & postea ad misceatur deinde recipe laudani insuli in aqua rosæ. & aceri. 3. iii. terebinthi lotæ cum aqua rosæ, quantum sufficit ad continuationem et mollificationē ad omnia ista, & fiat pōmum.

COMMEN. MANLIY.

Istud pomum est optimum contra pestem & est in usu Mesue in cap. de cura catarthi describit tres descriptiones pomorum quæ cum prædicta non cōueniunt. Verum ibi habet quædam simplicia quæ difficilia sunt inueniri, sed quædam hic declarabo. Primo in prima descriptione habet faufel, quod est auellana inda, & sandali mahazari qui sunt sandali citrini. In secunda descriptione habet sandaracæ quæ est uernix scriptorum, & habet bucur. i. zisenide, & secundum plures ista est alipta muscata. In tertia descriptione habet bucur seden, quod sunt plures est idem, tamē nō recte, quia ibi dominus Mesue inquit, Bucurseden an. partes viii. ergo sunt duæ res, quarum bucur est alipta, & seden est sadarum sue algalia habens bonum odorem, tamen Deus scit.

Acedulæ uero nomen multis herbis attributum, est in diuersis regionibus, nam acetosa acedula potest dici, idem tri solum acetosum, siue panis cuculi, siue aleuia idem. Macer autem de acedula speciale capitulum facit, inquit. Diximus acedulam quam Græcus dicit aizon. ergo est semper uiua. Nam aizon apud Diosc. est semper uiua, & componitur ab ai quod est semper & zon quod est uiua. uerum secundum modernos acedula est acetosa, aut est idem in uirtute.

XVIII.

Trazea confortans stomachum secundum Franciscum de Pedemontium in capitulo de cura passionum cordis per compassionem ad stomachum.

R. Coriãdri præparati 3. ii. sem. melissæ 3. s. cinnamomi electi 3. i. zuch. tabarzet 3. iii. puluerizetur & misceatur. dosis coclear unū post cibū nō sequetur potus, & ē sana & experta.

COMMEN. MANLIY.

Trazea autem sunt plures facti ex uariis rebus, ut est notum apud apothecarios. Hæc apud apothecarios Papienses nō est in usu, sed in partibus Mediolanensibus ea utuntur, & ualet mirabiliter ad confortandum stomachum, infra apparebit una alia descriptio quæ ualet contra ardorem urinx.

Coriandum siue coliaundum est semel satis notum. Eius autem præparatio fit cum uino cytoniorum & aceto, ut ostensum fuit supra.

Melissa est herba quæ alio nomine citraria uocatur, eo quod folia ipsius odorem citri habent. hæc apud Diosc. uocatur mellisophyllos: quidam uocant eam bederangiam, & ab aliis quibus ozimum citratum uocatur.

XIX.

Trazea ualens ardori urinx, secundum Nicolū Florē.

in libro. 5. in cap. de ardore urinx.

R. Seminis cucumeris, cucurbitæ, citrulli, mellonis, portulacæ, maluz, papaueris albi an. 3. i. draganti, gummi arabici uiolarum, amidi, spodiis, boli armeni an. 3. 6. zuchari ad pōdus omnium.

COMMEN. MANLIY.

Trazea est confectio reducta in puluere, & hæc est in usu apud illos qui patiuntur ardorem urinx, supra est posita una alia descriptio: quæ ualet ad confortandum stomachum, & utraque sunt uisuales.

XX.

Medicamen de turbith, secundum Auic. in lib. 4. in fen. i.

in cap. de cura phlegmaticæ.

* Zingiberis, masticis, amborum an. 3. x. turbit, sicut alcohol idest subtiliter triti. 3. x. zuchari tabarzet, idest, albi, quantum omnia & fiat.

COMMENTA. MANLIY.

Istud medicamen est in usu, maxime secundum istam descriptionem Mesue in ca. de turbith inquit: Filius Zazar medicamen bonum de turbith, & est idem in simplicibus. Niculus aut Florentinus in lib. 2. in ca. de cura febris phlegmaticæ pure per portionē habet unā alia descriptionē, sed nō est eadē tamen parti differt & differt solum, quia Auic. habet masticem. Niculus aut nō habet, idē Niculus describit unā aliam descriptionem quæ est fortior altera, sed nō est in usu.

XXI.

Puluis contra dolores post partum, magistralis.

R. Corticum cassiæ fi. & cassiæ lignæ, cinnamomi, capillorum ueneris an. 3. ii. feminis anisi, papularum an. 3. iii. teratur subtiliter, & detur cum uino albo, & est optimus.

XXII.

Puluis pro fluxu spermatis, expertus magistralis.

R. Mentæ rutæ, 3. iii. feminis agni casti, radicū ireos an. 3. ii. feminis rutæ, 3. i. feminis lactucæ, 3. ii. s. zuchari albi ad pondus omnium, fiat puluis subtilis, de quo sumat cum uino albo coclear medium ante cibum per duas horas.

XXIII.

Puluis expertus ad epilepsiam puerorum.

R. Coriandrorum præparatorum cum aceto & uino cytoniorum, 3. ii. feminis pconiz, feminis portulacæ an. 3. i. unguis asini usturum, 3. iii. misce & fiat puluis, & detur parum cum aqua rute.

COMMEN. MANLIY.

Vngula asini in illa materia multū ualet, & modus adfectionis ipsius est, quod ponatur in olla, & ponatur in furno panis, & dimittatur tantū quod eius affatio sit cōpleta. Sera. in c. de ungula ait, quidā uero existimantes hoc accipiūt unguis asini & adurunt, & curant cum ea epilepsia magnam.

XXIII.

Puluis ad frangendum lapidē in uescia expertus.

R. Milli solis, saxifragi, cinnamomi, capillorum ueneris, seminis anisi an. 3. s. liquiritiæ rasæ, 3. i. s. lapidis lycnis, lapidis iudaici an. 3. i. feminis spargorum, feminis mellonis an. 3. i. misce & fiat puluis capiat cū modico uini albi odoriferi.

XXV.

Puluis pro exitu intestini.

R. Masticis, thuris, nucis, cupressi, animonii, corticum granatorum, balustiarum, glandium an. 3. ii. misce & fiat puluis & utere, & est bonus.

XXVI.

Puluis pro stomacho.

R. Cinnamomi electi, 3. i. s. zingiberis, piperis, liquiritiæ, an. 3. s. piperis logi, garyophyllorū, galagæ, macis, cardamomi melegere, nucis muscatæ, an. 3. i. spicæ, 3. s. misce & fiat puluis addō in hyeme 3. i. zuch. albi pro qualibet, 3. i. s. specierum, & in estate adde 3. i. zuchari pro 3. i. s. specierū.

XXVII.

Pulvis dulcis ordinatus per illustrissimum dominum

Robertum Saueferinatem.

¶ Cinnamomi, garyophyllorum, corticum interiorum, cin namomi, amomi, malegeæ, striû piperum, zingiberis, foliû ligni aloes, macis, an. 3. s. cardamomi, cubebz an. 3. spice nardi. 3. s. musci gra. iiii. nucis musc. 3. s. zucch. albi boni. 3. vi. foliorum lauri numero vi. misce, & fiat pulvis subtilis.

XXVIII.

Pulvis Galatinæ.

¶ Piperis lib. i. zingiberis fini lib. ii. cinnamomi 3. ix. fusti garyophyllorum 3. iiii. nucis muscatæ 3. iiii. misce. & fiat pul vis subtilis: Iste uero fit ex speciebus aromaticis, ut est no tus omnibus. inuenitur autem gelatina piscium quæ fit quâ do pisces coquuntur in aceto: & postea congelatur acetum cum quo coquuntur, & eodem modo fit cum carnibus.

XXIX.

Pulvis piperatus communis.

¶ Piperis lib. i. s. zingiberis fini lib. iiii. croci. infusi in uino rubeo per noctem. 3. i. & 3. i. misce, & fiat secundum artem.

XXX.

EPITHEMA pro corde, ex Antidotario

Bartholomei Montagnanæ.

¶ Aquarum buglossæ, acetosæ, an. 3. iiii. aquarum florum fa licis, rosarum, absinthii, graminis, mellissæ, labruscæ, an. 3. ii. spërum cordialium temperaturum, credo qd sit pulvis cor dialis aut fragmentorum corda, 3. i. s. croci gra. viii. myr rhediptami, gentianæ, ligni aloes, fandalorum citranarum, semi. alfelici gemisch, bæe albi & rubri, hyacinthi, bitaragdi, an. 3. s. lucci hymonum 3. iiii. acetû 3. i. uini maluapici 3. v. mi sce. & fiat epithema.

COMMENTA. MANLII.

Epithema autem apud Græcos est superpositio siue em plastrum molle uel aquosum: apud nos epithema est medic amentum aquosum: quod Romacho cordi ac hepatis supra ponitur cum panno tincto ex chermes scilicet scarlatto, & eius modus est diuersus scëdû diuersa loca ac infirmitates.

LV MIN. MAIORIS

SECTIO DE VODECIMA.

CEROTA, uulgo CERATOS continens.

EX ANTID. MESVÆ.

I.

OESYPATVM, uulgo HYSOPL

descriptione Galeni.

¶ Ceræ citrinæ. 3. iiii.

Chamæmeli.

Olei Trini, an. 3. vi.

Masticis 3. i.

Spicæ 3. ii. s.

Croci 3. i. s.

Terebenthinæ 3. i.

Resinæ 3. s.

Hysopi humidæ. 3. x.

Fiat cerotum.

COMMENTA. MANLII.



S T V O cerotum apud nos nō est in usu: illa uero descriptio qua nos utimur est descriptio philagrii, de qua infra.

Ceræ citrinæ. i. uulsi. Sera. laudat ea quæ est grossa mû da a lorde: & in cuius odorem est parum odoris mellis, & in colore eius est parum rubedi nis, & illa quæ est alba per co cturam & pinguis est post ip sam. Reperitur etiam alia cera dicta propolis, & hæc est sex alacris apum, quæ apud Arabes mûz uocatur.

Oleum propriè sumpto uocabulo est omne oleum cuius cunq; sit rei, ut oliuarum ac aliarum rerum descriptio olei irini subi ungetur & est oleum de ieros, quod florè purpureo gignit.

Resina, resina pituina. i. pini. Pli. resina summæ spes sunt duæ, sicca & liquida, sicca e pino & picea fit liquida terebin

to, larice, lentisco, cupressu. nam & hæc nascitur in Asia & Asiria falluntur qui eadem putant esse e picea atq; larice: picea enim pingue & tirsu modo succosam fundit, larix gra cilem & mellei liquoris uirum redolentem: medicis liquida ra ro utuntur. Moderni pro pice liquida chitran accipiunt, & est gûmi quod egreditur ex arbore dicta serbin seu cedrus.

II.

Oefsyus ut extrahatur, uel operatio Hysopi humidæ.

¶ Lanarum omnium succidarum circiter lib. ix. & funde super eas aquæ fontium calidæ quantum sufficit ad infunden dum, & dimitte per horas. viii. deinde bulliat ebullitione una, exprimat aqua lanarû & coletur aqua, & coquat cû facilitate in uasè stânato agitâdo semper fundum uasis cum ligno amplo ne recipiat de uestigio adustionis aliquid, & coquatur usque dum fiat sicut mel currens, & seruetur.

COMMENTA. MANLII.

Hæc est operatio hysopi humidæ ad diffentiam hysopi siccæ, quæ est herba de utraque Auic. in 2. can. facit ca. dicēs qd hysopum humidæ est fordes aggregata super lamam ouî in Armenia, & sternitur super herbas tithymalli, & acci pit uirtutes & lac earum, & fortasse est currens, ergo coqui tur & præparatur ibi. Dios. autem hysopi cerotum est quâsi fordes ex succo lanarum succidarum, ut docet ipse ibi Plin. Hysopum est fordes pecudum: sudorq; femorum, & aliarû adhærens lanis hysopum uocant melior maritis omnibus genitus fit pluribus modis, sed probatissimû lana ab his par tibus recenti capta, aut quibuscunque fordisbus succidis &c. Melior autem est quæ non habet odorem altaris, & fit mol lis quando tangitur sine asperitate: habens odore lana succi dæ & quando dissoluitur in coctea munda nō apparebit ibi aliqua grossities, sicut apparet quando est adulteratum cû cera, aut seuo dissolutum cum oleo ut faciunt multi herbatî ci maligni. Liber qui dicitur Bulchasis quasi in fine docet modum seruandû zucherach: idest hysopum humidam.

APPENDIX.

Oefsyum quæ arte parandum Dios. lib. 2. cap. 84. elegan tissime docet, cuius placita Aetius quoque lib. 2. cap. 120. non obscure perstringit. A Mesue sane longe diueria.

III.

Oefsyi ex philagrîo, uulgo Hysopi

Descriptione Philagrii.

¶ Ceræ 3. v. bdellii, masticis, armoniacis, aloes, storacis li quidæ, an. 3. viii. ceræ citrinæ lib. i. terebenthinæ. 3. i. s. i. medu llæ cruris vaccæ, adipis anseris an. 3. xv. hysopi humidæ lib. i. s. olei nardini quantum sufficit, bdellii, armoniaci, & aloes dissoluuntur in aqua infusionis foeniculæ, & camemillæ et cum cæteris fiat unguentum, & post philagriû addiderunt expresionis squillæ. 3. iiii. olibani. 3. i. sepi uittulî. 3. xv. & in alio ceræ lib. i. minus quarta, & est conueniens.

COMMENTA. MANLII.

Hæc descriptio istius hysopi ceroti descriptio Phila grii est illa quam laudant magis nostri doctores: & sic gene raliter ista descriptio utuntur.

Vaccæ est animal quadrupes omnibus notum, & modus faciendi medullæ ex cruribus est talis. Oporet primo qd eli gatur tēpus in fine æstatis: quia in aliis temporibus reperit in eis superfluitas sanguinis qd congelat in loco cû medulla, & nō nouit hoc nisi ille qui affueit frâgere ossa & extrahe re medullas: & oēs spēs medullarû sunt mollificatiuæ, resolu tiuæ, & modus extrahendi ē, qd accipias medullas recetēs, & purges a sanguine ipsius. postea lauet cum aqua & dissoluat ad igne leuē: & dimitte donec liqueat medulla: & colet in uasè: deinde accipi illud colatû clarificatû, & pone in uno alio uasè terreo nouo, & qn apparet fordes colligat, & ibi dimittat donec fiat rubra: deinde accipiat qd est desup ex puro eius, & qd est in fundo, & nō purû abiciat. Auic. in 2. can. in ca de medullis laudat medullâ uitulorû & ceruî, deinde thauri, & postea caprarû, deinde ouî, & medulla qd hircorû cum recticulis, & thaurorû propriæ non calstrorû est magis sicca, & medulla extrematû est magis pinguis.

Anser est auis, cuius genera sunt duo. i. domestica & syl uestris. Domestica est quæ generaliter utimur, quæ morat in

*Pylus nō habebatur. † Antea mendose. 3. i. Alij 3. i. s. x.

*Alime dose 11 iia.

locis domesticis syluestribus uero est illa que in locis syluestribus moratur, & amba sunt notæ, & modum præparationis eius docet Bulchaffs in tractat. 3. qui ille est, Accipe adipem asneris quando est recentior occisa, & purga bene a pelliculis suis, & pone in olla noua terrea, capacitas sit dupla quantitati adipis & cooperi vas, & pone in sole calidissimo, & aufer quod dissoluitur, & pone in alio uase, & fac ita assidue ad illud clarificandum secundum quod egredietur ex eo donec nihil de eo remaneat, deinde accipe quod clarificatum fuerit, & repone in loco frigido, & uere ubi oportet, & ille qui uult facere opus cum præparatione, oportet quod dissoluat eum in olla duplici secundum formam, ut ibi docet eadem sit præparatio de adipibus anas.

IIII.

Ocyspatum ex Paulo, uulgo hyssopi descriptione Pauli.
 * Ammoniaci. 3. x. bdelli. 3. v. figie. 3. iiii. croci. 3. i. s. aloes, masticis oblani an. 3. i. s. ceræ. 3. iiii. s. sepi & medullæ vituli an. 3. i. hyssopi humidæ. 3. xl. irileon quantum sufficit.

COMMEN. MANLII.

Sigia, idest florax liquida, non est florax calamita, ut quidam dixerunt. Auic. in 2. can. inquit: Iubne est arbor sigie, ergo sigia est florax liquida, & hæc apud quosdam est mel floracis calamitæ. Item Circa instans ait in cap. de florace, florax alia calamita, alia liquida, quæ propriæ sigia dicitur florax autem liquida in Calabria reperitur, florax calamita non a calamo sed a calo quod est bonum dicitur, & micos quod est gutta, per decem annos seruatur.

Irileon. i. illirica: & est oleum de iereos, quæ florem purpureum gerit, nam Dioscor. in cap. de balano persico. i. ben: & est semen arboris ait. q. ex eo. 3. i. bibita cum pulsa splem fliccat cū iri illirica mixtus, & in cataplasmatibus positus & mulla adhibita dolores podagricos mitigat &c. Illirica mixtus. Sera. eodem loco ex verbo Dioscori. habet iereos, quod idem est. Iridis illirica similitudine iris coelestis nomen accipit unde & a latinis arcum dicitur iris, quod flos eius coloris uarietate eundem arcum coelestem imitetur. Illirica autem dicitur, quia in illirico plurima nascitur.

APPENDIX.

Quamquam hæc cerati compositio Paulo inscribatur, non ignorandum tamen uariæ modum esse, quæ libr. vii. cap. 17. Aegineta in hunc fana admodum bellissimi perscribit.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

Mellioi, triens.

Cardamomi, sextans.

Lanz admodum fordizæ. 5. vi.

Macerata in uini sextariis duobus, per triduum coquito donec pusillum reliquatur, his exemptis uiuo admisceatur olei quadrans, & de nouo usq; ad maxime partis consumptionem elixaro, uiuq; etiam tunc addatur.

Colophoniz.

Resinz terebinthinæ. } singulorum dextrans.

Sunt uero qui ceræ quoq; uncias. x. admisceant, & hyssopi herbæ unciam coquant pariter cum aliis. Alij lanas uiuo ablunt desiccatas quæ uiuam cum fordibus quæ etiam pinum appellant addiunt, ubi utendi est. ex eo 3. tres iniiciunt, & reliqua quemadmodum dictum est.

V.

Hyssopi Diatesaron Democriti.

* Ceræ ciring terebinthinæ an. 3. xii. olei irini. 3. iiii. hyssopi humidæ. 3. i. s. & fiat ex eis vnguentum & administretur.

COMMENTA. MANLII.

Istud cerotum apud nos non est valde in usu, & sunt ex hominibus qui utuntur ipso sub nomine ceroti de hyssopo humida: dicitur autem diatesaron a tessara græce quod est quatuor: unde diatesaron, idest de quatuor rebus, idem dicitur de lyrica diatesaron, Ioan. Anglicus in cap. de dolore iuncturarum in cura guttæ melancholicæ habet unam aliam descriptionem quæ eadem est.

Hyssopo humida (ut dictam fuit) est quasi sordes & succus lanarum succidarum. Io. Anglicus ibi ait: Hyssopi humidæ. i. uiscositas lanæ & non lotæ prius: deinde decoque, & quod supernat colligatur &c.

VI.

STOMACHICVM GALENI, uulgo Cerotum Gal. stomachicum confortans, & emendans uitia stomachi.

* Rosarum rubrarum. 3. x. foliorum abinthii sicci. 3. xv. masticis, 3. xv. spicæ indæ. 3. x. terre subtiliter, & accipe ceræ mûdæ. 3. iiii. olei rosati lib. i. s. dissoluantur in igne lauationis pluribus in aqua rosata deinde iterum dissoluantur & lauentur in uiuo uetere & succo cytoniorum & aceto pauco, deinde melleant cū caluere rerū & fiat cerotū & administretur.

* alii. 3. xx.

COMMEN. MANLII.

Istud cerotum secundum intentionem Melfæ est de mente Gal. tamen apud ipsum Galenum, non reperi, hoc apud nos est multum in usu sub nomine ceroti Gal. emendans uitia stomachi, non autem est unguentum stomachicum, ut quidam dixerunt. Et sunt ex hominibus qui uendunt unum pro alio sed non recte. Moderni doctores exhibent istud cerotum ad confortandum stomachum, addendo parum galliæ alaphanginæ, inuenitur in ipso uirtus mirabilis.

APPENDIX.

GALENVS stomachicæ initio. viii. medicamentorum καὶ τούτους, Pharmacia perscribens, hæc non ineleganter ad uerbum serè explicatis, inueniunt.

CERATVM quo assidue uitor.

Ex aloë, & masticæ, & cera pontica amara, atq; unguento nardino constat: componitur autē hyeme, ad viii. drachmas ceræ, vicia una mensurali Romana unguenti nardini consiecit. Aestate autem ad vii. eadem unguenti proportionē. Optimum autem vnguentum esse oportet, quale antea qui in sola Laodicea Asia præparabatur, nunc uero etiā in alijs Asiæ urbibus cōponitur. Cera si non pontica amara tibi in prōprietate sit, aliā ponticā coniecit, & neq; illa præsentē eā, quæ tyrrenica appellatur. Si uero neq; hæc adit, aliā aliquā odoratā, & pinguem, si nequale habes, eā quā habere potes lotam adde. Liquefact autem in duplici uase, atq; ita refrigeratum, atq; erafum ceratū, cum tritis reliquis probe permisce, cum aloë uidelicet, & masticæ, sit autem utriusq; 3. i. & qñq; plus, non tamen ut seque drachmā trāsgrediaris. Quod si ampliori opus sit altractione, nimirum debilitate tanta existente, ut cibum retinere non possint, omphacium pari pondere addatur, ut trium singulorum drachma fit una, masticæ vna, & tertia omphacii. Cæterum in cerati præparatione primum omphaciū miscetur: deinde etiam alia his uniantur. At uero quemadmodum, omphaciū, sic etiā abinthii succum admisceo, quandoq; etiā ambo, & tertiū insuper hypocythidis, & quartū cenanthes, sic autē appello uiciū syluestriū germen una cū floribus, ex quo succedēdus diebus uita fit, quin & thois succū non raro admiscui, sed & cerari nardini copiam augere oportet, iuxta proportionē numeri reliquorū pharvacorū, ut si quatuor drachmæ aliarū rerū accumulentur, triens sit nardini cerati, sextas quidē ceræ, sextans itē nardini unguenti, hoc est utriusq; 3. xvi.

Quod etiam iis uerbis. viii. Methodi Medendi cap. v. quam breuissime testatur.

Si uero q. affligitur, cinctū non patitur, siue ob consuetudinem, siue delicias cingi recuset, licet cerato idē efficias. Est autē in eiusmodi usum optimum, quod ex cera sit tyrrenica in unguento nardino liquata, qui postquam refrigeratū est aloes, ac masticæ molissimus pulvis est admixtus, debet autē singulorū hic esse modus, ceræ, ac nardi partes pares, aloes pars octaua, sic etiam & masticæ, vel (si placeat,) huius paulo aliquid plus. Quod si cerato aliquid e sumptuosius (numerauit namq; tum spicatarum, tum foliatæ,) his unguentis admisceas, præstantius medicamentum habebis.

VII.

DIAPENTE.

* Ceræ ciringæ. 3. iiii. figiæ. i. floracis liquidæ. 3. i. partem tertiam, terebinthinæ. 3. i. mucilaginis glutinis zanach. 3. v. olei irini quantum sufficit, & expertum est.

COMMEN. MANLII.

Istud cerotum est in usu, sed non multum.

Gluten zanach aliquādo gluten alchanah, quid autem sit

S E C T I O X I I .

generaliter ignoratur . Ego autem testor nunquam uidisse autorem autenticum de ipso loqui uerum scitum modernorum opinionem est colla pificum, quod a multis creditur, & a multis non, sed an sit idem aut non: infra in empla stro diaquilon magno, iterum de ipso ostendam .

V I I I .

ALEXANDRINVM optimum sto machum confortat.

Rx. Cimarū absinthij, olibanī, an. 3. x. am moniaci: storacis, calamitæ, an. 3. xii. spice nardij .iii. ceræ 5. iiii. olei camemillæ quantum sufficit, olibanum, & armoniacum in uino sub ficienti per diem & noctem infunde, absinthium autem & spicam tere & cribra: oleum uero, & ceram solue super ignem; & cum eis reliqua misce.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Istud cerotum apud practitantes Papienfes non est multum in usu apud nos, sed apud Mediolanenses est multum in usu, & ualeat multum in illa quæ dicit dominus Mesuz.

Absinthium, idest absinthium romanum, cimas, idest comas Isidorus in cap. de arboribus inquit: Cimas uocatas dicunt quasi comas.

I X .

D E S A N D A L I S .

Rx. Rosarum rubearum 3. xii. sandalorum rubeorū 3. x. sandali albi & citrini an. 3. vi. boli arme. 3. vii. spodi * 5. iiii. camphoræ an. 3. iii. ceræ albæ 3. xxx. olei rosati libr. i. conficiantur & administrentur, & sunt qui lauant oleum & ceram prius & postea permiscunt cum aliis, & est melius.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Istud cerotum est multum in usu sub duobus nominibus uidelicet sub nomine ceroti sandali, & sub nomine unguenti sandalini, sed communiter ordinatur sub nomine unguenti sandalini magis quam sub nomine ceroti dicitur autem sandalinum propter sandalos quos recipit.

X .

A L B V M G A L E N I .

Rx. Ceræ albæ 5. i. olei rosa 5. iiii. & sit radix olei, oleū omphacinum, & aquæ fontium claræ & propriæ uehementis frigoris quantum sufficit, oleum multotiens bene lauetur lauationibus multis: & quanto magis elaboratur in lauando illud fit excellentius, ultimo uero conuassetur cum aceto albo claro & pauco, & seruetur.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Istud cerotum est multum in usu sub nomine unguenti al. Gal. dicitur autem album, quia eius color est albus propter ceram quam recipit, & quanto albus tanto melius.

Cera alba, idest cera artificialis & fit est cera communi, cuius modus Venetis est notus: & de ipsa faciunt in multa quantitate, Liber qui dicitur Bulchalis in tractatu tertio dat duos modos facienti: ceram albam, sed non oportet scribere de modo ipsius, quia facis manifestus est.

Oleum rosatum quod fit factum ex oleo omphacino. i. ex oliuis immaturis. Isid. ait oleum spanum quod ex albis oliuis fit, quod a græcis omphacon appellatur, quod autem ex fuluis & non maturis fuerit expressum uiride appellatur, quod uero ex nimium maturis maturis dicitur hoc ad nos defertur a partibus Ianuæ, & ibi uocant oleum omphacinum idest oleum de oliuis non maturis.

Aqua secundum Papiæ est sapientia. Dios. de aquis duo capitula facit. vñ de aqua marina, aliud de aquis omnibus, & sic ait: Aquarū omnium natura frigida & humida, aqua quæ de lapide emanat leuior & limpidiore est, & uentrem & urinam prouocat aqua quæ de lapidibus argillosis emanat grauior est Auic. autem in primo lib. in fen. a. doctrina. 2. in ca. de dispositionibus aquarū ait: Aqua unum existit elementum, quæ sola inter omnia elementa habet proprium, ut in eo q. comeditor & bibitior, & ibi Auic. de aquis multum loquitur idem facit in. 2. can. sed non tantum. Mesue ponit hic aquam fontium, sed moderni doctores magis laudant aquā rosatam & sic hodie generaliter fit & cerotum sandalinum & hæc multum sunt in usu pro renibus vngendis.

Ista suprascripta cerota reperiuntur in antidotario diui

Mesuz, & inferius apparebit alia descriptio quæ inuenitur in suo gradabim.

A P P E N D I X .

Hanc sane compositionē multis in locis, nec dicam. i. Simplicium cap. v. & vi. Sanitaris tuende. G A L E N V S pulcherrimè explicat. uerum x. methodi medendi cap. ix. rem omnem hoc pacto abunde prosequitur.

Incipiam autem ab eo medicamine quod omnium quæ humectent, ac refrigerent, est simplicissimum. quo etiā aduersus Erysiplata uxor, & phlegmonas in pudendis, utique inter initia, priusquā depascas aliqua subindictur putredo.

Debebit aut ad id præparata esse cera quæ optima, & clorata. sane optima fuerit, uel alba pontica, uel quæ ex atticis fit fauis. Esto aut & rosaceū, quod ex oleo fit a nonnullis uocato omphacino, ad aliis crudo, quodq; citra salem fit confectum. Maxime uero ad rem pertinerebit, si & ipsum oleum tenuiū prolius fit partium, cuiusmodi sabinum est. Quum uti uoles aliquid mista liquenter in uase diluisti. Factoq; humido cerato (cuiusmodi. Cerit quod triplum, aut quadruplū ad cerā rosaceū habet) postq; ipsum fuerit refrigeratum, misceito ei paulatim in mortario tantum aquæ quantum in se, sed cum eo mollitur, accipere possit. Expedi aut & ceratū ipsum prius admodū esse refrigeratū, atq; et quæ huic admiscebitur aqua esse frigidissima. Abunde aut ceratū refrigerabis, si quantum modice coigit, totū uas in quo continetur, in aquā frigidissimam dimittas. Quod si acceti quoq; admodū tenuis ac clari paululum addicere uelis, utique magis adhuc tū refrigerans, tū humectans medicamentū efficiet. Nō debebit aut medicamentū hoc eo usq; sup. xgrū corpus manere, dū manifeste incalcet, sed asidue subinde mutari.

X I .

D E E V F O R B I O , in cap. de spasmo.

Rx. Olei de cinnamomo, aut olei antiqui lib. i. ceræ citrinæ i. usualis 5. ii. euforbij boni & recentij 5. i. misce & fiat cerotum, & igitur spasmatum locus & est mirabile.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Istud cerotum non est multum in usu, Euphorbium uero est gummi excedens omnia genera gummi calefaciendi & subiliando. Pli. ait, Rex Iuba inuenit herbam euphorbiam medici sui fratris nomine, cuius regis de ea uolumē extat, inuenit eā in mōte athlante. Spectatur folijs acatis eius tāta est ut succus eius vel lōgino quo recipiat incisa cōto succipitur uētriculo hādino locato humor lactis uidet effluere.

A P P E N D I X .

Ex euphorbio ceratum ii. medicamentorū per loca iuxta calcem, Galenus in hunc modum elegantissime pingit. Sepe uero, & ex tempore, ac improuiso, pharmaca præparare coactus simpliciter Euphorbij in litione usus sum, modica cera cōpagis acquirere gratia adiecta. Sufficit autem in librā olei, siue sabinī, siue alterius ei propinqui, ceræ quadratē iniicere, & euphorbij uncia vñ, atq; ex hoc dimidia frontis partē illinere, vñ cū tēporis uidelicet musculo.

E X A N T I D . B A R T H . M O N T A G N .

X I I .

[Pro capite.

Rx. Laudani.

Gummi elemi,

† Sandarachæ,

Olibanī,

Storacis, Liquidæ,

Sicce

Resinæ pini,

Misce & fiat cerotum, potest addi mirrhæ, & esset fortius & hoc fac uale necessitate.

C O M M E N T A . M A N L I I .

Istud cerotū est in usu multū apud chirurgicos. Gummi elemi apud nostros auctores nō reperio scriptū aliquid de eo: tamen est notum omnibus: secundum quosdā est gummi cuiusdā arboris quæ reperitur in regione hic appellata. Alij dicant q. est gummi arboris diæx elimus. Alii dicunt q. est gummi cuiusdā arboris quæ reperitur in terris Indiarum: cuius

† lib. 3. iiii.

† Venit appellat

} an ad libitum.

fructus linei appellantur. Alii dicūt, & hoc vbi scriptum in uno loco, q̄ gummi elemi est gummi citri. nam sine dubio gummi elemi est coloris citrini, sed hoc non est affirmatum.

Storax liquida. i. figia. storax sicca. i. calamita in isto ceroto debent poni storax liquida & sicca, i. idest calamita.

XIII.

DE STORACE.

R. Laudani, asphalti arthaniz, myrrhæ, calami aromatici squinati, ana. ʒ. s. ameo, amomi, ana. ʒ. s. picis nualis. ʒ. viii. fiat ex eis cerotū fm artem & superaddatur storax calamita.

COMMENTA. MANLI.

Istud cerotum non est in usu. Storax fm Diosc. lachrymū est arboris eiusdem nominis: eligenda est autem storax quæ est rufa: & pinguis & refinæ similis frustatam subalbida & odore plena & perseverabilis, quæ cum malaxatione humiditate dimittit ex se simile mellis viscidam naturaliter & odorata calefaciens. Aui. in. 3. can. tria ca. de storace facit: unū quod dicitur lubne. i. arbor figia, aliud de storace, & ibi ait ex mente Diosc. q̄ ipsa est spēs storacis, & apud quosdam est gūmi oliuz, & ipsius quidē sustumigatio ponitur loco suffumigationis thuris in omni re: infra habet aliud ca. de storace & ibi ait: Storax humida alia est q̄ extrahit p̄ seipsam gūmi, & alia est q̄ extrahitur cō decoctione, per se autē extracta est citrina, & q̄ antiquatur declinat ad aureum colorem & est abundans, sed quæ extrahitur ex cortice est nigra.

Asphaltum fm Dio. est bitumen iudiciū, & eius aliud est aridum, aliud liquidum, sed aridū gignitur in Iudea, phenice, sydonia: quod est primum, & tundi p̄t, v. cetera pigmēta: liquidū vero generatur in Babylonia & Apolonia & Sicilia. Reperitur autem innatans in fontibus: & infra scribit aliud genus: quod neq̄ ferrū, neq̄ aqua rūpere pōt: nī tāmē mensura mulieris, aut sanguis hircorum, & si volueris rumpere, sic rumpere, tolle filiū lanceum & intinge eum in sanguine, & sic hincinde circūponitur. Plin. bituminis sulphuri proxima est natura. Est alius limus a Iudeæ lacu emergens in Syria circa Sidonem oppidum maritimum, asphaltum vero quod & bitumen Iudæicum est, stercus demonis uocatur a quibusdam, & naphtha & petroleum vnius generis sunt. Bartho. Montag. in suis consiliis, in consilio de medicis habentibus commune iuauementum ad nocumēta stomachi usus & audius ait: est autē oleum de naphtha: oleum de petris factum, & oleum petroleum.

Pix nualis. i. pix visialis, quæ nigra est, Plin. pix liquida in Europa teda coquitur nauilibus muniendis multosque alios ad vsus, lignū eius cōficiū furnis undique igni extra circū ducto ferro: vter primus sudor aquæ modo fluxe, in canali, hæc in Syria cedrū uocatur uel cedria. cui tanta vis est vt in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfusa seruētur. Aui. pix est duarum specierum, una est marina, nigra, liquida, & sic hincinde circūponitur, & est de genere picis, & alia est montana syluestris, & syluestris alia est liquida, & est ex arbore aliembuc, & modis alijs pini.

XIIII.

DE GALBANO, in consiliis conf. de præfocatione matricis ex noumento ipsius.

R. Galbani electi. ʒ. i. bellij mollis & subalbidij. ʒ. ii. puluerum matricariz. ʒ. i. s. myrrhæ. ʒ. s. dissoluatur galbanum in aceto & diligenter coletur: deinde superaddantur pulueres suprascripti & fiat cerotum.

COMMENTA. MANLI.

Istud cerotum apud nos non est in usu. Ipse Bartholinus in suo antidotario habet vnam aliam descriptionem, sed non est eadem, quia illa soluta fit ex galbano extenso solum super uno corio in forma rotunda ad modum vnius nebulæ, galbanum uero gummi est satis notum.

Matricaria secundum Serap. est achæus. Et dicit de mēte Diosc. q̄ habet folia similia folijs coriandri, & florem album circumquaque & in medio citrinum, & habet grauem odorem & in sapore eius est amaritudo. hic Serap. allegat hæc uerba de mente Diosc. sed sub isto nomine non reperitur. verum est quod Diosc. de ipsa facit capicu. sub nomine Parthenion quod idem est.

EX RAINALDO DE VILLA NOVA.

XV.

AD HERNIAS, vulgo, ad CREPATOS

cum pelle arctina, in li. ii. cap. de crepatura.

R. Lithargyrii, opij, lapidis fedenei. i. lapidis fanguinaris, sanguinis draconis, boli armeni, mastices, armoniaci, mumie, galbani, thuris, costi, lumbricorū terrestriū. ana. ʒ. s. picis nualis. i. visialis, colophoniz, ceræ, albæ, & ruberæ. ana. ʒ. i. radices consolide maioris, mediz, & minoris ana. ʒ. i. iiii. rosarum, myrrhæ, aloes an. gr. xv. palæ marinæ cōbulzæ, gallæ, balastriarum, aristolochiæ rotundæ ana. ʒ. vi. visci quercini. ʒ. i. i. sanguinis hominis rufi lib. i. minus quarta. conficiatur hoc modo. Accipe penum pellē hādinā uel arctinam cū omnibus pilis suis, & decoquatur quasi bulliēdo per totū diē, quousq̄; quasi tota liquefacta sit, & fiat sicut colla, & parum uel nihil de aqua ibi remaneat: deinde ex illa aqua accipe lib. i. optime cō flaminea vel panno colatam, & adde cū eo viscum quercinum, & in olla noua lento igne fac liquefieri & bullire, & cum baculo semper & continue ducas, aut per aliū ducere facias, deinde lumbricos terrestres post cerā & picem addas: deinde adde terebintinā. i. gūmi albotin. ʒ. ii. postea colophoniam, masticem, myrrham, armoniacū, & galbanum adde, & liquefac in simul, & cum baculo semper ducantur, & signum quiddam erit coctum est, quod ponatur vna gutta ex eo super lapidem marcoreum seu super cultellum oleo vinctum quod cum refrigeratum fuerit, si malaxetur & optime coaguletur, tunc signum est perfecte decoctionis: si autem lento igne bulliat, & fiat, & vsui referua.

COMMENTA. MANLI.

Istud cerotum est illud quod generaliter utitur doctores sub nomine ceroti ad crepatos, uel sub nomine ceroti cum pelle arctina: ibi Rainaldus dicit: q̄ crepatura accidit æpe iuuenibus & robustis: uirique ipsi iolunt nimis saltare vel currere uel maxima pondera portare, uel petras grossissimas iactare, vel eas uiriliter eleuare, vel ex nimio & alto clamore. Et Bar. Mont. in suo antido. habet unū emplastrū usuale p̄ crepatis, sed idē nō est. uerū differunt parū. de quo infra. Gētilis in suis cōsiliis, in cōsilio primo hęc vnā aliā de descriptione, sed nō ē eadē: nec in usu apud nos ē. Moderni uero practitantes magis laudat descriptionē Rainaldi q̄ alias.

Lithargyriū est nomen Cōpositū ex lithos quod est lapis, & giros quod est argentum. vnde lithargyriū. i. spuma argēti Diosc. lithargyrium nascitur ex arena molopidimis, quæ cōbusta liquefit, & sic refunditur, multi ex argento hoc faciūt, & ex plumbo. melius est tamē Atici, secundum Hypanum tertium Siculum, quia ibi plumbū abundat rufum uero & limpidū cristis dicitur ex albidū argiritis. quia ex argento fit, aliud capitulum facit de spuma argenti, quæ est lithargyrios appellatur. Plin. spuma argenti genera eius sunt tria optima quæ cristū uocatur, q̄ & atica est hæc ex ipsa uena fit, & secundum argiritim uocatur, quæ hypanensis est. hæc ex argēto fit sicut dicit Diosc. de lithargyrio, alias duas spēs uidē ibi.

Lumbrici terrestres secundum Sera. sunt vermes qui q̄i foditur terra, vel aratur iuueniuntur, q̄i ipsi teruntur & ponuntur super neruos incisos conferunt iuauementum manifestū. hi apud Aui. in. 2. can. uocatur caratin, & satis noti sunt.

Colophoniaz. i. pix græca. Aui. in. 3. can. in ca. de ratingi ait: Ratingi nominatur colophoniaz, & est gūma pini, & non minatur arbor eius in sceni alher. Ioan. Sera. in suo breuiario in ca. de paralysi inquit: Gummi granorū uiridum quod nominatur ratenei. ergo ratenei q̄ est terebintina. idē in c. de althmate ait. Accipe granorū pincarū super quas est ratingi, uerū hoc gummi cadit super oēs gummas, sed ratenei magis conuenit esse colophoniam quam terebintinam.

Cera rubea secundū quosdā est cera usualis, fm quosdā est cera qua utitur ad sigillandum literas, & hæc est opinio pluriū, quia ibi ingreditur cera alba. i. cera artificialis sicut est notū, & cera rubea. i. artificiatā, & propter id si ponitur cera alba quæ est artificialis, non debet intelligi cera rubea quæ fit ex cynaprio, terebintina, & cera, & oleo ut est notū apud apothecarios, tamen non est firmum. uidelicet si cera rubea sit cera usualis: aut cera qua sigillantur literæ.

LVMIN. MAIORIS
SECTIO TERTIADECIMA.

VNGVENTA EX QVAMPLVRIMIS
AVTHORIBVS CONTINENS.
EX ANTID. MESVE.

DIAPHOENICON, vulgo DIAFINICON.

Consolida maior apud Diosc. vocatur symphytum. & ibi ponit q̃ eius species sunt duæ, tamen apud Modernos inuenitur alia quæ media dicitur, & hæc raro apud nos inuenitur, sed sunt ex hominibus qui loco eius ponunt pondus, æquale maioris, sed si haberi poterit est melius.

Palea marina, idest balla marina, alij auctores hanc non ponunt est autem quedam res rotunda sicut bora, quæ deferatur a Ianua ad nos, & ibi eius herba algora vocatur. hæc balla ingreditur puluerem, qui fit cōtra botium gulæ, vt dicitur fuit, & ibi melius ostendit.

Viscus quercinū, id est Dioc. lachrymus est arbor lenis & uiridis coloris deintus obtusum & nihil asperū colligitur & de femine obrotundo quod in arbore drii. i. quercus nascitur, folia habes similia buxo, hoc semen primo tunditur & lauat, & postea coquitur, multo uero illi masticā quod conqussat. fit etiam ex arbore matiani, & de piro & ex diuersis arboribus, aliqui & in radice arborum, & in fructe inuenitur Apud Auic. eius fructus est similis ciceri, nigro, non sincere rotunditatis, virgatus, frangibilis, ex quo manus inuiscantur. eius aut minima est arbor ferens glandes, & malus, & pirus: in quo sunt virtus aerea & aquæ multiplicata valde, & qui ex eo bonus est recens planus coloris puri interius uiridis, exterius teritur & lauat, deinde coquitur. Hodie multi apothecarii qui fe omnia scire fatentur lo eo eius ponunt viscum quod utuntur nostri rustici ad capien- das aues, sed uerum viscum quercinū fit ex quodā fructu simili piro, qui reperitur in arboribus ferētes glādes, seu arbores quercus, & pp id viscū quercinū appellatur, deferatur a Venetis ad nos in formis rotundis, prout succus liquiritiæ.

Sanguinis hominis rufi. Bartholomæus habet sanguinis humani, & idem est: sed nostri doctores magis laudant sanguinem hominis rufi seu robusti quam non rufi, & oportet q̃ extrahatur ab homine cholerico, quia est fortioris proprietatis in ista materia, & oportet q̃ ille sanguis sit phlebotomatus in una scutella lapide uretica, & ibi dimittatur siccat̃ tantum q̃ ueniat sicut est sanguis draconis, postea utere ubi oportet. Nicolaus Floren. in lib. iiii. in cap. de nouementis prouenientibus ex sanguine hominis, & sanguinis & lactis congelatorum inquit: Sanguis hominis cholerici rufi extractus ab eo dum fuerit ab ira & furore semotus, si sumptus fuerit in cibo uel potu, quia ipse pro tunc est uehementer cholericitatis & inflammationis in stomacho existens, magnam efficit & acutam effusionem ad caput, & cura eius si non fuerit congelatus est uomitus, si uero fuerit congelatus educatur fluxu uentris.

EX LEONARDO de preda palea. Patuino.

XVI.

DE BDELLIO, in cap. de cura serophularum.

Ammoniaci, galbani, bdellii ant. tantundē, cuius confectio est ut recipiatur ex his tribus gummis partes æquales, & in aceto uini: fortis vltq; ad tertiam diem dimittantur quousq; liqueant, deinde adde parum sulphuris, & fiat cerotum.

COMMENTA. MANLII.

Istud cerotum non est in usu, cerotum uero secundū Mattheum Syllaticum dicitur a cera, quia omne cerotum recipit ceram uel aliqd loco ceræ: & sic istud dicitur cerotum non quod recipiat ceram, sed loco eius habet gummæ, quæ liquefuit prout cera. Et nota secundum Saladinum, q̃ sicut aloes ut plurimum est materia pilularum, ita cera ut plurimum cerotum uel unguentorum est materia.

EX CONCILIATORE. DIF. CLXXI.

XVII.

Coadunatum scisci cranei.

Res. Gūmi elemi. 3. iiii. resinæ. 3. iiii. ceræ. 3. vi. olei rosa. 3. iiii. armoniaci. 3. iiii. et ibi notandum. 3. iiii. & 3. s. fiat unguentum.

XVIII.

Aliud consimilis intentionis.

Res. Gummi elemi. 3. iiii. opoponaci. 3. ii. bdellii. 3. s. resinæ pini. 3. i. ceræ quantum sufficit. fiat unguentum.

Peroratio. in iudicacionem.

Postquam expeditimus: duce Christo cerota, æquum est ut transamus ad unguenta, si idem annouet.



ECCE adipis zirbi antiqui mundi & colati & adipis uti- li antiqui mundi & colati, an- tib. i. s. i. co. cothar. 3. iiii. o. le. antiqui & lithargyri mundi, an. lib. i. iii. cereantur lithargy- rum & colothar cōrione vltima, & mundentur per par- tum subtilem & spissum: deinde tereantur cum oleo & elabo- rentur in permixtione cori-

ante parum ex oleo addendo, & fiat illud: deinde coletur super illud adeps, & coquatur cum facilitate, agitando illud sine intermissione cum ramo palmarum & extremitate eius grossa, abieciā cute eius & fuit rami super quorum in- cisione non præterierit spatium, & quotiens exhaurit hu- miditas rami a medicamine. iterum alterius humidi extre- mitate agitetur, necnon & aliorum ramorum partes humi- diores inciduntur in frusta & ponantur in medicamine: de- inde mutantur cum exsiccantur: & hoc fiat donec perficiatur eius decoctio, & fiat in termino horæ ignis aut sic ut prunæ aut flammæ tenuis.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum apud nos est multū in usu. Vnguentum autem dicitur ab unguendo. Iisd. in ca. de odoribus & ungue- tis inquit. Vnguentum uero est omne quod ex cōmuni oleo confectum aliarū specierū commixtione augetur odoris in- cunditatem sumens & longius redolens: vnguenta autē quæ dam dicuntur a locis, ut telinum: cuius Liuus Cæsar memi- nit dicens, compusq; suauit telino unguis, hoc conficieba- tur in insula Telo: quæ est una ex cicladibus, sunt & quædā ab inuentorū nomine ut amaricinū: nam quidam tradunt re- gum quendam puerum amaginum nomine complura un- guentorum genera ferentem casu prolapsū esse, & maio- rem ex commixtione odorem creasse. vnde nūc optima vn- guenta amariciana dicuntur: sunt autem ex genere florum.

Diaphœnicon dicitur a dia quod est cōfectio & phœnicē. i. de dactylis: nam phœnicon est dactylus: ut Melisse hēt vn- guentū diaphœnicon, non aut hoc dicitur a dactylis, sed po- tius a palma, s̃m Matth. Syldiaphœnicon uocatur vnguen- tum palmæ, quod diacalcadici dicitur: verum est q̃ possint sic dici. tamen melisse iterum scribit unguentum palmæ: quod non est idem, & differunt inter se: hoc vnguentum di- citur diaphœnicon, quia conficitur cum famis palmæ.

Zirbus est pinguedo inuolens intestina, & hæc pingue- do in terra nostra nominatur radiceilla.

APPENDIX.

Miraculose (vt singula alia), unguentū hoc GALENVS in- scriptione emplāstri δια χαλκίτεας, iis uerbis. i. Medica- men. κατά τὴν, memorix tradidit.

DE AMPLASTRO PHARMACO
DIACHALCITEOS.

Qua ratione seu industria composuerim emplāstrū δια- χαλκίτεας, q̃d a palma græce compositum appello, medicamen- glutinādīs vlcēribus, cicatrice obducendis, & phlegmonis curandis accommodū, ubi liquefactum humide cerati crassi- tudine obtineat, vos quoq; animum exercere, Empiricis ac Thesali sectatoribus cū infecia ipsorū relictis, qui optima pharma- ca Medicis inuēta cōtrariis constare facultatibus ignorant exercere inq; ingenio, ut eisdē mecum usi metho- dis medicamenta possitis conficere, persuasi re ipsa meoꝝ & nostrorū

noſtros ex ratione oīa illa cōpoſuiſſe: cū incidentia Empiricorum. Græci vocant *περίσπασιν*, nugatoria ſit Dicenda itaq; nunc iā eſt propoſiti medicamentū compoſitionis rō. Oleum uetus, & Adeps digerendi uim obinent. Chalcitis, & Palmæ fuccus repellendi, aſtringendi. Ex his igit phar macum compoſui, quo iam compures uti nouiſtis, ideo qđ omnibus ſui generis melius eſt uſu & experientia compro barunt. etenim ratio compoſitionem inuenit. Experientia de inuētorum uirtute decernit, ut etiam rationaliū metho dorum imperitis artiſiciole cōfecta fidem faciant. Porro cum ſuperioribus medicamentis argenti ſpumam tempeſta ui, quæ nihil magni adeo momenti adſerre poteſt, neq; repellentiū quod inſiuit, neq; digerentiū quod iam parti culis phlegmone laborantibus inſuxum eſt, quippe ſiccandi uirtutē habet, ſed non ualidam. Quare ipſam cū aptū medicamē in emplaſtri compoſitionem adiunxi, nam cum præ dictis incoquū, donec conſiſtentiam quæ nō polluat, conſe quatur. Adipē uero inſuſum, & quā maxime fieri licet uetu ſiſſimū cō conuenit, tum oleū uetus ſimiliter, qđ cū Suillo adipē quoquo nō propinquā uirtutem habere didiciſtis. I cet adeps paulo maiore emolliendi, calefaciendi; uim obri net. Audiſtis autē uetulaſte ipſa tenuiorum partiū fieri & digerere prōptius eoq; phlegmonis quæ magnā parti dolo rem inferunt, magis blanda. ac mitia ſunt ipſa recencia. iis uero quæ tales non ſunt, cōmodiora uetula & quo phleg mone diuturnior, & cōtūacior, hoc magis ueteta pſunt. ac ſola curare ualēt, mō præterea nihil aſſiſcite parti inſuāt. Quod ſi aliquid inſuſerit mixtam eſſe medicamenti quoq; uirtutē oportet, cuiſmodi hēt a me cōpoſiti phar macū, ac propterea Chalcitidem, & Palmā dirigentibus admiſcui, non ignarus paucas adeo phlegmonas diuturnas exiſtere, quibus nihil inſuāt nā ob humores in eas conſuentes diu tinā eſſe ſolēt. poro dū hęc incipiūt, & accreſcit, aſtringē tiū refrigerantiūq; medicaminū uirtus recte præpoller ideoq; hoc emplaſtrum phar macū aduſq; humidū ceratū pſi ſtudinem liquefactum multis uile reddit, interum uino ad iecto, uel aceto, uel aqua illiqueſcēs, nōnūquā ex oleo im matura *δυσπνέτης* appellāt, uel alio quodā aſtringētē, quale eſt Hiſpaniæ, & Hiſticiū, uel ex dulci quodā aſtrictionis ex pte, uel etiam uetula *ε. egoquoq; myrræ* & melino, ubi ualidius aſtringere res poſſulabat, medicamētū ſæpe libu ſeci. Hęc ipſius compoſitio tali ſymmetria conſtat.

Uetuli adipis, quem inſitiores axungiam appellant ſunt pondo duo.

Olei ueteris, pondo tria.

Argenti ſpumæ, tantūdem.

Chalcitidis, pondo uicē quatuor.

Hęc ita coquere oportet. Adipemembranulæ oēs exi muntur, reliquum cōtunditur, ut facile liquari poſſit, mox ad ignem liqueſcit, deinde per colū diſtillatur ut purū fiat: ni hilq; membranæ habeat, pondo duo prædicta pendens. Po ſtea chalcitidis leuioræ pōdo triens cū olei quadratē adipi miſceſ, his argenti ſpumæ pōdo tria adiiciuntur, ac oīa ubi ſimul in mortario coierint, cōiciuntur in cacabū, ac rudu cula palmæ mouent, ſufficiat autē ramus vnus maiuſculus, ut ſolida *ἀγνι* parte mouēdo uariis in modis ſpathæ dictæ, uocant. n. ſic quo cōſectus mouent, & nos perſpicuitatis gratia ſimiliter nominabimus. Quod aut ſolide parti con tiguū eſt, circūcidit, & tenelli uerinq; procedētēs ramuſcu li decepti contunduntur, ſed cortice prius exuto, ut ſegmē ta inieſta phar macū ſucco lo imbuat, inſiciat, proinde ſtatim ab initio ſpatha utendum eſt, ſed tenia palmæ frag menta iniicere oportet ubi medicamentū cerato conſiſten tiam ſimilē habuerit, nā ſi prius inter initia immittas ſuccus ipſorū quē manere uolumus ex decoſione conſumetur, in ſuper ſpathæ, quam medicamentum mouetur, pars intincta poſtquā inareſcit, ut propriū ſuccū nō amplius ſeruet, ampu tata reſciuitur, reliqua eſt uſui. Hęc ruriſ quatenus me dicamento intincta ſiccata fuerit, ſimil modo abſcatur, cō ſtare aut uobis arbitror qđ palmæ ramū non multis diebus ante abſciſtum arbore eſſe oportet, quippe uelut interual lo areſcit, & ſuccū amittit. pridie igitur p hyemem aſſera

tur, ætate eodem ipſe die quo coſectus eſt pahar macū, ubi iam coſum puritate, ut taſum non inquinet, acquirſit medicamē: hoc emplaſtro utere ad ulcera, quæ cicatricem ægre ducunt. *δυσπνέτης*, græce uocantur, & ad cruenta oleo liquefactum, ſi tamen chalcitidis uncie ſex immitant, quæ eſt ſelibra, medicamen ad magna uulnera glutinanda prompius, atq; ad ea quæ cicatricē ægre ducūt, eſſicaciſ ſiet. Huculq; GALENVS At inſuper nunc uſū, nunc oleum tum Hiſpanum, tum Hiſtricum, tum Omphacinum, ſeu Omotibes, Latinis crudum ſeu immatura uocitatū: tum dulce: uerū nec recens, nec uetuluſtum: tum uetus: tum cicinum, tum roſaceum, nunc acetum, nunc hyoſcyamos, nunc ſuccus tū mandagoræ, tū ſolani, tum pſyllii, tum uuz acerbæ, tum porulacæ, tum ſemperuiui, tum pomorum, tū papaueris, meconiū appellat, tū glaucii, tum laſtuce, agre ſitis nempe, ac hortenſis, quæ uniuerſi græci huius tempeſta tis non *θριδ δ. ucinum*, ſed *θριδ δ. κακ* nominant, agreſtem ſolam *θριδ δ. κακ* uocant, ſed ſeceto, tum polygono, tum trifolii, tum muris auriculæ tū paluſtris lenticulæ, tū ſeminis li niæ, ac chamæmeli, cum coriandri, nunc aqua & acetū ſimul, nunc calx uiua, pro uariis medentium ſcopis belle iniiciū tur, ut ſuſius inde ſtudioſi facillime colligent.

I I.

Diaphœnicum Atabicum.

Æ. Folioꝝ cheiri, ſaluæ, triaphyllon acetof, acori an. lib. i. terantur cōtione bona, & funde ſuper ea in uafe lapide olei roſati aut myrtini, & adipi ziri antiqui & colati an. li. ii. s. dimitte p dies ix. deinde accipe myrrhæ mundæ, aloes ſuccotentiſ an. aut. viii. ſarcocollæ aur. vii. terantur & cri bellentur & proſiciantur ſuper ea in uafe alio lapide o. uini albi, aut ſucci, atnogloſiæ longæ, plantaginis maioris, in quo coſta fuerint: ex ſoliſ eatundem herbarum an. ſ. iiii. & ſit uini aut ſucci, qđ fundit ſup ea quæitās ſufficiens ad di ſoluendū ea, & dimitte per dieſ ſex: deinde redeas de her bas: & decoq; cum oleo, & adipe ebullitionibus duabus, & cola & exprime oleū & adipē, & Æ. byex expreſſionis lib. iiii. s. lithargyri mundi & tti conſtrictione ultima lib. iii. & in alio li. iiii. s. calcadis. i. uiculi albi. ſ. iiii. & terat & co quātur: & ſicut ſuperius diximus in ungueto diaphœnicon.

COMMENTA. MANLIJ.

Iſtud unguentum ſecundum intentionē Meſ. eſt unguen tum diaphœnicon. poſtea ait: Quod hæc eſt deſcriptio ara bica: & eſt unguentum arabicum. non autē dicitur arabicu a gūmi arabico, ſed dicitur atabicum, quia in illis partibus ſuit inuentum, & utuntur ipſoſed nos raro.

Cheiti arabice eſt planta, quæ flores citrinos ſeu aureos producit, & eſt uiola citrina. Auer. in. ſ. col. ait. alcheiri eſt uiola de romanica. Sera. cheiri eſt planta nota, hīs diuerſa tem in ſpecie ſua, quæ a diuerſitate forum cognofcitur, nā quædam habent album, quædam purpureum, & quædam cō trinum, quæ habet citrinū melior eſt & aprior in medicina, & hæc ſatis eſt nota.

Triaphyllon acetofum. i. trifolium acetofum quidam dicunt quod eſt ſallum, quia repetitur in Nicolao triaphyllon. Et ibi dicitur quod triaphyllon dicitur a uicidibus ſoliſ ru tæ quæ in eo ponuntur & dicit qđ hic idem intelligitur, ſed ignoro. nam in aliquibus codicibus Meſ. antiquis inuenitur trifolii acetofum, qđ melius eſt, & herba dicta alenia ſue panis cuculi, quæ in ſapore eſt acetof. Præterea uidet apud Math. Syl. in ca. de pane cuculi, quæ dicit de iſto trifolio.

I I I.

Κρότος: magnum, uulgo mendole,

Ceraſeos magnum.

Æ. Ammoniaci. ſ. i. bdellii, oliban. ariſtoli ochiæ rotundæ, ſar cocollæ, an. 3. v. myrrhæ, galbani, an. 3. iiii. lithar. 3. xv. aloes opopanacis an. 3. ii. s. ſloris xris. 3. iiii. refinæ. 3. iiii. ceræ albæ 3. ii. olei quantū ſufficit, ammoniacū, & bdellium diſſoluitur

Lnmi. Ma.

N

in aceto, lichargitum teratur & decoquatur cu oleo donec liqueat, & tunc remoueat ab igne donec infrigidetur, & proice sup ipsum armoniacu, & bdellium dissoluta in aceto, & reduc ad ignem donec coagulet, & post illud proice super ipsum reliquas medicinas & administretur.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum apud nos non est in usu sub isto nomine uerum em chirurgicos est in usu sub nomine unguenti apostoloru, & sic sine dubio si legis hanc descriptione cu descriptione unguenti apostolorum quam Aui. describit, uidebis qd fere sunt idē. Petrus Argillata in ca. de medicinis mudi catiuis uel absteruis, hēt unguentum apostolorum mundificatiuum, & est descriptio Aui. & in fine eius descriptionis ait: & si bulliat usq; ad ingrossationem uocat ipse Mesuz ceraseos, & dominus Magister Antonius de Ianua gratia Dei quia mire reificat ulcera maligna. Niculus Floren. in lib. 7. in ca. de medicina absteruisa ait sic. Aliud de gummis ad mundificandum saniem grossam. Bz. galbani, armoniaci, resinæ, & terebentinæ, &c. postea ait conficiatur unguentum ex eis, & est unguentum apostolorum, & hoc unguentum qd decoquitur donec nigrescat, uocatur a Mesuz unguentum ceraseos, & a quibdam uocatur gratia Dei, quia mira biliter mundificat ulcera maligna, sed unguentum gratia Dei est aliud apud nos, de quo infra.

IIII.

DE ARTHANITA MAGNUM.

R. Succu arthanitæ lib. iiii. succu cucumeris asini lib. i. olei irini lib. i. butyri uaccini lib. i. pulpæ coloquintidæ .j. iiii. po lyopidi .j. vi. euphorbii .j. s. que terenda sunt tere, & submerge in succis & oleis & pone in uase uitreato stricti orifici, & stringe caput eius, & dimitte per dies. viii. deinde bulliat totu ebullitione una & colet, & proice super colaturâ serapini aur. v. myrrhæ aur. iiii. ita q; resoluat prius in aceto uini, & aggrega oia simul & bulliant, agitando semper cum tulle usq; ad succi fere consumptione tunc proice sup ea ce rx. j. v. fellis uaccini aur. vi. feruat cu eis usq; dum liqueat cera: deinde pulueriza super ea sicut conuertito scamoneæ aloes, mezerioi. herbæ oliuæ, colloquintidæ au. aur. v. euphorbii aur. ii. salis gemæ aur. iiii. turbit aur. v. piperis logi, zingiberis camemille au. aur. ii. cōficiant & administrentur.

COMEN. MANLI.

Istud unguentum est in usu, maxime secundum istam descriptionem que magnum nuncupatur: parum uero non tā tumidum Mes. in ca. de arthanita habet duas alias descriptiones, quæ idem sunt.

Arthanita fm Aui. in. 2. can. est hoc buchomarien: tamē miror qd idem in. 3. can. in fen. xvi. in cap. de cōpositione solutiouum eius, qui hēt cholici ex uentositate aur materia phlegmatica, de quibus hēt clysteria, ponit ibi buchomarien & arthanitan. ergo falsus est textus secundū can. Rasis in. ix. Alman. in ca. de cholica idem habet. idē in ca. de apoplexia in clysteris idē habet. Aui. aut. in. 2. can. dicit: Arbor Mariz est buchomarien. & iā dictum est de ea: & est tritum spētum, una spēs eius sine fructu & dux cum fructu. ego nō intelligo quid uelit Aui. per talia uerba: nam arbor Mariz est rosamarinus. & buchomariē fecūdm ipsum est arthanita, qd nō est possibile. error nero qui inuenitur in ipso apud me nunquam separabitur. hodie generaliter habetur opinio: quod Rasis in illo loco errauerit ponere buchomariē & arthanitā sed non recte, quia in hac inuenit differentia que reperitur inter scedenegi sine h, & inter schedenegi, cu h, similiter est differentia inter buchomariem scriptu cū litera t, & inter buchomariē scriptu cū litera c, nam ibi Rasis hēt buchomariē scriptu cū litera c, & hæc est arbor Mariz sue rosamarinus. Si uero reperias buchomariem est vera arthanita: de qua uide Sera. in ca. de cyclamine, qui inquit, Buchomarien. i. cyclamē. in ca. uero de arbore Mariz dicit: qd est libanotis, ergo ē rosamarinus, & sic si bene legis uidebis qd buchomariē est arbor Mariz: & buchomariē est cyclamen seu arthanita. Franciscus de Pedemontū in ca. i. de dolore intestinorū & medicinis eius ait: Buchomariē est radix pyrethri uel maliterre, qd est falsum: nam

buchomariē non est pyrethrum: uel uisī diceret buchomariē est malumerræ, sed non pyrethrum.

V.

DE ARTHANITA PARVVM.

R. Succu arthanitæ, & niscositatis quæ mulgeur, ex radice filicis, & succi chamæ. ana .j. viii. succi extremitatum tamarisci. j. ii. olei irini lib. ii. hyssopi humidæ. j. v. armoniaci bdellii, an. j. s. acceri quantum sufficit, ceræ citrinæ. j. vi. corticis radicis capparorum. j. s. spicæ felicitæ nardi. j. iii. fiat sicut superius diximus.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum de arthanita parauit non est in usu. Verum sunt ex hominibus qui faciunt unum pro alio, quia iā isto pau ciōra simplicia ingrediuntur, sed non recte faciūt.

Filix scdm Istā singularitate folii dicta, denique ex una uirgula altitudine cubitali uel scissum folium gignitur res, applicata uelut penna Diosc. aut de ipsa duo facit cap. unum de dipteris, aliud de felitro: secundum uero Mat. Sydiptaris est polipodium, sed nō recte. nā si legis cap. de dipteri apud Diosc. cum ca. de filice apud Sera. uidebis qd idem sunt. ipse uero Sera. in uno cap. loquitur de masculo & foemina. Aui. in. 2. can. duo capitula facit, unum de childarū, & aliud de saracæ. hæc apud Diosc. nascitur sine femine: sine flore, & sine hasta, sed quidam modernorum dixerunt, qd in nocte sancti Io. aliqui uadunt ad locum ubi filix nascitur, & ibi stant per horas tres, & dicunt qd cito in illa hora filix gerit florem, post tunc: Deus misericors scit.

Camelalis istud uocabulum est corruptū. nam quædam descriptiones dicunt cauhenzich, quædam camelalis, quædam chameacis quod melius est, & sic hodie habetur opinio qd debeat dici: e chameacis, ergo est ebulus, cuius ortus est iuxta fossos. Camella in lib. de cultu hortorum ait.

Parturit & rutilas ebuli creta uuida baces.
Nam neq; siccata caput, nec quæ stagnata palude,
Perpetitur quæruæ semper conuitia ranæ.

Tum que sponte sua frondosa educat olmos.
Hæc est species fambuici, & est quam nostri rustici Loriceum dicunt.

VI.

ALHARIEL.

R. Alhariei rectituum. j. x. axungie porcine. j. 3. xlv. terantur simul & dimittantur marcescere per dies. vii. deinde bulliant, & colentur, & seruetur unguentum in uitri uase, & administretur ubi oportet.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum apud nos non est in usu: uerum ut dicunt, fuit, chirurgici utuntur ipso nomine ruptorii de cāta ridibus, & dicit qd alhariei sunt cantarides. sine dubio uidetur habere eandem uirtutem. Præterea in sine practice Dini Florentini uidelicet in antidotario habet unguentū alhariei: & ibi ponit ad literam quod sunt cantarides. ergo unguentum de alhariei est unguentum de cantaridibus. infra apparebit una alia descriptio sub nomine unguenti de cantaridibus, sed non erit eadem.

VII.

ROSATVM.

R. Axungie porcine recentis quantitatem quam uoueris, & lauetur in aqua calida nouies, & tantundem cu aqua frigida lauatiōe ultima, deinde terantur cum ea rosarum rubearū recentiu quantum ipsa, & dimittantur marcescere per dies. vii. deinde coquantur cum facilitate, & colentur, & iterū tantundem rosarum terantur & dimittantur per alios septem dies, & fundantur super ipsum lucci rosarum circiter parte. s. olei amygdalini partes. vi. & iterum coquantur cū facilitate usq; ad succi consumptione, deinde reponatur & administretur & quandoq; dissumpuitur in aqua rosata parum opii & proiciatur in decoctione, & est mirabile ubi oportet: & proprie quando uigilie adstint.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum est in usu dicitur aut rosarum pp rosas quas recipit. Diosc. rosa aquosa colore mixta ē, due generantur in ea qualitates alterna. s. typica & amara flores autē

eius plus sunt styptici: & ideo plus deficcantui.

Axungia porcina pinguedo est satis nota. Sera. ex auctoritate Gal. ait in cap. de pinguedine. quando animal est humidum generatur in eo pinguedo: sicut porcus: & qñ est sic cum generatur in eo adeps sicut thaurus, capra, & alia quæ habent cornua. Dioscor. in cap. de axungia cum tunica ait in illo cap. confectio quæ sine sale est pessariis miscetur axungia porcina & ursina, conficitur sicut docet ibi.

APPENDIX.

Adipes est DIOSCORIDE odorandus nemo nõ pulcherrime didicite, unde proflus hunc componendi modum originem traxisse arbitror, libro nempe. 2. cap. 86. Quem locum (si cura plurius), studiosi percurrant.

VIII.

VIOLATVM.

Vnguentum violatum ualet sicut rosatũ, & confert pleuritidi, & inflammationi pectoris sit ut rosatum.

COMMENTA. MANLII.

Hoc apud nos non est in usu est rosatum.

IX.

BASILICON magnum.

¶ Cerz. albæ, refinæ pini, sepi uaccini, picis. f. naualis, glutinis, olibani, myrrhæ an. ʒ. ii. olei quantum sufficit. in alio cerz. ʒ. vi. picis. ʒ. iiii. & aliorum an. ʒ. i. s.

COMMENTA. MANLII.

Istud vnguentum est in usu: maxime secundum istam descriptionem, aliud uero quod minus non tantum. Aui. in. ʒ. can. habet duas descriptiones sicut habet Mesuiesed nõ cõcordant cum istis uerum differunt parum. dicitur autem basilicon. non quod basilicon. i. ozimum ingrediatur. sed fin quosdam dicitur basilicon a suo Compositore. nam basilicon seu basilicon interpretatur regale seu imperiale. nam græci uascula regem seu imperatorem dicunt. inde basilicon vnguentum regale est tetrapharmacum.

Gluten olibani. i. thus: quidam autem crediderunt quod per gluten olibani intelligeretur dux res: uidelicet per gluten terebintina & per olibanum thus: & hoc approbatur: quia Aui. ibidem habet loco eius glutinis alibanc. i. terebintina: sed ueritas est q per gluten olibani intelligitur solum thus: quia fatis est, notum fide Leonardus de preda palea: in cap. de cura ulcerum in generali. idem habet glutinum alborin & olibanum. ergo debemus ponere in isto unguento terebintinam, & thus: quia fatis conueniunt: tamẽ intentionem Mesuiesed solum thus debet poni.

X.

DE BDELLIO.

¶ Bdellij. ʒ. vi. euphorbij. ʒ. iiii. castorei. ʒ. iiii. serapini. ʒ. iiii. cerz. ʒ. xv. olei sambucini, aut olei de cheiri. ʒ. x. bdellij & serapini dissoluant in aqua rutzæ agrestis, cetera liniantur, cum aqua calida, & fiat unguentum, & liniatur cũ eo.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu. Bdellij est gumi arboris quæ nascitur in terris Arabi: & melius ex eo est illud quod est amarũ clari coloris: & in se non habens ligna nec sordes.

XI.

PHILAGRIOS.

¶ Cerz. ʒ. iiii. hyssopi humidæ succi rutzæ agrestis an. ʒ. ii. euphorbij, pipiperis, armoniaci, croci, * olei balsami, castorei, glutinis, alibanc. i. terebintinæ, poppanaci, an. ʒ. iiii. figz. i. i. floracis liqidz. ʒ. i. s. olei quantum sufficit.

XII.

A V R E V M.

¶ Cerz. citrinæ, ʒ. vi. olei boni lib. ii. s. terebintinæ. ʒ. ii. resinz colophoniz. i. picis græcæ an. ʒ. i. s. olibani, masticis, an. ʒ. i. croci. ʒ. i. misce & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu. Dicitur autem unguentum aureum, quia est optimũ & excellentissimum inter alia unguenta, sicut & aurũ preciosum inter metalla. Leonardus de preda palea in cap. de ulceribus ambulantijs hẽt alia descriptionem sed non est eadẽ Nico. Flor. in lib. 2. in cap. de maturatione uariolorum, & cura ipsarum post apparitionẽ, inquit sic, Et quan-

doq; confectio unguetũ de cerussa & litargyrij, & unguetũ rubei est bona ad ulcera uariolorum: & hoc unguentum est illud quod ponitur in antidotario: & hoc uocat ibi unguentum aureum: hoc ego ignoro, quia Aui. in. ʒ. can. habet unguentum rubrum, quod idem non est. Gilbertus de Anglia. in cap. de cura arthritidis, scđm Magistru habet unam descriptionem unguenti aurei, sed non est eadem.

XIII.

DE CERUSSA.

¶ Cerussa, merdasengi, an. ʒ. vi. plumbi adusti, scoriz argeti an. ʒ. iiii. masticis, olibani an. ʒ. ii. s. olei. ros. & acet. q. j. terantur in mortario, & ponatur prius oleum, post acetũ añ parũ infundendo, ita q sine intermissione teratur, nunc hoc nunc illud infundendo donec impingatur. si autẽ eo indiget pruritum habens, argenti uiui. ʒ. v. adde & administra, & quandoq; apud necessitatem adde ziniar. ʒ. ii.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu: solum sub nomine unguenti de cerussa ad phlegma salsum: sed quando medicus ordinat unguentum de cerussa simpliciter, intelligitur una alia descriptio, quæ infectius apparebit. Bartholomæus Montca. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem, sed non est eadem, nec in usu uenit.

Cerussa scđm Aui. est cinis plumbi, aut alaunoch: & tamen in ea quæ fit ex alaunoch: multũ elaboratur in adurendo sit alreng, & acquirat superfluum subtilitatem: quandoq; uero sũt oēs cerussæ cum aceto, & quandoq; cum salibus: & quandoq; sunt pluribus modis, scđm quod scitur in libris huius artis. Leonardus de preda palea in cap. de inflammationibus et uescis inquit: Cerussa. i. balacca.

Merdasengi. i. lithargyrium: sicut inuenitur apud Auer. in. ʒ. cof. Aui. in. 2. can. ait. Merdasen. est plumbum adustũ: ergo lithargyriũ scđm Aui. est plumbum adustũ: nõ hĩc aliud intelligitur, quia ibi ingredit merdasengi, & plumbum adustum, quæ idem non sunt. Leonardus de preda palea in cap. de inflammationibus & uescis in quodam unguento inquit: Merdasengi. i. lithargyriũ & sic hodie loco merdasengi lithargyriũ ponũt. plumbum adustum: scđm Aui. in. 2. cã. est merdasen. i. lithargyrium, sed hĩc aliter intelligit. Gal. in lib. secretorum in cap. de squinantia ait: Merdasengi. i. plumbum: plumbum uero uena est terre similis antimonio ac lithargyrio, & fatis notum est. Et modus adustionis eius superius habitus est.

Scoria argeti scđm Sera. ex auctoritate Alcanzi est ster eus argeti, & est bona scabiei & pruritui: quidam lithargyrium putauerũt, q non est Liber q dicit Bulchasis in tracta tu primo inquit. Doctrina qualiter aduratur scoria argenti & auri ex libro almeiamir: quibus utimur in collyrijs. de scoria cabrusæ quantum uis, & tere ipsam grosso modo & confice cum melle ipsam: & pone ipsam in uase siccili nõ uo, & fac ut ibi docet Aui. i. ca. de zre de alcabrusli loquit.

Argentum uiuum, aliud est minerale, aliud artificiale: artificiale conficitur ex minio & cinaprio. minerale autem inuenitur in mineris metallorum, & pp id inter genera metallorum est positũ: quorum spēs metallorũ scđm sũdo. sũt septem. scilicet aurum, argentum, plumbum, stannum, zẽs argentum uiuum, & ferrum: quidam posterũt argenti sublimatũ, ce-russam, & lithargyrium inter genera metallorum. Gilbertus de Anglia in cap. de cura lepræ in generali dicit, quod sit de mercurio. i. argento uiuo: hoc autem confertur in uasis plumbeis, aut uitreis, aut in uasis de terra uitreata, aut in uescis, quia alia uasa corrodit, & ipsũ computatur inter uenenosas medicinas.

XIII.

AE GYPTIACVM MAGNUM.

¶ Floris zis. aur. v. mellis t aur. xiii. acet. fortis. aur. vii. coque super ignem donec inspissetur, & sunt qui addunt in eo olibani masculi triti aur. ii. s.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu: maxime scđm istam descriptionẽ. Rasis in lib. diuisionũ in fine, in cap. de medicinis algebra, habet unã alia descriptionem, quæ est quafi eadem Lumi. Ma. N 2

Leonard. de Predapalea in cap. de ulceribus profundis habet unam aliam descriptionem quæ eadem est. Forma autem istius unguenti, efficitur in colore rubeo. nam quando flos coquitur colorem rubcum acquirit.

APPENDIX.

EX GALENO sumptum dixerim ne dum.iii. Metho di Medendi: uerum maxime.ii. Medicamentorum per genera abudè uiridia emplastra perscribens. nec suis inscriptionibus Aegyptia seu fusca malum, emplastra.iii. Medicamentorum *αλτα γαμ*, multum inturbant, cum potissimum ab his longe diuerfa existant.

XV.

TRIPHARMACVM.

R. Lithargirij tritis, sicut alcohol. i. subtiliter, sicut atomi solares partem unā. & funde super ipsum nunc oleum, nunc acetum, & teratur. & adequetur, & propriæ quantum sufficit, & administretur.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum sub isto noie non est in usu. uerum secundū chirurgicos est in usu sub nomine unguenti de lithargyro: tamen inferius iterū apparebit descriptio unguenti de lithargyro, qua generaliter utimur: dicit aut tripharmacū a tribus medicinis quæ in ipso ingrediunt. Auic. in. 5. can. habet descriptionē unguenti nigri, & eadē est huic.

XVI.

PSORICVM, uulgo alsefericon, Alexandri.

R. Cersuffæ, lithargyrj, alsefericon, aloes boni, croci argenti uiui extincti an. partes æquales: olei de oleandri, & acetum quantum sufficit, fiat scilicet unguentum de cersuffa.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Auic. in. 2. can. de ipso facit cap. sub nomine fasuricon, & dicit qd est medicina ad scabiebim, facta ex lithargyro calcidis. i. utriusq; & aceto, sine dubio alsefericon ē medicamē cōpositū: cuius descriptionē Mes. inferius describit, & si facere uolueris unguentum alseferico similiter oportet facere cōfectionē de alseferico.

Oleander apud Dios. uocatur nereon. lido. ait: Rodandrum quod corrupte uulgo lorandum uocatur qd sit foliis lauri similis: florem habet ut rosæ, arbor uenenata: interfecti. n. animalia, & medei serpenti uexationibus, descriptionē aut olei ipsius describit Rasid, de qua infra erit fermo.

XVII.

PSORICVM medicamen cōpositum, uulgo Cōpositio alsefericon.

R. Lithargyrj, albi, chalcanti. an. partem unam, floris æris partē mediam: terant cū aceto uehemētē forat in sole tempore æstiuo fere per diē unā semper ante modicū addēdo acetū: deinde ponatur in uase uitreo, & stinguatur os eius & sepe liatur in fimo diebus. xl. deinde administretur.

XVIII.

PALMEVM.

R. Olei ueteris lib. iiii. axungie ueteris depuratæ a sale lib. ii. lithargyrj lib. iij. utriusq; .j. iiii. cōficiant sic. oleū & axungiam intant in stānato supra ignē & liquefiant. deinde addatur lithargyrj & utriusq; & ducant cōtinuē cū tribus ramis palmæ, & accipe unum ranum palmarum minutatim incisum, & intromittatur, & tandiu bulliat supra ignē lentū factum de lignis siccis donec infleat & redeat ad suum statum, & inspissetur, & densitatem habeat.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu sub isto nomine, uerum est in usu apud chirurgicos sub nomine unguenti de colocotar. & sic sine dubio possunt uti sub isto noie: nam uide qd Nic. Floren. in lib. 7. in cap. de curatione phlegmonis ingit. Sic est emplastrum de colocotar: & est illud quod uocat Serap. in suo antidotario di palmā. Leonardus de Predapalea. in ca. primo de phlegmone ait Vnguentū de palma. i. de colocotar re latū ab Auic. & sic est quod Auic. in. 5. habet unguentum de calcadis, quod quasi idem est, de quo infra.

APPENDIX.

Idē cū *ἀλτα γαμ* Galeni emplastro exit, cuius cōpositionem hac in sectione num. i. per pulchre monstrauimus.

De flore æris, in cap. de uulneribus narium.

R. Cera. 3. iiii. olei antiqui uel facti ex oliuis immaturis. i. olei omphacini. 3. xvi. floris æris puluerizati sicut alcohol. i. subtiliter. 3. ii. fiat ex eis, & utere cū lycinio, & quādo; ad dicitur & minuitur ex flore æris, scdm qd exigit necessitas.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Auic. in. 5. can. hēt unam aliā descriptionem quæ eadē est nisi solū in uno, & hoc est qd Mesue nō ponit refinam. Auic. uero sic. in reliquis idē sunt Ioannes Sera. in suo antidotario habet unguentū de ziniar: quod est idem cum unguento de flore æris apud Auic.

Flos æris. fm Simonē Ianuensem non est uiride æris. uerum hodie ponunt loco eius: quia reperitur in multis locis ubi unus doctor habet florē æris: in uno alio loco habet uiride æris. nam uide Rasim in sief de calcanto ubi habet ziniar. i. uiride æris. Gulielmus Placen. loco eius hēt florē æris. Petrus de Argellara in ca. de medicinis modificatiuis uel absterruis in unguento apostolorum habet. R. uiride æris. Auic. in. 5. idem habet. R. floris æris. Item Ioannes Se. in suo antidotario habet unguētū de Ziniar. Auic. in. 5. can. habet unguentum de flore æris. qd idē est. & sic hodie unū pro alio ponunt. Serap. dat modum eius, sicut apparebit infra in emplastro apostolicon &c.

EX NICOLA O.

XX.

Alabastr nardi spicati.

R. Saurinæ uiridis. 5. v. hedere teranæ uiridis, millefolij artemisij, gallæ, cupressi, fenugraci, herbæ benedictæ, feminis lini, rosamarinis, omnium octo. 5. vi. pone hæc oia simul trita in aquæ sextari. xii. & dimitte macerari usque ad tertium diem. postea adde olei sextaria. v. diligētē cū cautela tādū coque usquequo ad oleū pueniat remota aqua. remoto uero ab igne, & colato per facculū nitidum adde cera. 3. vii. cōphoniz, terebinthacis, galbani, masticis, gūmi hædere, resinz, olibani, myr. an. 3. v. storacis calamiz, cozumbrj, spicæ nardi, omnium triū. an. lib. i. balsami. 3. iiii. qd terēda sunt terræ, quæ liquefaciēda liquefac insumul mixtis oibus, diu agitato cū spatula misce. deinde uisui. resūa &c.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum alabastr est in usu. Appellatur aut unguentū alabastr nardi: non qd alabastrū ingrediatur. hodie nā aut utunt unguento alabastr, & in eo ponūt alabastrū qd est genus marmoris: sed non recte, quia ex meo iudicio alabastrum in hoc non debet ingredi. nam hoc unguentū inueniē in lib. 7. Giliberti Anglici in ca. de retentione menstruorū, quod alabastrū nō habet. Papias uero ait: Alabastrum genus marmoris, unū fit uas in quo de intus unguenta cōseruāt, & ideo pro unguento ponitur. nā sine dubio hoc dicit alabastrū, quia ipsum cōseruari debet in uno uase factio ex alabastrū. Præterea in passione domini nostri Iesu Christi scdm Marcū ubi dicitur. & cū esset Iesus. Bethaniz in domo Simonis leprosi & recubaret, uenit mulier hīs alabastrū unguenti nardi spicati preciosi, & fracto alabastr effudit super caput eius, & hoc est istud unguentum quo, utebant Maria & Martha forores, unū p hoc uide apud Leonardū de Predapalea in ca. de casu & offensione propriæ doctrina ubi sic ait. Nota de unguento alabastrū, qd opatur mirabiliter in cōtusione & attritione, & casu, & offensione, ac etiā in uerberatis, & flagellatis, & tortis cū tortura, & similibus, & uocat unguentū alabastrum nardi de spica nardi piciosa, ga Romani a Hierim artulerūt tpe quo dñs noster Iesu Christus crucifixus est. Bonum & probatū in oibus febribus & rigoribus & calculosis doloribus liborū petrā de uescia rūpit. renū dolorē aufert & he micanetū dolorē amputat, cassibus matricis optime subuenit. Maria & Marthas sorores Lazari hoc unguētū usq; fuerūt oibus diebus uite sue. Scias aut qd ueritas ē, hoc unguētū dī alabastrū nardi spicati, ga cōseruat in uase alabastrū, & pp ipicam nardi quam recipit, & dicit sapientes, qd hoc potest

potest dici vnguētum de spica nardi confertur in vase alabastro. Sautin viriditas dicit recentis.

Hedera apud Diof. vocatur ciffos. Pli. hedera species habet tres candidam, nigram, & elix. Et hæ in species alias dicitur Gal. in li. ad Parthenianum ait: Hedera nascitur in diuersis arboribus, parietibus, vel petris, & terra sed hic in telligitur de illa quæ in terra reperitur, quæ satis est nota, de qua antiquitus coronabantur poetæ, unde Virgilius in bucolicis. Paltois hedera crescentem ornate poetam.

Galla cupressi. l. fructus eius: qui aptus est in medicina. Irid. in ca. de propriis nominibus arborum inquit. Cupeffus græce dicitur quæ caput eius a rotunditate in acumen erigit. vnde & canon vocatur. i. alta rotunditas, & hinc fructus eius conus, quia rotunditas, eius talis est ut conum imitetur vnde confertur cyparissi dicuntur huius lignum cedro pene, p. xianam habet virtutem, tunc plorū quoque trabibus aptū: impenetrabili soliditate, nunquā oneri cedit, sed ea quæ in principio fuerit firmitate perferuat. Antiqui cupressi ramor prope rogum constitutæ solebant, uti odorem cadaverum dū venteret comprimerent iocunditate odoris sui.

Millefoliū est herba quæ omnibus nota est. Diof. miriophyllos, sive ut latini millefoliū. i. supercilium veneris nascitur in palustribus locis, tistum habet ex una radice mollem & subrum, & quā manibus linitū, & folia simili a foeniculo. Pli. miriophyllon, quod nostri millefolium vocant.

Herba benedicta secundū copositorē est phurque alio no mine valeriana vocatur. Simo vero Ianu. ait: Terra benedicta in antidotario olim in vngueto alabastro, quod ignoro: verum est quod Gilib. loco herbe benedictæ hēt terram benedictam, sed Leona. habet herbā benedictam. ego vero ignoro: quid sit terra benedicta, sed herba benedicta est valeriana: quā meo tempore vidi apud in hoc vnguento.

Kosmarinus secundū Diof. est libanotis, sive uero Sera. est arbor Marizæ quæ nitor quæ ipse Sera. in suo breuiario in ca. de hamorrhoidibus inquit: quod arbor maria ē artharita: quod non recte, dicit ab aliquibus corona montis uel montana, eius flores alchili dicuntur: unde zucharum alchili id est de floribus rosifmarini.

Sextarium vero secundū Compositorem. Aui. & Ser. est pondus sex drachmarum, & dauid duorum: secundum Gentilem est pondus. 3. vi. Leonar. ibidem inquit: sextarium est pondus aur. iiii. aureus uero est quarta pars uncie, in uncia sunt octo drachmæ. Hodierni uero generaliter quæ reperiunt in receptis sextarium unius uel aquæ, intelligunt duas lib. cum dimidia, sed per sextariū piperis uel cinnamomi, sex drachmas intelligunt, Deus melius scit.

Colophonia. i. pix græca. Dioscor. in primo li. in ca. de eruptionibus exitialibus ait: Picis sicca. i. pix græca. Item Circainstans. colophonia. i. pix græca: est aut gummi cuiusdam arboris quæ in Græcia reperitur: unde pix græca dicitur, etiam reperitur in aliis locis. Pli. uocat eam bricia dicens: Bricia sit e picea refina: in Hispania autē e picea non sris minime laudata: est. n. refinarum amara, & arida, graui odore: vnde refina fixa: pix bricia, pix romana, colophonia idem sunt.

Cozumbrū sive Compositore est censura Iudeorum, uel thi miamatis, uel thus Iudeorū. Leonar. ibidem inquit: Cozumbrū sunt fœces storacis liquide, ego cozumbrū est storax rubra: quæ utuntur Iudei in Ecclesiis pro fumigatione, est cozumbrū potē dici quod interpretatur oculus fumigum odoriferus.

Spica nardi. i. aromatica. istud uero vnguentum dicitur alabrum nardi propter spicam nardi quæ recipit in multa quantitate. & confertur debet in vase facto ex marmore dicto alabastro.

Balsam. i. opobalsamū nā opus est balsamum, uelut lac. & similiter opobaci vocatur lac ficulneæ ab ipsa. Pli. autem ait: sed omnibus odoribus præfertur balsamū uni terrarum largitus concessum quondā in duobus tibi hortis utroque regio altero iugerum. xx. non amplius, altero pauciorum, Offendit arbutulum hæc ubi imperatores Vespasiani. Clarum quod dictū a Pompeio magno, in triumpho arbores quoque duxi mus, sicut nunc hæc & tributa pendit cum sua gente. In to

tum alia est natura quam nostri externique prodiderant: hoc præciosum est in nostris partibus raro inuenitur, sed infra describam quædam olea quæ possunt poni in omni loco ubi ingreditur balsamum.

XXI.

MARCATION, vulgo Martiaton.

R. Cære alba lib. iiii. olei t lib. vii. rutæ 3. vi. maioranæ 3. vi. tamaricis 3. vi. esbrii, rorifmarini, foliorū laurian. 3. iiii. fauinæ balsamitæ, lilifagi, ozimi, polii, calamenti, artemizæ, enulæ betonice, branchæ vrsinæ, spergulæ, herbæ uenti, pim pinellæ, agri mouizæ, absinthii, herbæ paralytis, herbæ sanctæ Mariæ, cimarum fambuicæ, herbæ crassulæ, millefolii, semper uiuiz, chamædryos, centū neruiæ, centaureæ, fragulæ, quinq. folii, terrari, t. an. 3. iiii. s. radicū euicis, cymarum myrti 3. an. 3. iiii. foenugræ. t. 3. i. s. butyri. 3. i. 3. ii. urticæ, violarum papa ueris nigri, mentæ saracenicæ, & aliæ mentæ, lapacioli polii trichi, carduncelli, matris siluz, maturellæ, herbæ muscatæ, aleluizæ, linguz ceruinæ, crispulæ, camphoræ, storacis calamitæ, medullæ ceruinæ t. ana. 3. s. adipis vrsi, adipis gallinæ, masticis ana. 3. i. thuris. 3. s. olei nardini. t. 3. ii. colligantur oēs herbæ in mense maii: & in uno die aut in duobus si pot ab hora tertia usque ad meridiem, conficiantur sic. herbæ trias diebus septē in optimo odorifero uino infunde, octauo autē die coquantur lento igne, & cū uinū aliquantulum incoeperit consumari addatur lupradictū oleū, & bulliant donec herbæ incipiant dimitti, deinde studiose colentur & piceis herbis iterum super ignē ponantur, & cum bullire incoeperit, ponatur storax, & cum modicū bullierit, ponatur butyrum, & axungia confusa, & oleū nardini. i. de spica nardi, & masticæ, & olibanū, & postea cera. Et cum cera liquefacta fuerit bene cū spatula semper agitando ab igne deponatur, & cum coagulatum fuerit in vase reponatur.

COMMENTA. MANLI.

Istud vnguentum martiaton dicitur a Martiatone peritissimo medico a quo fuit inuentum. hoc apud multos apothecarios si usu est, sed pauci sunt apothecarii qui ipsum faciūt, immo emunt a mercatoribus Ianuensibus, & hoc aduenit quia ibi ingrediuntur multa simplicia quæ difficilia sunt in ueniri, de quo cōsideraui dicens, si in partibus Ianuæ ac in aliis faciunt, nōne idem possumus cōponere nos? nam sine dubio idem nos possumus cōponere, & melius, quia ego fui in partibus Ianuæ & interrogauit apothecarios qui com ponunt prædictum vnguentū, qui in multis simplicibus certant, & ponunt in eo quid pro quo. inam rem pro alia, sed ego taliter agā quod nos & alii apothecarii facere poterūt. Gilib. de Anglia in ca. de cura arthriticæ secundū Magistro hēt unā aliam descriptionē quæ eadē est. eandem hēt Leonardus de predepaia in cap. 1. de cōsuetione & attritione.

Rutz. s. rute domestice, hæc satis nota est. Secundu Circainstans: quis est totus circumdatus ruta uindit secure potest accedere ad interficiendum basilicum, sed hoc credo quod apud ipsum nunquam fuit probatum, nec apud me.

Maiorana herba est satis nota hæc est quam Diof. sampsu cum uocat. Pli. amaracū. Diodes medicus & Figulagus appellauit, quod Aegyptus & Syria simplicium. In hac sunt diuersæ opiniones. nam Giliber. loco eius habet amoniaci. Leonar. non habet maioranam nec armoniacam, & sic meo tempore uidi facere ipsum sine maiorana, & sine armoniacā, tamen facit tibi placet.

Tamariscus apud Diof. uocatur myrica. Pli. muricem in Italia nasci quæ tamaricem vocat, certū est Achaia, aut briion syluestre insignē, & quod eam satium tibi ferat, cui gallæ si milis fructus in Syria & Aegypto copiosus. Gale. in lib. ad Parthenianum inquit: Miricas fructuolū afferre mollē fragi bile, & veluti florē tibi Aegypto quidē similem gallæ. huius igit succus in aqua si fuerit coctus pediculus occidit, & culices & pulices fugat, hæc apud nos iuxta aquas nascitur.

Febrium secundū Compositore est flos saluiz. secundum vero Mattieum Syl. est maiorana, quod non creditur. nam Leonar. loco eius habet flores saluiz, quod idem est.

Balsamita idē habent alii, est mentha aquatica seu sylvestris, in hac errauit traslator. Aui. in. 2. can. in ca. de nemea

dicens, q̄ nemē est sifymbriū, quod non est. nā nemē apud Sera. est (serpillum). Balsamia uero siue menta aquatica est herba habens folia similia folijs mentas, sed maiora cū flore coelesti, iuxta aquas nascitur. Multi autem ignorantes apothecarij credunt sed non recte, q̄ balsamia sit quadam herba inuoluens circa muros : quam nos uulgo balsaminam dicimus: sed aliē est: suum uero nomen de balsamina in latino est dictum mēgmordia &c.

Lissifagus. i. salua, unde Macer. Lissifagus græce, sed salua dicta latinē. Dioscelissagus aut lissifagus, aut fagnō Pli. bechion quæ & salua dicitur, alias tusilago. duo eius sunt genera, sylvestris ubique nascitur sed esse aquas credunt ita altera a quibusdam salua appellatur similis uerbascō.

Calamentum est herba satis nota. Isidorus : menta agrestis quum Græci calamentum, nostri uulgo neptam uocauerunt, est maioris uirtutis & uehemens in calore.

Branca ursina scdm Petrum de Crescentiis, calida est & humida in primo gradu uirtutem habet nulliū scdm Moder. duæ sunt spēs. Quarum una habet folia magna, sicut folia caulis: sed incisa. sicut brachia ursini medio eorū est stipis: cuius capite: sunt multi flores purpurei spinosi & cōclusi. hæc uero nascitur in montibus in locis umbrosis. Altera uero spēs habet folia similia folijs parietaris: sed longiora, & in ipsis folijs oriuntur flores cōclusi: sicut prius purpurei, & q̄ siccant efficiuntur spinosi. hæc apud nos iuxta hortos inuenitur: ponitur hæc si habere non poteris priorem.

Spargula scdm compositorē est rubea tinctorum minor & sic hodie habetur similis opinio. Diosc. uocat rubeam & inquit. Rubea quā alij erythrodanum latini, uero rubricam dicit. herba est omnibus nota. eius spēs sunt duæ: una agrestis: alia quæ appellatur sparthos: ramulos siue tirfos habens tenuēs: & quasi nodosa folia: per interualla distantia, atq; per singulas enodationes: ueluti stellarum imaginem mentientiam: fructus siue semen rotundum est & uride, dehinc rubrum, aut circa maturitatem: nigrū, radicē habet tenuē & parua & rubicundam &c. hæc est forma rubee tinctorij, si aut habere nō poteris minore, ponas maiore. minor uero uō ē illa herba quā nostri rustici Rasparella dicit, sed est aliud.

Herba uenti. i. herba uenti maior, & est parietaria eius species duæ sunt. i. maior & minor. maior uero est parietaria siue uitirola, siue alismē uel rectius helxine, ut apud Diosc. siue herba uetri, ut apud Auic. ideni Circainsians ait: parietaria herba est quæ alio nomine dicitur uitirola, quia optime uasa mundificat hoc apud nos in muris nascitur, & dicitur a uulgo ueraxiū. minor uero est cōsolidida minor habēs florem sicut artritica, sed sunt purpurea, & dicunt sapientes: quod utraque in hoc unguento debet poni.

Agrimonia herba est satis nota: apud nos in pratibus reperitur. Diosc. ait inquit. agrimonja herba omnibus nota quæ feraria minor dicit nasci in capis uel circa sepes, cuius radix græco nomine eupatorium dicitur, eo q̄ diuretica sit ualde apud modernos. eupatoriū ē aliud. Gal. in lib. ad parthenianū de agrimonia, & eupatorio in uno ca. loquitur in si ne uero ait. huius igitur radicem græci eupatoriū dicunt.

Herba paralytis scdm Compositore est herba sancti Petri, siue ut alij primula ueris: eius species sunt duæ. i. maior & minor. maior uero est herba sancti Petri que in hortis nascitur cū folijs uiridibus parum incisīs, hæc nota est oibus minor ē illa quā hodie generaliter herba margaritam dicimus, cuius flos similis camomille ē. huius i. paritis plurimū ē.

Herba sanctæ Marię scdm eundem est persicaria: seu fan guis Christi. scdm uero Mattheum Syl. est herba ad albedinem tendens cū folijs rugosis: sicut herba quæ dicit phloisnos. i. rufus barbatus: sed nō recte dicitur: quia si Compositor dicit q̄ est persicaria eius forma nō est, ut dicit Mattheus. Præterea Leonardus ait. herba sanc. Marię flos persicaria, & sic est sim ueritatem & eius forma est: q̄ habet folia similia folijs psici. intra quæ sunt puncta nigra: apud nos iuxta hortos nascitur, inuenitur alia species quæ caret maculis: sed hæc nō est tante uirtutis: quida uocant ipsam zingiber caninum alij persicaria cū sigillo scdm. Petrum de Crescentiis: herba sanctę Marię est menta romana uel saracenicā, quod sal-

sum est: nam in isto unguento utriusq; ingreditur.

Sambucus est actis. Seraf. ca. de sambuco inquit: Quod duæ sunt species, quorum una dicitur a græco actis, & in latino saboca, uult dicere sambucus. secūda nominat in græco chamæactis, & est eius intentio terrena, uel infima actis, & in latino dicit abolas, uult dicere ebulus, & ē arbor ebulluū uersus. Sambucus est actis, sed ebulus est chamæactis.

Herba grassula scdm Compositore est faba grassa: cuius spēs sunt tres. i. grassula maior. i. faba grassa minor uero est uernicularis, media est cardus benedictus, sed Lumen uerius tenebra, apothecarium exponit, q̄ est uernicularis, sed falsum est. nam uera grassula est herba habens folia uiriidia & pingua: ut semper uiua cum flore tēdenti ad albedinem nascitur autem apud nos iuxta fossos: & est illa quā nostri rustici uulgo fabam græcam dicunt: sed non recte: quia aliud est: debet dicere fabam grossam. Infra apparet oleum frigidissimū uiride: & ibi melius certificabo, q̄ grassula non est uernicularis, ut dicit Lumen malelucens.

Semperuiua apud Auic. uocatur succutum, sed non recte, quia succutum est corruptum, & debet dici sumpthum: ergo est cōsolidida maior, sed ipse ignorauit quid esset: apud Diosc. uocatur aizoon.

Diximus accidulum quam græcus dicit azoon.

Sic dicit credunt sapor illi q̄ fit acti. Inferius idem ait.

Altera uero minor species est illius herbe:

Quam semperuiuam dicunt, quoniam uiuet omni.

Tempore barba iouis uulgari more uocatur.

Chamædrys est herba dicta apud nos calamandrina. Pli. chamædrys herba est quæ latine trizaga dicitur, aliqui chamacropeni: alij teuciam appellant.

Centum neruia scdm Compositore ac Gili. ber. est arnoglossa siue platago maior, hæc apud Auic. uocat lingua arietis, & est herba quam nostri rustici Bleam syluestrem uocant. illud uero. Lumē fuscū loco centum neruiæ habet cētauream, quod non recte actum est. nam in isto unguento ingreditur, & centum neruia, & centaurea.

Centaurea. i. minor, sed Lumen malelucens inquit: Centaurea. i. maior, sed non recte. nam uide q̄ Mesue in cap. de centaurea ait: quod eius species sunt duæ. i. maior & minor minor uero est melior in omni re. Isidorus centauream græci uocant quæ a chironē centauro fertur reperta, & eadē & limnosa, quia locis humectis nascitur eadem & fel terree, propter amaritudinem dicta est.

Fragula est herba gerēs fragra. Vnde Ouidius metamorphoseos. Montana quæ fragra legebant. & Virgilius. Qui legis flores & humi nascētia fragra. Apud nos hæc nascitur iuxta fossos: cuius fructus comeditur in suo tempore. Quinq; foliū. i. pentaphyllon. Auic. in. 2. can. duo cap. facit, unū de pentaphyllon. aliud de quinq; foliorum. quod idem est: dicit autem pentaphyllon a numero foliorum: quia per singulas aduodationes habet quinq; folia. Auic. in. ca. de latēcinio ponit pentaphyllonem inter species eorum.

Tetrar. seu herba tetrabit, ut dicit Leonar. scdm Gili. ber. Iudaica. Idem ait Cōpositor, sed multi hodierni apothecarij credunt q̄ dicat torathit, sed non recte quia torathit est fungus nascens in radice rose caninę siue barbe hircinæ: ex quo fit hypoquistidos, & hoc multi ponunt qui errant: nā aliud ē tetrar, aliud est torathit. Si uero Cōpositor uult q̄ tetrar sit herba Iudaica: ergo est eruū. nā Auic. in. 2. can. inquit: Herba Iudaica. i. eruū, & eruū apud Diosc. ē orobum: cuius aliud est pallidū, aliud ubrum, & aliud albū. Circainsians dicit: tetrar est herba Iudaica: & sic est scdm ueritatē q̄ tetrar est herba Iudaica, siue eruū, siue orobū, ergo est eruū, aut illa herba quam rustici Elmocho uulgo dicunt. Eblfus, id est maluauifus seu althea. Auic. in. 2. ca. ait: Althea nomen in græco deriuatum est ex nomine plurium uiuentorum.

Menta saracenicā. i. menta romana seu nigra. Nam eius planta est nigra ad similitudinē faracenorū: cuius folia maiora sunt quā menta hortulanæ: hæc apud nos iuxta aquas inuenit. Petrus de Crescentiis in ca. de mēta ait: Mēta tres sunt species: est enim quādā domesticā, quæ propriæ hortulanā

lana dicit: & est alia syluestris quæ mentastrum dicit & est menta quæ lógiora, latorior, & acutiora hêt folia: & hæc est menta roma, uel faracenica: & uulgar iter herba sanctæ Marzæ uocat, quod salustum est, nâ supra in isto unguento posita fuit herba sanctæ Marzæ: ergo non est menta faracenica, ut inquit ipse. Hic Nico. dicit: & alia menta: idê dicunt alij, ut Gilib. & Leonar. & signat alia species mêtæ quas ipse non noiauit; nam spês menta sunt quinq; de quibus tres noiauit: supra, alias duas non noiauit: idê illas quas intelligere debemus, & alias mentas, est menta còis seu hortulana, & menta strû. Et sic meo tpe uidi in hoc ponere quinq; species mentæ, quæ sunt menta hortulana siue còis, uel odorifera: & syluestra, & est mentastrum: & est alia quæ dicitur faracenica siue romana: & est alia quæ dicitur aquatica siue balsamita: & est alia quæ dicitur menta non odorifera, & hoc est calamintum: & sic omnes iste quinq; debent poni in isto unguê to sed lumen de quo supra inquit, q̃ per alias mentas nò in telligitur nisi menta domestica, sed non recte, vt est notum apud omnes sapientes.

Polytrichum herba est minuta: cuius stipes vergit ad nigredinem: in puteis hanc uidi & in muris, ac in locis humidis: & hoc est satis notum.

Lapaciolum siue lapacioli fîm Compositorem ac Gilib. est lapacium acutû: ergo est acetosa qua generaliter vtunt, & sic est quod illa acetosa qua vtuntur est acutior lapaciolum speciebûs. Macer ait.

Herba solet lapaci vulgo paritella vocari.

Illius species dicunt quatuor esse. Idê ait Diof. in cap. de lapacio Circa inquit: Lapaciolum triplex est maneries. i. lapacium rotundum, acutum, & domesticum, lapaciû folia habens acuta, efficaciûs est lapacio rotundo, minus efficax est lapacium domesticum, q̃ folia habet aliquantulum lata & magna, vbi cuiusdam competunt.

Carduncellus fîm Gilibertû est cardus benedictus. idem dicit Còpositor: ergo est quem Pli. erigeron siue senecion vocat: de qua Ildorus, erigon non a grecis dicitur, quod vere primo senescat. vnde & eam latini herbâ senecionem vocant, nò intelligitur de senatione quod dicitur cressonum, sed de alia herba de qua Macer ait.

Erigeron græci senecio nòsq; vocamus.

Quod canis similis videatur flore capillis.

Nascitur in muris & in hortis & tegolatis.

Hæc apud Diof. vocatur sedû, & apud Gal. in lib. ad parthenianum vocatur suedo, quâ alij fenitio vocant. hæc vero est herba quæ in numero cardonû est. apud nos in hortis ac in muris inuenitur, & est quâ Lombardi herbâ Turcham vulgariter dicunt.

Matis silua fîm còpositorem est oculus lucidus seu capri folium: de hac apud quosdam fit lycium, sed illud lycium est debile. Hæc verba apud nos iuxta hortos inuenitur, cuius folium ab vno latere subalbida, & ab altero viridia: se ad hærentes & inuolutes sæpius super alias plantas, vt est notum. Et est quem Diof. periclymenon vocat, & nostri Cefoli vulgariter dicunt.

Maturella secundû còpositorem est potentilla seu amantilla, ergo & valeriana seu phu. Marth. Syl. dicit: Martorella. i. valeriana: vel phu, vel herba gattæ. sed herba gattæ apud nos etiam habet aliam significationem: nam significat nepi tam seu calamintum montanum, valeriana apud theutenicos dicitur thamaria. hæc herba omnibus nota est. Circa in stans ait: Phu intelligitur radix in medicina. Lumen malelucens non posuit in sua descriptione maturellam, forsân ignorauit quid esset.

Herba mulcata fîm herba mulcata maior. Leona, loco eius habet herbâ garyophyllatâ, sed non recte: Gilib. habet herbam mulcatam, fîm còpositorem est maior & minor: maior autem facit actus & non redolet: minor non facit actus & redolet: quid autem fit còiter ignoratur. nò. n. est luma mulcata, vt quidam dicunt, nec eius forma est. dicit Lumen nia Ielucens, veritas autem est quod herba mulcata maior est herba dicta fecabron, quæ folia habet minuta similia petro sellino aequaliter pilosa, florem habet paruum tendentem

ad rubedinem, & qñ flos decidit facit quandam rem ad similitudinem acus acutæ: vel ad similitudinê rostri ciconiæ: hæc suo tpe dum est recens comeditur: in vijs ac pratis inuenitur: hanc vulgares rostrum ciconiæ uocant: & hæc meo tempore uidi ponere in hoc unguento.

Alleuia idê dicit Leonar. Gilib. dicit: alleuia est species trifolij: & est herba acetosi laporis. ergo & panis cuculi: vn de meo tpe uidi multos in hac errare: reperit autê super arborem vlmis: quædâ res similis uesice: & hæc apud malignos herbatios panis cuculi uocat, sed nò recte, quia panis cuculi est alleuia: & est herba quæ saporê habet acetolum habet tria folia sicut trifolij: sed fons parua: & tripliciter diuisa, & in acumine cuiuslibet partis è incisa: femina ipsius sunt in uaginis similibus cornibus: quæ cum tangunt tpe maturat ionis euolant ab his femina sicut handachoche. i. trifolij: tendentia ad rubedinem: hæc raro in pratis inuenitur.

Lingua ceruina fîm modernos est scolopendria: qua generaliter vtuntur. uide de ipsa in syrupo de scolopendria.

Crispula idem habet Leon. Gilib. dicit. crispula. i. oculus bouis: fîm aut Compositorê est herba cancri: quid autê fit generaliter ignoratur, sed quia Gilib. dicit quod crispula est oculus bouis. ergo est quædam herba quæ apud Diof. uocatur bupthalmos: cuius folia sunt similia folijs marathri. i. fœ niculi: flores habet nigros. Hic textus Diof. est corruptus, debet. n. dicere, q̃ habet flores citrinos plus flore cammilla, vt dicit Sera. ex uerbo Diof. in cap. de cotula, quæ idem est. Aui. in 2. can. ait: Bichar & est illa quæ uocatur cheuleum focolus uaccæ, rosa eius est citrini coloris, rubea in medio grosior rosa cammilla: & est f. uide ergo quod crispula è oculus bouis seu bupthalmos siue cotula, & hæc apud nos in ciuitatibus, & in uis nascitur. Rasis in libro aphorismorum: in libro quarto de dictis medicinis & cibariis inquit: Ladiion. i. oculus bouis seu oculus uaccæ, q̃ idem est. hanc nostri rustici cotulam dicunt.

Camphorata fîm Compositorem est abrotanû syluestre, sed Lumê malelucens loco eius posuit camphoram: sed nò recte factum est. nam Gilib. ac Leonar. posuerunt camphoratam. i. abrotanum syluestre, cuius folia sunt similia folijs cammilla, loco eius uidi ponere abrotanum usuale.

Medulla ceruina seu cerui. Sera. in cap. de medulla ossû inquit, & illa quæ est melior per experientiam est medulla ossis cerui, & post ipsam medulla utuli. Idem dicit Aui. in ca. de medullis. in 2. cano. Diof. ait: Medulla ois recens sine sale molliuitur atq; mirificæ uirtutis est. inueterata sine sale sumpta recorporatiua efficitur, laxad. uerum de omnibus medullis melior est ceruina: secundo utulina.

Adeps uris secundum Sera. facit oriri pilos & alopecia, & est conueniens scissuris quæ sunt a frigore & apostematibus sanguineis. Auicenn. ait: Adeps uris & adeps anseris con ferunt alopecia.

Adeps gallinæ nota est. Diof. in cap. de axungia inquit, axungia ois utilis est matricinimæ reces anserina, uel gal linacea sine sale condita. nam salita contraria est matrici.

XXII.

AREGON, officinis Aragon.

R. Roris marini, maioranæ, radices iari, serpilli, rutæ, radices scydis, an. j. iii. s. foliorû lauri, saluiz, saunz, an. j. iii. pulicariæ maioris, pulicariæ minoris, ana. j. iii. byroniz, j. iii. lauroleæ, j. ii. nepetæ, j. vi. masticis, olibanij, an. j. vii. Pyrethri, euphorbiæ, zingiberis, piperis, an. j. i. olei muscullini. j. s. petrolei. j. i. adipis uris, olei laurini, an. j. iii. herbæ & radices colligant & in Mario, dictu est. nâ in mèse Iunii nò sunt apti nisi primus vel secundus dies, deinde fortiter tun læ in mortario ponantur in oleo per septem dies, septimo vero die super ignem ponantur donec coquantur bene postea super saccû coloretur, & tunc super ignem ponantur & cum inceperint bullire addatur butyri. j. iii. i. olei còis lib. v. ceræ lib. i. j. iii. & cera liquefacta ponatur petroleum & muscullinum, & ad ultimum mastic, & olibanum zingiber, & piper, & pyrethrum, runc ab igne deponantur & recondantur.

COMMEN. MANLII.

Istud vnguentum est in usu. Aragoni: adiutoriû. Gilibe.

de Angli. in ca. de dolore renum habet idemmet. Leonar. de preda palea. in capi. de cura casus & offensionis, ponit vng. aliud magistrale mirabile, q. vocatur aragon: & est idem, nisi quod ipse non ponit pulicariā maiorem: nec minorem: in reliquis idem sunt. vnde meo tempore multos in hac uidi errare, & hoc est in pulicaria, de qua infra.

Radicum iari siue iarus est dragontea minor: & est quam Diof. vocat aaron. Petr. de Crescentis inquit: Iarus alio noie dicitur barba aaron: uel pes vituli, quod idem est. Gal. in sexto simplicium ait. Luf idest iarus aaron.

Radicum scydis, idest radicem cucumeris asinini cuius fucus elaterium dicitur. Leonardus ibi dicit, radicem scydis. i. cucumeris asinini.

Pulicaria maior apud græcos conisca vocatur, sed apud Diof. conyza, cuius alia maior atq; odoris grauioris, alia minor & odoris iocundi, inter has alia est media grauioribus odorib⁹. Quorū prima appellata est et conyza lata siue vanitatis, uel ut latini armetalis. Itē feda uocat libanotis, siue ut latini pix marina: uel sirificatum media, appellatur et conyza cephalos, siue ut latini thymus minor: maior & minor conyza folia oliuæ similia habet, sed aspera & pinguius, minoris uero folia odorata sunt maioris uero grauis odoris, quæ etiā in frutice maior est. Diof. ponit qd species cōyza sunt tres, sed Plin. non ponit nisi duas, quid aut sit cōter ignoratur. secundum intentionē Luminis epothecariorum est elleborus, quod falsum est. nam gñaliter apud peritos tenetur qd conyza sit pulicaria, ut inuenitur in. 7. simpl. apud Gal. & sic conyza est pulicaria: & secundum intentionē Diof. tres sunt species. s. maior, minor, & media. Ipse autem Diof. dicit, quod media est cephalos siue thymus minor, & thymus maior apud moder. est faturegia, ergo per pulicariam minorem intelligitur faturegia: & per pulicariam maiorem intelligitur conyza maior seu thymus maior, vsualis, & sic si bene consideretur uidebis q. pulicaria maior est thymus & pulicaria minor est faturegia.

Pulicaria minor secundum intentionem Diof. est sicut maior in foliis, sed est odoris grauioris, & sic est qd pulicaria minor, idest faturegia seu thymra habet maiorem odorem quā maior, in foliis idem sunt, & in uirtute sunt quasi idem, in partibus Romæ unus Græcus dixit mihi, quod pulicaria minor apud ipsos uocatur conyza seu thymra: & sic cit. versiculos sic dicens.

Thymra solet græce faturegia dicta latine.

Thymra solet græce pulicaria dicta minore.

Thymus dictus halce nos pulicariani maiorem nominamus, & sic meo tpe pro pulicaria maiori thymum uidi ponere: & pro pulicaria minoris faturegian.

Laureola apud Diof. vocat daphnoides. Sera. uero inter species lauri laureolā describit, & est quā dicit esse gar. est species alia quæ dicit daphnides, et est arbor parua, cuius altitudo est unius brachii, hēt uirgas multa subtiles mediæ tæte, supra quibus superius sunt folia, & uirgæ eius sunt facile frangibiles, & super ea est cortex fortiter adhærens ligno, & folia eius sunt similia foliis lauri, nisi quia sunt molliora & tenaciora & ad frangendum difficiliora mordicantia & pungentia linguā & gulam exasperantia, & habet flores albos, & grana quando sunt matura sunt nigra, & habet radicē nullius uoloris in medicina, nascitur in locis montuosis. Ioan. Angli. in ca. de paralyti dicit: Semen laureolæ, & uocatur coccognidium, quod non est credendum.

Nepeta secundū Cōpositōrē est calamenum montanū, si ne dubio est consonum quōd nepeta sit calamenum, & est herba quæ a Lombardis Gattaria, seu neuidem dicitur.

XXIII.

DIALITHÆA.

R. Radicū ebisici lib. ii. semi. lmi. scenagræci an. lib. i. quillæ 3. vi. olei lib. iii. cera lib. i. cerebintinæ, gūmi hederæ, galba ni an. 3. ii. colophonæ, resinæ an. 3. vi. Nota uero quod si ita pnat radix, factis. i. sambuci, aut cyclaminis ualet ad conlationem uulnerum, oēs radices bene abluantur & confertur, postea totū in lib. vii. aquæ p tres dies ponantur, & bulliant donec incipiant inspissari, paulatim ponantur in fac-

co, cūq; exprimeré uolueris addatur aliquantulū aquæ feruētissimæ ab extrahōne illius succi, de succo istorū accipe lib. ii. & mitte in lib. iii. olei, & bulliat usq; ad cōsumptionē succi, postea addat cera, & cū liquefacta fuerit addantur te rebintina, galbanū, & gūmi hederæ, ad ultimum ponat puluis resinæ, colophonæ, & coctum ab igne deponatur.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum est nullū in usu. Dialithæa autē a radice ebisici dicitur malati cū. i. mollificatione. Leon. de Preda palea in ca. de cura casus & offensionis inquit: Vnguentū malaticum dictum dialithæa a radice illa ebisici, & est idem.

Ebisicus secundū compositorē est althæa, seu malua agrestis. Id. inquit: Althæa est malua agrestis siue malua uiscus, sed althæa quod in altū furgat, & ebisicus, quia glutinosa est dicit. Gal. in. 7. simpl. ait: Malma syluestris. i. althæa. Leon. de preda palea in ca. de medicinis facientibus nasci carnem in speciali inquit. & radicē herbæ quæ uocat falcumen. aliter uocatur herba vngarica, & asfinitur malua uisco, & in foliis & in radice. secundum uero Compositorem vngarica est malua agrestis seu bifmalua.

XXIII.

CITRINVM, quod sit in pomo citrino.

R. Boracis. 3. ii. caphoræ. 3. i. coralli albi. 3. s. amēti dulcis. 3. i. vmbilici marini, dragantati albi, amidi, crytalli, & anthali, dērali, oliban, albi nitri a. 3. iii. maioris albi. 3. ii. gērfæ ser pentariæ. 3. i. ceruffæ cōis. 3. vi. hoc modo fit, tere dragacantū albū & umbilicos mariuos in mortario marmore opi stello ferreo, insinipal cætera sigillatim in eodē mortario terantur, & cum pauco subtilissimo cribellent, & cum axungie nouellæ porcine albisimæ lib. i. s. sepi caprini, uel pecorini. 3. s. axungie gallinacæ. 3. i. confice sic. Caldariū plenum aqua super ignē bulliat, & cabacus cum axungis in caldario pdeat in ipsa aqua ut de calore ipsius aquæ axungie liqueant, & liquefactæ per subtile pannum colentur in catinum, & mox totus puluis apponatur præter camphorā & boracem, cū spatula semper agitando, ut oīum bona fiat incorporatio: hoc factū in uno citro hoc est in uno pomo citrino cauato uel duobus ponatur, cum spatula semper agitando, & cū inceperint bullire, iterū in caldario ponant, & cū spatula semper agitando pulueres camphoræ & boracis apponant, et donec incipiat frigidescere agitentur, et cū infrigidatum fuerit recodantur. Et nota qd pro lib. i. pulueris, libras octo axungie ponere debemus.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum est in usu dicitur autē citrinū, quia coquitur in pomo quod citrū dicitur et non cedrus, non autē dicitur citrinum a colore, ut quidā crediderunt, nā eius color est albus. Guliel. Lombardus in suo antidotario habet vnā descriptionem quæ idem est. Leonar. de preda palea. in cap. de eradicatione uelutiorum eadem ponit. Inuenitur aliud unguentum iofatum citrinum a colore, unde quando medicus simpliciter ordinat unguentū, citrinum, de illo intelligitur, sed qd dicitur unguentum citrinum coctum in pomo citrino, de illo intelligitur.

Borax. i. capistrū auri. Ser. in ca. de borace inquit. Micar. i. borax, & est ex speciebus salis, et in sapore suo reperitur de sapore baurach, et habet cum eo parū amaritudinis, et est mineralē et artificiale. alius mineralis eius est ripensis maris. Idem Sera. ex autoritate Rafis ait: quod radix eius est vrina infantium, et intelligit eius quod est artificiale, et est gluten auri. hæc apud Diof. uocatur chryso colla, quæ in principio habet colorem uiridem ualde, melior est Armenia, secundo Macedonia et Cypria. eligenda uero est munda sine lapide et sine terra. Aui. in. 2. cano. duo facit ca. unū de eo quod aurum adhæret. aliud de tincar, et capistrū auri, eo quod cum ipso aurifabri aurum, ac alia metalla consolidant, secundum autem Circa instans, borax est gummi cuiusdam arboris quæ in partibus traufmarinus nascitur, et in ætate effluit, hoc fatis est notum.

Amentū dulce secundū cōpositorem est gypsum coctū, quidam crediderunt quod esset quidam lapis albus qui de uitro coctū sit, sed ignoro. Sed si compositor uult quod sit

gyplum totū, ergo idem debet poni, & sic meo tempore uidi gyplum coctū ponere, & modus coctionis eius est quod ponatur gyplum super ignem, & ibi dimittatur tantum quod in colore efficiatur album, sicut fit de alumine rocha.

Umbilici marini. i. bellirici marini eorum forma est quasi sicut forma umbilici hominis, & sunt lapides parui & albi, & inueniuntur in ripis marinis coherentes sicut dentales deferuntur a Venetiis ad nos, & sunt noti.

Crytallus. lapis crytallus est de genere berilli ipsum enim reperitur in fluuiis. hoc notum est, eius puluis lac mulieribus præbet. secundū Serā. crytallus est de genere vitri.

Anchali sunt ossa facta, sicut dentali vinctum; maiora, sed non habent superficiem leuem sicut dentali, sed virgulam & totam albam. oriuntur sicut illi: & eandem habent virtutem, in partibus marinis inueniuntur.

Dentali sunt ossa satis alba, & sunt sicut canini dentes sed longiores & intus perforati & inanes. i. vacui, oriuntur in cauernis lapidum existentium in profundo maris, & sunt noti.

Marmor albu inter genera marmorea lapis alabastru est positu, & hæc est opinio Compositoris. Idē vide apud Ioan. Angli. in cap. de lepra. ait enim sic, & aliqñ aliqui addunt de lapide alabastru, quod idē est cu marmore albo. hic vero lapis nascitur in Alabastria Aegypti & Damasco. Isid. in cap. de marmoribus ait. Post lapidum genera veniemus ad marmora: Nā inter lapides & marmora differentia est. Nā marmora dicuntur eximii lapides, quæ maculis in coloribus cōmendantur, marmor termo græcus est a nitiditate vocatus, marmorū colores & genera innumerabilia sunt. idē ibidem ait Alabastrides lapis caudius: inter tinētus variis coloribus ex quo euangelici illius vnguenti vasculū fuit. cauantur. n. ad usū vnguentaria, quoniam optime feruare incorrupta dicunt. nascitur circa Thebas Aegyptias, & Damascū. Syriæ cæteris candidior, probatissimus uero in India &c.

Gerfe serpentariz. hoc Compositor est lac serpentarie, vel colubrariz, vel viperinæ, quidam crediderunt quod esset cerussa cōis, sed non recte. nam ibi cerussa cōis ingreditur. Circūstant inquit: Cerussa est flos plūbi, gerfe appellatur. Verum gerfe dici posset cerussa si illud non subiungeretur, sed hic dicit gerfe serpentariz, quod aliud est. Gliberius autē de Anglia in cap. de pilis, & rugis tollendis ait: Gerfe fit, ex iaro uel de uicella, sicut de serpentaria extrahitur succus radicis, & colatur, & ponitur ad solem, & cum recesserit aqua superior proicietur, & ponitur aqua alia & residet & proicitur, & sic fit quousque subtilitas exiccatur & est gersa calida & sicca, sed cerussa est frigida. meo tempore uidi facere gersam ex serpentaria minori, hoc modo puluis subtilissimus est radice ipsius conficitur cum aqua rosata, & ponitur ad solem donec aqua ex toto consumetur, & ita fit quater vel quinq̃ies tantū quod eius puluis efficitur albus, & usui reseruat, & uocatur gerfe serpētariz, siue cerussa serpentariz, idem potest fieri de serpentaria maiori.

X. V.

FVSCVM, seu nigrum.

Re. Olei libi. s. ceræ nox. ʒ. iiii. colophoniz sepi porcini, gummi arabici, serapini, picis naualis colatæ ana. ʒ. ii. masticis galbani, oliani, terebintinæ ana. ʒ. i. confice sic. oleum in olla super ignem mittatur & bulliat, tunc apponatur cera, deinde colophonia, quæ liquefacta ponatur pix naualis, postea gummi, serapini terebintinæ, ita tamen ut omnia terantur prius præter picem naualem & terebintinam. pul. masticis, & oliani, & cum spatula agitando semper omnia liquefiant, & bene coctum sit, deinde cum infrigidatum fuerit vsui reseruetur.

COMMENTA. MANLII.

Itudunguentum apud nos est in usu. Fuscū dicitur quia est nigrū. Rasis in. 7. Alman. in cap. de medicinis generantibus carnem ponit vnguentum nigrum, quo utendum est cū uulnē est siccatum & fuscum, sed non idē idem. Nicolaus Flo. in lib. 7. in cap. de uulneribus euenientibus peccatori habet alia descriptionē huic conformem nico in una r. & hoc est quod Nicolaus habet armoniaci. Mico. non Leonardus de Preda palea in ca. de cura ulcerū in generali ponit vnguen-

fulcum. i. nigrum & est idem. Idem habet Gilib. de Ang. in cap. de uulneribus capitis & eorum curis.

X. XVI.

POPULEON.

Re. Oculorum populi, lib. i. s. foliorum papaueris nigri, foliorum mādragoræ, cinarum rubi tenerimarum, foliorum iusquiami, solatri, vermicularis lactuca, bardanæ, semperuiue, violæ, scatuncelli, ana. ʒ. iii. axungie nouellæ porcine, sine sale lib. iii. oculi populi per se bene pilentur, & magdaleonibus informantur, per duos dies dimittantur tertio vero die omnes herbæ supradictæ colligantur & per se bene terantur, & cum magdaleonibus iterum terantur, & misceantur, & formati magdaleonibus per nouem dies reseruentur. postea uero magdaleonibus illi frustantur in caldario cum lib. ii. vini optimi odoriferi ponantur, & bulliant vsq̃ ad consumptionem uini cum spatula semper agitando, & postea per faccum bene expresse cola, & colatum dimitte infrigidari, & in uasē reffere.

COMMENTA. MANLII.

Itud unguētum est in usu. Dicitur autem populeon: quia fit de oculis arboris quæ populus nominatur: & fit in tepore ueris, Leonardus de Preda palea in cap. de inflationibus & uersicis habet idem. populus autem est arbor satis nota. eius species duæ sunt sicut patet per Diosc. quidē ipso dno facit cap. unum fl. nomine agros. aliud sub nomine populus. in cap. uero de agros ait aliqui etiam perhibent eius la chrimum. i. gummi arboris in Rhodanū distillatum, & coagulatū, & succinum facere. Hic uidetur quod hæc est arbor de qua fit charabæ: nam sine duobus charabæ idē gummi arboris secundum Auicenna dicitur haur romanum quæ iuxta rhodanum est nascens.

Papauer nigrum. s. papauer qui gerit semen nigrum: nam inter papauer album & nigrum: in foliis est parua differentia, & sunt ex hominibus qui ponunt unum pro alio: nam non distinguunt nisi in semine tantum. Hodierni apothecarii: si nigrum habere non possunt, ponunt rubeum, sed non recte, & hæc est quæ a Diosc. anemonis vocatur, & a nostris rusticis dicitur rosella, sed hoc non conuenit, quia papauer nigrum est frigidum, & rubeum calidum.

Mādragoræ. s. folia apud nos raro inueniuntur, sed moderni herbarici reperiunt speciem unam mādragoræ in partibus Comi, & illa uisitur: & si hæc habere nō possunt ponunt folia bryoniæ. Leonardus autē ibi inquit, foliorū mādragoræ, & loco eius fabæ inuersæ: faba uero inuersa apud Diosc. inter spēs strychni describitur, & est tertius strychnus. i. solatru.

Rubus alius facus ferens mora: alius rubus canis qui apud Diosc. cynosbatos uocatur, sed hic intelligitur de rubo qui fert mora.

Iusquiamus. i. dens equinus fide symphoniacus, & est hierbaque in sterquilinis locis inuenitur, apud nos iuxta hortos ac in ciuitatibus inuenitur hanc papientes uulgo herbam pinulam dicunt.

Vermicularis secundum Compositorem est semperuiua minor, quidam portulacum agrellum uocant. hæc apud Diosc. aizoon minus uocatur, nascitur in prætiis, in ciuitatibus, & super tecta: hæc nota est.

Bardana secundum Compositorem est illapheos seu lappa quidam lappagoneum maiorem dicunt. Isidorus ait: Lappa dicta, quod habet caulem ingentem per terram dispositam, hæc a græcis philoantropos vocatur, supra de ipso dictum est in filoantropo antidoto.

Scatonecellus fm Compositorem est umbilicus ueneris. Idē dicit Leonar. de Preda palea ibidem. sed hodierni apothecarii: maxime ignorantes loco eius ponunt pilum cardū qui a Diosc. vocatur diplicus: cuius frutex est spinosa, habens folia sitia lactuca, & hoc vtunt fullones ad garzandū pānos & bireta: & sic meo tpe uidi multos ipsum ponere, sed errant nā ut dictum fuit. Nicolaus compositor uult quod scatonecellus sit umbilicus ueneris. Idē dicit Leonardus, & sic est secundum ueritatē hæc a Diosc. vocatur cotilidon. apud nos nascitur in tectis domorū, & ecclesiarum, ac aliis locis, & vocatur ipsum uulgo herbā rotundellam, aut cimbariam.

XXVII.
AGRIPPAE.

R. Bryonia. i. cucurbita agrestis lib. ii. radices ficidis. i. cucumeris affini lib. i. squille. 3. vires. 3. ii. radices filicis. 3. ii. radi. ebulli. 3. ii. tribuli marini 3. ii. oēs radices ter uel qua ter abluant, & terant pila marmorea, & i. l. iii. olei de leu co uel lētiscini ponātur p duos dies. iii. die superponant et tandiu bulliant donec incipiant radices dimitti : postea ponantur in sacco, & expimendo colentur, & cum colata fuerint iterū super ignem mitantur, & cū bullire inceperint ponant. 3. xv. cera albisima, liquefacta cera ab igne de ponatur, & dum infrigidatū fuerit, collige in uase & serua.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum est in uisidicitur autem agrippa, quia Agrippa rex utebatur, uel quia ab eo, uel eius causa, fuit inuentum Leonardus de preda palea in cap. cura casus & offensionis habet idem.

Ebulus est species sambuci, & est chamæactis, de forma ipsius apparebit infra in unguento ebulino.

Tribulus marinus. i. cicer imperiale. hic apud Auic. in. 2. can. uocatur haseche: eius species duae sunt, scilicet domesticus & agrestis, sed ille qui hic intelligitur est ille qui fert quēdā fructū ad fistulinē castaneæ, & propter id multi uocant ipsum castaneolū, & isti fructus abundant in locis uicinis sanctæ Mariæ de monte, & ibi uocantur lagani ab in colis, & sunt primo uiridis coloris: deinde nigrescunt, & habent angulos acutos: apud nos idem inuenitur ultra padum, maxime in aquis & hic fructus piscatoribus nocet. eo quod inuoluitur circa rete, & pisces fugiunt.

Oleum de leuco. i. oleum album de oliuis: nā leucos græce album interpretatur, & tale est oleum antiquum, quia quanto oleum est antiquius tanto albius est, in hac sunt diuersæ opinionēs: nam secundum multos non debet ingredi nisi oleum de leuco. i. albū: sed in ista descriptione habet oleum de leuco, uel lentiscinum, & hæc litera ut puro fuit super addita. nam in codicibus Nicolai uetustis non reperitur nisi oleum de leuco uerum hodie generaliter ponunt oleum de lentisco, sed non recte faciunt.

Lentiscus aut arbor est quæ in noctis partibus non reperitur, immo nisi in Chio insula: huius arboris lachrymā nā stix est, ut uolunt moderni. Sera. in cap. de terebinto de lentisco loquitur. in isto unguento ingreditur oleum de leuco. i. album uel lentiscinum. i. de grani lentisci, sed melius est ponere solum de leuco, ut dictū fuit, si tamē ponere uolueris oleum de lentisco. Modum ipsius inuenies apud Diosc. sub noie olei schinini, huius modus est sicut olei laurini. f. de semine ipsius: in Chio insula fit in multa quāritate, et utuntur ipso in conuiuijs loco olei oliuarum, & ad faciendum lumen hoc defertur de Ianua ad nos, sed raro utimur.

EX GALENO.

XXVIII.

DIAPOMPHOLYGOS.

R. Pulueris plūbi uisti, lauati, pompholygos, olibani ana. 3. ii. abanthij 3. ii. ceræ 3. iii. olei rosoli. 3. v. uæ lupinæ, ex fructu succi quod sufficit, & coques & facies unguentum.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu sub noie unguenti pompholygi: imo apud chirurgicos est in usu sub noie unguenti de thutia: nam pompholygos aut pōphiliæ est thutia, sicut patet si legis capitulum de pomphiliæ apud Diosc. cū cap. de thutia apud Serap. & Auic. uidēbis quod idem sunt, sed Diopius Florentinus in suo antidotario habet prædictum unguentum, & inquit: Pompholygos est spodium, quod non est benedictum (ut iam dixi) ipse Gal. in lib. Secretorum in ca. de conseruanda sanitate oculi inquit: Alceonē, id est thutia inda idem in octauo de simplicibus ait: Chatimia. i. thutia, unde per hoc dico quod unguentum diapompholygos est unguentum de thutia.

Vua lupina. i. solatū scdm modernos non est stassifragia, ut quidā crediderunt, miror quod Mesue in ca. de alsefera dicat. nascuntur super ea botri, sicut botri uuarū, & uocantur

tur uua lupina, sed apud modernos non recte. nam uua lupina apud Sera. in cap. de solatro est idem. Auer. in. 5. coll. inquit: Hupne phatahalep. i. uua uulpis quæ in latino nō minatur uua canina, hæc herba. f. uua uulpis uel maurella. Præterea Auic. in ca. de chechengi ait: Virtus eius est proxima uirtuti uua lupina: & proprie uirtus foliorum eius. nam sine dubio chechengi est species solatri siue uua lupina: q idem est. Item Circiniflans strychnum uua lupina solatū morella idem est, & sic ex meo iudicio dico quod uua lupina est solatrum quæ apud Diosc. strychnum uocatur. a uulgo dicitur herba mora. Papias ait Vua lupina dicta quod semē eius uua simile est hæc strychnos græce dicitur.

EX ANTI. IOAN. SERAPIONIS.

XXIX.

DE ZINIR.

R. Zinir. 3. ii.

Ceræ,

Resinæ pini,

} ana. 3. v.

Misce, & liquefat cum oleo, & administretur.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Hoc unguentum uideatur concordare cum unguento de flore æris quod scribit in 5. cano. Auic. & sic sine dubio idem est.

Zinir autem secundum intentionem Simonis Ian. non est flos æris, ut apparet in cap. de ærugine æris, & in ca. de flore gris. ergo unguentum de zinir, nō debet esse unguentum de flore æris, sed moderni generaliter loco floris æris ponunt zinir. i. uiride æris, & sic si consideras intentionē Auic. ac Sera. uidēbis quod zinir & flos æris idem sunt. Io. Angli. in cap. de ulceribus nā dicit zinir. i. uiride æris, scinir aut est ancusa. i. lactuca affini, ut apud Auic. in. 2. cano.

EX RASI.

XXX.

DE MELLE, in. 7. ad Almanf. capitulo de carbunculis.

R. Sarcocollæ, mellis, partes æquales deinde sarcocollā puluerizata cum melle misceatur & recondatur.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Dubitant nostri chirurgici an istud unguentum sit unguentum de melle an de sarcocollā quod ignoro, quia scdm intentionem Rasis est de melle, & sic credo, quia istud unguentum inuenitur apud Nicolaum Flo. in lib. 6. in ca. de ademu & forniculo spina siue claua ubi ponit unguentum de melle, quod idem est.

EX ANTID. AVICENNAE.

XXXI.

DE FLORE AERIS.

R. Floris æris. 3. ii. ceræ, resinæ an. 3. v. teratur flos æris & liquefiant reliquæ medicinæ cum oleo, mensura quæ est necessaria, & projiciatur de superfluo æris, & commoueatut donec æqueatur, et administretur.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum nō est in usu. Mesue in suo grabadia describit unā aliam descriptionem, sed non est idem. ut dictū fuit: tamen differt parum. Io. Angli. in cap. de ulceribus nāsi habet idem, sed nō est iste, immo est idem cum illo Mesue. Io. Ser. in suo antidotario: habet unguentum de zinir, quod idem est in omnibus, et secundum intentionē utriusque flos æris, et zinir idem sunt.

XXXII.

DE CHALCANTHO, uulgo de calcadis.

R. Adipis zirbi. f. pinguedinis seu pāniculi cooperientis in testina antiqui lib. iii. olei antiqui li. iii. calcadis 3. ii. lique fiat adeps, et teratur calcadis, & misceatur cum lib. iii. olei, et teratur lib. iii. lithargyrii, et misceantur cum eis, et cum adipe in mortario, deinde ponatur in frixorio mundo, et permisce ea cum spatula quæ fit abscissa ex palma, donec æqueatur et administretur.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentū in usu non est scdm Leonardum de

preda palea in ca. de phlegmone, est unguentum de palma nam ibi inquit: Vnguentum de palma. de collochar relatu ab Aui. in suo antidotario.

Calcadis vero apud Aui. in secundo can. in cap. de atramento est viriolum album. Leonardus loco calcadis habet viriolum supra flos postum unguentum palmeum, quod idem non est.

XXXIII. RVBEVM.

1. Lithargyri cōriti & crebellati eminan. i. olei oliuz lib. ii. acceti lib. x. concutiantur donec coagulentur, & ponatur super ipsa postquam coagulantur lib. i. de venis tinctorum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu: fm intentionem Nicolii Florentini est unguentū aureum tamen Mes. ponit unguentum aureum q. idem non est, ut ostensum fuit. Leon. de preda palea. in ca. de medicinis faciētibz nasci carnem: habet idem quod est huic conforme.

Emina secundū ipsum Aui. maxime romana est. 3. xx. sed emina Italica & ægyptiaca est. 3. xvi. & sic secundum modernos emina est. 3. xvi.

Vena tinctorum secundū intentionē Aui. est rubea tinctorū, quidā crediderunt ipsam esse vena citrinā sed nō recte, fm intentionem Nicolai vena tinctorum est rubea tinctorum, & vena citrina est radix celidionis seu curcuma.

XXXIII. APOSTOLORVM.

R. Terebintinz, cere albz, resinę pini an. 3. xiii. opopanax, floris zris an. 3. ii. armoniaci. 3. xiii. aristolochiz longę, thuris malsali an. 3. vi. myrrhę, galbani an. 3. iiii. bdellii. 3. vi. lithargyri. 3. ix. infundatur bdellium in aceto vini, & coquantur in zeltate cū duobz lib. olei, & in hyeme cū lib. iii.

COMMEN. MANLII.

Istud vnguentum fm intentionē Aui. est unguentū apostolicon, & notatur vnguentum veneris, & dē quod est medicina. xii. apostolorū. Per. Argillata chirurgicum. in ca. de medicinis mūdificatiuis & absterſiuis habet idem in fine vero eius descriptio inquit: Vocat ipsum Mes. ceraceos & magister Anso. de Ianna. gratia dei. quia mire reſtituat ulcera maligna, ut dictum fuit in unguento ceraceos. Leon. de preda palea in cap. de ulceribus virulentis habet idē & est similes, & sic apud nos est multum in usu.

Flos zris loco eius. Per. Argillata habet viride zris, ergo est ziniar, & sic moderni viride zris in ipso ponunt.

XXXV.

DE CALCE, in 4. can. Ven. 4. ca. de medicinis, quę sunt ad combustionem, secundum intentionem secundam.

1. Calcem, & ablatur septies donec separetur eius acuitas toratēde cōquassē cū oleo rosato aut oleo oliuz, & pauca cera si indiget ea, & fortasse additur super ipsum chimo lea & albumen oui, & parum vini, & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentū nō est in usu: idem habet vna aliā descriptioē ibi subsequente: & utraq; est optima contra combustionē ignis. Barto. Monta. in suo antidoto. hēt idem Leon. de preda palea in ca. de combustionē ignis vel aquę uel olei, ponit unguentum mirabile de calce quo usus fuit in abbate, quē afflauit fulmen, & ille abbas erat de Villa Caranzę Paduensis, & cōbūlus erat ab una parte integre per mediū corporis, & per mammillam cordis, & destruxit ferrum id fulmen absque lāsione uagine, & cōbūsit camissam absque lāsione aliorum pannorum, & ante ipsum a latere mortuus est unus suus famulus, & mortui sunt duo canes distantes per xx. pedes & plus. R. calcem uiam & decies exinctam in aqua feruentissimā, & postea exccatam farsa aqua cum pecia & exccatam calcem ad vmbra referus, & tempore quo uolueris uti, utat ut ibi docet.

EX GVIL. VARIANANA.

XXXVI.

COMITISSAE, in 4. ca. 30. de his quę sunt a communi natu ra magis sūtunt menstrua mulierum.

R. Corticū medianorum castaneorū & gladium & arborē gladiū, myrtinorū, caudę caballinz, gallarum, corticum fabarum, acinorū uuarū, forbellarum siccarum, mespillorum maturorū, radicū chelidionis, foliorum prunorū syluestriū ana terantur grosso mō, & coquantur in aqua plantaginis, & colentur. R. ergo tunc ceram quantum uis & dissolue ilam cū oleo myrtino, & laua eā nouies cum prædicta aqua semper innouando aquam qualibet uice. Post hoc. R. ite. rorum cortices prædictorum. i. castanearum, & gladium & arboris gladium ana partem unam, cineris osium cruris bo uis, myrtillorū, acinorum uiuarum ana partem mediam: terantur & fiat puluis. R. ergo huius pulueris partes duas, trochiscorum de charabe partem unam, misceantur & cū prædicta cera, & oleo myrtino, & oleo masticino ana q. l. fiat unguentum, ex quo cum expedit renes & pectē, & omnes partes circumstantes inungantur.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum est multum in usu maxime fm descriptionem istius auctoris: hoc multi moderni faciunt per aliam uiam, sed ista descriptio est nobilior alijs, quia inuenit primum istius unguenti fuit Gul. qui ibi ficit: Ego uero in restrictione menstruorum mirabilem habeo experiētiā cū hoc unguento: quod propria industria inueni pro comitissa Vadrę ipsa. n. prægnans existens propter pressurā genitium sibi factam in festo sancti Grifogoni iam inceperat abortiri, & sanguis & aqua iam in magna quantitate egressa fuerant: perinxit ergo se tūc semel cum ipso, & sanata est, parum conseruans ut debuit: & postea semper propterea uocauit ipsum unguentū comitissę, & cum ipso etiā postea plurimas alias sanauit, & sic ex eo etiā renes a sursum usq; deorsum inungantur, sicut hæmorrhoides, & ibi ponit duo experimenta mirabilia in restrictione menstruorū: magister. Io. Concore. in ca. de partu innaturali, hēt idē: sed istud est nobilius. Nicolus Flo. in li. 6. in ca. de fluxu humiditatu a matrice, ponit unguentum utile quo utebatur duciſſa Austrię, & a quibusdam dicitur unguentum comitissę & est idē, sed Nicolus non fuit primus inuentor: magister Anto. Guain. in ca. de approximandis ab intra: & cura superfluitatis menstruorum ab hæmorrhoidibus matricis prouenientibus rupturę uenę frigidę describit hoc idem: scias quod multi hodierni medici ac apothecarii quærebant prædictum Vnguentum in Guil. Lombardo: & hoc aduenit, quia non habuerunt cognitionem. Gui. de Vargana.

Castanea fructus ē satis notus: Is. ait: Castaneā lati. a græco appellant uocabulo: hanc. n. græci castaneam uocant pp quod fructus eius gemini in modū testiculorum intra folliculorum reconditi sunt, qui dum eiciuntur quasi castrantur. Glans nota est. Serap. de glande & castanea in una cap. loquitur, sicut etiam Aucenna. in secundo can. Gulielmus inquit: & gladium hoc est mediani corticis gladium, sicut habet Nicolus.

Arbor gladium seu gladium nota est omnibus. Gulielm. inquit: Et arbor gladium. i. corticum medianorum arboris gladiū siue querqus. Nicolus loco arboris gladium inquit: Et iterum cupularum gladium, sed hoc Gulielm. non habet: uerum est quod hodierni cupulas gladium in ipso ponunt, quæ sunt laudatę.

Cauda caballina est cauda equina, & est quam Diof. hippurim uocat. Nicolus loco eius habet caudā equinam: quæ idem est. Sera. in ca. de cauda equina inquit: alia tornatilia: aliquando aprellā dicitur, aliquando troxia Gulielm. Lombardus ait: Cauda equi est aprellā: hæc apud nos in fossis ac iuxta aquas inuenitur.

Faba. corticū ipsarū. Isid. in ca. de legumibus inquit: Faba græca etymologia a uersō de uocabulo sumptā, quasi fagaſage. n. græce comedere dicitur, primū enim homines hoc legumine usi sunt: cuius species sunt duas, quarum alte-

S E C T I O XIII.

ra cōis, altera ægyptia, faba frisa dicta, eo quod eam hoies frendant. i. frangant, & molendo cōmuniunt ipse Isido. describit fabā græcā inter species leguminis: sed secundū modernorum opinionem faba græca est fructus cuiusdā arboris magnæ, quæ apud Diof. agrifolium vocatur.

Acini vix secundum quoddam sunt acini vix dictæ lambreux: quia habet maiorem stipticitatem quam alix. Niculus & magister Antonius Guainerius loco acinorum vuarum habent arillorum vuarum, ergo sunt grana vuz, seu femina quæ magis laudata sunt.

Sorba vero apud Ser. est zarur. sed apud modernos non recte, uerum est quod ponitur non pro alio, & eius arbor sicut narrat Sera. est spinosa: cuius formam uide in electuario de forbis. Gal. in 8. simpliciū ait. nix. i. sorba. arbor eius fructus a multis dicitur omnia.

Mespilla secundū Diof. semen hēt rotundū & minutū maciano simile, tria ossa habēs, unde & triconū dicitur, & alia quæ in Hispania nascitur, quā multi epinelidam uocant, semen rotundum habens hoc aptum est ad edēdum, & stipticum, & tarde maturefcit. & hæc apud Sera. est ca. de sorba. & sic filigis ca. de mespilla apud Diof. cū ca. de sorba apud Sera. uidebis quod idem est. Isid ait mespilla arbor spinosa, fructui similis malorum, sed paulo breuiore. unde & appellata qd pilule formam habeant eius poma. Gul. Cōpositor. & magister Antonius Guainerius ponunt mespilla, sed Niculus habet mespilam, & sic hodie nespula in eo ponunt.

Pruna syluestria secundū modernorū opinione sunt fructus ex quo acacia fit, de qua liber qui dicitur Bulchafis inquit: Modus extrahēdi succum prunorū syluestrium ex quo fit acacia. Lumen male lucens loco eius habet folia pini syluestris, sed non recte: quia Cōpositor & Niculus habent folia prunorū syluestrium. Cōpositor autē Niculus & magister Ant. Guainerius non ponunt dosim ipsarum rerum, tamen notum est quod quando dicitur ana, significat æquale: & sic in prædicto unguento idem intelligitur, & potest fieri in magna quantitate, & in parua, sed magis fit in magna quam parua. Si vero facere uolueris istud unguentum de manipulis duobus pro qualibet rerum supra dictarum dosi, ceræ acaliarum rerum ostendam infra.

Plantago herba est satis nota. Cōpositor ait: Coquantur in aqua plantaginis. Niculus inquit. Coquant in succo vel decoctione plataginis, cera. f. cera usualis, Cōpositor & alii inquit. ceræ quantum vis, hoc est quantum oportet. supra dixi quod ana significat æquale, & si prædictum unguē tum facere uolueris de manipulis duobus cuiuslibet prædictarum rerum debet poni lib. i. & 3. iiii. ceræ nouæ, & dissolue ipsam, ut docet Cōpositor.

Olei myrtillorum descriptionem docet dñs Mes. in trac. de oleis, de quo infra Cōpositor, nec alij non ponunt dosim istius olei, sed gñaliter ponitur tantum olei quantum ceræ. postea dicit ceræ quantum uis, & dissolue istam cum oleo myrtillo, & laua eam nouies cum prædicta aqua semper innouando eam unaquaq; uice, accipiēdo de ipsa oi vice portio nem eius sufficientem ad lauandum, & hoc factū æ. ut dicit Cōpositor ana. i. æqualiter Cōpositor ait. ana partem vnam. f. rerū supradictarū, & debent esse pro qualibet. 3. ii. & per partem mediā quæ ponitur inferius, intelligitur. 3. i.

Troc. de charabe. descriptio inuenit in pluribus authoribus, ut dictum fuit, sed generaliter faciunt secundū descriptionē Mes. quam superius posui, dicitur autē charabe quasi rapiens paleas, & est gūmi arabis dictæ haur romanū. Ioan. Ang. in ca. de feb. ethica ait: Charabe, & est charabe idem qd vernix, sed charabe idē quod ambrā. pondus eorū debet esse. 3. iiii. 3. vi. Oportet iterū addere oleū myrtillo, & oleū masticinū, sed Cōpositor non dicit: Si debet esse lota aut nō Niculus ait ait: Oleo myrtillo lotum. additio eis oleo masticino non loco, quidam tñ lauant ipsum simul cū illis post q̄ oia sunt simul cōmixta, & confectio unguento quo unguēto ungantur renes a sursum vix: deorsum dosis vero istorū duorum oleorū. f. myrtillo & masticini. i. de masticice debent esse an. lib. ii. & 3. iiii. & fiat istud unguentum debet confici

cum optima diligētia propter optimam vtilitatem quæ in ipso inuenitur.

EX ANTID. DINI FLOREN.

XXXVII.

PSILOTRVM.

R. Calcis fortis supra quā ponatur septuaguli aquæ, & p tres dies sic dimissa coletur, posita in hac aqua. vi. partis calcis ponatur, & per tres dies morentur. his gestis sexta pars arfenici citrini in prædicta aqua mittatur & tandū ad solē dimittatur donec pēna immixta depletur, cum extrahitur vñ loco fricetur. id enim cito abradit pilos.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Liber qui dicitur Bulchafis in tractatu primo scribit modū psilotri noti, sed non est idem, uerum superius posuit modum faciendi medicinam depilantem pilos una hora, & hoc uidetur esse melius vnguentum psilotrum pro psilotro, intelligitur medicamen depilatorium.

EX IOAN. ANGLICO.

XXXVIII.

GENESTRICVM commune capit.

decura quartanz.

R. Florum genestæ. 3. vi. butyri Maii. facti de mēse Maii, vel alterius si hoc haberi nō posset, xunigix porcine recētis lib. i. ceræ modicū, uel fiat liquidū, uel potest cōfici cum oleo camemillæ, & tunc cera plus ualebit. ibi conterantur flores cum istis prædictis uel cum aliquo istorum, & tunc ista per x. dies continue agitando, & ad solem ponendo, & tunc ultimo ponantur in patella ferrea ad ignem, & dissoluantur, & liquefact pinguedo uel butyrum, & runc deponatur ab igne, & cito post coletur per medium panni linei bene comprimendo, & erit unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentū apud nos non est in usu. Idem in eodem cap. describit duas alias descriptiones quæ idem non sunt. ego uero solā scripsi istam descriptionem: quia Cōpositor intitulat ipsum unguentum Genestricum commune. Gene tra ait frutex est omnibus not. hic apud Diof. uocatur spar tus. Pli. genistæ vinculi vsum præstant. flores apibus gratissimi, dubito an hæc fit quæ greci autores Sarton vocant quidam myricam vocant, sed non myricem. Mes. inquit: Albrachin est capistrū arboris, & est arbor montana: super cuius stipticem eleuatur densitas sultium multæ rectitudinis, & dū picantur, non patiuntur fracturas. unde ligantur ex eis arborea, & producent flores figuræ lunaris citrinis multæ, & proferit folliculos secundum semitam orobi habentes femina distincta sicut lens, sed in lingua latina genestria sue myrica appellatur. Electio ultra marina est melior, & omnes quæ in partibus orientalibus oriuntur. Gal. in 8. simpl. ait, Spargamum. i. genestria.

XXXIX.

DE TALPA, in cap. de cura lepræ.

R. Talpam combustam, cortices æuellanarum, nucum maiorum, castanearum, & cum his apes & muscas, & omnia ista cōburantur, deinde recipe capillorum ueneris recētū, spicæ nardi, laudani, bulliant omnia in oleo laurino, & addatur cera, & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentū non est in usu. Talpa aial est quod vocat irbea, & est notum. Papias inquit: Talpa dicitur quod sit dāna cecitate perpetua. est. n. absq; oculis terram semper fodiens, quæ græce dicitur talfas. Isid. in ca. de minutis animalibus inquit: Talpa dicitur quod sit damata cecitate perpetua, & tenebris: est. n. absque oculis, semper terram fodit, & humum egerit, & radices subter frugibus comedit: quam græci assalan uocat: comburatur autē istud animal ut comburitur lepus: cuius modus patuit supra.

Apes sunt postæ iter minuta aialia, & hæc notæ sunt Isid. inquit: Apes autē dictæ uel quod se pedibus inuicem alligēt, uel pro eo qd sine pedibus nascantur: nā postæ & pedes & pennas accipiūt, hæc solertes i gñandi mellis officio assignatas incolunt sedes: domicilia inenarrabili arte componunt

ex nariis floribus fauim condunt, textisq; ceris in minera, prole casta replent exercitiis, & reges habent, prelia mouet, fumum fugiunt, tumultu exasperantur: has plerique experti sunt nasci de boue & cadaueribus nam pro his creandis uulturnum occurrunt carnes uerberantur, ut ex putrefacto cruore uermes creentur: quae postea efficiuntur apes, proprie tamē apes uocantur orde de bobus ficut crabrones de equis, fuci de mulis, uespe de asinis. Dioscor. in cap. de melle inquit: Mel est ros celestis, quem apes colligunt.

Musca apud omnes nota est. Iisdem musca ex græco uenit, sicut & mus, hæc sicut & apes necat in aqua aliquotiens post. i. hore spatium reuiuiscunt: reperitur alia species muscæ quæ uocatur cynomia apud Græcos, & est musca canina: nam cynos græce canis uocatur.

X L.

DE CASTOREO, in cap. de pasino.

R. Piperis nigri, castorei, euphorbii ana. ʒ. ii. pyrethri, costi amari. ana. ʒ. ii. costum resoluatur in. ʒ. iii. uini albi per unam diem & noctem in crastino addantur. ʒ. iii. olei, & bulliant: vsque ad consumptionem uini, & postea addantur pulueres & fiat unguentum.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum apud nos non est in usu: verum secundum intentionem Compositoris est expertum in illa materia. ipse uero in principio non dicitur quod istud sit unguentum de castoreo. immo in fine eius descriptionis ait, & fiat unguentum: q̄ ego uolo unguentum castorinum.

X L I.

EBVLINVM, in cap. de dolore iuncturarum.

R. Foliorum ebuli. M. iiii. coquantur in aqua diu deinde extrahantur & conterantur sicut si deberent comedi, & pistentur in mortario, & tunc modicum xungie porci vel butyri de Maio, & flores genestæ miscantur, ut per medium panni lini extrahantur, & erit unguentum optimum in causa frigida, sicut ego probaui in vno podagrigo & sciatico pingui ualde, nec ualuit sibi aliquid aliud.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum non est in usu: tamen secundum intentionem Compositoris est mirabile in illa materia.

Ebulus autem est species sambuci: unde uersus.

Sambucus est actis sed ebulus est chameactis: de quo Sera. in ca. de ebulo, de utraq; loquitur, & ibi describit de forma ipsorum dicens, quod illa species quæ dicitur chameactis est minor prima, & habet ramos magis herbe pertinentes quadratos, in quibus sunt multi nodi, & folia inuicem distantia in singulis nodis similia foliis amygdalæ in summitibus suis, nisi quia habet uenas, & sunt longiora eis habentia grauem odorem, & in summitibus ramorum sunt capitella seu coronæ similes coronæ supradictæ speciei, & flos similiter, & habet radicem longam in grossitudine digiti, & apud nos in uitis ac in multis locis nascitur, & uocant ipsum rustici Lorex.

X L I I.

QUERCINVM, ibidem.

R. Visci quercini, rubæ minoris, ebuli & mediani, corticis sambuci, ana. ʒ. ʒ. coquantur in aqua camemillina, & fiat unguentum quercinum: est in fæcetiisimum.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Viscum autem quercinum uel uiscus secundum Serap. ex aut. Diosc. melior ex eo est nouus qui est similis in colore suo porris, exterius uero subrubrus sine asperitate, & sine fursureitate, & fit ex fructu rotundo qui nascitur in arbore glandium. idem Sera. dicit, reperitur autem in arbore malorum & pirorum: & in aliis multis arboribus. Ego uero uidi prædictum fructu qui est in grossitudine cicercis, & parum plusetiam fuit ex hominibus qui dixerunt, quod inuenitur aliquod eius fructus in magnitudine piri parui, & aliquando in magnitudine cicercis, sed parum plus secundum diuersorum locorum uarietatem, & nascitur super quercum, cuius folia sunt citrina, longiora & paruiora, & inuenitur in Hispania: Compositorem in fine descriptionis istius unguenti ait: & tamen loco uisici

quercini potest poni viscum alterius arboris, & est quoddam uiride inter ramos arboris nascens, & per totum annum est uiride, & habet baccas & grana sicut foliarum, & folia talia qualia crassula maior, sed sunt strictiora, & ualeat in omni gutta fomentata & emplastrata & inuncta ut satis uidi, & uiscum quercinum est optimum in epilepsia, & uocatur ab Auic. in. 1. can. cap. de corallis, lignum crucis.

EX PETRO TVSSIGNANA.

X L I I I.

DE EUPHORBIO, in cap. de paralyssi, tremore, tortura, & pasmo ex repletione.

R. Olei antiqui multum lib. i. ceræ rubæ. ʒ. ii. liquefiat cera cum oleo ad ignem, & proiciantur desuper euphorbii. ʒ. i. castorei. ʒ. s. & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Hoc enim mirabile est in passionibus neruorum: apud nos in usu est.

APPENDIX.

Medicamentum δὲ εὐφορβίῃ ex euphorbio nempe, GAIRNVS. bellissime III. Medicamentorum per genera compositum, in hunc sane modum.

Euphorbii pars una.

Ceræ tres.

Olei duodecim.

Ceram quidem euphorbii triplicatam, olei uero ipsius ceræ quadruplum esse conuenit. & hæc est simplicissima compositio symmetria, uerum (modo plura uelint,) studiosius locum consulant.

EX ANTID. BART. MONTAGNANA.

X L I I I I.

DE CORTICIBVS castanearum.

R. Olei de masticæ lib. i. olei myrtini, cytoniorum, ana. ʒ. vi. masticis, acaciæ, sanguis draconis ana. ʒ. i. corallorum rubeorum. ʒ. i. charabæ, terræ sigillatæ ana. ʒ. i. corticum castanearum, scoræ ferri præparatæ, uidelicet in aceto, ut ostensum fuit ana. ʒ. iii. s. refinæ pini. ʒ. i. ceræ quantum sufficit, & fiat unguentum.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum non est in usu: maxime apud nos. Castanea est fructus omnibus notus. Serap. de castanea & glans de in uno cap. loquitur. Apud Auic. de castanea non inuenitur cap. immo de ipsa loquitur in cap. de glande. glans enim generale est uocabulum ad plures fructus sicut ad castaneas nuces &c. unde nucem dicimus iuglandem quasi iouis glandem cui est dicata. Petr. de Crescen. in lib. 5. in cap. de natura arborum, & de utilitate fructuum ipsorum inquit: Castanea est arbor nota: & earum quædam domesticæ, quædam syluestres, & domesticæ quædam mediocres fructus facientes quæ castaneæ dicuntur: & quædam faciunt fructus ualde grossos, quos Mediolanenses marrones uocant uulgariter.

X L V.

PRO VERMIBVS.

R. Succi persicariæ, absinthii, abrotani, centaureæ minoris, maliteræ, foliorum persici, foliorum lupinorum, radicem ebuli, corticum granatorum ana. ʒ. i. porrorum non transplantatorum, sunt porri dicti purillix. ʒ. ii. nasturtii aquatici lib. i. aceti fortissimi. ʒ. iiii. ceræ quantum sufficit, fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu, tamen non ualde. Idem Compositorem describit duas alias descriptiones, sed hanc opinantur esse nobiliorem alias.

Persicaria secundum Nicolaum est herba sanctæ Maræ, cuius folia sunt similia foliis persicorum, nascens iuxta hortos, eius species duæ sunt: quarum una in medio foliorum habet maculam fuscam. alia uero est absq; macula, sed prima & melior est quam persicariam cum sigillo uocant.

Malum terræ est cyclamen aut burthormarien. Nasturtium aquaticum. s. fenation. hoc apud Auicennam in secundo can. uocatur pupilla oculi. de nasturtio aquatico uide supra in dianasturtio.

XLVI.

DE MUCILLAGINIBVS.

℞. Mucillaginis, fœnugræci, feminis lini, althææ, an. lib. s. coquantur omnia donec inspissentur, & quando coquiritur, semper aspergatur cum aceto, deinde fumatur lib. s. merdæ fengi .i. lithargyrii, & coquatur in lib. i. olei sisamini, lento igne. deinde proiciatur super ipsum mucillaginem, & proiciatur super marmor, & malaxetur cum manu, & fiat unguentum mollificatum & lenitum.

COMMENT. MANLII.

Istud unguentum de mucillaginibus s̄m modernos est diaquilon, & sic sunt ex hominibus qui faciunt istam descriptionem sub nomine diaquilon sine gummis: nam Mat. Syl. in litera diaquilon ait, Diaquilon est male scriptum, & debet dicere diachylon. i. compositio facta cum succis vel mucillaginibus. Præterea Io. Serap. in suo antidotario inquit: Vnguentum de mucillaginibus, & est diaquilon. idem dicit Gentilis super quintum cano. Aui. inquit apparet emplastrum diaquilon magnum, & ibi melius ostendam.

XLVII.

PECTORALE.

℞. Pinguedinis anatis, pinguedinis gallinæ an. ʒ. i. s. butyri recentis ʒ. i. croci. ʒ. i. olei violati ʒ. ii. ceræ albæ ʒ. vii. fiat unguentum molle quod postea laetetur duabus uicibus cum aqua hordei tepida.

COMMENT. MANLII.

Istud unguentum est multum in usus fuit ex hominibus qui faciunt ipsum secundum istam descriptionem: & sunt ex hominibus qui faciunt ipsum secundum aliam descriptionem, tamen moderni doctores laudant istam descriptionem adiungendo in ipso mucillaginibus, fœnugræci, & feminis lini, an. ʒ. v. Mesue in cap. de alinate habet vnam aliam descriptionem, quæ satis laudata est ut apparet in cap. alleg. infra apparet vna alia descriptio.

XLVIII.

DE ELLEBORO mirabile ad tinea.

℞. Olei laurini ʒ. ii. myrrhæ, ellebori albi an. ʒ. i. lithargyrii ʒ. ii. ceræ ʒ. ii. misce & fiat unguentum molle.

COMMENT. MANLII.

Istud unguentum non est in usu apud nos. Elleborus s̄m Mesue est barba albugi: s̄m Auer. in ʒ. col. elleborus est confusus, quod non creditur. verum multi moderni cōputant cum disti inter species ellebori, eo quod s̄m mutationem commouet, tamen nostri doctores non ponunt species ellebori nisi duas, s̄m album & nigrum, quia satis noti sunt. infra in oleo de euphorbio ostendam melius, & confundi non est elleborus. secundum intentionem Mesue, quando niger nascitur, apud radices arboris fructuosæ sunt fructus eius solutui. Papias inquit. Anticira est insula ubi abundat elleborus ad capitis purgationem necessarium: & ponitur pro elleboro antiqua parte templi quæ ortus respicit. hæc ab aliquibus dicitur velax, & ab aliquibus dicitur strandilla, eo quod pulvis ipsius in naribus positus s̄m mutationem commouet.

XLIX.

DE SEMPERVIVA.

℞. Olei uolarum, olei rosarum an. ʒ. i. pinguedinis anseris. ʒ. vi. succi semperuiuæ ʒ. iii. bulliant usque ad consumptionem succi postea adde croci. ʒ. i. & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Semperuiua. s̄m maior secundum Circainstans dicitur, quia semper viridis reperitur. Aui. in 2. inquit. Semperuiua est succum in ca. vero de suo cōputat inquit: Sucuti dicitur quod est semperuiua, & dicitur quod est species feminis mandragoræ, sed non recte, quia illud ca. defucuto est corruptum. nam apud Arabes est symphytum, ergo est consolida maior, & sic si legis illud ca. de fucuto apud Aui. in cap. de symphyto apud Diosc. videbis quod idem sunt semperuiua apud Diosc. vocatur aizoon. Maius dicitur quod omni tempore folia viridia habet, dicitur & buphthalmum quod non est. nam buphthalmum est oculus bouis, aut zophthalmum, aut ambrosia, quod non est. Aliud facit cap. de aizoon minori, & hæc est uermicularis, & am-

bæ notæ sunt. aizoon vero est proprie nomen suum, quia cōponitur ab aliquod est semper, & zon quod est viua. unde semperuiua dicitur, quia semper folia viridia habet nascitur super regulas plurimum, & in locis quibus stercorea proiecta fuere, & alibi.

L.

DE SVCCO ENULÆ.

℞. Succis radicum enulæ, lapacii an. ʒ. vi. salis nitri, sarcocolæ, merdæ fengi. i. lithargyrii, mastici an. ʒ. s. vitrioli, aluminis iamen, an. ʒ. i. s. argenti viui mortificati ʒ. ii. butyri. ʒ. v. terebenthinæ ʒ. iii. picis naualis ʒ. ii. & fiat unguentum, butyrum, & terebentina dissoluantur simul: deinde cum eis incorporentur species omnes: & vltimo omnia cū succis bulliant lento igne vsq; ad consumptionem succorum, & referua.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Enula est herba omnibus nota, vide de ea in electuario de enula.

Salnitrum s̄m Moder. opinionem est sal quod ignem accendere facit, & est sal quo Bombardarii vtuntur: nascitur in muris vteribus, quod quidam florem parietis vocant. Li ber qui dicitur Bulchafis in tra. 2. ponit operationem salis alchali, & est sal nitru, quod ingreditur in medicinis multis, & hoc sal vt docet ibi, fit ex cinere cuiusdā herbæ quæ vocatur chali, seu vñen, vt apud Serap. & est stercus passerum.

Argentū vltimum inter metalla est computatum, mortificatur autem argentum vium cum salina secundum artem. Aui. in 4. can. in fen. vi. de argento viuo loquitur dicens, quod plurimi qui bibunt ipsum non læduntur eo, egreditur enim cum dispositione sua per inferiorem regionem &c. Niccolus autem Floren. in lib. iii. ad vltimum inquit: Argentū vium interius cum sumitur sicut est s̄m plurimum nullam aut paruum efficit læsionem, & per hanc causam existimant quidam quod argentum vium non fit in numero venenorum: verum veritas est, quod est venenum: immo vt dicitur multa uenena ex eo conficiuntur, & si maneret in spacio sufficere, & non egredieretur velociter, interficeret, vt fuit de quodam apothecario qui sitiens in nocte bibit argentum vium, & mane mortuus est, & ipsum quidem extinctum cum salina deterioris est venenositatis.

L I.

DE AMYLO.

℞. Olei sambucini ʒ. i. olei uiolati rosati, ana. ʒ. i. s. cerussæ ʒ. x. thuris, mastici, ana. ʒ. i. campore. ʒ. i. amyli. ʒ. s. aq. rosarum. ʒ. i. albumina duorum ouorum, ceræ ʒ. v. coquantur simul oleum & cera, deinde addantur species aliæ propter infrigidationem, postea incorporentur simul albumina, & vltimo addantur boliarieni. ʒ. x. diligenter agitando cum spatula, & fiat.

COMMENT. MANLII.

Istud unguentum nō est in usu. Amylū. i. amydam Galin. lib. ad Parthenianum inquit: Amylum omnibus notum est: est. n. quasi medulla frumenti: nā apud nos amyli est succus frumenti in aqua diu macerati colatus & desiccatus. Amylū autē apud apothecarios nostros non est valde in usu: sed in partibus Venetiarum apothecarii magis vñen in faciēdo quondā mixturam quæ fit ex zucchero albo, aqua rosa, & amido: & hæc tria bene coquantur simul addendo si erit necessitas parsi olei amygdalari dulcium recentium, & fiat in de confectio in morsellis: quam Veneti Saoniam vocant.

Oleum sambucinum. i. oleum quod fit ex floribus zambac, cuius descriptio inferius apparet.

L I I.

DE TERE BENTHINA.

℞. Pulueris serpentariæ ʒ. i. sarcocollæ ablutæ ʒ. ii. s. sandaracæ ʒ. iii. thuræ pparatæ videlicet vt docet Bulchafis. ʒ. ii. terebenthinæ lotæ cū aqua sumitæ lib. iii. s. camphoræ ʒ. s. unguenti de succo enulæ ʒ. vi. misce, & fiat unguen.

COMMENT. MANLII.

Istud unguentū apud nos nō est in usu. Terebenthina la chrymū est arboris fatis notū. hanc quidam vulgo largariū vocant. Moderni multū cōputant abiectū inter spēs terebenthinæ, eo quod manibus cito inuiscatur, & arbor autē terebenthinæ

thinz botin dicitur: & eius fructus granum uiride. Matth. autem Sylyaticus in litera, inquit: Terebenthina est gummi arboris quæ uocatur terebinthus. idem in litera g, dicit gummi albotin. i. lacca uide ergo q. sibi ipsi contra dicit.

Serpentaria. i. dragontea maior seu colubrina: uide de ipsa in hiera Hermetis.

Sarco-colla abluta. i. lota aut nutrita in aqua rosata aut in lacte asinz vel mulierum. vt ostensum fuit.

Vnguentum de succo enule. i. heleniæ: eius descriptio fuit posita superius secundum ipsum.

L. I. I.

VIRIDE secundum Chirurgiam.

R. Chelidonium, leuistici, herbæ centrigalli, lilifagi. i. saluiz an. M. s. myrrhæ. ʒ. iiii. ceræ, terebentinæ, an. lib. i. pinguedinis anatis lib. iiii. olei communis lib. vii. aloes. ʒ. v. fiat ung.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum apud nos non est in usu: tamen secundum intentionem Compositoris est quoddam unguentum uiride quo utuntur chirurgici.

Centrigalli. i. galli crista: & est quæ gallitricum uocamus reperitur ex eo domesticum & syluestre: de quo uide supra.

EX ANTI. GLIEL. PLACENTINI.

L. I. I. I.

DE CERUSSA.

R. Cerussæ. ʒ. v. lithargyri. ʒ. ii. coriæ argenti aur. i. dragan. ti. ʒ. i. terantur & cribellentur & sumatur ceræ albæ. ʒ. i. liquefiat cum. ʒ. iiii. olei rosati, & proiciantur, & incorporentur medicinz in mortario: remouet enim excoarctationem & adustionem ignis.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est multum in usu: sed hodierni apothecarii non faciunt ipsum fm istam descriptionem illa uero descriptio quæ generaliter utuntur pro unguento de cerussa coctosissimum est cerussæ & olei rosati ana partibus æqualibus, & ambo bulliât ad ignem leuem & fiat ex eo pasta in magdaleonibus, & usu reueretur: quidam addunt in ipso parum lithargyri, sed raro Leonar. de preda Palea in ca. de medicinis consolidatijs ponit cerotum huius unguentum durum de cerussa coctum cum sepo castrati, istud est uerum unguentum, de cerussa coctum si admixturat sebum, in reliquis est idem cum descriptione quæ oibus cõteit est in usu, & hoc satis est notum. reperitur alia descriptio quæ dicit multis unguentum de cerussa crudâ, & multis dicitur unguentum album, et ab aliquibus dicit unguentum de biacca crudum, & ambæ descriptiones sunt in usu, sed hæc descriptio infra apparebit pro unguento albo, quod idem est.

Cerussa. i. biacca, & est ærugo plumbi, apud Auic. in. 2. can. est cinis plûbi, aut alanocho: quod idem est fm Circianstans cerussa est flos plumbi uis gerfa. gerfa etiâ fit ex fuc eo serpentina: sicut: dictum fuit in unguento marcionis.

EX RAINALDO DE VILLA NOVA.

L. V.

PRO capite puerorum, cõtra grossam, & crustosam scabiem, in lib. ii. cap. de scabie, seu pruritu.

R. Butyri recentis, terebentinæ, axungie gallinæ recentis, olei uiolati ana. ʒ. i. ceræ, a. q. & fiat unguen. quo ungatur caput in die, & post supponatur folium siclæ. i. bletæ, & aut brasice. i. caulis.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu, sed non ualde, sed uere a me fuit probatum contra crustam & scabiem puerorum mirabiliter ualere utendo ipso, ut docet compositor.

EX NICO. FLORENTINO.

L. VI.

DE CICUTA, in lib. v. cap. de duritie splenis.

* De tota herba cicuta. ʒ. vi. armoniaci. dimittantur nouè diebus in aceto nono die bulliant ad ignem donec armonia cum bene dissoluatur. postea coletur per pannum fortem, & illa liquoritas iterum bulliat, & addito oleo & cera fiat unguentum. Est enim potissimum contra omnem duritiem.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum apud nos non est in usu. Magister Pet. Argil. in ca. de duritie splenis habet unum quod idem est.

Cicuta uero aut fucharam est herba fatis no. apud Dios. uocatur conios, hausta habet nodosas sicut marathrum, folia similia ferulæ, sed angusta apud Aui. in. 2. cano. uocatur fucharam, & inquit sic. inquit Dios. crui huius plantæ est ficut crui ferulæ, & folia eius sunt sicut folia cucumeris. Hic textus Aui. est corruptus, quia debet dicere hausta habet nodosas sicut marathrum, folia similia ferulæ sicut dicit Dios. Liber qui dicitur Bulchalis in tracta. 2. inquit: Forma extrahendi succum ex fucharam. i. iusquamio, quod falsum est: nam Serap. in cap. de cicuta ait, fucharam sic nominatur apud medicos, sed Arabes nominant eam scicharam vel zucharam, & sic est quod zucharam vel fucharam est cicuta. Idem Serap. in fine eius capituli, inquit. Et quâdo ponitur cicuta super testiculos puerorum non dimittit crescere eos. melior autem ex hac planta est illa quæ nascitur in Creta, & in Chio, & in Attica, etiam apud nos in multis locis hæc reperitur. vnde si fricaueris folia ipsius recentia grauem odorem referunt &c.

Armoniacum lachrymum fuc gummi est satis notum. Nicolus: & magister Petrus Argillata non ponunt dosim armoniaci, sed si ipsum facere uolueris. adde. ʒ. iiii. armoniaci, & confice, vt ipse Nicolus docet.

L. V. I.

DE RANIS, in lib. vii. cap. de curatione dolorum iuncturarum per medicinas conferentes a proprietate.

R. Ranarum fluuiatum euisceratarum & exorticatorum quod uolueris, & laua eas nouies in aqua dulci & olla lapidea in solo sufficienti coquantur usq. ad consumptionem vel dissolutionem carnum earum. postea coletur per pannum rarum fortiter manibus exprimendo carnes earum. hoc enim oleum pedibus vnctum, & iuncturis optime confert, etiam locis cancrisosis inunctum.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum apud nostros doctores est in usu, tamen non ualde. sed utuntur magis medici Mediolanenses, quia in ipso inueniunt mirabilem experientiam in illa materia. verum est quod hæc descriptio non est illa quæ in usu est. nam Nicolus dicit: quod est unguentum de ranis. infra uero dicit. hoc. n. oleum pedibus iunctum, & iuncturis optime confert. ergo descriptio Nicolai reducit ad modum olei vel admodum apozimatis, sed melius est fieri unguentum de ranis. secundum intentionem Petri de Tulsigiana positam apud eum in cap. de podagra sciatica & arthritica. quorum hæc est descriptio. R. sepi ranarum. ʒ. i. s. butyri, a. grippæ. f. vnguenti de agrippa ana. ʒ. i. olei canamille, olei anethi, olei coltini ana. ʒ. ii. olei rosati. ʒ. iiii. vitrioli. ʒ. ii. ceræ albæ. ʒ. i. euphorbii. ʒ. i. resine. ʒ. ii. & misce fiat unguentum, & ungatur locus. Hæc uero descriptio a modernis doctoribus pro unguento magis laudata est quam illa Nicolai. uerum infra apparebit vna alia descriptio quæ est magistralis, & hæc est illa quæ ab omnibus uisitur de qua infra.

Rana fm quosdam est de genere piscium quæ facis notæ sunt omnibus Ipse Nicolus in li. 4. in ca. de speciebus serpentum facit ca. de ranis & buffonibus. & inquit: Buffo est de speciebus ranarum, & rana magna a quibusdam dicta botrax, & est turpis aspectus, ventrem habens latum & grossum & cutem durissimam difficiliter penetrabilem, & color eius declinat ad citrinatorem obscuram & oculi eius sunt ualde lutescentes &c. Idem in ca. de animalibus aquaticis uenofosis inquit: Et ex eis est rana quædam rubea maligna inuadens animalia per transuentia ut uideat ea, & si non possit mordere insufflat ad ipsa sicut buffo insufflatione nociua. sine dubio species ranarum sunt multe, sed non vimur nisi quâdam specie earum quæ morantur in paludibus, quæ notæ sunt.

L. V. I. I.

DIVINVM, optimum, in lib. vii. cap. de medicina generatiua carnis.

R. Pimpinellæ, verbenæ, betonicæ an. M. i. terantur & bulliât in Lumi. Ma. O ij

in vino optimo albo vsq; ad consumptionē quartæ partis vini. deinde coletur, & post colationem fumatur tota substantia distillarum herbarum, & ponatur in facculo de panno lineo, & fortiter stringendo pmatur cum torculari vel baculis supra aliquod vas, donec tota substantia herbarum cadat in eo, deinde. R. de tota substantia herbarum & terebenthinæ ana. 3. vi. ceræ virginis albæ. 3. iiii. & pone in vase terreo nouo ad ignem donec dissoluantur, & misceantur cum dicta substantia herbarum: deinde supermiratur masticis. 3. i. & lactis mulieris. 3. ii. & bulliant omnia sufficienter donec sit coctum, quod cognoscitur quando modicum ex eo proiectum in aqua frigida adheret digito tangentis.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum apud nos est in usu, sed non ualet: sed quis nō sit ualde in usu apud nos, forsan eo in aliis locis magis utuntur. Leo. de Preda palea in trac. de neruis in ca. de uulneribus, ponit unguentum diuinum a Deo datum: & est magistrale: ibi habet vnam descriptionem, sed non est idē.

Verbena seu berbera est herba que apud Dios. hierobotanum vocat: quidam uocant ipsam sacram herbam quæ sagmē. i. sanctimē antiquitus dicebatur: eo quod pagani in sacris faciebant, & omnibus expiationibus ea utebantur. hæc autē herba inde nomen accepit quod sacerdotes, eam purificationibus adhibere consueuerunt in Palsionario habetur, quod si medicus uisitando infirmū ipsam in manu portauerit ægroto incenscente: & dicit ægroto qualiter habes? si eger dicit, bene, sanabitur, & si dicit male, morietur, hæc apud nos in ciuitatibus nascitur: hanc quidam rustici herbam sancti Ioannis uocant, sed non recte. Papias berbera herba figmen dicitur dicta quasi pura. Hæc & hierobotane dicitur græce.

LIX.

DE LILIO, seu de radice lilii, in lib. vii. ca. de sudationibus.

R. Radicis lilii in aqua decoctæ, & optimæ tritæ. 3. i. incorporantur cum. 3. i. axungie recentis liquefactæ, & cola, & cum. 3. i. aquæ rosatæ: deinde super addantur cerussæ puluerizatæ. 3. ii. pulueris masticis, olibanī, ana. 3. s. camphoræ. 3. i. & optime incorporantur & usui reseruatur.

COMMEN. MANLI.

Istud unguentum non est in usu: maxime apud nos Liliū planta est: cuius species sunt multæ: de qua Serap. in suo capitu. loquitur.

LX.

ALBUM, in lib. vii. cap. de combustionē ignis vel rei ardentis, aquæ feruentis, uel olei, vel similibus.

R. Olei rosati. 3. iiii. ceræ albæ. 3. ii. cerussæ quantum sufficit ad incorporandum & inspissandum, & in fine addantur duo albumina oui.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum est multum in usu: verum est quod sunt ex hominibus qui utuntur ipso sub illo nomine: quidā utuntur sub nomine unguenti de biacca crudi: aut de cerussa crudi ad differentiam cocti, quod superius scripsi. Rasis in lib. de Diffinitionibus in cap. de aduisione inquit: Cōfēt aduisioni ignis unguentum de calce, & unguentum de cerussa, & magis vltimum, quod experti sumus, ad hoc est unguentum album, & cum est res magna, plurima indiget phlebotomia ex latere dīnero aut opposito: deinde curetur cum unguento albo: nolo quod intelligatur per unguentum album, quod est factum de cerussa & oleo rosato & cera, & non de pluribus. idem hodierni faciunt.

LXI.

DE CANTARIDIBVS, in. vii. cap. de saphati, tinea, & aliis pustulis capitis.

R. Cantaridarū purgatarū puluerizatārū. 3. ii. sulphuris. 3. s. cort: cum nucis. i. nucis communis dictæ corea basilica seu regalis. 3. ii. sinapis, myrrhæ, ana. 3. i. mellis & acetī quantum sufficit, & fiat, & teneatur super locum per unum diem, postea eo amoto superponantur folia sicclæ. i. bleat vel caulū.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu apud nos. Gilib. de Au-

glia in cap. de paralyfi habet idem, sed non est omnino simile. Hoc unguentum secundum intentionem Dini Florentini est unguentum alhariel. hanc intentionem habent hodierni chirurgici, & eius descriptionem describit Mesue in suo antidotario de quo uide supra.

Cantarides secundum Nicolaū sunt muscæ uirides, quarum ortus est in frumentis ac aliis locis secundum intentionem Compositoris debent esse purgatæ, uidelicet a malitia suis: Dios. inquit: Cantarides uirtutem habent purfectiui, sunt autem bonæ ad repositionem. in triticea segete colligitur, quæ misce in uase fictili, & desuper ligato panno imponuntur super cacabum ubi acetum bulliat, ut uapore acetī bullientis eadem incluse necentur: quæ postea lino inferuntur vel in uase non picato. i. uitreato reponuntur: meliores autem sunt uariæ grossæ & longiores, quæ super testam bulisæ combustæ uirtutem habent stypticam. Liber qui dicitur Bulchafis. i. Seruitor in trac. 3. docet formam colligendi cantarides, & reponendi eas, sed eius forma non est, ut docet Dios. ipse. uero loco acetī ponit oleum vetus. Moderni uero ponunt acetum & non oleum.

EX LEONARDO DE PEDA PALEA.

LXII.

DE PLUMBO, in cap. de herisipila.

R. Plumbi usti cum sulphuræ secundum Seruitorem. 5. ii. li taryrii. 3. ii. cerussæ, antimoni, ana. vnc. i. olei rosati quantum sufficit, fiat unguentum molle.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum est in usu: maxime secundum istam descriptionem. Idem in cap. de cura cancri habet idem. Idem in cap. de ulceribus ambulatoriis habet idem. Sed uterq; ab isto differt. Plumbum uero apud Aui. uocatur aluan ochi, & alhabar: uisum uero cum sulphure secundum Seruitorem superius in quadam Sief ostendi.

LXIII.

DE LITARGYRO, in ca. de pruna, & igne persico. R. Pulueris lithargyrii. 3. ii. cerussæ. i. biachæ. 3. s. olei rosati & acetī ana quantum sufficit, fiat unguentum in catia decoctum ad ignem: sed melius adhuc est, ut fiat in mortario sine decoctione.

COMMENT. MANLI.

Istud unguentum est in usu: maxime secundum istam descriptionem. Petrus Argilla in i. ca. de phlegmona habet idem & est simile, nisi quod deficit acetum. Rasis in. 7. Alman. in cap. de his quæ ulcero consolidant, & in ulceribus multam habentibus humores ostentem, carnem generat, & ipsorum remouent humorositatem: habet idem, sed non est in usu: idem habet Guliel. Placentinus.

Lithargyrium secundum Dio. est scoria argenti: idem est secundum Pli. eius uero species sunt multæ, quia quædam species eius est quæ fit ex plumbo, & quædam fit ex argento & quædam fit ex auro, & quædam ex eis est nigri coloris, & quædam aureæ: quæ quidem melior est cæteris. n. m. unguenta quæ sunt ex tali lithargyrio, declinant ad albedinem, & sunt nobilissime bonitatis: sed lithargyrium fuerit nigrum aut habens in se aliquid plumbi, erit unguentum quod fiet ex eo nigrum & turpe hoc est satis notum.

LXIII.

DIABVTION, ibidem.

R. Minium indicum & terram nigram, de quibus tribus pinunt pictores ana. 3. s. olei. 3. iiii. salis communis bene pistati. 3. ii. pone hæc omnia ad ignem in catia lento igne semper cum spatula agitando, & decoquatur donec ad formam quamuis ut reducatur, & maxime ad formam ceroti.

COMMEN. MANLI.

Istud unguentum diabution non est in usu. Aui. in li. 4. in fen. in cap. de curatione prunæ & ignis persici in fine cap. inquit, cum ergo quiescit inflammatio, & remanent ulcera, curentur cum eis quæ sunt sicut emplastra de merda fengi. i. de lithargyrio, & emplastra diabutiaron. Aui. ibi non ponit descriptionem sed solum de ipso loquitur. & si facere ipsum uolueris, descriptionem habebis.

Minimū est res rubea qua pictores vtuntur. Gal. in li. ad Parthenianum inquit: Armenianum vel minimū optimū dicimus quod est leue, æquale cerulū cum, frangibile, sine lapidibus vires habet crisocolle hoc apud Diof. vocatur armenium. nam ibi Diof. dicit idem quod dixit Gal. sed Simō non cognouit ipsum.

Endicum siue indicum est quedam res qua vtuntur pictores ad pingendum colorem turchinum, & eius color tēdit quasi ad cœlestem. Pictores de ipso habēt cognitionē, quia eo utuntur. & hoc notum est, & sic de flore cuiusdam herbæ quæ Arabicē dicitur nil quo panni tinguntur. Macer vocat ipsum ofatim. unde uersus.

Olatis a græcis est uulgo guaido uocatus.

Non Modicum quætum præbens tinctoribus herba.

Moderni existimant ipsum esse uerum gualdum seu telafam, & est herba cum qua tingitur blaetum.

LXV.

DE CANCRIS fluuiatibus, in ca. de cura cancri.

R. De cineribus cancrorum fluuiatium recentiu, & de climia auri, & de aqua solatri quod sufficit, fiat unguentum per optime ducendo in mortario de plumbo cum pistello aut super tabulam plumbeam.

COMMENTA. MANLII.

Istud vnguentum non est in usu. Cancrī maxime fluuiatiles noti sunt. Liber qui dicitur Bulcasia. i. Seruitor in trac. 3. ponit formam conuendens fartas. i. cancris, & ait: Accipie cancris fluuiatibus uiuos quādo fol fuerit in signo arietis. xiii. die mēsis, intelligo lunaris, & pone in furno panis quo usq; comburantur, & non conuertantur in cinerem.

Climia auri ēm Aui. melior est illa quæ aurea est ut cinctus glaciē cineritū coloris recēs, & laminosa grosior. Gu liel. Lomba. inquit: Climia auri ē superfluitas quæ adhæret parietibus uasīs in quo purificatur aurum. climia argēti est superfluitas quæ adhæret uasī in quo purificatur argentum. ultimo sic climia ex ære, & marchesia est sicut climia auri.

LXVI.

DE DRAGANTIBVS, in cap. de medicinis facientibus nasci carnem.

R. Draganti. ʒ. s. & ponatur ad mollificandū in aqua calida ad tantam quantitatem ut reduci possit ad formā collæ. nā istud vnguentum est ualde conglutinatium, & si uis potes addere de sanguine draconis, & sarco collæ ana parum.

COMMENTA. MANLII.

Istud vnguentum non est in usu secundum intentionem. Luminis malulucensis. hoc unguentum non reperitur ab authoribus.

Dragantum gurma est quæ apud Diof. vocatur tragacanthum. sed apud Æra. dragantum. Plin. ait: Tragacanthum est spinæ albæ radice multum plantata apud Medos & Caucasum nascitur. Eligendum est dragantum album & limpidum & lucidum & dulce & leue, hoc satis est notum.

LXVII.

INCARNATIVM Aesculapii, cap. de incarnatiuis in generali.

R. Herba dicta licii, quæ herba est tæx proprietatis quod excreatis pullis, harūdines tangunt oculis cum dictis foliis, & faciunt cum dicta herba reuidere, & dicta herba reducat ad formam pulueris, & resine pini ana. ʒ. ii. olei & ceræ quantum sufficit, & fiat vnguentum, quoniam est mirabile.

COMMENTA. MANLII.

Istud vnguentū nō est in usu, sed ē intentionē Leona. est ex auctoritate Aesculapii primi medicī, qđ ualet mirabiliter in illa materia, & est certū quod Aesculapius primus medicus fuit in uentore medicinæ vt existimant hodierni. Isti dno. inquit: Medicinæ aut auctoris ac reperiator apud græcos perhibetur Apollo. hāc filius eius Aesculapius laude & opere amplius. sed postqđ fulminis ictu Aesculapius interit, interdicta fertur medendi cura, & ars simul cum auctore deficit. Latuitq; per annos pene quingentos usq; ad tps Artaxaxis Regis Persarum, tunc eam reuocauit ad lucem Hippocrates Aesclepio patre genitus in insula Choo.

Licium apud moder. fit ex succo fructus arboris qđ darfi-

laham dicitur. quidam hanc uocant bugiam sicut Mat. Sylr. in litera. p. qui Ait: Puluis bugiæ. i. puluis de radice arboris berberis: ipse Leon. in ca. de indimia inquit: Licium est succus fructus conastrelli, de ipso uero uidet supra i descriptione ne pilularum lucis minorum, ubi melius fuit ostensum.

LXVIII.

DE FLORIBVS salicis, ibidem.

R. Florum salicis uel succi foliorū ipsius. ʒ. ii. lachrymi, uel terebinthine loco eius. ʒ. ii. alpalci, uernicis humidæ ana. ʒ. i. colophoniz. i. picis græce drach. ii. olei & ceræ q. s. & fiat vnguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Salix autē est arbor quæ in aquosis locis semper nascitur ut est notum oibus. Sera. in ca. de salice dicit. Quod flos & rosa ipsius administrant ab oibus medicis in vnguentis defecatiuis. Isido. ait: Salix dicta quod celeriter saliat. hoc est uelociter crescat, arbor lenta vitibus habilis uincit. Aui. in. s. can. tria de ipso facit ca. vnum sub nomine ana, & ibi dicit quod est algarab dicta in ca. de gami. aliud ca. facit de garab. quo est salix nō species eius, & aliud sub nomine salicis, hæc apud Græcos itea uocatur Circainflans ait: Salix cortex & flores & folia, usui medicinæ competunt Pet. de Crescen. dicit: Salix est arbor nota sic dicta: eo quia eius planta in altū flectit, Plin. salicis fructus ante maturitatem in arenam abit.

Lachryum. i. lachrymū arboris balsami. nā ipse Leon. in ca. de fistulis ait: Olei uitæ seu lachryum, qđ idē est uel terebinthine loco lachrymi sine dubio ēm intentionem Compositoris lachryum est opobalsamum, quia ipse dicit qđ loco eius ponitur terebinthina vt faciunt multi alii.

LXIX.

DE PVLEGIO, ibidem.

R. Succū pulegii montani, succi calamanti, succi centaureæ uel pul. isthorum, ana. ʒ. i. olei myrtini, & ceræ quantum sufficit, & fiat.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum nō est in usu. Pulegium herba est satis nota. maxime pulegium commune. i. pulegium regale. Isid. inquit: Pulegium apud indos pipere preciosius est. Circainflans ait: Pulegium in tempore florum colligitur, per annū seruatur: folia cum floribus abiectis stipitibus in medicinā ponuntur gliconium etiam est pulegium.

LXX.

DE CENTAVREA, in cap. de medicinis consolidatiuis.

R. Centaureæ minoris. ʒ. i. aristolochiz lon. ʒ. v. venæ tinctorum. i. rubeg tinctorum. i. lacæ. an. ʒ. ii. terebinthiz. ʒ. i. olei masticis. ʒ. i. ceræ. q. s. fiat vnguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Centaurea uero herba est nota. Io. Angli. in cap. de fluxu ventris ponit uersus, de centaurea quod ipse, optime, ualet in hæmorrhoidibus.

Centaurea iuuat neruos pedibus, secundū. i. i. secundū. Eicit, & vulnus solidat, uisum meliorat.

Incisās carnes radix conuicta reducit.

Tulsibus atq; sciz ualet & muliebria ducit.

Si defecetur & post bene puluerizetur.

Stringit hæmorrhoides oleo si commiscetur.

Plin. inquit: Centaurea hæc dicitur curatus chiron cum Herculis exceptus hospitio petra cecidit arma sagitta ei excidisset in pedem: quare aliqui chironou appellat: alia est centaurea maior, sed ista non est nota, nec fuit in tempore Macri. nam Macer inquit.

Sunt centaureæ species maiorq; minorq.

Vt supradictis dixi de plurius heris.

Sed quia per paucas species est cognita maior.

Hanc præter mittens vires narrabo minoris.

Quam notam cunctis credo uulgariis ipsis.

Apud nos in locis aquosis nascitur.

LXXI.

CITRINVM, ibidem.

R. Terebinthiz. ʒ. ii. ceruiz. ʒ. i. olei myrtini. ʒ. ii. argēti uiui

Lumi. Ma.

O 8

cum salina extincti. 3. s. cerę quantum sufficit, & fiat vnguentum in mortario sine igne propter argentum vitu ne saliat.

COMMEN. MANLI.

Istud unguentum est in usu, led sunt ex hominibus qui componunt per alium modum: dicitur autē citrinum, quia eius color efficitur citrinus. Gul. Lobar. habet idem sed nō est in usu: inuenitur aliud vnguentum dictum citrinū, quia ēquitur in pomo citriuo, sed hoc non habet colorem citrinum: immo eius color tendit ad albedinem: cuius vnguenti descriptio superius ostensa fuit: infra apparebit vna alia descriptio quę generaliter vsui venit &c.

LXXII.

DE HEDERA, in ca. de combustione ignis, vel aque, vel olei.

R. Granorum & foliorum hedera, & pistentur peroptime & extrahatur succus, olei communis ana partes aequales, & rubeum quantum sufficit: omnia in simul decoquantur vsque ad consumptionem succi: & postea proiciatur supra acetum album & malaxetur illud vnguentum.

COMMEN. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Hedera apud Auic. in. 2. can. vocatur cissus, & sunt eius spēs tres. f. nigra, alba, & rubea, & oēs sunt acres & stirpiceę, & vna quidem specierū eius est quiddam quod nominatur laudanum, & cissus quidē in radice laudanum, aut aliud, ambo. n. sunt propinquarum dispositionis: Sera. de hedera loquitur in ca. de volubilibus in fine eiusdem capituli inquit: Eodem. i. laudanū colligitur ex vna specie cissus & nominatur laudanum apud Diosc. hedera vocatur cissus, & dicit quod multe sunt species, sed tria sunt genera. salba nigra & elix. Hęc ab Auic. dicitur rubea, alba vero semen affert album nigrum aut: croceum, q̄ multi dicyssiam vocant, elix vero non habet semen. ibi a Diosc. cōsumitur sermo de hedera volubilibus, hypoquistidos & laudano: ex quo uidetur textus falsus. nā hypoquistidos non est hedera, nec est species eius. vide Sera. de hypoquistidos separatū ca. facit, & illud q̄ dicit Diosc. in ca. de cissos. idē dicit Sera. ex autoritate ipsius in ca. de hypoquistidos, & si bene cōsideretur uidebis quod ille textus Diosc. est corruptus. Gale. in. 7. simpl. inquit: Cissus vel laudanum. infra ait: Cissus vel hedera. Idem in lib. ad Partenianum inquit: Hedera nascitur in diuersis arboribus parietibus vel petris uel in terra. Isid. hedera dicta quod arboribus raptando adheret: dicitur etiam hedera, quia libenter a capris editur, vel dicitur hedera, eo q̄ hedis lactis abundantiam in escam teneris prębeat.

LXXIII.

DE VITRO, in capitulo de eradicatione uelutiorum.

R. Vnum collū anguillarę uitrii albi, & accēdatur in igne & extingatur nouies in succo lymonum, & hoc factū uitrum subtilissime tere, & loco ipsius ualet spuma uitrii, & est melius si haberi potest: si aut non pōt accipite supradictum vitrum. 3. ii. pulueris sandalorum alborum, pul. crystal. ana. 3. i. & diu omnia super posidum. i. lapidem quēdam sic uocatur bene ducantur cum aqua lymonum, donec tuscias unguentum extendibile super locum q̄ uolueris extendere.

COMMEN. MANLI.

Istud vnguentum non est in usu. Collum vnum anguillarę dicitur vulgari nomine, sed a latinis dicitur infusa, & hic est sermo Venerorum & astanum regionum.

Vitrum maxime album est laudabile, secundum Auic. vitrum est inter lapides sicut stultus inter homines: species autem uitrii sunt multe, nam est vitrum album, rubeum, citrinum, uiride & azurinum, sed nobilior cunctis est illud quod colorem habet album.

LXXIIII.

DE SANDARACHA, in capitulo de cura vulnerum.

R. Cerę albę. 3. iii. terebinthinę lorę. 3. viii. masticis. 3. i. s. sandarachę, sarcocollę, turis ana. 3. vii. misce & fiat unguentum malaxando in forti aceto, vel in bono uino montano albo, & habes ipsum pro secreto, quia bonam operationem facit in omnibus membris caniniformibus, & neruosis.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Sed Leonar. habuit ipsum pro secreto.

Sandaracha secundum Diosc. in eisdem locis nascitur, in quibus aurumpigmentum. Eligenda quoque est quę colore est rufa valde & facile terribilis, munda, colorem cynabryi habeas, hanc multi facile crediderunt esse aurumpigmentū rubeum, sed non recte. nam apud arabes sandaracha est uet nix, & idem est apud Moder. Item Serap. in cap. de vernice ait: Sandarax. i. uernix. Item Ioan. Aug. in cap. de reuma te ait: Vernix quę uocatur sandaracha penultima genitiui pręducta, quia ipsa breuiata non correpta, tunc est idem quod auripigmentum. vnde uersus.

Est sandaracha uernix medicorum non tinctorum.

Sandaracha. auripigmentum rubeum vel citrinum: quia color citrinus aliquando vocatur rubeus apud grecos, sed non recte ut dictum fuit.

LXXV.

DE VVLPE, ibidem.

R. Iuniperi, terebinthinę sublimatę ana. 3. vi. axungię porci. 3. ii. pyrethri, gentianę, piperis lon. baccharum lauri, aristolochię rutor. castorei, myrrhę, salis ana. 3. ii. adipis uisui adipis gatti, adipis tashi, mellis crudi, cerę rubeę ana. 3. ii. armon. affe teride, gelbani, serapini, olei petrolei an. 3. i. euphorbi, nigellę, linapis, laudani, masticis olei cōmunes ana. 3. i. s. omnia vno modo terantur & ponitur in uulpe ad ignē & coquantur bene donec uulpes bene cōsumpta fit cū oibus supradictis rebus, & fac ung. fm artem ex ingenio mirabile.

COMMEN. MANLI.

Istud unguentum apud apothecarios Moder. Papien. nō est in usu, sed Mediola. utuntur ipso, magister Pet. Argilla. in ca. de podagra siue gurtā frigida ponit unguēde uulpe ipsius Mesue R. uulpem integram interioribus euulsis, & pone in uase cū aqua calida mmo & oleo, & ultra hoc pone in isto uase saluā, rorem marinarum, iuniperum, anethū, origanum, & maioranam, omnia ista bulliant usq; ad uini consumptionem: & aquę, taurum bulliant, quod caro uulpis ab osse separatur, & postea in coelestri exprimitur & coletur: & ex ista colatura fiat vnguentum hęc descriptio magistri Pet. uidetur esse oleum vulpinum, quę est de mente Mesue, sed apud nos aliud est unguētū de uulpe, aliud est oleū vulpini. uerum quidā sapientes dixerunt, q̄ si addatur in illa colatura cerę quāties cōueniens, pōt dici unguētū de uulpe.

Vulpes apud Arabes uocatur taleb. Auic. in. 2. can. narrat virtutem suam dicens, quod quando uulpes coquantur in aqua, & embrocantur iuncturę dolorosę: ex ea confert uehementer &c.

LXXVI.

IRINVM, ob colorem in cap. de ulceribus uirulentis.

R. Olei irini. i. fasci de foliis liliorum cōlestium. 3. ii. non aff dictum oleum in bacili bene terfo & mudo, deinde R. salis armoniaci. 3. i. s. & frica tādū in oleo, donec illud oleum re maneat cōlestis coloris, deinde recipe resina pini, & terebinthinę ana. 3. i. pul. indici. 3. s. & cerę. q. f. & fiat unguētū.

COMMEN. MANLI.

Istud vnguentum non est in usu, infra apparebit aliud vnguentum quod uocatur de ireos, sed istud fit ex puluere radicis ireos, de quo infra.

EX PETRO ARGILLATA.

LXXVII.

DE MINIO, in cap. i. de phlegmone.

R. Minij. 3. i. olei rosa. uel myrini secundum quem uis 3. ii. secundum quantitate quam uis facere: misceantur omnia in cazola & bulliant ad ignem cum paruo & lento igne usque ad consumptionem olei, & semper misce cum spatula ne aduratur, & fiat vnguentum in bona forma.

COMMEN. MANLI.

Istud unguentum non est in usu apud chirurgicos ac alios Leonar. de preda palea in cap. de medicinis consolidatiuis ponit cerotum de minio, & est idem.

Minium uero apud Auic. in. 2. can. uocatur sirengi. Sera. vero

vero vocat ipsum minium. & inquit. Aftengia. minii. Alexander Paulus, & Alchindus dicunt quod ipsum est azarcò & alii dicunt quod est afregei, & fit ex plun-bo qñ ponitur in igne & inflatur & fit rubrum, pictores eo multum utuntur.

LXXVII.

DE IREOS, in cap. de medicinis facientibus nasci carnem.

R. Seni uacii. 3. vi. olei rosa. 3. iii. ceræ. 3. ii. radiculi ireos. 3. i. thuris masticis, sarcocollæ, aloes, succorini, aristolochiæ rotundæ. an. 3. i. terebinthinæ. 3. ii. & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in vfu Barho. Montagnana in suo antidotario habet idem. Leon. de predi palea in cap. al lega. habet vnguentum irinum, quod est factum de oleo iri no facto de floribus litorum coelestium.

Ireos uero est radix filii coelestis. Sera. in cap. de lilio inquit. quod habet stipitem super quæ est flos habens colores diuerfos. & sunt albus citrinus, purpureus, & coelestis, & ppter diuersitatem istorum coloru nominatur ireos. i. arcus demonis. i. ab illo arcu demonis qui apparet in aere tempore pluuioso, & habet radices duras, nodosas, quæ habent odorem bonum. & hæc satis est nota.

LXXIX.

GRATIA DEI, ibidem.

R. Ceræ albæ, resinæ pini, amoiaci an. 3. vi. terebinthinæ. 3. iii. galbani, olibanii, masticis, myrrhæ claræ an. 3. s. aristolochiæ rotundæ. 3. ii. terenda terantur & infundantur in uino in quo decocta fuerint betonicæ, verbenæ, consolida maioris, & minoris cætareæ, pimpinellæ, hypericon, herbæ gratia Dei, baucis an. M. i. & postea extrahantur & malaxentur cum lacte mulieris. hoc unguentum generat carnem & consolidat, & est commune ad omnia vulnera.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum generaliter est in usu, sed moderni nõ componunt ipsam secundum ista descriptionem. illa uero de scriptio quæ utuntur est magistralis quæ ab auctoribus non reperitur, sed hodierni chirurgici mirabiliter ista descriptionem laudant, quia mirabiliter genera carnem & consolidat: & est eodẽ ad omnia vulnera, Falciscius medicus in sua anatomia habet idem, sed non est simile: inutilis diuersitas inter multos est in hoc unguento. nõ quia dicunt quod dicit gratia Dei. ita Deo datu. Alii dicunt quod dicit gratia Dei, a quadi herba quæ gratia Dei vocatur quæ eius cõponem in tract: cuius formam infra ostendam, & sine dubio est consonu quod debeat dici unguetu gratia Dei, ab illa herba q̃ recipitur dicimus unguetum de lithargyrio a lithargyrio qd recipitur: & sic de singulis: sed quia hæc descriptio in usu non est ualde: hoc aduenit quia pauci inuenerunt eius descriptionem. infra uero apparebit alia descriptio quæ est magistralis: hoc unguentum apud quosdam dicitur vnguentu ceraseos.

Herba gratia Dei apud Moder. herbanicus uulgo sic est uocata, & est herba: cuius longitudo est unius palmi, aut parum plusfolia habet similia hyssop: florem habet inter folia paruum: cuius color tendit de bicoloribus ad album & purpureum: scilicet herba quæ dicitur uolubilis quæ in uineis nascitur: radicem habet parum & paucã. apud nos in praticis ualde abundat, & cognoscitur propter saporem folioru: nam folia ipsius habent amaritudinem, prout centaurea minor aut parum plus.

LXXX.

DE CLIMIA, in cap. de medicinis cicatrizantibus.

R. Climiz adustæ, colcothar adusti, an. 3. ii. cerussæ, lithargyrii an. 3. iii. puluerizent, & cum oleo myrrino & aceto uini granato & uino styptico. i. forti miscant, & fiat unguetu.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum nõ est in usu. Climia uero fm Moder. est res sicut fuligo quæ adhæret superioribus partibus fornicis in depuratione auri, & tunc dicitur climia auri uel argenti, tunc dicitur climia argenti uel aliorum, & modu eius adustionis docet liber qui dicitur Bulchasis in. i. tracta.

Colcothar est vitriolum citrinum. Gal. in lib. Secre. in ca.

ad omnes ægritudines dicit quod est atramentu albu ergo est vitriolum album, sed nõ recte. Io. Angli. in ca. de ulceribus & vulneribus nasi ait: Colcothar. i. atramentu citrinu, & ita dicit Aui. in ca. de atramento: nos uero loco eius vitriolum viride generaliter, aut vitriolum Romanum ponimus.

LXXXI.

DE VERMIBVS incarnatum, in cap. de medicinis incarnantibus.

R. Vniusq; cõsolidæ, pilosellæ, utriusq; plantaginis, an. M. i. uermiu terrestriu, 3. vi. terantur oia & ponantur in libr. i. s. olei cois per septem dies. deinde bulliant modicu, & coletur & exprimat, & tunc addatur seui arietini mundati libr. i. picis nualis. 3. vi. picis græcæ. 3. iii. armoniaci, galbani, opoponaci terebinthinæ, an. 3. i. i. thuris, masticis, an. 3. s. dissoluantur gummi in aceto, & fiat unguetu, quod mirabiliter ualet.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum nõ est in vfu. Vermes s. terrestres sunt, multum laudati. Isido. in ca. de uermibus inquit: Vermis est aial quod plerq; de carnis, vel de ligno, vel de quacunq; re terrena sine ullo cõcubitu gignitur: licet nõnunquam & de ouis nascantur ut scorpioides autem uermes, aut terræ, aut aquæ, aut aeris, aut carni, aut frondium, aut lignoru, aut uestimentoru. O quanta admiratio est quod in corpore humano generant lumbrici longitudinis duodecim brachioru: & isti uermes apud quosdam unguentum solea piscis. Ser. de uermibus duo fecit capitula, vnum de libricis terrestribus ubi dicit: Isteuli vel lumbrici terreni. Aliud de uermiculis uasorum quos dicit esse uermiculos paruos, qui quando tanguntur inuolunt seipsos & sunt virides. Aui. in. 2. can. vocat ipsos charathin, & sunt lumbrici terrestres. Leonar. de Preda palea in ca. de medicinis & soli latius inquit: Puluis uenæ teræ. i. lumbrici terrestris, his satis noti sunt.

Pilosella herba est satis notadicit aut pilosella pp abundantiam pilorum quos in foliis habet ego nõ inueni auctorem autenticu qui de ipsa speciale faceret ca. sed apud Moder. pilosella est herba, nascens in locis lagidiosis siccis cū foliis quæ expandunt super faciem terræ, & super ipsa folia habet pilos ab vno latere, & ab alio cū flore rubeo: quia a multis dicit esse recens comeditur. Exultimauerunt quidam quod hæc fit quam Aui. in. 2. can. vocat fistulam, sed nõ approbo.

LXXXII.

DE MATRISSELYA in cap. de fractura cranei, Colicis capitis,

R. Ex matrisselyla recentu, & fac ipsam bullire in uino usq; ad consumptionem medietatis, deinde coletur, & in ipsa colatura addatur oleum & cera, & bulliat vsq; ad consumptionem, & pone super duram matrem.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum non est in usu. Leonar. de preda palea in cap. de cura vlcium in generali habet idem, sed non est conforme: verum differt parum. hoc unguentum videtur esse idem cum uno emplastro quod describit Nicolaus Flor. sub nomine emplatri bouini quod communiter vtuntur: cuius descriptio inferius apparebit.

Matrisselyla apud Dio. vocatur periclimen siue spleon, siue splenaria, & est herba seu frutex, dictu fuit supra in unguento marriatonis. Leonar. inquit: Matrisselyla. i. caprifolium idem dicit Nicolaus de hac multi faciunt licu, sed est deterior in bonitate aliis speciebus licui.

Olei. solei. oliuæ, ceræ. s. uulualis hic Magister Petrus nõ ponit dosim de istis duabus rebus, sed Leonard. ponit olei communis, 3. vi. ceræ 3. iii. Nicolaus uero ponit ceræ citrinæ, terebinthinæ, an. 3. iii. olei i. rosati, 3. ii. magister Petrus non habet resinam nec terebinthinam. Leon. habet resinæ terebinthinæ, an. 3. ii. bulliant omnia ad consumptionem medietatis succi, & fiat unguentum.

LXXXIII.

DE VESPERTILIONIBVS, in cap. de podagra, siue gutta frigida.

R. Vespertilionis numero decem, & pone in caldario, & cooperi cum aqua pluuiali, & coque usq; ad medietatem consumptionem aquæ & cola, fiat unguentum &c.

COMMENT. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Vespertilio est animal quod de nocte uolat. Aui. in. 2. can. de vespertione sic ait: Dicitur quod feritazur est lac eius, & dicitur quod est urina eius. Lafrācus chirurgicus in ca. de panno. lentiginibus gutta roseacea cicatricibus ulcerum, & eorum cura inquit: Pulvis paruorum murium misce vespertilionum, quod idem est.

LXXXIII.

DE FORMICIS, ibidem.

Re. Terræ formicarum cum ouis & toto. 3. iiii. faring hordei et fabarum an. 3. rofarum. 3. s. malum, mandragoræ an. 3. vi. coq. rosas maluam & mādargorā in tribus libris aquæ usque ad medietatē, & colas, & confice cum reliquis medicinis in mortario puluerizatis, addendo tria albumina ouorū & vttere.

COMMENT. MANLI.

Istud unguentum non est in usu. Formica est animal paruū oibus notum, etiam formica aliqui accipiunt, per quam ægritudine, de qua Aui. in. 4. can. in ten. 3. ca. de formica miliari inquit: Formica est pustula, aut pustula quæ ægreditur & facit ut accideret apostema purum, & ambulat, & fortasse, vicerant, & fortasse resoluuntur, & tu iam sciuit causam cuiusque illorum, & color quidem formicæ ad citrinitatem est decliuus, & est inflamata cum suba verrucali & rotunda, & sem plurimum habent radicē latam, nisi quædam spēs eius acruhaurod, & est radicis paræ quasi sit pendens, & sentit in omni formica sicut punctura formicæ &c. Leon. de Preda palea, in cap. de formica inquit: Formica dicitur esse puscula parua granata de cholera aduicta denominata sit tali noie per formam coloris citrini, & per quantitatē paruitatis, & similitudinem illius animalis apparet. f. in colore formicæ citrinæ. & paruitate illius animalis & pūctione.

Postquam dixi de formica quæ pustula vocatur, nunc uero uolo narrare de natura quæ inuenitur in formica nā Isid. inter minuta animalia computat ipsam, & inquit: Formica dicitur eo quod fera micis faris, cuius solertia multa est, prouidet enim in futurum, & preparat in æstate quod hieme comedit, in messe autem eligit triticum, ordeum non tangit dum pluit & super frumentum totum eitit, dicitur in Aethiopia esse formicæ ad formam canis, quæ harenas areas pedibus eruant, quas custodiunt ne auferantur, captant teo; ad necem persequuntur.

EX OFFICINIS, vulgo MAGISTRALES.

LXXXV.

DE ADIPIBVS.

Re. Olei camæmillæ, olei vio. an. 3. vi. butyri recentis, adipis gallinæ. an. lib. i. ceræ quantum sufficit.

COMMENT. MANLI.

In usu est.

LXXXVI.

GRATIA DEI.

Re. Galbani, opopanacis, viride æris, thuris, aristolochiæ lōgæ mastici, myrrhæ an. 3. i. armoniaci. 3. ii. 3. ii. ceræ. 3. viii. olei communis, litargyri an. 3. xviii. bdelli. 3. ii. adamantis, calamitæ, lapidis hæmatitis an. 3. i. cōficiantur secundum artem addendo 3. vi. terebenthinæ. 3. iiii. abietis, & fiat in magdaleonibus, ut est notum.

COMMENT. MANLI.

Istud unguentum est in usu generaliter, uerum est quod sunt ex hominibus qui componunt ipsum sem istam descriptionē, & sunt ex hominibus qui componunt per aliam descriptionē nem secundū diuersitatem locorum, quando autem hoc facis, eius color est tripliciter: Scias autem quod hodierni chirurgici laudant unguentū gratia Dei secundum descriptionē Petri Argillatæ, & illud uocatur unguentum gratia Dei, propter herbam gratia Dei, quam recipit de quo supra.

Thus dicitur a uulgo, incenso. Circinsilans aut oliabanū idē est quod thus, gūmi est cuiusdam arboris, iuxta Alexandriā nascit quod Alexandrinū dicit, & est melius & purius, nā scitur ēri iuxta Damascenū, & Damascenū dicitur, quod est albu purū, & inuenit thus grossū, quod thus masculū dicit.

Adamas, f. lapis adamas. Sera, in ca. de lapide adamas dicit, quod lapis adamas est mes fluminis in quo est lapis de

mes, & est flumen ad quod nunquam inuit aliquis nisi Alexander, & est in finibus coracæ, & color eius approximat coloris falis armoniaci, nō est lapis magnes, ut quidam putauerunt. Simon Ianuen. ait: Adamas lapis durissimus, inter preciosas gemmas computatur, sex angulos habens ferruginei coloris, quod multi mentiti sunt non posse frangi nisi cum hircino sanguine, aut plūbo, quod auri fabri experti negant aliquando adamas magnes vocatur, sed falso.

Calamita, f. lapis calamita quæ a multis vulgari nomine sic est vocata, sed apud Dios. vocatur lapis magnes, & est lapis qui inuenitur circa latus oceanī apud trogoditas, & in India ab inuenteore sic uocatur. Iste est lapis qui attrahit ferrum sicut est notum omnibus. Aui. in. 2. can. inquit, magnes est lapis qui attrahit ferrum, cū ergo aduritur fit ematites, dāt mihi admirationē verba Aui. dicentis, quod quā magnes aduritur fit ematites. Slapis ematites, quod ignoro, quia lapis ematites est in colore rubeo, & magnes nigro, quod nō conuenit nisi forte ut arbitror acqueret illū colorē ex adultione.

Abietinum est gūmi abietis, & est succus terebinthi, sed non est ita subtilis, ut est notū. Isid. in cap. de propriis nominibus arborum inquit: Abies dicta quod præceteris arboribus longe eat, & in excelsum promineat de qua Virg. ait.

Et calus abies visura marinos.

Quia ex ea arbores nauium sunt, hanc quidam gallicū vocant propter candorem. Pet. de Cresc. dicit. Abies picea, & arexes, seu larices quæ eadem arbores sunt.

LXXXVII.

STAPHISAGRIUM.

Re. Staphisagria, saponis mollis an. 3. ii. axungie porcine 3. iii. argenti viui extincti 3. i. s. misce, & fiat unguentum.

COMMENTA. MANLI.

Istud unguentum est in usu sub nomine ugentis staphisagria: aut sub nomine ugentis pro piatolis, aut pro pediculis, aut pro foldatis, quod idem est.

Staphisagria autem secundū Sera. est granū capitis, & est dicta passula montana. Aui. in. 3. can. ait: Staphisagria est uia passula mōtana, & est granū capitis, in monte Libano inuenit de eo plurimum, & est granū nigrū fuscū cicer nigrum. Circinsilans inquit: Staphisagria quæ est caput purgū dicitur: fimen & herba simili noie appellantur. dicitur. n. caput purgū, quia caput purgat: multa est efficacitas: semē vliū medicinæ competit per decem annos durat Isid. staphisagria, hoc est herba quinq; digitorum: huius semē &c.

LXXXVIII.

DE ANTHERA MAGNUM.

Re. Antheræ. 3. vi. rofarum rub. balauftiarum, corticum granatorum, gallarū, nucis cypresis, gummi arab. myrrhæ, myrtillorum draganti, terræ ligil. coriandrorum preparatorum boliar. sandalorum rub. an. 3. iiii. sanguinis draco. mastici, thuris hypoglossidos an. 3. iiii. sacaciæ. lumach an. 3. v. bdelli, spodii, corallorum rub. an. 3. iii. camphoræ. 3. i. copularū gladiū. 3. vi. charabæ, seminis, plantaginis, an. 3. iiii. olei rosæ. i. olei myrtillorum, olei cytoniorum, olei masti. an. 3. vi. misce, & fiat unguentum secundum artem.

COMMENT. MANLI.

Istud unguentum est in usu: fed sunt ex hominibus qui componunt ipsum secundum istam descriptionē, & sunt ex hominibus qui componunt ipsum per aliam: tamen ista descriptio apud hodiernos doctores multum est laudata, & sunt ex hominibus qui uocat hoc unguentum constructium: in fra apparebit una alia descriptio.

Anthera autem secundum communem opinionem est semē cuiusdam fructus qui dicitur a uulgo gratacul. Io. Anglicus in ca. de fluxu ventris in febre inquit Anthera. i. semen rosarum idem dicit in cap. de cura fluxus sangu. Circinsilans anthera dicitur flos rosæ: est autem quoddam quod reperitur inter rosas: eius fructus apud Aui. in. 2. can. vocatur rubus: cuius fructus est sicut oliua habens interius lanam. idē Sera. in ca. de rubeo inquit: Sed rubus canis est maior rubo satis: nam asimilatur in magnitudine sua arboribus, & folia eius sunt latiora foliis myrtis in ramis eius sunt spinæ duæ habet florem album, & fructus eius est oblongus similis

in oleo oliuæ: qui quando maturauerit fit rubeus, & habet interius simile lanæ: qui quando deficcatur auferit quod interius est: hæc est planta quæ apud Dios. uocatur cynos batus: in cuius fummitate nascitur quædam res similis spongiæ: & in ea interdum uermes inueniuntur. & hæc apud igno rantes spina alba seu begeduar uocatur.

LXXXIX.

DE ANTHERA MINVS.

℞. Olei rosati .℥.vi. ceræ, anthera, ana. ℥.i. i. acaciæ. ℥.liij. sanda-
lori rub. rosa. rub. ana. ℥.ii. boli ar. ℥.i. misce, & fiat unguentū.

XC.

Rubeum Camphoratum.

℞. Olei rosati lib. i. & .℥.viii. lithargyri .℥.ii. minij. ℥.iii. s. ceru-
fæ .℥.i. s. thutæ, camphoræ, ana. ℥.iii. ceræ .℥.ii. in æstate, & in
hyeme .℥.i. fiat unguentum in mortario plumbeo cum pistel
lo plumbeo, & sunt qui addunt chimolæ .℥.vi.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentum est in usu: maxime apud chirurgicos: di-
citur autem unguentum rubeum camphoratum, ad disse-
rentiam alterius descriptionis quod dicitur album.

Camphora autem apud Sera. & Aui. est gummi arboris,
ut dictum fuit: sed secundum Circæitans camphora est succus
cuiusdam herbe quæ in fine ueris colligitur, & teritur, &
succus eius exprimitur: quod foculæum dicitur, & abii
scitur, quod purum est & liquidum retinetur, & soli exponi-
tur & deficcatur, & reducitur in substantia camphoræ. Io.
Angli. in ca. de sterilitate ait: similiter camphora frequenter
odorata multo impedit erectionē: & ideo dicitur in uersu
communī. Camphora per nares castrat odore mares.

XCI.

DE CAMPHORA ALBUM.

℞. Olei rosati lib. i. ceræ nouæ albæ .℥.iii. ceruifæ .℥.xii. albu-
mina ouorum numero. vi. in quibus dissolutæ sint. ℥.ii. cam-
phoræ cum aqua rosata, & fiat unguentum secundum artem.

XCII.

PECTORALE.

℞. Mucilaginis psylli, dragacani, gummi ar. feminis lini,
foenugræci ana. ℥.i. pinguedinis gallinæ, medullæ uituli, buty-
ri recentis loti cum aqua uolarum, ana. ℥.i. s. olei uiolati,
olei amygdalarum dulcium, ana. ℥.i. ceræ albæ quantum suf-
ficat, & fiat unguentum molle pro pectore.

COMMENTA. MANLII.

Istud unguentū est illud quod generaliter utuntur: uerū
supra est posita una alia descriptio, quæ est ex auctoritate
Bartholo. Montag. sed non est idem: uerum quod hodierni au-
thores laudant etiam illam sed in usu non est tantum hæc
descriptio in partibus Mediolanensibus est multum in usu.

XCIII.

DE LAPACIO.

℞. Olei uiolati .℥.vi. ceræ uirginis .℥.ii. succi lapacii in aceto
infusi .℥.vi. ceruifæ lithargyri, ana. ℥.iii. & .℥.ii. camphoræ. ℥.
ii. misce, & fiat unguentum, & laetetur cum aqua solatri, &
optimum est.

COMMEN. MANLII.

Istud unguentum est in usu: maxime scdm istam descrip-
tionem: eius autem descriptionem non repperi ab auctori-
bus. uerum est quod Petrus Argillata in cap. de corrosionibus
capillorum laudat unguentum unum factum de succo lapa-
cii scriptum ab ipso, ut inquit: infra in cap. de tineæ: ego au-
tem uidi prædictum cap. totum, & prædictum unguentum
non repperi, uerumque est quod ipse in illo cap. describit duo un-
guenta, & in utroque illorum ingreditur succus lapacii, sed
non habeo certitudinem si sint de lapacio, aut non: lapa-
cium autem est rumex, quod apud omnes notum est.

XCIIII.

PRO STOMACHO.

℞. Masticeis. ℥.i. aloes. ℥.ii. garyophyllorum, cinnamomi, ca-
lami aro. ana. ℥.iiii. aquæ rosæ, & uini cytoniorum ana. ℥.iii.
olei mali. ℥.iii. ceræ quantum sufficit, & fiat unguentum,
quod est bonum & expertum.

COMMEN. MANLII.

In usu est.

XCV.

CITRINVM. usuale, quod in colorem
citrinum efficitur.

℞. Terebentinæ, olei communis ana. ℥.vi. rosæ pini. ℥.iiii. ce-
ræ citrinæ. ℥.iiii. s. gummi elemi. ℥.s. misce, & fiat unguentū
secundum artem.

XCVI.

AD SCABIE M, quod si plantæ pedum, et manum
ungantur, omnem scabiem delet.

℞. Olei laurini. ℥.iii. thuris albi, ceræ mundæ, ana. ℥.ii. argen-
ti uiui mortificati cum salina .℥.ii. pinguedinis porci mun-
di. ℥.v. falsi communis triti. ℥.viii. succi plantaginæ, & fumi
terreæ ad libitum omnia misceantur, & fiat unguentum, &
est mirabile.

XCVII.

MOLLITIVVM, quod utuntur Veneti.

℞. Mucilaginis althææ, mucilaginis foenugræci, mucillagi-
nis feminis lini ana. ℥.vi. lithargyri auri lib. ii. terebentinæ,
medullæ cruris uacæ an. vn. ii. ceræ. vn. iii. irosos pulueriza-
ti, olei feminis lini lib. ii. s. misce, & fiat unguentum in bona
forma.

Peroratio in .xiii. sectionem.

Vtilis tractatus de unguentis coadiuuante uniuersis orbis
conditor feliciter expletus est. Sequitur nunc tractatus
de emplastris super antidotarium domini Mesue ac aliorū
doctorum in sacra medicina scribentium.

LVMIN. MAIORIS,
SECTIO QVARTADECIMA.EMPLASTRA CONTINENS.
EX ANTID. MESVE.

I.

DIACHYLON, uulgo DIAQVILON magnum.



ECIPE lithargyrii mudi tri-
it et cribellati. ℥.xii. olei irini
i. de irosos, & camemellini, &
anethini an. vn. viii. mucilla-
ginis feminis lini, mucillagi-
nis foenugræci, & radicū al-
thææ, & mucilaginis ficum
pinguium, mucilaginis passu-
larum, & succi irosos, & succi
squillæ, & hyssopi humidæ, et
glutinis alchanach an. ℥. xiii. s.

terebenthinæ. un. iii. refinæ pini, & ceræ citrinæ ana. vn. ii. cō-
ficiantur hoc modo: lithargyrium & supra scripta olea diu
in mortario lapideo cum pistello ferreo conuassentur per spa-
tium mediæ horæ, deinde bulliant super ignem leuem cum
facilitate semper agitando cum spatula donec coaguletur
totum, tunc deponatur ab igne & dimittatur infrigidari: de
inde. ℞. mucilaginis ac alia & simul iterum bulliant donec
efficiantur eius forma dura deinde ab igne deponatur: & po-
natur super marmor, & fiat in magdaleonibus. inquit: Filius
Zachariæ, acquiritur eis decoctio ut descendat a molli-
tate, & accedat ad spissitudinem unguentorum, & liniatur
in panno, & superponitur ubi oportet.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum est in usu maxime, scdm istā descrip-
tionem. ipse autem Mes. intitulat hoc emplastrum diaquilon,
sed scdm Moder. opinionem debet dicere diachilon i. cōpo-
sicio facta ex mucillaginibus & succis, & propter hoc a mul-
tis dicitur cerotum de mucillaginibus sine gummis, & sic si
bene legis expositiones nostrorum doctorū uidebis quod
emplastrum diaquilon magnum, & cerotum de mucillagini-
bus, & unguentum diaquilon sine gummis idem sunt, & qui
non credit uideat in antido. Io. Sera. quod dicit unguentum
de mucillaginibus, & est diaquilon. idem dicit Gentilis sup
quintum can. Aui. Magister Petrus Argill. in cap. de scro-

fulis:ponit unguentū diaquilon,quod idem est.& ibi docet ipsum cōficere cum gūmis,de quo infra,supra est positū unguentum de mucillaginibus ex autoritate Bart.Montag. quod pōt fieri pro diaquilon sine gummis. Scias autē q. generaliter apothecarij maxime, apud nos faciunt emplastra in forma molli,& cerota in forma dura.de quo apothecaria Neapolitani admittunt,quia ipsi faciunt contrariū.nā emplastra faciunt in forma dura & cerota in forma molli. Leonar.de Preda pascia.in.ca.de ulceribus profundis ponit emplastrum diaphinicon descriptione Alexandris, sed dicitur emplastrum.i.dura confectio,eadem est opinio Nicolai.

Gluten alchanach.sive alchamach, siue alcanach quid sit generaliter ignoratur:vere nūq. uide nec audiui ab aliquo uidisse authorē autenticum de eo mentionem facere. uerū secundū consuetudinē apothecariorū est colla pisciū,quod non nego,nec affirmo.certe in partibus Romæ dictum fuit mihi q. in rei ueritate gluten alchanach est quidam uiscus qui reperitur in Arabia sup arborē affix fatidæ,tamē Deus scit.Magister Pet.Argil. qui sape & sepius utitur isto unguento quod ipse describit in ca.alle.& ibi loco glutinis alchanach ponit uiscū cū quo capiuntur aues, sed nos intelli gimus uiscū quercinū quod conuenit in isto casu,tamē ego nō affirmo quid sit, sed generaliter loco eius ponitur colla pisciū, sed interio nostrorū chirurgicorū uiscus quercinus et ualet. Si autem facere uolueris unguentū diaquilon seu emplastrū de mucillaginibus cū gūmis oportet facere, ut docet magister Pet.Argil.in ca.alle.ubi sic air.in fine descri ptionis dicens.conficiatur sicut ipse Mesue docet in antido tario.& sic cum istis addatur bellium,serapinum,armonia cum an.ā.ierit diaquilon gummatum siue cum gummis,tu uero scias si ponas supra unguentum diaquilon sine gum mis,aut cerorum de mucillaginibus sine gummis istas tres gummas quas nominauit,tū erit diaquilon cum gummis.

A P P E N D I X.

Medicamentum διαχυνδον,ex succis nempe, si Menecra te inuenit,hunc in modum Democrates(ut GALENVS vii.Medicamentorum per genera testatur)numeris trime tris non inelegerat cecinit.

D A M O C R A T E S.

Prefati igitur,quod tandem pacto uulnera. A phlegmone scura recte glutines. Potthac agemus quo modo cum phlegmone Colledit ipsa,curare queas commode. Cum mulculo la so,uel neruo quopiam Vel & propinqua quando osi membranula Puncta dicim post quartum continuus dolor. Ex phlegmone febresque cum symptomatis Quia ita nigiia,tum delirio,& tri At siccitae linguae,crescantque omnia. Et quotidie uergant magis ad deterius. Et loeculenta sanies tenuis,uulnera & Ruberant,propinqua item patiuntur corpora Erit tenses,phlegmonas,cedemata, Et uariis tunc ablitine cataplasmati Qui mos iuuenibus est facere,quo phlegmonum Status effugientes non den calumniis Occasionem,at arti qui fidit suæ. Lum timei e pariter cum ægrotantibus Oportet,haud expectantem uad uicerit Natura,nel fortuna quædam iauerit. Ego pares,quibus consilui affectibus Quod & podagricis medicamentum conuenit Aegris impositum,quo tu cupias tempore Spatio quidem promptam agilitatem corpori Erit igitur,ipsum nec cito permiserit Quibus,nec facile crebris angust insulubus. Melibos initio prohibet incrementum, Quod autem uigentes mos decrescere, Quod ad alia descendas facile medicamina. Et huc pharmaci in modum sit compositio. Lithargyri leuissimi chrytidis Sulfuris duas mulsens,quatuor axungiz.

Valde uetustæ,annosæ atque crassissimæ Et non olentis,nam nigra,non asperæ: Sic nanque sumet pharmacum efficaciam. Liqueat diligenter signa axungiz, Membranulas salemeque mox deponit In uas aliud ipsa percolans amplius: Adiectoque oleo,rursus coqua ferueat, Non omne pones oleum, sed partes duas, Tertia manebit in expedito condita, Si sit necessum iungere,ne ablit longius. Vteris omnino per hiemem,cum inditum Medicamini oleum crassum longo tempore Euaserit,lithargyrum & feruentibus Inpergit,leui igne & assiduo coquas Spatha mouens,quæ potior est expicea Cum coeperit mediocri coctum tempore Medicamen hoc emplastrū spissitudinem Nec non foetorem simili pacto pharmaci, Ab igne cacabum confestim deponito, Curans per æstatem pauxillo durius, Sed hieme molliusculum,non inquinaus tamen Moueto,quoad modice ita refixerit: Sic deinde rursus manibus durioribus Totum subactum, ex olla transferi iube Cum poscet usus,iterum ualide molles, Mollique pellicula diligenter illines Per magna superaccommodatam pleniam. Si quando hoc emplastrum efficaciam Desideres ad neruos crassos mulculos, Durasque mammæ, atque articulos insupe rimentes fieri,pondo radicem indito Agrestis maluz,puratum ac recentium Sectarum in partes digiti crassitudine Ac longitudine,in olla feruentibus. At cum madorem totum,& uires pharmacum Exigne de posuerit colo traice Maluz radiculam,leuem & lithargyron Inspersum coquito,ut dixit prius, reponito & Simi i modo rursus,eodemque utitor. Vriusque tenere istud uirtutes ait Inuentor Menecrates medicaminis Primus,uir equidem erga artem affectus optimi Etenim recentia feruat cirra phlegmonem Vulnera,eadem diuisa glutino Iungere,tum phlegmone obfessa ulcera Nimis,medicari & uulneratos mulculos Persuasit,sine quodam alio,quæ succurrere Possunt,cataplasmati,somentis,spongiis. At omnia,quæ facere confirmari prius Medicamen ex lithargyro,& axungia Facit,optimum uero pessum diutinis Recentibusque uteri inflammationibus Implere caua diluti rosaceo Vel myrteo bono,& cicatricem addere. Summatim omne cataplasma necnon pharmacum Extrinsecus quod ipsis super infunditur. Superfluum esse dicit isto utentibus. Profecto dignum scriptione est pharmacum Tam & fidem promittit inuidis. Hunc in modum ipsum preparari dicitat. Septem æstius olei libras,temporibus Indes,alias eius dimidium reperi Pinguis,recentis pariter & axungiz. Sed hieme,sicut tradit, conficies nouem. At sex leuissimi modo lithargyri, Foenigraci adhibet dimidium sextarii, Et seminis tantundem T combuti lini, Maluzque agrestis pondo statuebat tria Radicis,etiannim cui succus sit recens Coquere ex aquæ sextariis bis quatuor. Olla orificio amplo recenti fictili Maluz radix purgata,concisa itidem

Et tenuis, & confusa ut fuerit indita,
Mox adde foenigræci elutum probe
Liniq; semen, cum iam succum emiserint
Et spissitudinem habeant expressum linteo
Succum teneto libras implens quatuor,
Milecensq; oleum totum incoquito carbonibus.
Cum uero tenues bullulæ ex maioribus
Crebræq; in iis que cacabus tenet, emerferint,
Lichargyrium lzuem protrinns aspergit,
Igniq; non acris, sed assiduo coque
Dum succus una cum pingui fit torridus.
Medicamen appareat emplastrum melinum
Boni coloris, amolyntum, sed non nimis
Durum: uerustis hoc qui inuenit pharmacis.
Vocabat ipsum non absurde *δραχμυδον*.

A L I V D.

Er hoc eodem prodit genere pharmacum
Alis licet misturis ipsum præparet,
Affectibus quos retili, profusus benefacit.
Summatim omnibus, & crudis, & quæ coqui
Mutariq; facile nequeant, ingueant, ingentia
Et musculorum, & membranarum uulnera
Perfanat, ipsorum nam facile subuenit
Punctibus, arthriticis iniectum item omnibus
Inestato iam mitigabit diutino
Dolore. Sumit picis quam sicci sime
Libras duas, ceræq; totidem ponticæ
Puræ, terebenthinæ liquide libras duas
Mannæq; & thuris ueri unam pondi libram
At felibram, uel hac pauxillum minus
Albi, recentis, ualde pinguis butyri,
Reliqua liquato acri igne, & assiduo simul:
Vbi cernis digitos pharmacum non amplius
Inquinare, cacabum a flamma deponito,
Mannam liquatis inde sic aspergit
Mouens medicamentum ualde rudicula,
Sic refrigeratum, & mollium reponito,
Huic copiosum, tum recens rosaceum
Contemperans, ad caua, & carnis indiga
Adeo ulcera utere, tendonumq; phlegmonas,
Tum quæ non facile in pus mutantur candidum.

Et hæc Damocrates.

Quæ omnia quam breuissime Paulus lib. vii. cap. xvij. iis
uerbis perstrinxit.

Spumæ argenti lib. sex.

Olei { Estate } lib. x.
 { Hieme } lib. ix.

Foenigræci, sextarius dimidiatus.

Seminis lini, semisextarius.

Altheæ, lib. tres.

Althæam, jac femina in aquæ sextarij .xx. decoquito, donec
parum relinquantur ex ipso, inde succi libris quatuor ad
mixtis oleo decoque, tantisper dum bullæ desierint: deinde
leuissima argenti spuma imperfecta, igni clemente usque dum
manus non inquinet elixato.

II

DE GRANIS LAVRI.

R. Olibani, masticis, myrrhæ, an. 3. i. grano. lauri, 3. ii. cypre-
ris, cocti, an. 3. s. mellis colati, q. s. ad aggregandum & exten-
datur in panno, & calidum superponatur ubi oportet: fit aut
tripliciter cyperum, & de testore uaccarum aut caprarum
sicco ad podus omnium inuenitur mirabile ad hydropisim.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum est in usu, tamen non ualde. Petrus de
Crescen. inquit: Laurus est arbor fatismagna: cuius frondes
sunt late & longe, & folia semper uiridia & odorifera ual-
de, quæ arbor baccas facit quæ sunt fructus parui nigri quor-
um magnitudo est sicut auxellæ paræ super quas sunt
cornices nigri subtiles qui compressione franguntur in
duas partes, & ille sunt qui competunt medicinz.

APPENDIX.

Compõem *δραχμυδον* uel ex baccis Lauri malumus.

VI. Medicamentorum per genera, Emplastra, Græcis *δρα-
μυδον* atq; *επισπαστικα* uocitata, explicans: similiter etiã
VII. inter Malagmata Asclepiadis, nec nō lib. Medicamen-
torum per loca. I X. cap. I I. G A L E N U S non inepte,
quanquam ab hac Mefue longe diuerfat, offendit.

III.

DE GALLIA.

R. Galliz muscate, squamanti, an. 3. i. s. ramich, sumach, aca-
cia, hypocistidos, laudani, gallarū nō perforatarū, calami
aro. rolarum & seminis eius, quod anthera a multis moder-
nis dicit, sandalorū albo. & rub. masticis, xyloaloes, garyo.
spicæ nardi, olibani, myrrhæ, costi, cyperi, abanthij, an. 3. ii.
fiat eorum cōtritio bona: deinde accipe succi foliorū myrrhæ
humidæ, foliorū lauri, aquæ ros. & uini pontici an. 3. i. s. &
submerge in eis calefactis tortellarum de seni. 3. iij. dactylo-
rum siccōrū nume. xii. dimittatur per diem & noctē de-
inde terantur, & fiat sicut puluis, et misceatur cū mizæ aroma-
ticæ. i. cum spibus. 3. iij. aut. iij. gūmi afsi. gūmi ar. 3. vii. co
quantur omnia lento igne usq; ad spissitudinem mellis: de-
inde aggrega cum puluere rerum & tere diu in mortario,
donec fiat totum uiscosum: deinde lini ex eo super lamina
& suffumiga cum ligno aloes & epithimetur cum eo.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu: dixerunt aut q appellat-
tur emplastrū de gallia ppter troch. de gallia quos recipit.
Alii dixerunt q dicitur de gallia, quia in Gallia provincia
reperit fuit, & utuntur ipso Bartho. Monag. in suo antido.
habet unguentum de gallia muscata, quod in usu non est. Ra-
mich uero est quædam confectio facta ex uariis rebus et re-
ducta ad formam trochisci, apparuit supra.

Galla, galla asiana, gallarū aliz sunt perforatæ, aliz nō
sed non perforatæ sunt magis laudatæ in medicinis quam
perforatæ. Circainstans ait: Galla est fructus quercus: quæ
dā inueniunt grossa & leuis & perforata quæ modicū ualeat:
aliz reperiuntur in Asia & Africa: & dicuntur asianæ, quia
paruæ sunt, & non perforatæ: quæ uero inter eas inueniuntur
grossiores, meliores sunt.

Tortellæ de seni. i. panis afsi, siue panis biscotellus: eius
modū ostendat infra in cōfectione emplastri diaphanico.

Vinum ponticum. i. forte: nam ponticus est sapor dictus
fortis: potest etiam dici ponticum ab insula quadam sic no-
minata sed non est ad propositum.

IIII.

Relatum ad Andromachum.

R. Sepi arietini, picis, an. 3. xviii. gūmi pin. 3. viii. q ex Aui.
restituendū censemus, auripigmenti rubei & citrini aluminis
scis, calcis non extindæ an. 3. xv. armoniaci 3. ii. dissoluat-
ur armoniacum cum uino rubeo, & dissoluatur in igne, &
dissoluatur cum eo olei lib. ii. & puluerizanda puluerizen-
tur, & aggrega omnia simul fm decentem modum præpa-
rationis eius, & utere ubi oportet expansum in lamina.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu. Auripigmentum lati-
num nomen est ab aureo colore. Iliid. in cap. de coloribus
inquit: Arsenicum quod latini ob colorem auripigmentum
uocant, sine dubio auripigmentum & arsenicum eiusdem
sunt generis, sicut patet si legis cap. de arseni apud Dios.
in cap. de auripigmento apud Sera. uidebis q idem sunt: spe-
cies autem arsenici uel auripigmenti: fm Diosf. sunt duæ. Iru-
beum & citrinum: sed secundum Aui. sunt tres. I. alburni, ci-
trinum, & rubrum: de quo uide supra. Liber qui uocatur
Bulchalis in lib. i. docet modum comburendi & albifican-
di auripigmentum, & sublimandi ipsum, & comburendi &
uerendi citrinum in rubrum: & de sublimatione arsenici,
& de modo uertendi arsenicum citrinum in rubrum.

APPENDIX.

Idem. v. can. Aui. non inelegerat perferribi, uerum in sim-
plicibus, ac ponderibus non nihil euariat.

V.

SINAPINVM DEMOCRITI.

R. Ficuum siccarum pinguium partem unam, et infuso in
aqua tepida per diem et noctē, tunc exprime fortiter utri-

lus humor in eis remageat : deinde sinapi tritam cum aceto cum eis misceas diligenter diu cōmiscēdo, et sit sinapis pars una, & sicū pars alia, si uehemētioris uirtutis facere uolueris pone de sinapi partes duas: si aut minus ex sicubus partes tres, & ex sinapi partem unam. qñ autem applicatur loco dimittitur in eo, & auferatur anteq̃ uulneretur locus, & proprie qñ solum calefacere oportet, & qñ dimittitur do nec uulneretur, & proprie qñ profundam materiem ex clusioe quæris sicut in talibus: in defectu uero sinapis squibale caprine ponantur pridie in aceto iussu, & est ad hydropisim & duritiem & dolorem sphenis efficac. & qñ; ad dicitur in eis simus columbarum agrestium, & radix enulæ, & semen nasturtii, & grana lauri, & confert ad frigidas & uentosas ægri tudines uiscerum & splenis & hydropisim & similia, & est expertum ab antiquis medicis.

COMMENTA. MANLI.

Istud emplastrum apud nos non est multum in usu. D. Rasis in lib. Diu. in ca. de sciatica & dolore iuncturæ anchæ, habet etiam hoc emplastrum. Synapis autem semen est satis notū. Columella in lib. de cultu hororum inquit. Seq̃ lacefenti sterū fractura synapis. hæc apud Arabes cardedel dicit. Serap. autem in ca. de synapi ex autoritate Dioscor. inquit: Elige dum est illud quod non est sicum nimis neq̃ extenuatum habens granum grossum, et qñ frangitur est alium interius & est humidum, nam istud tale uouem est bonum.

Squibale caprinæ apud auctores non inuenitur cap. sub hoc uo mine, sed squibale apud græcos stercora sunt. unde per squibales caprinas intelliguntur stercora caprarum, & sub isto uocabulo Aui. & alii de eis loquuntur.

Colubi agrestes fm multorum sententiam sunt columbi quos rustici fauacios dicunt, quorū ortus sunt in arboribus. D. Rasis in lib. aphori. inquit: Alchenebir. i. columbæ syluestres. Extinuerūt quidam quod columbus syluestris sit ille qui apud Aui. can. dicitur guarefene: sed non est certum.

APPENDIX.

SINAPISMI præparatio ab Aegineta li. vii. cap. xix. ad uerbum sic perpulchre explicatur.

Ficus aridæ pridie aqua tepida irrigandæ sunt. Postero die præualidæ exprimendo sirenue leuigandæ, deinde acre sinapi, cuiusmodi Syriacum, & Aegyptium est priuatim com terendum, affuso illarum diluto, & massa cōfecta miscēdū. Siquidem uiolentius uoluerimus exulcerare, duas partes si napsi cum una sicuum temperabimus: si uero mitius, e contrario, sin mediocriter, æquis partibus utraq̃ confundemus. cæteri sinapi ante contritionem aceto dilutum, quemadmodum aliqui faciūt, inefficacius redditur. Atqui a sinapis purgatione, & lauacri usu, si dolor intensus, ruborue locus suffunditur, & pustulæ oboriuntur, linctum succo malux, aut focnugræci cum rosaceo irriguū applicemus, deinde rosaceo cerato addita cerussa utemur. In dissolutis uero in quibus sensus oblatūs est multū diu; aduertere oportet animum, detegendo, & speculando subinde partē, non sentientes & enim, sæpenumero supra modum miscere exultisunt, & caprarum bacca cum aceto cataplasmaticis instilar illitæ efficaciores quā sinapi sūt, potissimū in his q̃ laborat Coxedice.

VI.

DIAPHOENICON Alexandri.

*. Dactylorum uicinorum maturitati sine obisus. j. v. tor tellarum de seni. j. i. cytioniorum & proprie carniū eorū decoctorū in uino styptico. i. forti. j. i. s. i. toracis, calamitæ, masticis, laudani an. j. iiii. acaciæ, succi agrestis, florum uua rum agrestium, rosarum, sandalorum citrinorum, marchasitæ, ramich, myrrhæ, aloes an. j. iiii. ceræ. j. iiii. olei ro. j. xv. uini potissimum quantum sufficit ad infundendum infundenda: & confice ipsam secundum artem, & lini ex eo super laminam, & cum xyloalo & suffumiga & superpone.

COMMENTA. MANLI.

Istud emplastrum est multum in usu, maxime scdm istam descriptionem quæ est de mente Alexandri. ipse uero Me sue describit unam aliam descriptionem, sed non est tantæ utilitatis ut est ista, tamen infra apparebit.

Tortellæ de seni. i. panis assus. & ab aliquibus uocatur

panis azimus, & ab aliis biscotellus, & eius modus est multiplex scdm diuersa loca. nam scdm quosdam est panis biscotus factus de flore farinæ, de illa cōtrata uel de illa regione quæ dicitur Seni. Io. Mat. Gradi. in cap. de fluxu uentris in generali inquit: Huic quoq̃ addatur panis biscotus de Syria. sup. qñ intendimus facere cōfectionē ad modū emplastri ad magis incorporandū. nam talis panis sic biscotus infundit in uino uel aceto: & cū pulueribus facta expressio ne reductur ad formā emplastri, & talis panis biscotus ap pellatur tortellæ de seni. & a Mes. ponitur in emplastro dia phoeniconis, siue dubio tortellæ de seni in emplastro dia phoen. intrat, sed eius modus non est, ut docet Io. Mat. Gra di, & ignoratur quid sit Guli. Placen. in troc. de uiperis docet modū faciendi, ut ostensum fuit ibidem: tamē melius in fra iterum ostendam Mat. autem Syl. inquit: Pafsime. i. tor telle panis azimi biscotus de seni. i. de terra Hierusalē: qñ ibi Arabes impastant eas cum aqua decoctionis masticis, passularum, uerum sunt ex hoibus qui solum impastant cum aqua decoctionis masticis: sed non recte. nam hodierni maxime sapiētes impastāt ut dixi. & eius modus est q̃ accipiat ur farinæ frumenti purgatæ a fursure quantitas q̃ uolueris, & impastetur ea cum aqua decoctionis masticis & passu larum quātum oportet. & fiat ex eis panis in forma panis qui manducatur, & decoque in furno tantum qñ in colore efficiatur niger, & quod facilius teratur, & posita utere ubi oportet. Isti. panis azimus est panis non fermentatus. nam azimus est sine fermento funderis acrimus, leuiter fermentatus, quasi acrozimus. Flores uua agrestis sunt flores lambrusæ, & hæc est quam Dioscor. ananthium uocat. Mat. Syl. in ca. de anantio inquit: Ex autoritate Dioscor. ananthium flos est uitis agrestis, quæ cum secerit flores colligendi sunt: & deffecandi: & alio nomine uocatur uitis, flores eius optime redolent, & sicantur in umbra, & in testa reponendi sunt melius nascitur in Syria. idū in litera. i. ait: Inanitum. i. flos lăbrusæ: & est flos uitis agrestis. idē dicit in litera masticis.

Marchasita est lapis qui ab aliquibus uocatur luminaris, eo q̃ percussus ferro ignem emittit, dominus Mesue in ca. de lapide stellato de ipso loquit, & hic est lapis qui a Dioscor. uocatur lapis pyrites, & dicitur a pyr quod est ignis: quia percussus ferro ignem emittit.

VII.

DIAPHOENICON, confortatiuum stomachi.

Prius fiat cerotū cū ceræ. j. ii. olei rosæ. olei nardini an. j. iiii. deinde. dactylorū siccorū n. xl. tortellarum de seni. i. panis uiti. j. v. deinde fluidum biduo in uino odorifero, & accipe carniū cytioniorū decoctorum in uino. j. viii. & tere cū dactylis cōtritione ultima, & misceantur cum ceroto, & cōtundatur in mortario donec aggregentur, deinde picee lă per ea masticis, olibani, abanthii, Romani sicci an. j. ii. s. i. ligni aloes mactis, myrrhæ, aloes, spicæ, acaciæ, * galliæ, ramich, calami aro. an. j. i. laudani. j. ii. & iterū conterant donec pmsceantur, deinde lini sup lamina ex eo, & suffumiga cū xyloalo, & pone super stomachum & hepar & uiscera. de meliori autem operatione est ut mastic, & laudanum cū cera & oleis misceantur, & sic cum cæteris emplastrū fiat.

COMMENT. MANLI.

Istud emplastrum est in usu: sed non tantū ut prædictum, quod dicitur esse ex descriptione Alexandri: dicitur autē emplastrum diaphoenicon. i. de dactylis. species autem dactylorum fm modernorum opinionem duæ sunt. i. domesticis & syluestres, domesticis autem sunt fructus ex palmis domesticis, & isti sunt noti, syluestres uero sunt dactyli dicti acerofis, & isti sunt tamarindis, ut allegat dominus Mesue in ca. de tamarindis. eius arbor a multis aliori uocatur, unde Io. Serap. in cap. de debilitate hepatis inquit. oleum de calcala. i. oleum de floribus dactylorum.

APPENDIX.

Emplastrum δὲ δακτύλων ἑκατέρωθεν ἁλῆν, ab his maxime diuersum in unguentis numero. i. abunde scripsimus.

VIII.

Fili Zachariæ.

℞. Ceræ citrinæ. j. iiii. medullæ cruris uaccæ, adipis gallinæ, mucilaginis

μucillaginis, semi. lili. an. 3. iiii. olei de lino. q. lxi. autem fortius facere volueris adde mucillaginis altheæ, & mucillaginis fœnugreci partes conuenientes, & pro oleo de lino ponatur oleū de cheiri citrina. i. de uiola citrina vel utrunq; & si adhuc fortius facere volueris adde hyssopi humide, & glutinis danaham quantum de una mucillaginum, & miraberis effectum ad ea quæ diximus.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum apud medicos Papienses nō est multū in usu. immo est in usu apud medicos Mediola. quia in ipso inuenitur virtus mirabilis. nā lenit duritiē nodositatē & iuncturatur, & multa alia operatur. Gluten autem danahā vel zanach. de ipso uide in apud diachylon supra.

VIII.

DE ALLIIS, Alexandri.

μ. Spicarū alii mundatarū. 3. iiii. s. storacis, aloes boni, bdellii an. 3. iiii. terebinthinæ. 3. iiii. axungię porcine rectis, adipis anseris an. 3. v. masticis, oliba. an. 3. i. s. euphorbii. 3. i. croci. 3. s. ceræ citrinæ. 3. xii. olei nardini. i. s. spica nardi, & vii. odoriferi. an. quantum sufficit.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu Allium autem dicitur quod oleat, maxime allium domesticū, & est illud quod intelligitur, quando simpliciter ponitur, & est aliud allium quod agreste uocatur, & istud appellatur scordeon seu tyriaca rusticorum. Sera. in cap. de alio ex autoritate Dioscorici. inquit allium aliud est domesticum & aliud agreste, & est quoddam ex eo quod inuenitur in Babylonia quod non est diuisum in dentibus &c. Columella in libro de cultu hortorum inquit: Alia quæ in fractis spicis & olentia &c.

IX.

RELATVM ad Aristarchum.

μ. Ceræ citrinæ. 3. i. terebinthinæ. 3. vi. axungię porcine rectis, adipis anseris, medullæ curis vaccæ ana. 3. iiii. bdellii myrrhæ, oliban, storacis, opopana. aloes, masticis ana. 3. i. s. armoniaci. 3. iiii. colophoniz. 3. vii. aluminis quod a uulgo de pluma uocatur. 3. i. spicæ. 3. vi. folii, calami. aro. euphorbii granorū lauri. an. 3. vii. olei balsami lib. i. olei nardini & vii. ni odoriferi. q. lxi. confice sicut sepe narrauimus & utere.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum apud medicos Papienses non est multum in usu, sed apud medicos Mediolanenses magis.

X.

DE MELLILOTO.

μ. Melliloti. 3. vi. florū camemil. fœnugr. granorū lauri, radicū altheæ, absinthij an. 3. iiii. semi. apii, cordermeni, ieros cypeti, ameos, anisi. i. semi. fœniculi romani, spicæ, calsæ an. 3. i. s. sampfuchi. 3. iiii. ammoniaci. 3. x. flora. bdellij. an. 3. v. terebinthinæ. 3. i. s. siccum pinguium numero. xii. sepi caprini, resinæ an. 3. i. s. ceræ. 3. vi. olei sampfuchi, & olei de spica. q. laque decoctionis fœnugreci, & camemillæ & melliloti. q. laad infundendum, infusione diligenti misceantur & conficiantur, & epithimetur cum eo.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum est in usu apud oēs maxime in ista descriptione. quia inuenitur in ipso mirabilē iuuamentum ad oēm duritiem quæ est in stomacho & ad multa alia. Hæret Montagen in suis consiliis in consilio de indigestione habet hanc descriptionē, sed non est oīno similis nec usualis Ioan. Concore. in cap. de spasma & thetano & cūzē ponit emplastrum etiā mollium competens, & est emplastrum de melloto. ponitur a Melse in suo antid. & sic ista descriptio Melse est nobilior aliis. Mellilotū autē nomen compositum a melli & lotos quod est tritolium. unde mellilotū inter species trifolij enumeratur, quod semelā campanā uocant, eo q. fertō antiqui coronabantur, & propter id uocatur etiam corona regia. Sera. in cap. de melloto ex autoritate Isaac ben amram inquit. Elchilemelich est herba quæ habet folia rotunda inquit de ramuli eius sunt subtiles mulrū: & tollit rura & fructus habens vaginas subtiles rotundas sicut virgē puerorū parvulorum, & sunt in eis grana pauca glauci coloris rotunda maiora granis synapis, & quod de

ipfa administratur sunt illæ uaginæ, cū eo quod est in eis ex granis, miror q. hodierni generaliter ista herba nō utuntur nisi floribus & non feminibus ut uult Isaac, & c. Auerr. in 5. collat. ait: Alchel lacmelec. i. mellilotū, vel corona regia. Circinsitans ait: Mellilorum herba est cuius semen simili nomen appellatur corona regia, femina cū ipsi cornibus colliguntur: per quatuor annos seruat, semen cū cortice in medicinis ponitur. ob quod miror vt dictū fuit quia apothecarij id nō faciunt, hæc autē herba apud nos in ciuitatibus inuenitur cum flore croceo boni odoris ut est notum.

Cordermeni. i. carui agreste, & alio nomine a Romanis charda uocatur sed apud nos cheibim campestre dicitur.

Sampfucus fm Diosc. a Siculis amaracus nominatur herba est ramosa: multas uirgas super terram spansas habens cum folijs paruis & rotundis non dissimilibus nept. i. calamanto montano: & hæc est herba quæ a nobis maiora nā uocatur quæ nota est.

APPENDIX.

Malagma δὲ μελιλωτοῦ Ἀσκληπιάδου, Hieraticon inscriptū, necnon paulo inferius Andromachi. viii. Medicamentorū κατὰ τὸ τοῦτο, ca. 5. apud Galenum, a Melse emplastro longe diuersum legitur. Aegineta insuper ex Melliloto Malagma lib. 7. cap. 17. haud quaquam omittit. Quorum compositiones de industria flectim inuoluere placuit, cum satis du xerim hæc indicasse.

XI.

Mistura ad uulnera.

μ. Gariophyllata, radicum artemisæ, pimpinellæ, camemillæ, pentaphyllonis, uiolarum, herbe uenti, calulis rubei, canapis renatæ, omnium ana. M. i. rubeæ quantum de omnibus. hæc omnia bulliant in uino vsque ad medietatem: postea cola & colaturæ adde tertiam partem mellis, & cum eo bulliat: deinde cola & usui reserua.

COMMENTA. MANLII.

Gariophyllata herba est similis agrimonie: cuius radix odorem gariophyllorum refert. hæc apud nos luxta fossos inuenitur, & a multis sanamunda uocatur, & apud herbarios dicitur pes leporinus, quod falsum est.

Herba uenti. i. herba uenti maior quæ parietaria uocatur minor autem uocatur consolida minor, ut dictum fuit supra in unguento martiano. Parietaria autem apud Auic. in 2. can. uocatur herba utri, sed apud Dioscor. uocatur helixine aut parthenion quod falsum est, quia parthenion apud ipsam est herba quæ a modernis uchen uocatur: & apud Serap. matricaria, & sic si legis cap. de parthenion apud Dioscor. cum de matricaria apud Ser. uidebis quod idem est. ergo parthenion non est parietaria. hæc parietaria apud nos nascitur in rectis, & uocant eam rustici ueragium.

Caulis rubei fœncæ caules sic nominati, qui eorum color rubeus est: in hortis inueniuntur: quorum folia & stipites rubrorum habent colore.

Canapis renata. i. syluestris, & fm quosdam iste textus est corruptus: quia debet dicere canapis syluestris aut summities canapis: Dinos aut Florent. in suo antidot. habet eandem mixturam: & loco eius habet summities canapis.

Rubea. rubea tinctorum: de qua diximus supra.

EX NICOLAO.

XII.

APOSTOLICON.

μ. Lithargyrii. 3. vi. ceræ ru. colophoniz. an. 3. ii. ppolei, visci querciniani. an. 3. i. armoniaci, lapidis calamina. an. 3. vi. masticis oliban. mūmiz. an. 3. i. terebinthinæ, galbani, bdellii, myrrhæ, chalucæ camemini, sarcocollæ, lepidis calcis, diprami, aristol. lon. prasij viridis, opopanax. an. 3. iiii. con sicut sic, galbani, armoniaci, & opopanax aliquantulū conusa ponantur in uino una nocte, ita ut bene cooperiantur & mane bulliant donec liqueant, & per captium coletur, & iterū bulliant ad consumptionem vini, deinde lithargyriū in subtilissimū puluerem redactū cū sufficiens oleo in caldario dissemperetur, & super ignem mittatur, & cum spatula agitando tandū bulliat donec superpositum lapidi in modum ceræ inspissetur, & statim addatur cerā, qua

* alias, 3.
xviii.
† al. 3. vi.
* al. 3. iiii.
† al. 3. i.
* al. 3. i.
† al. 3. i.

liquefacta addat colophoniz: postea addat mastix, olibanis, & myrrha, & facto interuallo ponat bellidum, & uiscus quer- cinis, liquefacto uisco ponatur terebinthina, ea liquefacta ponatur caldarium in terra, & tunc gummi in ipso caldario paulatim ponantur, iterum super ignem ponantur & cum spatula agitando aliquantulum dimittant bullire: postea addatur sarcocolla, deinde lapis calaminaris, facta interual- lo ponatur flos æris & lepidus calcis, post hæc chalcuceau. me non semper cum spatula agitando, donec aliquantulum rubere inceperit, ad altum distipatum & aristolochia ro- tunda: deinde infundantur in aqua frigida, & ab aqua abstra- ctum manibus exprinendo & malaxando ita tractetur ut to- ta aqua inde exeat, & in istis manibus oleo laurino magda- leones informantur, & usui referuntur.

COMMEN. MANLII.

Emplastrum dicitur dura confectio. (Apostolicon. i. supra positi uel supra missum interpretatur. Gilib. de Ang. in ca. de vulneribus in partibus interioribus habet unam aliam descriptionem quæ eadem est: hoc emplastrum est fauus sue cera. Gilib. ibidem dicit, quæ propolis est cera alba: sed hoc non approbat, sapientibus: nam propolis est fordici- cæ alueariorum apum quæ uocatur mum; quod patet per Dioscori. de cera propolei singulare facit ca. & inquit quod utilis est rufa, & odorata sicut storax, & mollis non ualde: quam manibus si uolueris duces ut storacem. hæc uidetur es- se cera quæ apud Au. in. 2. can. uocatur mum, ubi sic inquit, quæ mum purum est paries domorum apum: in quibus faciunt eam & pullos, & adducunt eis mel, & mum quidem nigrum: est fordes fenestrarum intrinsecarum & forinsecarum. Aue- in. 5. col. ait: Alumen. i. cera citrina. Sax. in cap. de cera, de ipso mum loquit, & inquit ex authoritate Dioscori mum est supposita & fordes quæ apes prociunt extra domicilia sua, & reperitur in alueariis, & melius mum est illud quod est ru- beus coloris, odoris boni simile storaci: non dæ substantiæ: sed pot. malaxari sicut storax. hæc est fordes uasorum apum inuenitur in orificiis alueariorum ipsarum apum: & hanc uidi- ponere in dicto emplastro non inueniuntur: nam empla- strum ex ea redditur attractum, ut uult Compofitor.

Viscus querquins lachrymum est arboris lenis, & uiridis coloris, intus obusum & nihil asperum habens, supra de ip- so melius ostensum fuit in unguento querquino.

Lapis calaminaris fm Compofitorem est lapis magnæ. Gilbertus ibidem dicit: Lapidis calaminaris, i. calamitæ quæ apud modernos ignoratur communiter, quia lapis calami- naris non est lapis calamitæ, i. magnes: immo lapis calamina- ris est lapis qui a uulgo calamina dicitur, quo tingerit æs: in antidotario uero in ueneris in eodem emplastro est posi- tum quo i. lapis calaminaris, lapis uero calamitæ est lapis qui attrahit ferrum, secundum intentionem. Simonis Ianuæ: sis lapis calaminaris est species thutiz, sicut apparet in cap- de cadmia: & apud nos est notum quæ lapis calaminaris, & la- pis calamitæ idem non sunt.

Chalcucechaumenon. i. æs viti. Gilib. ibidem dicit. Cal- cecumenon. i. æris viti. Dio. in ca. de ære viti dicitur alii cal- cucechaumenon vocant, & sic est.

Lapidus calcis uel lapidos calcis. i. squama æris inuenit- aur in aliquibus descriptionibus istius emplastri scripsum la- pis calcis, sed debet dicere lapidos calcis, quia Gilib. ibide dicit Lepidos calcis. i. barrituræ æris. Diosc. in ca. de lepidi- dicit bona est quæ ex acutis ciprinis fit, quæ & patia dicitur aut elitis nuxa quæ ex tenero æramine fit. hæc apud arabes tu- bel uocatur, seu squama, seu barrituræ æris, seu cuiusq. me- talli: Circumstans dicit: Ferri ferrugo & squama ferri eiusde- fuit uirtus, idem dicit Math. Syl. in aliud est ærugo, aliud ferrugo, & aliud squama uel scolia. nam squama uel sco- ria est illud latu uel tenue quod exolet percussione a ferro fer- rugo est quæ per excoriationem liquefit a ferro, alia uide ibi.

Præsijs uiride fm Compofitorem est flos æris, præsijs autem album est marubium, flos aut æris apud multos est uiride æris, sed fm Simonem Ianuæ. aliud est uiride æris, aliud est flos æris, uerū hodie pro flos æris uiride æris, po-

nicur. inuenitur autem in antido. Io. Sera. unguentum di zi- niar. i. uiri de æris. Auic. in. 5. can. habet unguentum de flore æris, quod idem est. ergo flos æris & uiride æris idem sunt. ut ostensum fuit supra. uerum est quod Sera. in lib. de aggrega- tione simplicium facit ca. de ziniar. i. ærugine æris, flos uiri de æris: & aliud ca. facit de ære, & quæ ex eo fiunt. Et ibi do- cet modum faciendi florem æris, & inquit flos æris fit secun- dum hunc modum: quando liquefit æs in botis metallorum & extrahitur a climia & est in botis aliquantulum tere incé- se de subitus in fundo & æs purificatum dimittitur currere in loco ubi colatur. tunc purificatores eius proiciunt super ipsum aquam dulcē donec coaguletur: & faciūt hoc donec infigitur, & est aqua clara: ex hoc ergo quod accidit æri ex aggregatione partium adinuicem fit hæc substantia, & est flos æris. alia uide ibi.

XIII.

OXYCROCEVM.

Be. Croci, picis nautalis, colophoniz, cere* an. 3. iiii. terebin- thinz, galbani, armoniaci, myrrhæ, olibanis, mastix. an. 5. j. & 3. iiii. aceti phialam, Nic. habet, fiat aut hoc modum galbanum & armoniacum contusa in sufficienti aceto ponantur per no- stem, & mane ponantur ad ignē usq. ad liquefactionē & li- quefacta colentur per catiam parua, & coquantur iterum ut aliquantulum cōsumetur. tunc addatur pix nautalis bene co- lata. liquefacta pice adde cerā, & ea liquefacta addatur colo- phonia & terebinthina: interuallo facto ponatur mastix, oli- banū, & myrrha, & semper cum spatula agitando, ad altum cum fuerit bene coctum in aqua frigida infundantur, & ab aqua extracta manibus exprimantur ut aqua inde exeat & super marmor iunctum oleo laurino cum puluere croci su- pposito malaxetur, & factis magdaleonibus usui recondat.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum est in usu, & maxime fm istā descriptio- nem. dicitur aut oxyroceum ab oxy quod est acetum, & croce- um a croco dicitur, nalet proprie ad fracturā ossium & ad dolorem eorum & ad multa alia. Gilib. de Anglia in ca. de vulneribus in partibus interioribus habet unā aliam descri- ptionem quæ idem est. Barth. Monrag. in suo antido. habet unam aliam: sed non est similis huic nec in usu est. crocus autem quod intelligitur est crocus orientalis seu communis, qui a uulgo zaffran dicitur. Papias ait: Crocus dicitur ab oppi- do Ciliciz quod uocatur coricum.

EX RASI.

XIII.

DE CASEO, in lib. de aggritudinibus iuncturarum ca. de cura propria lapideitatis.

Be. Caseū antiquo longi rps, & naturū & pulueriza simul postea accipe pedes porci antiqui salis & coqs, & cum illa aqua accipe naturū, & misce calcū & fac emplastrū super iuncturas lapideas, & rumpeatur cutis & exhibit uenrositas omnis, & sic patiens sanabitur, & expertus sum illud sepe.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu. Caseus fm Au. in. 2. can. quæ ex ferro, & est ille qui notatur recto cā natura, recēs ue- ro est frigidus & humidus in tertio, & salicus antiquus est calidus & siccus in eo. Istid. in ca. de eis ait: Caseus uocat, quæ caret ferro quasi carenum.

EX AVICENNA.

XV.

MIRABILE, Andromachi. in 5. can.

Be. Granorū quæ inueniuntur in fructu plantæ quæ dicitur amelli- baurach rubei i. salis rubei, salis armoniaci, aristol. cretice, & radicis cucumeris afinini, & gummi albotin omnium an. aur. xx. piperis, macropiperis, armonia. amomi, xylobalba- mi an. au. x. rhuris masculi, myrr. refinæ ficæ, albadab frigide an. aur. x. lactis arboris mori aur. x. ceræ, au. xxx. & adipis capræ aur. xv. amurcæ olei de lilio. q. ad conficiendum me- dicinam. terat ut medicinz ficæ & fricentur etiam & inun- gat qui fricatur eas manus suas, ex amurca olei de lilio. ut cū permixta fuerint omnia bene reponant & referuent, & cū necesse fuerit uti eo ad auferendā laxitudinem, tunc sumat de eo 5. iiii. & adipis anatis 3. iiii. & olei de alcanna. 3. iiii. & permisceatur

Permisceantur & administrentur.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu, huic Auic. dicit.

R. Granorū quæ inueniuntur in fructu plātæ quæ dicitur au melifid. non dicit quæ planta sit. uerū ipse in. 2. can. de ea capitulū facit dicens. q̄ ameli est oleū dulce ualde spissum sicut mel, & spissius eo extrahitur ex crure arboris q̄ est in terra Nurciz dulcis, & fit ex eo oleum, & cū eo admiscetur etiā oleū de flore eius, & nominatur amel & oleū mellis, & melius ex eo est quod est magis clarū & spissum, & antiquius & c. neq; per id cognoui quid sit. Ibi. inquit. oleumella nascitur in Palmaria Syrie ciuitate ex eo ita appellata, q̄ ex tunc oleum defuit in crassitudine mellis saporis suauis.

Aldabach siue dabach est uiscus quercinus: sicut apparet apud Sera. in ca. de visco. Idē dicit Au. in suis synonymis.

Amurca olei de lilio. i. fex olei de lilio Dios. inquit Amurca fex est olei nigra & aquosa cū præmitur: quæ coqui solet ad mellis spissitudinem, & sic uetustatem accipit. Leon. de preda palea in ca. de cura ferofularum inquit: Amurca olei antiqui. i. fex olei. Itē Io. Angli. in ca. de paralytici dicit: Fex olei oliuarum quæ uocatur amurca. Serap. in cap. de oliuiis dicit: amurca olei quando coquitur in uase raris crabruci quousque ingroffetur, & fiat sicut mel.

Oleum de alcanna. i. oleum de cyprino: unde oleum de al cana. i. oleum cyprinum: & modus eius infra apparebit.

XVI.

AVREVM, in 4. fen. 4. cap. de curatione eorum quæ sunt difficilis consolidatiois.

R. Merdasengi auri boni, eminat vnā, ceræ, & radices almezereon an. aur. xxxvi. floris xris. aur. xviii. limaturæ auri tritæ, limaturæ almerdasengi, an. aur. xl. olei antiqui lib. iiii. ponantur super ipsam in primis merdasengi, & aurū, & flos xris: deinde reliquæ medicinz, & iterū summum olstracum furnorū, & cinis uenarum, & plumbum cōbitum ablutum, & fiat ex eis emplastrum cum oleo myrtino, & oportet. vt. fit illud oleum in spissum cum merdasengi. v. g. j. i. & aceti acuti, in triplo ipsius, & ex oleo, aut oleo myrtino, aut oleo anethi. j. i. moueantur cum facilitate donec resoluatur merdasengi, & in spissum, & nō adurāt & acuerūt de eis cortices xris, & flos xris, & calx abluta sine exsiccatione fiat ex eis puluis, & antecedit, & liniat ea cū melle deinde puluerizetur super hunc puluerem contritum xris partes. ii. ceræ x. diffusum digitis in sole, & administretur. aut cerussæ & aluminis an. partes. viii. corticum xris. salis gēnz, thuris floris xris, corticū granatorū oīum an. partes. ii. calcis partem. i. ceræ partē. x. olei myrtini. q. f. & iterum merdasengi olei an. lib. i. gallarum non perforatarum, aristolochiæ an. j. i. armoniaci. j. i. minuti thuris. j. ii. fiat ex eis linimentum super ignem, & moueatur cum radice canna.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu: dicitur autē emplastrum aurū ab auro, eo q̄ limatur auri ingreditur: nō dicitur autē lithargyrio, auri, vt quidā crediderunt: aurum autē inter metallā est positū. Plī. ait: Auro effuso in est argentum vario pondere alibi dena, alibi octaua parte, in uo tamen galliæ metallo quod uocant albucrense tricesima sexta porcio inuenitur: ubique vnā argenti portio est: electrum uocatur & c. electrum etiam uocatur succinum. i. chabacbe. Circainstans autē aurū temperatius est aliis metallis, aurum de uena terræ fit per decoctionem: & in decoctione id quod superfluum est ab auro separatur, & cathimia seu spuma auri uocatur. Sera. in cap. de auro inquit. Limatura auri confert cardiacæ melancholicæ. infra ait: & dixerunt antiqui, quando accipitur anulus aureus aut argenteus, & ponitur in igne, & cauterizantur cum eo alæ columbarum veniunt cito, & libenter ad turrim suam, & non separantur ab ea.

Merdasengi aureum. i. lithargyrium aureum: nam merdasengi apud Auer. in 5. col. est lithargyrium: idem dicit Io. Angli. in ca. de ulceribus & uulueribus nā inde merdasengi aureum. i. lithargyrium aureum, infra in isto emplastro habet merdasengi: credo q̄ sit lithargyrium argenti.

Almezereon. i. mezereon.

EX ANTID. BART. MONTAGN.

XVII.

DE VIOLIS.

R. Violarum siccarum. 3. vi. rosarum. 3. ii. s. spicæ, masticis an. 3. i. florum camemillæ. i. bebonigii, melliloti. i. coronæ regie farinz hordei, & seminis altheæ an. 3. x. farinz feminis lini. vn. i. squinanti, cyperi, calami aro. an. 3. i. fiat emplastrum cum aqua communi quod applicetur omni die semel.

XVIII.

DE EUPATORIO.

R. Eupatorii. M. ii. camemillæ, melliloti, an. M. s. cyperi, masticis, squinanti, spicæ an. 3. i. sandali albi & rubei, calami aromatici, abinthii an. 3. ii. spodii. 3. i. mucillaginis farinz vnc. iii. olei de masticæ, de spica, farinz hordei, an. vnc. ii. aceti parum & fiat emplastrum cum decoctione eupatorii.

COMMENTA. MANLII.

Istud emplastrum non est in usu. Eupatorium autē est herba quæ apud Arabes gasti uocatur, secundum uero Circainstans eupatorium est salua agrestis, quod non est, ut ostensum fuit supra in confectioe de eupatorio.

XIX.

VSSALE PRO CREPATIS.

R. Picis naualis. i. uualis. vn. iiii. lithargyrii, armoniaci, galbani, masticis ana. vnc. ii. ceræ albæ & rubæ, colophonizæ, aloes, aristolochiæ longæ & rotundæ, an. vnc. iiii. uicis querci ni, boli ar. an. vnc. vi. gyphi, myrrhæ, thuris an. vnc. s. glutinis albotin loti cū aceto vnc. iii. lumbricorū terrestrū. vnc. iiii. radices cōfoliæ maioris & minoris, an. j. s. mumizæ, sanguinis draconis, bdellii, an. vnc. i. pellis arietinæ a pilis mudatæ & frustatim incisæ partē vnā, sanguinis humani lib. i. & cōstituitur sic: bulliat pellis in aqua quousq; sit liquefacta: postea supra addantur prædictæ glutinis scriptorum glutinis capri ni, glutinis piscium an. vn. ii. bene incorporentur omnia & ceteris gummis liquefactis simul & pulueribus additis fiat emplastrum & malaxetur cum oleo myrtino & fiant magda leones, & ponantur in uase terreo vel æreo, & uali seruentur, & cum opo fuerit super corio extendantur.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum fm intentionem Cōpositoris est usuale pro crepatis: & est illud quo utimur uerum supra est post tum cerotum ad crepatos cum pelle arietina: & secundum illam descriptionē a multis fidei quia etiam illa descriptio est laudata in illa materia camfrisci, & fac illam descriptio nem quæ tibi placet, quoniam ambe sunt optime.

Gluten scriptorum secundum multos est cola quæ uocatur taurocolla, quæ fit de coriis: sed Nico. Filo. in li. 7. in ca. de curatione herniæ siue ramici inquit: Addatur glutē carpentariorum. i. quo ligna connectuntur ad inuicem, & glutinis scriptorum, alias piscatorum. i. collæ de piscibus: ergo gluten scriptorum secundum intentionem Nicolī est colla piscium: sed secundum intentionem Bartholomæi aliud est, quia in isto emplastro, utrunq; ponitur, ergo non sunt idē.

XX.

DE CRVSTA PANIS.

R. Masticis, mentæ, spodii, corallorum rub. sandalorū rub. & alborum an. 3. i. crustæ panis alsi infusæ in aceto per mediam horam. vnc. ii. olei de masticæ, & cytoniorum ana. vnc. i. farinz hordei. q. f. & fiat emplastrum.

COMMEN. MANLII.

Istud emplastrum apud nos non est in usu. Panis autē fm Auic. in 2. can. oportet q̄ sit panis coctus salutus, massam habens confectam fermentatus coctus bene in tanor ultime una nocte permanens, & non comedatur calidus sicut est electio panis de simula nutritibilis est aliis, & eius nutrimentum est melius, sed est tardioris penetrationis.

EX LEONAR. de preda palea.

XXI.

DE CARICIS, in cap. de cura carbunculi.

R. Caricari bene pingui & siccatū lib. i. sinapis. j. iii. farinz scenugræci, & semi lini an. 3. i. bdellii, armoniaci, galbani, an. j. i. diffusant gūmz in oleo lili orum, & posita simul oīa mulscent pinguedinibus prius colatis, & fiat emplastrū ad

Lumi. Ma.

P 2

dendo fariuz hordei quod sufficit ad inspissandum.

COMMENTA. MANLI.

Istud emplastrum apud chirurgicos est multum in usu, sub nomine emplastri de fibubus, nam caricæ sunt ficus sicce pingues de quibus Io. Angli. in cap. de lapide renum inquit fiat emplastrum de caricis, & de fibubus ficis. Ficus autem pro morbo uocatur durities ulcerosa habentes in se grana sicut ficus, hæc apud quosdam ueram uerucam id est porus uocatur.

XXII.

DE PENTADACTYLIS, in cap. de medicinis maturatiuis.

Granorum mirafolis mundatorum nu. xxx. amygdalarum dulcium nu. xx. foliorum rutæ, cicutæ, cœlidonæ an. M. ii. axungie porci. j. iii. olei communis quod sufficit, & fiat emplastrum secundum artem.

COMMENTA. MANLI.

Istud emplastrum non est in usu: sed in intentionem Leo. est mirabile in illa materia. ipse uero Leonar. inquit: Emplastrum pentadactylis: & postea dicit. I. mirafolis. grano num ipsius, & idem est. Idem in ca. de ulceribus putridis inquit. alcheria. i. mirafol. ergo est catapulta maior libro uero qui dicitur Bulchasis. i. Seruitor in tract. 2. ponit formam exorandi grana alcheruæ, & ut inquit ipse, est catapulta maior siue pentadactylus & c. eius autem species duæ sunt. i. maior & minor: de qua Sera. duo ca. facit. vnum in quo dicit catapulta maior est arbor sicut ficus, cuius semine est factum ad modum zechiaron, quæ inueniuntur sub uentre belitium. maior uero est planta habens folia longa in longitudine minus digiti aut duorum. & ambæ in hortis nascuntur. & minor apud rusticos herba chagorola uocatur, & ambæ sunt uox Mesue de utrisque loquitur. in cap. de albemeluch. Dios. autem uocat eam cicj siue sisamum agrestem.

Cicutæ autem herba est quæ apud Dioscorios uocatur, & apud Auic. succharam sed ipse ignorat eam, ut dictum est in unguento de cicuta. Istud cicuta autem est dicta quæ inter cannam nodos lateat. In indicis stagnis nasci harundines calami: dicitur: ex quorum radicibus expressum suumissimum succum bibant. unde & Varro ait.

Indica non magnum in arbore crescit harundo.

Illius, & lentis præmitur radicibus humor.

Dulcia cui nequeunt succo concedere mella.

EX PETRO ARGILLATA.

XXIII.

DE CENTAUREA, in cap. de fractura cranei.

R. Centauræ minoris. M. vi. temperentur per unam noctem in uino albo, deinde coquantur usque ad consumptionem medietatis vini, deinde coletur, & colatura bulliat usque ad mellis spissitudinem, de qua accipias. j. ceræ nouæ uirginis. j. ii. lactis mulieris. j. ii. terebinthinæ lib. i. ceræ nouæ. j. iii. refinæ. j. i. s. thuris, mastice, gummi arab. ana. j. milce, & fiat emplastrum, & mirabiliter ualet.

COMMENT. MANLI.

Istud emplastrum apud nos non est in usu.

Centauræ autem maxime minor est herba quæ satis est nota. Sera. autem duo ca. facit, unum de centauræ maiore, aliud de minore, sed maior apud nos non inuenitur, nec inuenta fuit tempore Macri. Minor uero nascitur in locis aquosis, & est similis herbæ hypericon, aut pulegio montano. habet virgam longam quadratam unius palmi, & floribus rubrum vergentem ad purpureitatem similem flore plantæ quæ dicitur ambes, & habet folia parua oblonga sicut folia rutæ, & ferien sicut granum frumenti, & habet radicem paruum in qua nullum est iuuamentum. Idem in fine sui libri de uirtute centauræ loquitur.

Lac mulieris sive Auic. canon. in cap. de lacte ait. Lac quod melius est omnibus est lac muliebre, & melius est quod est ubere sugendo bibitur aut sicut mulgeatur, & melius ipsius est quod uehementis albedinis æqualis essentia quod super uingem distillatum figitur & non currit & est passus ani-

malis ipsius planta bone, & non est in ipso sapor extraneus declinans ad acetositatem, aut amaritudinem, aut acriditatem, aut odor extraneus horribilis.

XXIII.

DE BETONICA, ibidem.

R. Succu betonica, succu plantaginis, succu api, colatorum an. lib. i. refinæ, ceræ nouæ, an. vnc. iii. terebinthinæ lib. i. coquantur primo usque ad succorum consumptionem, ultimo addatur terebinthina, & fiat emplastrum.

COMMENTA. MANLI.

Istud emplastrum est in usu, maxime apud Mediolanenses: Betonica uero est herba quæ apud Dioscorios uocatur. Auer. in 5. coll. inquit: Alchison quæ in latino dicitur, & bethonica, & in Persica lingua herabuem. Apud quosdam dicitur etiam lingua bubali, & ab aliquibus dicitur lingua equi. uide supra de synopo de betonica, quia et aliquid de ea ostendi. Hæc est herba quæ apud nos in pratibus inuenitur.

EX NICOLAO FLORENTINO.

XXV.

BOVINUM, in 7. cap. de cura fracturæ cranei.

R. Matrisfyllus recentis, vel passæ, vel etiam siccæ ad libitum, & decoque in optimo uino donec minuatür tertia pars ipsius, deinde colectur, & tunc habes terebinthinæ, ceræ citrinæ, an. j. iii. olei rosati. j. ii. liquefiant, & colectur supradictum uinum: deinde tandiu cum ipso uino ducatur cum spatula donec infringidum fuerit, & tunc collige & utere.

COMMENT. MANLI.

Istud emplastrum secundum Nicolauum est emplastrum bouinum quod conuenit utimurego uero existimo quod istud emplastrum sit in usu in partibus Florentiæ sub nomine emplastri bouini, sed apud nos est unguentum matrisfyllæ, & sic si legis istud emplastrum bouinum cum unguento matrisfyllæ: quod supra positum fuit, uidebis, quod quasi idem sunt.

EX GALENO.

XXVI.

DE ADIPIBUS, Galeni.

R. Adipis agni, adipis porci, uisui, utili, cerui, hirci, asini syluestris, anatis, gallinæ, uulturis, ana omnium. j. i. olei filamini, olei de cherua, olei lentis, medullæ cruris vaccini, olei amygdalarum amararum, ceræ albæ, omnium. an. j. s. ceræ rubræ, butyri vaccini, omnium ana lib. i. liquefiant, & colectur & administretur.

COMMENT. MANLI.

Istud emplastrum non est in usu. uerum loco eius utimur unguento quod appellatur unguentum de adipibus: de quo uide supra.

Agnis autem, ac porcus, uisus, vitulus, ceruus, hircus, sunt animalia quæ omnibus nota sunt.

Afinus syluestris de asino syluestri nullum auctorē inuenio mentionē facere. Aui. uero in 2. ca. facit. ca. de asino, sed non dicit, an sit domesticus an syl. & dicit quod cinis carnis asini & hepatis eius locū non ualet superpositus fissuris frigoris.

Vultur est alius maligna quæ alias aues offendit ungulis ipsius ac cum rostro ut est notum apud aucupes. Papias inquit: Vultur a uolatu tardo nominata dicitur, idem infra uultures, sicut & aquilæ ultra maria cadauera sentiunt.

Oleum filaminum. i. de granis filami, oleum de cherua. i. de pentadactylis seu catapulta maior oleum lentiscinum. i. de granis lentisci quæ in insula Chio inuenitur: & secundum multos gummi ipsius arboris mastix appellatur & c.

Peroratio in. xiii. sectionem.

Expleta sectione de Vnguentis, emplastris, ac Cerotis, eam quæ ultima est iuxta ordinem præmissum sectionem de Oleis aggrediemur: nisi non oleo gratiæ suæ perfuderit Dominus cuius influxu deficiente in nihilum tendunt uulnera quæ exacta huic operi nostro finem statuemus, ad alia forsitan non uiliora accessuri.

LVMIN. MAIORIS SECTIO DECIMAQVINTA.

OLEA EX QVAM PLVRIMIS AV-

TORIBVS CONTINENS.

EX ANTIDO. MESVAE.

I.



fictis, & oleum de pincis & sic de singulis.

COMMENTA. MANLII.

Oleorum genera sunt multiplicia, quædam sunt quæ ab ipsi feminibus sunt: & hæc sunt simplicia sicut oleum de amygdalis dulcibus ac amaris ac alia supradicta, quædam sunt composita quæ artificialiter per impositionem medicinarum in oleo antiquo fiunt: non oportet. n. narrare modum & formam faciendi olea supradicta: sunt. n. per expressionem eorum: ut docet Mesue: ad quem si necesse fuerit recurratur. hæc autem olea plurimis nota sunt.

Amygdala dulcis dicitur ad differentiam amaræ. Amygdalus autem arbor est: eius folia, fructus & gummi medicinarum competunt.

Amygdala amara aptior est in medicina, sed dulcis esui. Pet. de cref. ait: Amygdalus est arbor satis nota. eius quidē diuersitates in fructibus duæ sunt: quoniam quædam faciunt fructus dulces, quædam amaros. Dulces esui hominum in cibum competunt: amari quia sunt calidiores magis cōpetunt vsui medicinz. Item quædam sunt valde grossum & durū habentes corticem, quædam subtilem, & quædam amygdala est lōga, quædam quasi rotunda, & quædam grossa, quædam parua eligendæ sunt grossum rotundum, & subtilem corticem seu testam habentes: amant aerem clarissimum.

Nux grossa. i. usualis, uidelicet illa quæ comeditur de qua fit oleum quo aliquando utimur per faciendum lumen loco olei feminis lini. aliquando vtimur in cibarijs loco olei oliuæ: & hæc nux est illa quæ apud Dios. vocatur carea basillica. i. alexandrina: quam multi persicam dicunt: quidam vocant ipsam nucē regalem quæ idem est. Pet. de Cre. inquit: Nux a nocendo dicta, eo quod eius vmbrā nocet alijs arboribus. Io. Angl. in ca. de discrasia calida hepatis laudat ipsam, & facit verficulus sic.

Nux homini salus est si sumitur vti medicina.

Si velut escadatur non est salus immo ruina.

Auellana autem est fructus satis notus: maxime auellana usualis. Id. ait: Auellane ab auellano Campaniæ oppido vbi abundat cognominatæ sunt: hæc a Græcis pontice appellantur, eo quod circa ponticū mare abundant. Auellana aliqui per pondere sumitur Io. Angl. in ca. de discrasia calida hepatis laudat auellana, & est verficulus sic.

Dic auellanas hepati semper fore sanas.

Sanat rheumaticos frigidos & hydropicos. Iqñ assantur. Idem in ca. de passionibus stomachi ait: Dico tātum hic de auellanis, quod inter fructus, post ficus & uuas sunt meliores.

Chrysolima apud nos est fructus similis persicis & cōputant ipsam inter gēia ipsius. Pet. de cref. vocat ipsam monia cham, & ait: Moniacus est arbor quædam quasi similis pruno, sed est magis nodosa, & eius fructus est magnitudinis oium prunorum, sed similis fructui persicorum in forma, est tñ valde odoriferum & in colore auri. Bartho. Montag. in cōsilio

de exiccatione & consumptione hæmorrhoidarū, & restrictione immoderati cursus earū inquit: Approbatū est oleū de chrysolimis, & sunt fructus parui persici aliquoties similes coloris auri cum maturefcent, & ideo noiantur chrysolima a chrys græce quod est aurum, & milon malum. unde chrysolima quasi aurea mala, ex quorū nucleis tale perficitur oleum, ut dicit Mes. Gal. in li. 2. de alim. ait: Armeniacis & præcocis. i. chrysolimis. Id. armeniacum dicit quod primum genus eius ab Armenia fit adductum.

Perfica fructus sunt satis noti. Pl. ait a regionibus distinguitur eius gēia. Pet. de Cref. ait: Persicus, est arbor nota, quæ parua est: cito tamen crescit, & paruo tempore uiuit.

Ben. Id. de granis been, hoc oleum a multis ignorantibus dicitur muscellinum: sed non recte. nam muscellinum dicitur a musco. Mes. de ipso facit capitulum & inquit: Been est granum almesus: & eius aliud magnum, aliud paruum. magnum aut est in magnitudine fructus auellane triangularis, paruum vero est sicut cicor: & utrique habet medullam vntuosam leuem & albam, & hoc apud Dios. vocatur balanus persicus, cuius semen est femini arboris simile miristico. i. ita marisco, ut habet Sera. in eodem ca. ex uerba Diof. Auic. in 2. can. de been duo facit ca. unum de ben scriptum cum uno e tātum, & hoc est granum ben. aliud scribit cum duobus e, & istæ sunt illæ radices quibus gñaliter utimur pro been albo & rubeo. Io. Ang. in ca. de sterilitate inquit: Oleū de ben. i. de pipere albo est optimum in illo casu. item Dinus Flo. in li. 2. in ca. de cura apostematis dicit inquit: Oleū de been. i. cataputia illa alba grossa quam speciarū piper album uocant, hic tex. est falsus. nam oleum de been non est de cataputia, nec aromatarū eius semen vocant piper album etiā opinio Luminis male uentus est quod been sit semē cataputiz, quod nō est: quia uide quod hic Mes. docet modū faciendi oleū de been, & oleum de cherua. i. cataputia, ergo non sunt idem, nec est piper album, quia piper album apud omnes est notū, & uocatur leucopiper, de quo infra in oleo de piperibus, descriptio ipsius olei inuenitur. idem reperitur apud Dios. sub nomine olei balani, quod conficitur ut amygdalinum. Cherua. i. cataputia maior. Mes. de ipsa facit capitulum sub nomine albemescus, & dicit quod est granum regum, & est ex aliud magnum aliud paruum & dicitur quod magnum est cherua, magnum & paruum competunt vsui medicinz. Auic. in 2. can. in ca. de oleis inquit: Oleum de cherua est bonū lentiginibus & panno. idem in quinto habet duas descriptiones de hoc oleo, est unum compositum quod in usu non venit. Aliud simplex quo magis vtimur. hic possumus uidere veritatem quod been non est cataputia ut dicunt multi. cherua autē apud Dios. uocatur cicū siue sissam agrestis, sed apud Sera. uocatur cataputia maior, & ab aliquibus dicitur pēra dactylus, & ab alijs mirafol, & ab aliquibus custos horri, & ab aliquibus solsequia, minor uero est sicut planta habens folia longa, & in hortis nactur.

Nux indica. i. nux magna quæ de India uenit. apud Auic. nux indica est neregil, & bona ex ea est recens, vehementis albedinis, & aqua quæ in ipsa est, est suavis, & cum in ipsa non inuenitur aqua significatur quod est antiqua, & oportet quidē ut ab ea tollatur cortex medullæ eius. hanc nucem ego uide tantæ magnitudinis quod ex ea potest formari uasculum quod impleatur unum loco cantari.

De cerasis habuit vires supra sermo diffusus. Recurre lector ad id loci.

Machaleb ben Nicolai est granum cerasi syluestris, & de eo in prioribus abunde diximus in Eisdæ descriptione.

Citrus ben Dios. est arbor cui oibus partibus suis non una eademque virtus continetur: & hoc est pomū dictū citrū de acetositate cuius cōsicitur syrupus in tempore hyemali qui appellatur syrupus de acetositate citri. Non est aut cedrus ut quidam crediderunt. nam Dios. aliud facit capi. de cedro cuius gēia mod. alchitram seu pix liquida dicitur. Mes. inquit hic, oleū de granis citri & citrangulorum. i. citroniorum, inferius habet oleum de pomis citranguli, & hoc est pomum apud moder. dictum arancius.

Fittici. i. pistacia. Dios. inquit: Pistacia quæ i Syria nasci.

Lumi. Ma.

P 2

tur similia strobilibus. i. pineis sunt Aui. scitum natura dicitur qd est uehementiores caliditatis quā nux & amygdala, & est calidum in fine secundi, & est in ipso humiditas, & existimauerunt: quidam quod est frigidum sed errauerunt.

Pinus arbor nota est, cuius fructus pinea dicitur. Dioscor. pinea ex nucleis fortissimus cibus est & humores optimos gignit. Aui. in. 2. can. inquit: Geloum est grani pini maioris & est melioris nutritiōis qd nux, sed est tardioris digestiōis. infra aliud facit ca. de grano pini, sed si bene cōsideretur, uidetur quod illud ca. de geloum fit ca. de auellana maiori.

APPENDIX.

Cum oleum ex amygdalis, nempe dulcibus, ueluti quiddā typus aliorū oleorū, quz tum ex nucleis, tum ex seminibus extrahuntur, existat. non ab re censemus hic ad uerbum ex Mes. compositionem explicare, hunc in modum sese habēs.

Amygdalæ dulces cortice lignoso, & cute membranosa purgatæ, plurimum teruntur, in offas coguntur, horas circiter quinq; loco calido continent, uel in vase duplici hora una coquantur, aut sub calente arena, aut cinere, sacculo inuolutæ, & panis, aliquandiu fouentur. Postea rursus terunt, & sacculo cōclufa torculari exprimentur, uel trita amygdala in vase quō maza subigitur in aere calido, pauca calida identidem affusa. Hisq; modis oleū exprimes largius torculari quod asserere inferno fit cauato, & decliui versus emissā riu: superno aut pro cautatis magnitudine, & forma gibboso, ut undiq; ceu sigillo quodam amygdalæ aequaliter exprimantur. Quo etiā pacto quō facillime subleuantia extrahi possent memorat tradidit. Ex amygdalis amaris, Ex nucibus, *καρύειν*, Græcis uocatum. Ex auellanis. Ex chrysomelis Ex perficis. Balaninā, vulgo de ben appellatum. Ricinum Græcis *κικιν*, officinis de cherua nuncupatum. Ex Cnico, vulgo de carthamo Ex nucē Indica. Ex cerasis. Ex nucleis cerasi syluestribus, vulgo de amachale. Ex seminibus citri, arā cii, vulgo citrangularū. Ex pistaciis uel siticis. Ex strobilibus seu pineis Interim tñ non ignorandum huius olei compositionem paululum diuersam Græcis auctoribus fieri, præsertim Dioscoridi qui lib. 1. ca. 39. sic componit.

Se modus ex amygdalis dulcibus uel amaris repurgatis, siccatisq; in, pila, ligneo pistillo leniter tunditur in offas Aquæ, quæ feruerit, sextarius adicitur, & ubi dimidia hora humore hauserit, uehementius, quā antea, tunditur, mox tabellis præmitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur pressis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postquam ebiberint, idem opus prosequendum, singulas heminas reddunt singuli modii.

II.

L A V R I N V M.

Re. De granis lauri maturis quantum uoueris, & cum adhuc sunt recetia tere in pila, & fac bullire cum aqua in caldario: deinde exprime in zainari plano hano nō habere concauū, & collige ex aqua qd supnatat oleū: deinde iterū exprime grana contrita in zainari habenti uacuū, & infunde aquā calidā & collige oleū, & reponē & administra ubi oportet.

Oleum. { Ex bacis viridibus terebinti, vulgo de granis viridibus. } eodem modo param.
 { Ex schino, idest ex lenticiis bacis, nō autem de stincho, ut prius mēdo se legebat. }

COMMEN. MANLII.

Istud oleū est in usu p. oleo de bacis lauri. idē est in usu pro oleo de urbis: eius descriptionē idē Dioscoribit.

Laurus arbor est satis nota: eius granū apud Aui. est granum. ademest. hoc granum est satis notum melius de ipso ostensum fuit supra in electuario de bacis lauri.

Granum uiride secundum Aui. in. 2. can. est fructus arboris terebintini. unde terebintina colligitur. Mattheus autē Syl. in litera g. ait: Gūmi albotin. i. lacca, quod ignoro: unde supra in vng. de terebintina, quia sibi ipsi contradicit, non est autem resina ut quidam putauerunt.

Stinchus secundum Diosc. est animal, quod in India in-

uenitur: vide de ipso in electuario de stincho.

APPENDIX.

Varie ex lauri bacis oleum apud Dioscorib. 1. ca. 48.

parari studiosi non ignorent. his nempe uerbis. Maturæ lauri bacæ in aqua coquantur, si quidem ex obducto cortice quandam pinguedinem reddūt, quæ manibus expressa, concha excipitur.

Alii omphacium prius oleum cypro iuncto odorato, & calamo inspissant: deinde mollia lauri folia concoquant.

Alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit. Alij styracem, & myrtum addunt.

Optima laurus ad id latifolia, & montana.

Ad hæc Actuarius non inepte, merum, ac syncerum oleū ut extrahatur, edocet, sic inquit.

Quidam baccas lauri solum citra missionem aliam molliunt, & ita Prælo, uel Fisco oleum exprimunt. hoc autem merum est, & sincerum.

Hocq; utilius cum Dio. censemus, cum simplex laurinum maxime laudet, recens, uiride amarissimum, & acre.

III.

DE BALSAMO.

Fit ex plāta longitudinis cubiti vnus aut duorū ad plus si mili rutæ agrestis, cortici cuius si acciderit scarificatio aut scapellatio ex parte ortus solis fluuit sicur lachrymæ pinguedinis & est dimel balsam. i. pinguedo balsamis et quiq; accipiunt palmites planta in principio Veris & terunt in pila, & coquūt in aqua, & expriment in zainari, & uocatur oleū balsami, & quandoq; terunt palmites & funditur super eos oleum antiquum & ponitur in sole diebus. xl. deinde coquuntur in duplici uase, & iterum innouatur in eo alij palmites & ita tertio deinde colatur & reconditur.

COMMEN. MANLII.

Hoc oleum secundum istam descriptionem est illud quo utimur: sed apud nos non potest confici, quia eius planta nō reperitur in partibus nostris.

Balsamum autem huius Aui. est arbor ægyptij, nascens in loco qui dicitur oculus solis, sed quia in partibus nostris prædictum oleum nō potest confici: hodierni doctores composuerunt olea quæ debent administrari in omnibus locis ubi ingreditur balsamus: & docto. isti sunt Pet. de Ebano Gul. Placen. etiam Bartho. Montagna. scripsit modum faciendi balsamum artificiosum: quod in omni probatione ualet ut balsamus: de quo infra.

APPENDIX

Nostram studiosi consulant (modo plura desiderent) The riaces Fabricam, cum mihi hæc abunde pertractentur.

IIII.

Oleum de granis sisami, oleum de semine lini, oleum de granis papaueris, oleum de semine lactucæ, oleum de semine cucurbitæ, oleum de semine citrulli, cucumeris, & melonis, hæc omnia sunt eodem modo.

COMMEN. MANLII.

Istud oleū quod fit de granis sisami ingreditur in multis cōfectionibus: sed hodierni apothecarij nō cognoscūt ipsum. Ego uero habui prædictū semē delatum est Venetiis, & fieri feci prædictum oleū, sicut oleum de amygdalis, & inueni eum optimū & in cibis delicatissimū, & in colore clarū vñ phoc dico qd bonū esset qd oēs idē facerent & vterentur ubi oportet. Ph. ait: sisama ab indis uenit ex ea oleum facit: color eius est cæcidus Matt. Syl. in litera f. ait: Fchidegi. i. confectio de melle sicut penidie, & i lingua nra uocatur sisami.

Oleū de semine lini est in usu: & est duplex. vñ qd solū fit ex semine ipsius: & hoc dī oleū linofæ purū qd aptum est eiui aliud fit cum aqua: tñ non multum, & hoc dicitur oleū linofæ compositum. hoc lucernæ aptum est. Ibi. in ca. de liniis ait. Linum ex terra specie nitenti ortur deflexum: nomē eius ex græco: nam liniū græci linarin dicunt: siue qd sit molle & lenē: hoc oleum a quibusdam dicitur oleum lineleon.

APPENDIX.

Quantū hic iā expōsit, ut amygdalinū, extrahantur nō ignoro: tñ inter cætera tantū sisami semē varie prius exortitādum, ut ex Mes. colligere liquet, ad uerbum sic inquit.

Sisami

Sesami semen ab excrementis purgatum, aqua parum falsa irrigetur: manibus fricetur, iterum irrigetur, donec madescat, siccat, modice afficitur, faculo aspero multū diu- que cōfricando excorticetur, corticibus expurgetur, mola- tur in farinam, oleum, ut ex Amygdalis. exprimitur. Ex eo- dem semine (addit,) non excorticato, sed affato, & moli- to in farinam, oleum quoq; ut prius, extrahitur.

V.

ROSATVM completum.

℞. Oleum de oliuis, aut oleum sisaminum recens, & lauetur cum aqua fontium lauationibus pluribus, deinde accipe folia rosarum rubra recentium contularum quantitatē sufficientem, & sepelias in oleo q̄ modo lauari, & recon- de in uase uitreo, & obtura orificium eius & exponas soli dies. vii. deinde coque in uase duplici per horas tres, deinde fac permutationē foliorū rosarū, & utere aliis recētibus, & dimitte p̄ alios dies. vii. deinde exerce cōtione in eo sicut fecisti prius, & fac de nouo permutationē foliorū rosarū, & proice sup̄ illud aquę infusionis rosarum quā tradidimus, in cap. de syrups, sicut est quantitas olei & stringe orificiū uasis, & dimitte in sole p̄ dies xl. deinde scola, & iterum ex- pone soli, & dimitte tempore extēso & uterē ubi oportet.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum apud nos est multum in usu, secundum aut intentionem Mesue est oleū rosarum cōpletū. ipse enim do- cet facere ipsum tribus modis: sed solum scripsi unum modū quia ab hodiernis in usu non est fm̄ illum modū: Nicolaus habet oleū rosaceū. i. rosarum, quod magis apud modernos in usu est, uerū est quod sunt ex hominibus qui accipiūt foliorum rosarum recentium, & comminuunt cum forficibus quantitatē quam uoluerint, & superponunt oleum com- mune, & exponunt soli per dies. xl. deinde administrāt ubi oportet Circiansans in cap. de rosis inquit: Oleum rosa- ceum sic fit quidam decoquant rosas cū oleo & colant & re- seruant. alii terunt rosas uirides, & ponunt in oleo. & in ua- se uitreo soli per. 5. o. dies exponūt. & hoc optimū est. Dios- corides habet oleum rosa. sed nō est idem uerum ipse docet ipsum componere tribus modis, ut facit Mesue.

APPENDIX.

Ultra Dioscoridem lib. i. cap. 5. 2. Actius lib. i. rosaceum oleum his uerbis bellissime componit.

Accipit floris rosarum rubearum exunguium, & per diem ac noctē siccaturū quadrās, olei omphacini sextarius unus, rosis infectis, os uasis occludere oportet, intrinsecus linteolo, foris fecus pellicula, propter imbres repētinos, & insolare ad dies. 40. atq; ita excolatum reponere, uasis su- per tabulas locatis in domo temperata. Quidā alia quadā rosis adiiciunt. Verū optima est preparatio ex foliis rosis, & oleo cōstans. Alii non insolant, sed uas in puteū aquę frigide ad dies 40. suspēdūt. propterea q̄ ex frigore (addit Pau- lus, hęc oīa lib. 7. cap. 20. & Actio perscribens) amarus, ac gratus odor cōseruetur. Aliqui in terram hoc ipsum fodiūt.

VI.

CHAMAEMELINVM, uulgo camomillinum. Oleum chamemelinū est oleum benedictū, & modus operationis eius est sicut olei rosati prater quam oportet ut fiat cum oleo de oliuis completo, aut oleo sisamino cum illis modis preparationum quos diximus.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu, sed eius modus apud modernos si- cut idem, ut docet Mesue, uerū est quod faciunt ipsum sicut dixi de oleo rosato. Mesue inquit quod oleum camemilli- nū est oleum benedictū. Io. Anglicus in cap. de dolore iuncturarum ait. Item in gutta indurata ualeat oleum camē- millinum in quo coquantur flores hyacinti crescentis in campis. uoco istud oleum hyacinthi.

APPENDIX.

Ex primo Actii libro, Paulus non inepte. 7. cap. 20. cha- memillinum preparat. uerum non ab re Actium sequemur, cuius uerba hęc existunt.

Oleidulcis sextarius Italicus unus, florem chamemeli- diū unū p̄secatorū sextans, in uas mittunt, cuius osculum

raro linteolo integitur, quo perspirationem habet oleum, & sic per dies. 40. insolantur. Etenim si non perficitur, ac transpiret chamemellinum oleum, odorem goro similem acquirit. Post insolationem seruare ipsum oportet ex cola- tum, uase locato in tabulis in domo temperata.

Ad hęc actarius flores, camemelli proprus eligendos hac compositione pulcherrime admonet.

Chamemelli flores lutei, sine ambientibus candidis foliis, pondere sextantis in libran olei demerguntur, & ui- treo, uase linteolo cooperto. 40. dies flos finitur illustrari.

VII.

VIOLATVM.

Modus operationis eius est sicut olei ro. excepto quod debet fieri cum oleo rudi, aut amygdalino, aut sisamino cum illis modis operationum quos enarrauimus.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu secundum intentionem Mes. fit si- cut rosatum, excepto quod debet fieri cum oleo rudi. i. oleo de oliuis immaturis, quod onfacinum appellatur. nam idē in ca. de oleo ro. inquit. Rudis aut materia est ex oliuis, qui- bus nondum accidit completo & maturatio. Præterea Si- mon Ianuensis inquit. oleum violaceum. i. de uiolis ex om- phacino oleo fieri debet, & sic intelligendum est pro oleo- rudi oleum oliuarum immaturarum.

Viola autem flos est satis notus Bulchafis. i. Seruitor in- tract. 2. in cap. de modo desiccandi uiolas dicit: qui uult co- lorem & odorem arum seruare sicut est uiole montium sunt meliores hortulanis, & lib. x. ex recentibus conuertun- tur ad unam quando sicce fuerint.

APPENDIX.

Inter alios Græcorum Egineta, *ἡσὶν* hoc est, uiola- ceum abunde his uerbis. 7. cap. 20. exponit.

Iarum, alii quidem purpurarum, aliqui uero crocino- rum, alii albarum uiolarum, uinguibus detractis, foliorum vncias tres, in olei omphacini, Italicos sextarios quinque iniiciunt, preparant, & accurate, ne liberius euaporet, vn- diq; cōstringentes. x. diebus insolare solent. ter ipsā pot- triduum commutantes, perinde atque lilia: ad cōseruan- dum præterea pauca quædam exaëta arida immittunt.

VIII.

ANETHINVM.

Modus operationis eius est sicut olei chamemeli. COMMENTA. MANLI.

Istud oleū est in usu: & modus eius apud modernos est, accipiantur flores anethi, & similitudinē habet cū fenicu- lo & asfimilator plantæ ipsius, & ponantur flores cum oleo, & exponantur soli per. xl. dies. deinde utere ubi oportet.

APPENDIX.

Actius lib. i. oleum anethinum elegantissime hunc in modum præparat.

Anethinum ex anethi coma fit adhuc uirente, prius quā semen solidum reddatur, & acre inutile enim ad usum hūc fit floribus abiectis. Refecare autem mollia tantum germi- na, & vnciæ vnus pondere expansa, ad sextariū Italicum vnium olei dulcis iniicere oportet. & osculum uasis probe obturare, & diebus. xl. insolare.

Confici autem potest (Aegineta. vii. ca. xx. addit,) pro temporis ratione anethinum, ubi insolatū denegatur co- pia, aridi nāq; anethi comā cū oleo i diplomate uasculo effi- ciat utunt, & chamemeliu cōsimiliter. Minoris uero effi- cacię hęc sunt iis, q̄ ex uiridib' cōficiūt, p̄sertim insolatis.

IX.

DE LILIO compositum, uulgo cum speciebus.

℞. Ex foliis liliorum. 5. ix. masticis, calami aroma. costii, car- pobalsami, an. 3. i. garyophyl. cinnamonomi electi, an. 3. s. cro- ci. 3. uti. oīa præter folia liliorū insundant in aqua sufficienti, & dimittant die ac nocte: postea bulliant ebullitione una, aut duabus: deinde proice olei sisamini super ea, aut olei de oliuis cōpletis lib. ii. & pone in uase uitreo cū foliis lili- rū, & dimitte in sole p̄ dies. xl. deinde cola & administra.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleū est in usu sub nomine olei liliorū cum specie-

bus: aut sub nomine olei de liliis compositi ad differentiam alterius descriptionis secundum quam fit oleum de liliis simplex cuius descriptio inuenitur in antidotario Io. Serap. de qua infra. Dios. habet idē sub nomine olei fusini. i. de liliis.

APPENDIX.

Lilium, quod alii, cum in suis maxime in promptu, tum aliis tum pregnantibus (vt Aetius lib. i. clare expressit,) ad partum facilitandū, olim esset fusuū appellatum, apud Diosc. lib. i. ca. lxi. pulcherrime teperat: cuius placita in unum quā breuissime Paulus Aegine. lib. 7. ca. xx. his uerbis p̄trinxit.

Sumito olei sextarios, calami odorati libras quinq̄, myrrhæ, quincuncem, cardamomi libras tres, foliorum lili de tractis unguibus refrigeratorium libras, cinnamomi quadrātem, croci cilicii, quincuncem. Præparationem uniuersam in treis iniectiones diducito. Primū, myrrham, & calamum uino p̄ quinq̄ dies macerata, ter in die agiteus, post hæc oleo quā minimum decoquamus.

Secundo, cardamomum aqua maceratum per triduum cum mouebimus pari rursū ratione cum oleo ad horam unam simul elixemus: quibus deinde exemptis oleo puro liliorum tertiam partem iniciamus & lapsū iam triduo his quoq̄ exemptis tertiam liliorū aliam partem iniicito: quā iterum post triduum exemptis, ac proiectis primis, ultimā liliorum tertiam partem cum croco leuigatā immitte, tranfactis tribus aliis diebus oleo detracto, cinnamomum consumtum indito. Loco huius aruabon, uel cassiæ duplum, uel carpesum iniice, & reponito.

X.

IRINVM.

R̄. Radicum ireos quantitatem aliquam, & florum eius duplum, & aquæ decoctionis radicū eius q̄. Et funde super ea olei sisāmini, aut de oliuis maturis quantum oportet, & decoque in duplici uase: deinde permuta radices & folia liliorum, & fac ut diximus de oleo rosato.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu sub noīe olei de ireos, aut irini, aut liliorum purpureorum: nam oleum irinum est oleum factū cum radice ireos: & est radix lili quod purpureum florem gerit. Gal. inquit: Ireos ad similitudinem iris quem in cœlo uidemus dicitur: & hinc cognominatur: quoniam illa plures & dissimiles habet colores, sic & varios, & differentes mit t̄ flores: aliqui. n. sunt albi, aliqui cerulei, & aliqui purpurei. Vnde Virg. de iri loquens ait.

Mille trahens uarios aduerso sole colores.

XI.

LEVCOII, officinis de cheiri.

Oleum de cheiri, quod est ex cheiri citrina est melius & subtilius: deinde quod ex alba: est autē oleum de cheiri resolutionum sedatium dolorum qui sunt in neruis & iuncturis & pectore, renibus, & uescica, & eius modus est sicut olei de cāmæmilla.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu, & debet fieri: quia ingreditur in multis locis.

Cheiri autem est uiola citrina dicta apud quosdam saronica. Auer. in 4. col. inquit: Alcheiri, id est uiola de romanica hæc apud nos in hortis ac bladis inuenitur. Aui. in 3. cā. in fen. xxi. cap. de potionibus ad solutionem faciendam, & de illis quæ conferat eis inquit: albesed. de quo dixit quidā quod est alcheiri rubea. Hic tex. Aui. apud Arabes debet corruptus. nam albesed est corallus, sicut apparet apud Sera. in proprio cap. de corallo. Nicolaus Flo. in lib. 7. in ca. de cura dolorum iuncturarum in speciali, & proprie sciatici inquit. Dixit Gal. medicamen confectum cum cheira citrina plures dissoluit apostematata dura accidentia in articulis. Idem ibi ait. inquit. Dios. hæc est descriptio medicaminis cheirini citrini qualiter debet fieri & debet intelligi de flore eius, qui & appellatur cheiri rufa, & appellatur bassad. Similiter textus Nicolī est corruptus dicentis quod cheiri rufa appellatur bassad. nam uidet in omnibus libris de Arabico translatum in latinum, & uidebis quod bassad est corallus: & alcheiri est uiola citrina, quæ satis est nota.

XII.

E MELLILOTO.

Conferat sicut oleum chamæmelinum, & fit sicut illud.

COMMENTA. MANLI.

Oleum de melliloto non est in usu. Melilotum autem cōponitur a mellī, & lothos quod est trifolium: nā sine dubio melilotum est species trifolii, & dicitur quod est trifolium odoratum, ut dictum fuit in emplastro de melliloto.

XIII.

NYMPHATVM, officinis de nenuphare.

Conferat sicut oleum uiolatum, & fit sicut illud.

COMMENTA. MANLI.

Apud nos est in usu. Sed componunt ipsum ex floribus nenupharis, & oleo omphacino posito soli per dies. 40. & postea utuntur.

Nenuphar autē apud Diosc. uocatur nimphea siue ut alii cacabus ueneris. i. papauer palustre siue ut latini alga palustris secundum Auicē. fit caulis aquæ de nenuphare uide in electuario de farfara: quia ibi clare determinatū est de eo.

XIII.

MELINVM, uulgo de CYTONIIS.

R̄. Carnium cytoniorū tritorum cō cortice suo, quibus media accidit maturatio, & succi eorum ana partes æquales, olei ex oliuis incōpletis. q̄. pone in uase utreo per dies. xv. ad solē, deinde coq̄ in uase duplici per horas quatuor, post illud fiat permutatio cytoniorū, & succi eorum & fiat sicut diximus his vel ter, deinde cola & reconde.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu. Cytonium autem fructus est satis notus: exsimilat autem quidam q̄ istud oleum fit illud quod a Diosc. melinum dicitur.

APPENDIX.

Melinum (vt Aetij uerbis utar lib. i.) ex malis cydonijs paratur, fit etiam ex aliis malis corium habetibus acerbis, & odoratus hoc modo.

Adimitur pediculus ad exortum, & festuca ad fundū, & pars interior una cum seminis gravis, deinde secantur mala una cum adhærente cuticula. Nam in ipsa & odoris gratia, & adstringēdi vis continetur. sunt autem paruā frusta, quorum quadrans in olei omphacini sextarium iniicitur, & insolata ad dies 40. reponuntur.

XV.

MYRTINVM.

Fit sicut oleum de cytoniis.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum apud nos est in usu. Myrtus uero est arbor cuius semen myrtillus dicitur. eius species fm moder. duæ sunt. s. albus & niger. albus autē cubeba, seu myrtus agrestis, niger est ille quo utimur generaliter. Id. ait: myrtus amara dicta: eo quod magis littorea arbor sit. vnde & Virgilius.

Littora myrtetis letissima & amātes littora myrte. Hinc est quod a grecis uene dicitur. Medicorum autē libri hæc arborem aptā scribunt mulierum necessitatibus plurimis.

APPENDIX.

Myrteum Dioscorides lib. i. ca. 47. hunc in modum bellū sine parandum edocet.

Myrto nigra syluestri, aut satia, foliorum mollissima quæque tusa præmuntur. Succo per se omphacini olei porciones addiuntur, subiectisq̄ carbonibus inferuiscunt, donec concoquantur. Innans oleum deraditur.

Sed longe facilius hæc compositio.

Tenera folia contusa coquuntur in oleo, & aqua, & quod in natat, eximitur.

Priuatim alii directā in oleum folia in sole macerant.

Alii prius oleum inspissant malicorio, cupressi, cypri, & iunco odorato. Efficacius est amarum gustū, & oleosum, viride, translucens, & olens myrtum.

Insuper Aetius lib. i. uinum odoratum adstringens addi dicit ac uarie concoqui, sic inquires.

Fit & hoc foliis myrti uiridibus pōdere sextantis, in olei Omphacini sextariū Italicū vnū iniectis, addita uini odo-

rati adfringentis quartæ sextarii parte. Coquantur hæc ad lentam prunam, donec folia ardeant, ac cōstringatur, & uinum consumetur: Deinde oleum purum excolatur, & utro uale excipitur, ac reponitur.

XVI.

EX POMIS mandragoræ, uulgo de pomis Iabrol.
R. Expressione eorū completorū, & olei sissamini ana partes æuales, decoque in uase duplici usq; ad succi consumptionem, deinde cola & reconde in uase cum eiusdem succi expressione, sicut quartæ partis & utere.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu. Nicolaus in suo antidotario habet hoc oleum, sed non est omnino idem.

Pomum Iabrol est pomum mandragoræ scdm intentionem Mesuræ. Aui. in. 2. cano. inquit: Iabrol est radix mandragoræ syluestris, & est radix ois mandragoræ magna similis formæ hois, & pp hoc nominatur mandragora. est enim non men imaginis naturalis. s. sicut planta exilis in forma hominis. hic textus Aui. est falsus. nam mandragora non est sicut forma hominis, ut apparet apud Dios. & Sera. Præterea.

Petr. de Cresc. inquit. mandragora non determinatur ab autoribus, cuius duæ sunt spēs. i. masculus & foemina, & quidam ut Aui. & alii dicunt foeminā formatam esse ad modum foeminæ, masculum ad modum uiri, quod falsum est, & sic certum est quod mandragora non est in similitudine formæ hois. uerū Itali herbatici, & maxime falsificatores accipiunt radicem brionis, & cū certis instrumentis faciunt quādam imaginē ad similitudinem forme hois, & dicunt q̄ illa est uera mandragora, quibus nō credit. Sera. in cap. de mandragora, narrat de pomo ipsius de mente Rasis, & ibidē dicit. dixerunt mihi quidam ex antiquis Babylonis q̄ puella quædam comedit quinq; poma mandragoræ, & cecidit sine copizara, & facta est tota rubicunda, & quidam supueniens effudit super caput aquam niuis totiens donec surrexit.

XVII.

ENVLATVM, uulgo de enula.

R. Radicis enulæ contrusæ & succi eius radices, & olei sissamini ana partes æuales uini odoriferi partem. ʒ. fac sicut diximus in oleo myrcino. Alius modis operationes est: ad de permutationi prædictæ foliorum lauri, cordumeni. i. chei-sim hortulani, spicæ indæ, calami aromatici ana sextam partem unius & decoque sicut diximus.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu. Enula est herba satis nota.

XVIII.

DE CINNAMOMO.

Cōfert sicut oleum de enula, & modus operationis eius est sicut illius.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu. Dios. habet descriptionem huius olei, sed non est eadem huius.

Cinnamomi autem scdm Serap. est species sunt plures sicut apparet in suo cap. Macer. autem inquit: Cinnamones tres species dicuntur habere.

Sed harum est præciosa magis quæ plus subtilis habetur. Et quæ plus mordet mixta dulcedine linguam &c. Secundum intentionē Macri eius species sunt tres. sed scdm Ser. sunt plures. Io. Anglicus in cap. de passionibus stomachi inquit: Item utantur homines frequenter cinnamomo, quia os redolere facit & ualet contra rheuma frigidum, & preseruat a corruptione humorū & ideo dicit. Cur morietur homo, qui sumit de cinnamomo supposito bono regimine.

XIX.

RVTACEVM, officinis de ruta.

Modus operationis eius, est sicut olei myrtini.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum scdm intentionem Mesuræ fit sicut oleum myrtinum. fit autē sicut oleū de cyronis hoc est quod accipiat foliorum rutæ, & succi eorū ana partes æuales olei oliuarum incompletarum, quantum sufficit ponantur hæc tria in uase per dies. x. & obturetur os eius: deinde coque in uase duplici per horas quatuor: postea colatur fortiter mani-

bis comprimento & bis uel ter hoc reiteretur: deinde cola & reconde.

Ruta autem herba est satis nota.

APPENDIX.

Rutaceum quam breuissimè Actuarius hoc pacto præparat Comarum rutæ, & foliorum diu, noctuq; decoctorum, vncia, olei libra, anethini, modo foli expōitur.

XX.

NARDINVM BENEDICTVM.

R. Spicæ aromaticæ ʒ. iij. uini & aquæ ana ʒ. ii. s. olei sissamini ʒ. vi. decoquatur in uase duplici: iteno igne quā per horas quatuor, & frequenter moueatur omni hora.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est in usu: maxime scdm istam descriptionem uerum est q̄ Mesue ponit quod ipsum potest fieri duobus modis: sed primus est magis in usu: si autē facere uolueris iuxta secundum modum infra apparebit.

Olei autē nardini. i. de spicæ nardi: seu spicæ aromaticæ. Aui. in. 5. can. hæt unam descriptionē, sed nō est idē. Rasis in. 9. Alman. in cap. de dolore stomachi proueniente ex apostemate indurato ponit oleū nardinum, sed non est in usu. Dios. ait. Oleū nardinū diuerse conficitur cum folio malabathi & sine isto miscetur. Io. Anglin. ca. de modo abluendi oleum, hæt descriptionem huius olei, sed non est similis.

Oleum sissaminum. i. oleum quod fit ex granis sissami: cuius modus supius fuit positus, sed non oportebat q̄ D. Mesue diceret oleū sissaminū, quia hodierni apothecarii apud nos generaliter ponunt loco olei sissamini, oleū oliuarum pro hoc oleo conficiendo, sed erant errore maximo.

XXI.

NARDINVM ALTERVM.

R. Spicæ indæ. vnc. iij. lamplici, xyloaloes, enulæ folii indi, calami aro. foliorū lauri, cyperis, squinanti, cordumeni, ana. vnc. i. s. proiciant super ea prius quā fuerint cōtrita uini & aquæ fontis. q. l. olei sissamini lib. vi. deinde fiat sicut primū, & coquatur horis sex, & agitur omni hora.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum scdm istam descriptionem apud nos non est in usu: dum Mesue ponit quod ipsum potest fieri per tertium modum, sed non est in usu.

APPENDIX.

Pulchre. admodum, quamquam uarie, NARDINVM oleum Actius lib. i. memoriz prodidit, quæ non ascribimus cum satis duxerim locum adnotasse.

XXII.

MASTICHINVM.

R. Masticis. vnc. iij. olei sissamini Kist. i. coque in uase duplici. Secundus modus operationis eius est. R. olei rosaci ʒ. ii. masticis. vnc. iij. uini boni. vnc. viii. decoque sicut primum ad uini consumptionem.

Istud oleum est in usu: scdm intentionē Mesuræ pōt ipsum confici duobus modis, sed primus apud nos non est in usu immo secundus est ille quo generaliter utimur. Aui. in. 5. can. habet unam descriptionem, quæ est eadem cum prima.

Mastix uero gummi est satis notum. Istā. mastix arboris lentici guta est: melior autē in Chio insula gignitur, odoris boni. Secundum Gal. mastix est gluten Romanum.

Chist est pondus scdm modernorum opi. libra. i. cum dimidia. Aui. in. 5. can. in tract. de pōderibus inquit: Chist apud gentes quæ lingua græca loquuntur cognunt est: super mensuram uero non conueniunt omnes: & illud est: quoniam quidam eorum utuntur alia quam utantur alii. Chist enim apud Romanos cap. lib. i. s. & sextam. quare est. vnc. xx. & chist Italicum lib. i. s. & lib. est. vi. xii.

APPENDIX.

Mastichinū, nunc simplicissimum nunc magis narium Aegii neta lib. vii. cap. xx. egregie parat hæc proferens.

Mastichinum simplicissimum hoc modo paratur. Mastiches in Chio insula natæ uncia, & Omphacini oleo sextario Italico permiscetur, & in olla decoquitur: nonnulli uero absinthii, & styraeis cuiuslibet uncia adiciere cōsueuerūt.

Magis uarium.

Olei sextarii quinquaginta. Enulæ cāpanæ lib. quinq; xylobalsami libræ decem, florum iunci rotundi libræ quinq; cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinq; xylo mastiches libræ octo, terebenthinæ libræ tres, absinthii cum libra, uini odorati sextarii quinq; aquæ sextarii decem, mace ratæ in uino res aride ante tridui cōmlescent oleo, & aqua & elixatur horis sex, itaq; mastiche, & terebentina iniiciū tur & exacte commixta, & infrigidata deporantur, & trans fusa reponuntur.

XXIII.

STYRACINVM, officinis de Storace.

R. Olei sisāmini. ʒ. xii. storacis. ʒ. iii. fiat sicut oleum mastichinum: deinde coletur & administretur.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu idem Auic. in. 5. cano. habet uero aliam descriptionem quæ eadem est, Dios. habet de scriptum huius. sed non est eadem.

Storac. s. floræ calamitæ quæ facis est nota. Mef. in suo grabadin in cap. de ægritudinibus neruorū hēr duas descri ptiones olei de figia, & est storac lig. d. sed non sunt in usu.

APPENDIX.

Styracinum ex Aetio lib. i. simplicisime sic paratur, olei dulcis optimi, sextarius unus.

Styracis pinguis sextans.

Coquantur in duplici uase, donec styrac uim suam in oleum deponat.

XXIII.

COSTINVM.

R. Costi amari. ʒ. i. casis lignæ. ʒ. i. extremitatū samplici ʒ. viii. uini odoriferi. q. ad infundendum noctibus duabus olei sisāmini lib. iii. decoquat sicut oleū nardinū horis sex.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est in usu. Aui. in. 5. cano. habet duas descri ptiones, sed non sunt eadem.

Costum uero est radix amara.

XXV.

CIPRINVM, uulgo de ALCHANNA.

R. Florum alchannæ. ʒ. iii. olei antiqui. ʒ. x. fiat sicut oleum ros. In defectu autem florum fiat cum foliis, & iteretur decoctio eius cum modico uini.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est multū in usu. Dios. habet aliam descri ptionem sub nomine olei cyprini, q. idem est. nam oleū de alchanna apud Arabes est oleum cyprini apud græcos. Idem Dios. aliud de ipso facit cap. sub nomine cypri arboris, cuius folia sunt oliuæ similia, sed uiridiora & paulo gros fiora, & semen nigrū, & florem albū geminat cū odore bo no. apud Moder. dux sunt spēs. s. alba & rubea alba uero fm existimatio nē pluriū modernorum est frutex sicut arborosa quæ iuxta hortos ac in campis inuenitur, & est quam nostri rustici Ceuerox uulgariter dicunt, de cuius flore mulieres inficiunt capillos, rubea uero apud nos non inuenitur.

APPENDIX.

Cyprinum Dioscorides lib. i. ca. 64. Aetius li. i. Aegineta li. vi. ca. xx. nec non actuarii, uariæ præparant, spissamen tum potius quam oleum, nuncupandum.

XXVI.

SAMPVSCHINVM, uulgo de SANSVCO,

Fiat oleum myrtinum.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu. Dios. habet unam aliam descri ptionem, sed non est eadem huius.

Oleum uero sampschinum est oleū de maiorana. Diosc. inquit: sampschus a ficulis amaracus nominatur. Idem dicit Plin. sed secundum Aui. amaracus est alacoen siue uchuē, ut apparet apud eundē in. 5. cano. in trochiscos andarachon, uerum generaliter hodierni habent opinionem quod amaracus sit maiorana. uerum contraria est opinio Simo nis Ianuensis in cap. de alacoen lido. dicit sampschus est quilibet latinū amaracum uocant, cuius nomine usus est Vir gilius etiam ad Venerem referens.

Vbi mollis amaracus illam.

Floribus, & dulci aspirans amplectitur umbra.

Vnde & nomen traxit amaracus a puero cuiusdam regis, qui casu lapsus, dum ferret unguenta, nomen, & gratissimum ex effusione unguenti odorem creauit.

APPENDIX.

Legantissime Dioscorides lib. i. cap. 57. (quæ etiam ad uerbum actuarii reperitur.) Sampschinum sibi uerbis nificet, atq; componit. fersilli, casis, abrotani, florum sisymbrii, frondium, myrti, sampschis singulæ portiones, quadam pro uiribus singulorum cōiectione una tunduntur: a quæ ijs omphacini olei modus adicitur, qui madentium uires non euincat. Hæc post quadriduum exprimuntur. Denno alia simili mensura, & æquali tempore macerata premuntur: ita enim ualidius reddi solet. Eligii oportet sampschum colo re nigrum, plurimum redolens mediocriter acre.

XXVII.

Ex Thymælea, officinis de mezeoron.

R. Foliorum mezeoreon. ʒ. i. iij. & proijce super ea aquæ dulcis lib. i. dimitte die ac nocte, deinde fundatur super ipsum lactis dulcis & recentis. ʒ. vi. olei sisāmini. ʒ. viij. coquantur usque ad lactis & aquæ consumptionem, deinde coletur & reponatur.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum est in usu, & debet fieri fm istam descriptio nem. Idem in ca. de mezeoron habet unā aliam descriptionē sed non est eadem huius. Leonardus de Preda palea in ca. de fistulis, habet unam aliam descriptionem quæ est eadem.

Mezeoron apud Dios. uocatur chamælea siue cocogni dum ut dictum fuit in electuario de mezeoron.

XXVIII.

DE THYMO, uulgo de HASCE, oleum (nescio unde, fericinum uocitatum.)

R. Hasce. ʒ. iij. zingiberis. ʒ. i. s. funde super ea in uase uitreato succi extremitatū halacæ. ʒ. iii. olei sisāmini. ʒ. xiii. aquæ dulcis quantum sufficit. decoq; usque ad aquæ consum ptionem. Modus alius. R. olei sisāmini. & succi halacæ & lactis uaccini recentis ana. lib. ii. albarum penidiarum. ʒ. v. zingiberis albi. ʒ. xii. decoquantur usque ad succi & lactis consumptionem & administretur.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum non est in usu sedm autem in rectionē Mef. oleum de hasce est oleum fericinum, & sic credo. quia. Io. Serap. in suo antidotario inquit, oleū alsek. in fine descri ptionis ait, coquantur donec consumetur aqua, & remaneat oleum fericinum, & ibi docet ipsum facere duobus modis, ut facit Mesue. Aui. in. 5. can. habet tres descriptiones. Mesue uero dicit. R. hasce. Io. Serap. dicit alsek. Aui. hasce. s. hæc tria idem sunt est thymus: si autem nō, est hyssopus usualis. nam in isto oleo primo hēt hasce, inferius habet extremitatem hasce. i. thymi: & sic quidam sapiētes dixerunt quod per hasce intelligit hyssopus: & per halacæ thymus. Mesue ponit in alia descriptione penidios, unde Io. Serap. inquit: In descriptione alia non dicitur uaccinum, & dicitur quod illud accipitur ex penidis.

APPENDIX.

Ex uaria, ac obscura huius compositionis inscriptione, sponte studiosis uaria, ac nō obscura olea sese offerunt. Cum hoc oleum nonnullis de hasce, ex thymo nempe, seu de ha, lasce, ut ex hyssopo dicamus, Arabice inscribatur, aliis (for san rectius ut autumant,) de Alhasce, ac si ex Tribulo dixē rimus, nepe terrestri. Vñ, ne augurium potius quam iudicium, quæ nam exhibitis uerior existat, asseramus, non iniuria poterit q; iuxta modū a Mesue iam expositū, vñ ex thymo, vñ ex hyssopo, vñ ex tribulo oleū ppulchre sibi parare.

XXIX.

SICYONIVM officinis de cucumer asinino. R. Succi cucumerum eius completorum olei sisāmini ana. vnc. vi. coque usque ad consumptionem succi & utere.

Modus alius. R. Succi radicum eius, & radicum eius cō tritatum ana. vnc. vi. olei sisāmini lib. i. coquantur sicut diximus, & administretur.

Istud oleū est in usu: maxime apud Mediolanenses. dicitur autē de piperibus propter tria genera piperis quā in eo ingrediuntur, & sunt propter albi dicti leuci, nigri dicti melani longi dicti macri. & hæc tria genera nota sunt apothecariis, sed apud medicos non ita; q̃ opinio multorum medicorum est quod piper albu sit cataputia, aut granum benū, quod non est credendum. Et ego summe admiror qđ doctores supra-

dicti in descriptione olei de ben fuit decepti in rectam facili cum habeant capispeciale & clarissimum a Sera. qui hæc genera apertissime declarat.

Hæc humiditas. i. recentis & est thymus, nam inuenitur in aliquibus codicibus Mef. ubi dicitur hæc humiditas, ergo hæc est uerus thymus: sicut apparet apud Ser. in ca. de thymo quidam dixerunt quod est hyssopus: Deus uero nouit.

Oleum de cherua est olei quod fit ex femine, quod dicitur granum regum siue cataputia maioris apparet supra.

Emina secundum Aui. in 5. can. in ca. de ponderibus emina italica & ægyptiaca est. 3. xvi. & emina romana est. 3. xx. Papias ait: Emina appendit librā unam quæ geminata sextarium facit habet drachmas centum.

Tapsia secundum Dioscoridum tapsia, quia primo in insula Tapso fuit inuenta ab Aui. vocatur thexixie, & dicitur quod est gummi ruthe agrestis, & secundum Halabatam tapsia est ruta agrestis. Auer. in 5. colligit: inquit: Tapsia. i. gummi ruthe agrestis em quosdam medicos. quidam prauè crediderunt quod esset rubea tinctorum: sed non recte. uerum est quod tapsia secundum Simonem est autoritate Pauli est rubea tinctorum sed aliud est. Aui. in 4. can. in ca. de cura alguada & albas in quodā medicamen habet tapsiam & rubea tinctorum: quod non esset si essent idē. sunt ex hominibus qui loco tapsie ponunt rutam sylue. & sunt ex hominibus qui ponunt casiam ligneam, & sunt ex hominibus qui ponunt lepidium, quod est genus eruce siue seitaragi indi.

Sextarium secundum Aui. in 5. can. in ca. de ponderibus est 3. vi. idē dicit Genitilis super illum passum. Moder. uero generaliter opinatur quod sextarium sit pondus duarum librarum cum dimidia: maxime quando inuenitur sextarium unum uel aqua uel succi. si uero inuenitur sextarium. cinnaomoi aut piperis intelligitur pondus drachmarum sex. in hoc sunt diuersæ opinionis.

XXXIII.

DE EUPHORBIO.

Re. Euphorbii. 3. s. olei de cheiri. i. olei quod fit ex viola citrina. 3. v. uini odoriferi 3. v. decoq. usque ad vini cōsumptionem & utere.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu. Mef. ponit quod istud oleum pot fieri duobus modis, & sic est, quod sunt ex hominibus qui faciunt ipsum secundum primum modum, & sunt qui faciunt ipsum secundum alium modum. uerum nostri doctores magis laudant secundum modum quam primum. Aui. in 5. can. habet unā aliam descriptionem, quæ uidetur esse eadem cū secunda descriptione, & sic aliam describam.

XXXIII.

DE EUPHORBIO, secundum alium modum.

Re. Staphisagris, conditi an. 3. iiii. pyrethri. 3. vi. calamenti montani, succi. 3. xii. colli. 3. x. calthorei. 3. v. tere decoque in aqua uitreo cum uini odoriferi lib. iiii. s. postquam infusa fuerint in eo diebus duobus usque ad mediū uini, deinde frica manibus in fricatione uehementi, & cola & fundes super ipsum olei de cheiri. i. de uiola citrina, aut olei fissimani lib. i. s. & decoque usque ad cōsumptionem uini. deinde proice super ipsum euphorbij recentis, & albi. 3. iiii. trita cōtrito multima, & coquatur cum eo & utatur.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleū est illud quod magis laudant nostri doctores. Euphorbium uero est gummi satis notum.

Staphisagris secundum Aui. in 7. can. in qua passa montana & est granum capitis, & in monte Libano inuenitur de ea plurimum & est granum nigrum: sicut cicer nigrum, & hæc ab aliquibus dicitur pedicularis, eo quod pediculos occidit.

Condex. 3. conditi. & est id quod Dioscoridus uocat structum: & sunt radices quibus utuntur lanarii ad suffumigandum lanas sunt intentionem Dioscoridi ego nunquam potui scire quid esset: uirtutem etiam habet ad prouocandum sternutationem, & propter id multi crediderunt ipsum esse elleborum album, sed non recte sicut patet per Dioscoridem propterea Macer uocat id structum & inquit, quod non minus prouocat id sternutationem quā elleborus albus. Dioscoridus aut Flo. in lib. ii. in ca. de

cura scrophularū inquit: Cōditi. i. elleborus albus, quod falsum est, idē dicit. Auer. in 5. col. uide etiam Aui. in 4. can. in fen. vi. in summa secūda uenientū ex platis quæ ait: de cōditi & elleborus albo. ergo idē non sunt. uerū hodierni putant ipsum esse speciem ellebori, & loco eius pot poni elleborus eo carētes, & nullo modo audeant huiusmodi interius propinare.

APPENDIX

Quoniam GALENVS passim pro uariis medendi scopis euphorbium oleum preparat, ueritatem quam simplicissimè. i. Medicamentorum κατὰ τὸν, iuxta calcem, in hunc modum componit.

Nimidium ad librā olei unam, euphorbij uncia dimidia, si ualidum euphorbium existat. Verum in corporibus molli, ac tenero seu su præditis, etiam si minus quam dimidium uaciam inieceris, melius res procedet.

XXXV.

VULPINVM.

Re. Vulpem integrā cuius interiora sint euulsa & pone in uase & funde super ipsam aqua fontium, & aqua maris ana. 3. i. Kist. i. olei antiqui clar. Kist. ii. s. decoque lento igne cum salis. 3. iiii. usque ad aquæ cōsumptionē: deinde pone in uase & proice super ipsam herba anethi, & alace. i. thymi, ana: lib. i. & funde super ea aqua dulcis, ubi coctus fuerit ex eisde herbas ana manipulus unus, decoq. sicut prius usque ad aquæ cōsumptionem, & admi. i. streetur, est. n. mirabile, & quæ præter oleū coquitur uulpes in aqua fontium & aqua salia (& sit aquæ quantitas multa) cum eisdem herbis, & admi. i. streetur lauando in tina & est efficac. hoc quoque non præmittimus, quod uulpes tandiū debet coqui siue in faciendo oleū siue aquam ad abluendum, donec sic cocta sit ut eius artus omnes laxentur & dissoluantur.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est multum in usu: Io. Angli. in ca. de dolore iuncturam inquit: Oleum vulpinum est medicamen vltimum ad atreticam & podagrā & dolorē renum & docti quæ ita fit ut docet. D. Mef. Petrus Argil. in cap. de podagra siue gutta frigida ponit unguentum de uulpe ipsius Mef. Re. vulpem integram euulsis interioribus, & pone in uase cū aqua salia uino & oleo, & ultra hoc pone in oleo nase saluam, rorem marinum, iuniperum, anethum, origanum, & maiora nam: oia ista bulliant, ut docet ipse ibidē. miror ob talia uerba. Nam primo Mef. non ponit unguentum de uulpe. Preterea de scriptio olei vulpini non est eadem: sed uide supra in unguento de uulpe, uulpes ihero apud Arabes dicitur thaleb. Gal. narrat uirtutem ipsius dicens, quod oleum in quo decoquitur uulpes cōfert multum doloribus iuncturarum, & multi medicorum ponunt ipsam viam in nase cum oleo & decoquunt: quidam ponunt eam mortuam, sed hoc oleum non est plus resolutiuum, quam oleū in quo coquitur adebit: nam quando coquitur in oleo est uirtus eius resolutiua multum, & nos quidem diximus quod medicinæ quæ hoc faciūt attrahunt ab interioribus corporis.

APPENDIX.

Vulpes in oleo apud GALENVM. xi. simpliciu, totæ coquuntur, nonnullos quoque sic Arthriticos curare uoluit, partem uiuas uulpes in lebete in gentem iniicientes, partem etiam mortuas, atque hyenam. tota oleo ut uulpes, in codā non inefficacius idem posse affirmat, quod etiam Aetius lib. ii. in ca. xciii. his uerbis abunde prosequitur.

Hyena uiua in oleo cocta, uelut de vulpe (eadem quæ iā ex Gal. habuimus, ad uerbum explicans), dictum est, oleum discussoriū efficit. Arthriticis utilissimā. Vnus fiat ueluti de vulpe indicauimus, in lib. ii. ca. clxiii. nempe.

XXXVI.

DE SCORPIONIBVS.

Re. Scorpiones circiter x. uel plus uel minus secundum quantitatem eorum & pone in uase uitreo, & funde super eos olei amygdalarum an. lib. ii. & stringe caput uasis, & dimitte in sole diebus xxx. deinde cola & utere.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu. Mef. docet ipsum componere duobus modis. Et sic sunt ex hominibus qui cōponunt ipsum secundum

128

Ex hyena oleum arthriticum.

cundum primum modum, sed nostri doctores magis laudent secundam descriptionem quam primam, & sic illam describā.

XXXVII.

DE SCORPIONIBVS, secundum alium modum.

℞. Aristolochiæ rotū, gentiane, cyperi, corticū radicis caparis, ana. ʒ. i. funde super ea olei amygdalarum amararum, Kist. i. & pone in sole. xx. diebus: deinde proice super ea ex scorpionibus a. x. usque ad. xv. & iterum sringe orificium uasis, & dimitte in sole per dies. xxx. deinde cola & referue tur est enim mirabile.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum maxime secundum istam descriptionem est illud quod magis laudant nostri doctores, uide etiam apud Rasim in lib. diuisionibus in ca. medicinarum urinæ vñā descriptionem quæ eadem huic est. Io. Anglicus in cap. de lapide renum habet hanc descriptionem. Scorpiones autem satis notū sunt supra narraui de ipsis in ca. de tyriaca quæ ualet contra scorpiones.

XXXVIII.

EX VIPERIS, uulgo de Serpentibus.

℞. Ex serpentibus uigris circiter lib. ii. & sint serpentes nigri integri, & funde super eos olei siliamini Kist. i. s. & pone in uase terreo uitreato stricti orificiū, & sigilla orificium uasis, & decoque lento igne usque dum dissoluantur serpentes, & caueat sibi operator a uapore eius, & cum coctum fuerit dimittat refrigerari, & recondatur in uase uitreato, & admixtetur liniendo cum penna.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu. Serpens autem accipit nomē quia occultis accessibus serpit. Aui. in. ʒ. can. habet unā aliā descriptionē quæ est similis huic. idem habet Leona. de prada palea in ca. de fistulis. Gilbertus de Anglia in ca. de paralyti habet unam aliam descriptionem, sed non est simili: isti species autē serpentū multæ sunt. Aui. in. 2. can. de serpente facit cap. sed ibi non narrat eius species. uerū idem in quarto in fen. vi. in ca. de speciebus serpentū de ipsis loquitur & narrat de morū basilicū. i. reguli quæ habet coronā: cuius lōgritudo est duorum palmorū, & caput est acutū ualde & oculi eius sunt rubei, & color eius ad nigredinem, & citrinitate decliuis est, qui adurit totū super quod incedit, & non oritur in circuitu cauernæ eius aliquid, & cum apponitur habitatio eius auis, moritur ipsa auis, & sem plurimū qui tangit eum cum uigra moritur, & est mediante uigra. & propter illud iam tetigit illum miles quidam cum lancea sua, & statim mortuus est miles, & animal eius, & tetigit ipse la biū equi, quare mortuus est equus, & miles, & hi quidē serpentes multiplicauerunt in terra arab, & nubæ. uerum de numero serpentum primi ordinis reponuntur species quædā draconis interfecti nūi sicut basiliscus statu eorū, de quorū numero fuerunt dracones, de quibus recitat Arist. in lib. de proprietatibus elementorum, & plantarū, quod tpe Regis Philippi erat in duobus montibus inter quos mōtes erat posita uia ducens ad ciuitatē, & quotquot per illā uia transibant quā erant inter illos duos montes moriebantur, & nunc Socrates ingeniatu est ad mortem ipsorū, & fecit fieri equeam uitream, & intrans in eam illic perrexit, & uidit illos quorum statu insciebatur ærper eius respirationē, & contactum insciebant transientes, & moriebantur. dicunt etiam quidam, quod regulus serpens interfecit suo sibillo, & suo uisu. regulus etiam est auis paruissima omnibus nota nullius effectus ad opera medicine.

XXXIX.

DE RANIS.

℞. Ranarum aquaticarū capita circiter ʒ. vi. & funde super ea in uase uitreato olei siliamini Kist. i. & obtura orificium uasis. decoq. sicut diximus in oleo. Serpentine ex multis alius rebus sunt olea secundum hūc modum: quæ rerum ex quibus sunt uerum habent, de quibus multi ex scriptoribus scripserunt in quibus sermōnem non extendimus.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum non est valde in usu. Io. Angli. in ca. de dolo

re iuncturarum habet descriptionem huius olei, species autē ranarū multæ sunt Aui. in. 2. can. de ipsis loquitur, sed non di stinguit species earū, uerū idem in. 4. can. in fen. vi. in tract. 2. de uenenis exhibitis quæ sunt ex animalibus loquitur de ranis lacunalibus uiridibus, & marinis rubeis, & de ranis citrinis, & ibi loquitur de uenenositate quæ est in ipsis. nam sine dubio omnes ranæ sunt uenenosæ. Serap. in cap. de ranis inquit ex autoritate Dioscoranæ quæ sunt in paludibus quādo coquuntur cū sale, & oleo, & administrentur in cibo sunt bezaar uenenis, nam bezaar est tyriaca contra uenenū bezaor est lapis contra uenenū. Isid. in cap. de piscibus inquit. ranæ garrulitate uocant eo, quod circa genitales strepunt paludes. & sonos uocis importunis clamoribus reddunt. ex his quædam aquaticæ dicuntur, quædam palustres quædam rubetæ ob id quia in uepribus uiuunt grandiores cunctarum: aliæ calamites uocantur: quoniam inter harundines, & frutices uiuunt, minoræ omnium, & uiridissimæ, & sine uoce sunt, agri dule ranæ parue in fisco, uel agris morantes unde, & nuncupant, negant quidam. canes latrare, quibus in ossa rana uiua fuerit data.

XL.

DE OVIS.

℞. Vitella ouorum elixatorum circiter. xxx. & comminue ea manibus, & pone in sartagine lapidea, & frige super ignem mouendo cum ligno, aut ferro cocleari, donec ru bescant, & resoluatur ab eis oleum, & tunc exprime ea cum cocleari, & manabit abunde.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum non est in usu: secundum intentionem Mes. potest componi tribus modis. Leonard. de Prada palea in cap. de fistulis habet etiam hanc descriptionem.

Quorum species sunt plures. Aui. in. 2. can. ait oua nota sunt, & meliora ex eis sunt oua gallinæ recentia, & melius quod in eis est, est uitellus, & melius eorum artificium est, ut non cum alio congelentur. Gale. autem inquit. oua quæ eligimus sunt oua gallinarum: non ergo oportet, quod narremus naturam aliorum ouorum.

XLI.

DE FRUMENTO.

Pone frumentum super laminam ferream ignitam non multum, & comprime, & manabit oleum. secundum modum ponatur frumentum excorticatum in uase sublimationis, & fiat sicut dicemus in oleo Philosophorum.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est in usu Leonard. de Prada palea in cap. de fistulis habet huius olei descriptionem. Frumentū. i. uitellū. Isid. ait: frumenta sunt proprie quæ arillas habent, fruges autem reliqua frumenta autem uel fruges a fruendo hoc est a uescendo dicta sunt. nam frumen. dicitur summa pars gualæ primitiæ quæ sunt de frugibus percipiuntur. triticum uel a tritura dictum, quod purissimum horreo condatur, uel quia granum eius commolitur, & teritur.

XLII.

SINAPINVM.

Fuit oleum de Frumento.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est in usu: secundum intentionem Mes. eius operatio est sicut operatio olei de frumento. ego autem uidi fieri oleum de sinapi sic: sic oleum de amygdalis sinapis autem dux sunt species. nigra, & alba nigra autē est illa quæ intel ligitur quando simpliciter ponitur, & utaq; nota est.

APPENDIX.

Sinapinum ficitur quem beatus Aquarius paratur.

Sinapi fracto, aqua feruenti persuso, dein additur oleum & simul exprimitur.

Facit ad inueteratos dolores, ex alto id in infestat euocans.

XLIII.

DE VINIPERO.

℞. Ex lignis iuniperi quātūcūq; sufficere ntem, & scinde in frusta, & imple ex cis doliū magnum ueruatū interius, & curius orificiū sit arcū, & fac fontem aquæ, & præpara parietes Lumi. Ma.

eius cum terra figuli, deinde pone ollam vitream ex directo infundito foueā habentem orificium amplum, & cooperiatur lamina terrea subtili perforata foraminibus multis sicut cribatorum tritici ita quod lamina undique ollæ orificiū cooperiat deinde super laminam præparet orificium dolii ex inuerso, & p. præparet cum terra figuli, ut nihil ex utrifque orificiis respiciat: post illud accende ignē super totū corpus dolii, & dimitte ardere sic per horas duas, manebit. n. ex arte ac oleū, quoddam recondere, & administrare ubi oportet.

COMMENTA. MANLII.

Titulus oleum est in usu Leonardus de Prada palea in ca. de fistulis, habet etiam hanc eandem descriptionem.

Iuniperus autem apud Aui. est cupressus sylvestris, & eius quidem alia est parua, alia magna, & arbor multiplicata in terris Romanorum, & occidente, & assumuntur ex ea ligna ad fabricas magnas, & granum ipsius apud eundem uocatur abel, sed ille textus est corruptus: nam abel est fauina quæ uocatur bracteos, & sic libene legis illud cap. de abel apud Aui. videbis quod est falsum. nam Ser. in ca. de iunipero inquit ex autoritate Dioscoridi iuniperus est una ex speciebus cupressi masculi, & oēs sunt quatuor species, & sunt iuniperus. i. pinus indus, & abel. i. fauina, & serbin, & gar: uidelicet iuniperus quæ nominatur arconas, & gūmi ipsius secundū Mod. opinio est sandaracha, seu uernix scriptorū.

Terra figuli. i. terra feu argilla. unde uasa sunt. Isidor. in cap. de pulcribus, & glebis terre inquit. Argilla ab argis uocata apud quos primum ex ea, uasa confecta sunt. Creta ab insula creta ubi melior est. Io. Angli. in ca. de sterilitate ait. Argilla Anglicæ clei, & est terra rubea uiscosa & tenax.

XLIII.
FRAXININVM.

Valeat sicut oleum de Iunipero, & conferat spleni, & sit sicut illud.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum apud nos non est in usu.

Fraxinus autem est arbor satis nota, eius semen apud Modernos dicitur lingua auis de fraxino: apud nostros doctores reperitur uariæ opinionis, quidā uolunt (ut Mattheus Sylua,) quod hæc arbor sit illa quæ ab Aui. in. 2. can. dicitur arbor cemicum, sed non recte: verum Mattheus Sylua inquit dirdam vel dirdar est arbor cemicum sive fraxinus quod falsum est. nam dirdar est pelea, & pelea apud grecos est vimus & sic est, quod dirdar sive arbor cemicum est ulmus: fraxinus autem secundum Isid. uocari fertur quod magis in asperis locis montanisque fragis nascitur. hinc per deriuationem fraxinus sicut a monte montanus.

XLV.
DE GAGATE, sacrum.

R. Ex lapidibus gagatis quantum uis, & fac ex eis sicut diximus in oleo de iunipero. secundus modus est cum opere sublimationis, ut dicemus.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu: secundum intentionem Mesue est oleum quoddam ex lapidibus qui gagates dicuntur, & ipsum est oleum sacrum.

Gagates autem secundum Dio. est lapis qui inuenitur in licia circa ripam quæ ganges appellatur, color niger, & aridus, & quasi luminosus mediocriter, leuis ualde. Et est melior qui facile exarferit igne: & odorem asphalti habens. secundum Plin. optimus est qui ad lucernam accenditur. quidam extimauntur ipsum esse oleum petroleum, alii dixerunt, quod est carabæ, sed aliud est.

XLVI.
PHILOSOPHORVM.

R. Ex lateribus antiquis multæ antiquitatis, & propriæ factis & terra rubea, & cōmune eos in frusta, & accende super eos ignem carbonū sine fumo uosque dā inflammantur, & rubescendo deinde submerge eos in cōca plena oleo de alchechil aut oleo antiquo claro vñ: dā imbibantur imbibitione ultimi ma & pone in cazola, & permittit exiccare per se, post illud

commine eos cōmīnutione ultima. & pone in cazola, & figilla orificiū cazolę cum orificio alēbici, & figilla cum luto alchymistarum, & pone in fornace, cuius ignis sit prunæ & coquatur vñ: dum distillet oleum, & tu ordinabis vas sub rostro alembici in quo fluat oleum, deinde reconde illud & stringe orificium uasis in quo recondis, & administra ubi oportet, & quanto antiquius tanto melius.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est in usu, sed oportet ipsum fieri cum bona diligentia: secundum intentionem Mesue est oleum in quo concordati sunt antiqui, & uerificauerunt esse oleū secretorum iuniorum. Alii illud oleum sapientie dixerunt, & alii oleum benedictum, & alii diuinum, alii uero sanctum, & a pluribus oleum perfecti magisterii uocatur est, ipse Mesue in sua distinctione de oleis ponit duas alias descriptiones olei quæ uocantur oleum benedictum, & sunt oleum camæmillæ, & oleum nardinum, & hoc quia sunt olea multæ utilitatis, sed propriæ oleum benedictum est oleum philosophorum. nam uidet apud Rasim in suo tract. de oleis qui habet oleum benedictum, & est idem in fine uero eius descriptionis inquit, hoc oleum est de secretis philosophorum, & ualet sicut oleum balsami. Liber qui dicitur Bulchafis. i. Seruitor in tract. 2. habet unam aliam descriptionem quæ eadem est cum ista. uerum Mes. dicit quod accipiantur ex lateribus antiquis multe antiquitatis. Albulchafis autem inquit.

Accipe lateres rubeos nouos quos aqua non tetigit. Leonardus de Prada palea in cap. de fistulis, habet unam aliam descriptionem quæ est similis huic quam ponit Mesue Io. Anglicus in cap. de dolore iūcturarum ait petroleum, & est oleum benedictum factum de lateribus, tamen foetidum est, sed summe penetratium.

Oleum alchichil. i. oleum quod fit ex floribus rorifmarini. Bulchafis. i. Seruitor habet oleum uetustissimū. Leonardus habet oleum oliuæ, uel oleum antiquum clarum, uñ: uero componere vis cum oleo de alchichil, accipiantur florum alchichil. rorifmarini. 3. x. & proiciantur in li. i. s. olei oliuæ, aut salsamini & dimitatur soli donec accipiat uirtutem rorifmarini & postea coletur & administratur.

EX PETRO DE EBANO.

XLVII.
BALSAMINVM, in capitulo de ægritudinibus cordis.

R. Myrrha electæ, aloes heparici, spice nardi, sanguinis draconis, thuris, mumie, opoponacis, bdellii, carpopalami, armoniaci, * farceocolle, croci, maltici, gummi aro. storacis liquide. † ana. 3. ii. laudani electi, * succi castorei ana. 3. i. s. musci. 3. s. cerebenthinæ ad pondus singularium rerum misce omnia hæc puluerizando cum terebentina, & pone totum in alembico, & ingeniose distilla. est enim ars sicut de aqua rosata, & postea usui referetur.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est illud quod meo tempore uidi componere, & uidi ipsum poni in tyriacæmithridato: diacurcum a. u. rea alexandrina ac aliis confectionibus in quibus ingredi balsam: uerū supra fuit posita alia descriptio olei qd ex ligno balsami manat, & illa est nobilior ista, sed quia illud apud nos non potest fieri nostri doctores cōpulerunt descriptiones olei cum tanta diligentia quod potest poni in omni loco ubi ingrediatur balsamus, & sic ista descriptio magis est laudata qd aliæ descriptiones sīnauerunt secundum istā descriptionem facere uolueris infra apparebit alia descriptio ex autoritate Gulielmi. Placen. & oleum quod fit secundum illam descriptionem potest poni in omni loco ubi ingrediatur balsamus: etiam ostendam facere balsamum artificiosum sicut docet Bartholomæus Montagnana. Succus castorei. hæc litera est corrupta. debet enim dicere sicci castorei, aut castorei sicci: quod idem est. Castoreum autem est animal quod uocatur castor. Gal. in lib. ad Parthenianū inquit. castoreum animalicum quadrupedis & castor appellatur testiculus eius.

EX NICOLA O.

XLVIII.

FRIGIDISSIMUM, uiride.

R. Olei communis albi vel albuli lib. iiii. cimarum rubi tenniramarum, foliorum uoluarum, uermicularis, cimbalaria: temperuiuz, solatri, foliorum papaueris, iniquiani, mandrago: æ crassula maioris, portulacæ, lactuce, bardanæ, omnium ana. ʒ. iiii. hæc oia simul terantur, & in supradicto oleo mittantur per tres dies post tres uero dies super ignem ponantur & usque ad spissitudinem bulliant postea colentur bene expressa cum panno: deinde iterum in stannato vase ponantur super ignem, & bulliant ad succi consumptionem, tunc ab igne deponantur, & residere permittantur, & illud clarum quod supernat colligatur, & vsui referretur.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum non est in usu: dicitur oleum frigidissimum viride ab herbis frigidis, & uirius quæ in ipso ingrediuntur, & sic ipsas herbas quæ difficiles sunt declarabo.

Vermicularis secundum Compositorem est semperuiua minor, aut portulacæ agrestis, in rectis domorum nascitur, secundum autem Lumen maleuens est crassula: quod falsum est: quia in isto oleo utrunque ingreditur. Macer ait. Semperuiua minor species est istius herbe. Quam semperuiuam dicunt: quoniam virescunt omni tempore. Barba iouis vulgari more uocatur secundum intentionem. Macri barba iouis est semperuiua minor. secundum uero Math. Syl. barba iouis est herculis, uel bonades. i. florados citrinum. secundum autem Nicolaum est floccados citrinum seu fantionem marinum. ergo est herba marina. i. herba lumbricorum. Aduertendum est autem quod Macer non dicit ipsam vocari barbam iouis nisi a uulgaribus, sed Deus hoc nouit.

Cimbalaria ymbilicus ueneris scantuncellus idem apud Dioscorid. vocatur cotilidon, siue ut alii cimbalion, siue ut latini ymbilicus ueneris: hæc est herba quæ folia habet rotunda, & lata, quæ in maris nascitur, & est quam nostri rustici herbam Rotundellam vulgariter dicunt.

Crassula maior secundum compositorem est faba grossa, secundum aliquos est semperuiua maior, sed non recte: nam in isto oleo possumus certificari, quod idem non sunt, quia in hoc ambæ ingrediuntur. Crassula uero species tres sunt. maior minor & media. maior uero est herba quæ habet folia uirida, & pinguiora, & uiridiora, & florem tedeum ad albedinem. nascitur autem apud nos iuxta fossos, & hæc est faba grassa. minor uero est uermicularis, & media secundum Compositorem est cardus benedictus.

EX ANTID. IOAN. SERAPIONIS.

XLIX.

DE LILIIS, Purum.

R. Ex liliis albis mundatis ʒ. iiii. s. proiciantur in lib. iiii. olei sisamini, & maneant donec accipiant virtutem liliorum, & coletur & administretur.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum est illud quod apud nos est in usu sub nomine olei de liliis puri: aut simplicis. Guliel. Placen. in suo antiodotario habet. oleum de liliis simplex, quod idem est. supra fuit positum oleum de liliis compositum, quod etiam est in usu, sed non tantum.

APPENDIX.

Hanc nec dum purum, uerum simplicissimam compositionem lib. primo Aëtius hunc in modum bellissime explicat.

Liliaceum, siue sisum, aut lirinon oleum, fit ex albis liliis foliis exanguibus, & solum iniectis, citra ipsorum crocum filamentum, ad sextarium Italicum olei dulcissimi potere sextantis, siccare autem etiam hæc oportet in ymbra per diem, ac noctem. Deinde uas inicere, & diligenter obturata insolare per triduum. Deinde excolare: & alium sextantem foliorum immittere prioribus uidelicet uelut inutilibus eiectis. Ternis enim alterationibus folia inicere expedit, quare ubi rursus per triduum insolaueris, rursusque excolaueris, tertium sextantem liliorum immittes similiterque per triduum insolabis, & sic excolatum in umbra repones. Siquis enim mox a principio fecerit uicem foliorum immittit

tat putrefacta oleum foetidum reddent.

L.

DARSISAHAN.

R. Selib. & est darsifahan. ʒ. vi. calix lignæ ʒ. viii. costi. ʒ. iiii. cinnamomi. ʒ. v. calami aromati. ʒ. ii. olei lib. vii. s. decoquatur omnia bene lento igne, & coletur, & administretur.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum: non est in usu Darsifahan uero est arbor quæ apud Dioscorid. vocatur aspalum: ut dictum fuit in confectione de chifodea.

EX RASI.

LI.

FOENUGRÆCI, in tractatu de oleis.

R. Foenugraci lib. i. elaterii lib. viii. cyperi lib. ii. calami aromati. lib. j. pone in oleo per decem dies quotidie moue ter, & ex prime oleum & referua.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum non est in usu. Dioscorid. habet unam aliam descriptionem sub nomine olei telinidis, sed non est simile huic.

Foenugraci farinam multi buceron, aut egloceras: aut loron appellauerunt: uide apud Galienum octauo simplicium, quod telinum est foenugracum, & ista nomina non sunt referenda farinæ, sed ipsi foenugraci. buceru enim sonat bouis cornu egloceron uero capri cornu. nam semina ipsius in cornu culis similibus faseolis sunt, & hoc semen notum est. inuenitur apud nos quædam herba quæ multum sibi assimilatur in foliis & in reliquis, & hæc apud quosdam dicitur capricornu, & de hoc semine multi falsi herbarii vendunt aromataris ignorantibus loco foenugraci, sed errant.

Electuarium huius elaterii, ut apud Dioscorid. & est succus cucumeris asinini. uide supra ubi posite fuerunt pilule de elaterio & ibi melius ostensum fuit.

LII.

EX SALIVNCA, vulgo salmenra.

R. Salmentam, & pista, & pone in aqua, coque & pone oleum, & coque ad ignem & serua colatum.

COMMEN. MANLII.

Istud oleum non est in usu. secundum intentionem Rasis est oleum de salmenta, sed textus est corruptus. debet. n. dicere oleum de saluincia. i. spica celtica. secundum Mathæum Syl. sed non recte: quia Dioscorid. facit Plin. de saluincia speciale faciunt cap. & est aliud, sed secundum plurimum loco saluincæ spica celtica ponitur, & sic hodie herbarii vendunt apothecariis saluincam pro spica celtica: quæ idem non est, ut dictum fuit: tamen potest poni loco eius, licet fit debilior. hanc teutonici, & alia gentes apud quas nascitur saluincam uulgari nomine appellant. nascitur apud teutonicos plurima in alpinis Italiæ, & in montibus Pirencis, in desertis, & aspersis summitatibus montium, & est cibis caprearum liliue damarum.

LIII.

DE OLEANDRO.

R. Succu oleandri lib. i. rosarum lib. s. olei omphacini lib. ii. coque donec consumatur succus cola, & serua, nam ualeat scabiei, & auferat eam omnino.

COMMENTA. MANLII.

Istud oleum non est in usu.

Oleander autem fm Aulian. 2. can. est syluestris, & fluuialis, & ipse computat ipsum inter species uenenosorum. idem in quarto in fen. 6. in cap. summa. 2. uenenorum ex plantis inquit oleander plurimum interficit homines, & animalia, & hæc planta est quæ Dioscorid. nereon uocat. hæc plura nomina habet. nam ab aliquibus dicitur nereodendron, & ab aliis redodendron, & ab aliis lorandru, & ab aliis rododaphne & ab aliis nereon. eius folia sunt similia amygdalæ. sed maiora, & pinguiora, & florem habet similem rosæ. in locis, maritimis nascitur. Leona. de preda palea, in ca. de pruno, & igne persico inquit oleum de dandro. i. de oleandro.

Oleum omphacini. i. oleum de oliuis non maturis. Auic. in. 2. can. in cap. de oliuis inquit oleum quæ exprimitur ex oliuis ultimæ maturis, & oleum omphacini est illud quod expressum est ex immaturis & quæ exprimitur ex oliuis ruri-

Lumi. Ma.

Q 2

SECTIO XV.

beis mediis inter immaturas, & vltime maturas.

EX ANTIDO. AVICENNÆ.

LIIII.

DE VS NEA.

℞. Vñez sextaria. v. costi. ʒ. x. casia lignea. calami. aro. an. ʒ. iii. marmacor. ʒ. ii. storacis calamit. ʒ. v. olei myrtini li. i. s. tetantur medicinz, & infundantur in aceto, & dimittantur tribus diebus continuis, & coquantur cū oleo donec confumetur acetum, & remaneat oleū, & coletur & recondatur.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum non est in usu, de usua uide in electuario de vñea: quia ibi ample determinatum est.

Marmacor. i. melissa, quidam crediderunt esse marrubiū, sed non recte. nam vide Sera. in ca. de melissa qui inquit. be derangiz. i. curungē, & dicitur marmacor. i. melissa. Auic. in 2. can. in cap. de maru. inquit Maru dicunt indi, quod sunt species plures. est enim quædam species eius quæ est boni odoris, & est marmacor. ibi ipse Auic. in plures species distinguit. Leonar. de preda palea in cap. de ademenul inquit. semen almaru id est semen buglossæ siue linguz bouis sine dubio almaru est eius species, sed pro marmacor intelligitur melissa siue ozymum citratum.

EX IOAN. ANGLICO.

LV.

De Staphisagria, in ca. de cura tinnitus Aurium.

℞. Staphisagrie. ʒ. s. coquatur in succo rittæ, vel in aqua fœniculi, deinde apponatur oleum laurinum, uel nardinum ad pondus. ʒ. vi. vel lib. i. coquatur vsq; ad cōsumptionem quartæ partis, & coletur, & fiat oleum de Staphisagria.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum nō est in usu. Staphisagria apud Auic. est vna passa montana & est granum capitis. Diosc. staphisagria quā latini pediculariam vocant, & nominatur hoc nomine quia interficit pediculos, & lendines. quidam vocant ipsam caput purgium, & quod caput a pediculis purgat.

LVI.

DE LAUDANO, in lib. v. capitulo de modo abluendi oleum.

℞. Laudani. ʒ. i. olei laurini lib. i. conficiantur simul, & est oleum de laudano simplex q̄ valet in confortatione stomachi mollificati, & capillos cadentes decinet.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum non est in usu. Idem in cap. de lepra habet hoc oleum. Laudanum autem est notum.

EX ANTID. BARTH. MONTAG.

LVII.

BALSAMINVM.

℞. Terebentinz lib. i. thuris albi. ʒ. iii. gūmi elemi. ʒ. vi. granorum lauri. i. baccarū lauri. ʒ. iii. masticeis, galangæ, garyophyllorum, cinnamomi, zedoariæ, nucis muscatæ, cubebz ligni aloes bene triti an. ʒ. i. omnia simul mixta ponantur ad distillandum primo cum lento igne, & prima aqua dicitur aqua balsami iterum pone aliam, & sic fac ter, & tunc veniet balsamum in omni probatione, sed quanto plus distillatus fuerit tanto erit fortior, serua in vase bene obturato.

COMMENTA. MANLI.

Iste est modus artificii balsami secundum quem secundū intentionem Bartholomei veniet balsamum in omni probatione prout balsamum naturalis. verum supra est possum oleum balsaminum quod apud nostros doct. satis est laudatū. si autem illam descriptionem facere nolueris, fac istam Barthol. si autem istam Bartholomei facere nolueris, fac descriptionem Guliel. de qua infra.

EX GVLIEL. PLACENTINO.

LVIII.

BALSAMINVM.

℞. Myrrhæ, carpopallami, nucis indæ an. ʒ. s. hypericon. ʒ. ii. terantur grosso modo, & miscantur cum. ʒ. v. olei, vel. ʒ. i. s. largatis, & in fine addatur gra. v. musci. & gra. iii. ambre.

& ʒ. i. olei de lateribus hoc enim loco b... poni in omni loco, facit enim operationes, vt balsamum.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum maxime secundum istam descriptionem potest poni in omni loco ubi balsamus ingreditur, & secundum intentionem Guliel. facit operationes, ut balsamum, verum ipse Guliel. describit duas alias descriptiones olei quod ponitur loco balsami, sed secundum intentionem suam ac Mo der. doctorum ex illis tribus hæc est nobilior: sed ipse Guliel. non ponit qualiter ipsum oleum debeat componi, uerū est, quod in secunda descriptione melius docet, & est quod omnia bene terantur, & malaxentur adinuicem in mortario, & ponantur in vase alembici, & distillentur ut aqua rosacea. Lumen malelucens habet unam descriptionem secundum intentionem Guliel. sed ipse Guliel. non scripsit talem descriptionem in suo antidoto.

Alargatum. i. largatum, & est vulgare uocabulum, sed a latinis terebintina nuncupatur, & non resina. nam in multis locis ubi ipsa inuenitur uocatur largatum.

Oleum de lateribus. i. oleum philosophorum seu oleum benedictum. eius enim descriptionem describit idem, & est similis descriptioni quæ inuenitur in antidotario Mesue: de qua supra.

EX LEONAR. de Præda palea.

LIX.

DE CALCE, in capitulo de curatione corruptiouis ossis.

℞. Calcis vix unum frustum integrum antequam extingatur, & infundatur in oleo communi donec extingatur, & calx in puluere reducatur. & postea pone in alembico uitreo & distilletur, & emanabit oleum, quod uocatur oleum calcinum.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum non est in usu: tamen secundum intentionem Compositoris valet mirabiliter in illa materia.

Calx secundum Sera. ex autoritate Diosc. quædā est quæ fit ex conchiliis marinis, & quædam quæ fit ex lapidibus, & quædam fit ex marmore, quoniam hæc comburuntur in igne donec sunt alba interius, & exterius, & sunt calx, sed melior omnibus est calx quæ fit ex marmore.

EX PETRO ARGILLATA.

LX.

DE TARTARO in cap. de his quæ abstergunt faciem.

℞. Tartarum puluerizatum, & funde in aceto postea ponatur in pano lini: deinde ponatur in stupis balneatis, & ponatur sub cineribus, postea ponatur in scutella vitreata per tres dies ita tamen quod scutella sterpalea, & distillabit quædam humiditas magna vergens in subruffum, & hoc est oleum de tartaro.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu: maxime apud prostitutas, eo quod ex ipso liniant faciem. Dinus Flor. in suo antidoto. habet hoc: sed lumen tenebrosam inquit. quod hoc oleum est magistra le quod salum est.

Tartatum uero secundum Nicolaum est lapis vini apud nos vulgariter dicitur greppola. Leonard. de Præda palea in cap. de remotione carnis superflue inquit: pul. tartari. i. fecis vini adherentis parieti uidelicet uasis ubi collocatur vinum quia vulgari sermone dicitur Greppola, de hoc inuenitur album & rubeum, sed album magis ad faciendum hoc est laudatum.

EX OFFICINIS, vulgo Olea magistralia.

LXI.

DE HYPERICO, mirabile.

℞. Summitatum hyperici. ʒ. iii. infundantur in vino odorifero tribus diebus, & noctibus: deinde bulliat in duplici vase in balneo maris bene obturato, & fiat expressio fortis postea. x. toridem hyperici bene cōtusi, & infundantur in supra scripto vino tribus diebus, & noctibus: deinde addant, tereb.

rebenthinæ. 3. iiii. olei antiqui. 3. vi. croci. 3. i. & miscetur, & coquantur in boccia in duplici uase ad consumptionem vini: deinde referetur in uase vitro.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum non est multum in usu. Hypericon autē herba est satis nota, quæ a Dios. uocatur hypericon. Aui. inquit hypericon nominatur arabice alharib, & nominatur syriacè uua demonis. Dios. de hypericon facit tria capitula, & distinguit ipsas species. unum facit sub nomine asquiron. aliud sub nomine corimquod est rapa rustica. aliud de hypericon. sed Sera. in cap. de omnibus loquitur, sed illud hypericon quod uimur habet folia parua, & in eis foramina minuta, & fuga demonum: apud nos in ciuitatibus nascitur.

LXII.

DE SULPHVRE.

3. Sulphuris citrini, rebenthinæ, an. 3. iiii. uini boni. 3. iiii. olei rosati lib. i. bulliant omnia ad consumptionem uini leni igne & fiat oleum de sulphure.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est in usu: maxime apud Mediolanenses. Sulphur citrinum. i. uisuale, quod satis est notum. Dios. dicit sulphur eligendum uiuū colorem habens limpidum, & resplendens, & per lucidum, & sine lapide: quod missum in focum, uiridem, & pinguem colorem facit. nascitur in melsoda & liparia. istud est capitulum de sulphure uino: quod hic non debet intelligi, de ipso uide in dia sulphur.

APPENDIX.

Et sulphure insuper oleum nonnullis sic prope paratur. Sulphur igne non expertum, uel flauissimū inter vrendū fumū crassum remittit, excipiendum campana uitrea, aut siclice, in qua ex uapore crasso oleū concretū distillat in uas planū capax, in cuius medio sulphur uasculo conditū uritur. Aliis trito sulphuri per aquam uitæ incensam gineā conlinitur substantia, post reliquū distillatur, ut oleum philosophorum.

LXIII.

DE CAPPARIBVS.

3. Corticum radicum capparorum. 3. viij. ieros. agni casti, tamarisci an. 3. iiii. olei communis lib. ij. uini. 3. iij. hæc omnia bulliant simul usque ad consumptionem uini, deinde coletur, & referetur.

COMMENTA. MANLI.

Istud oleum est multū in usu. Miror tamen ex quo apud docto. & Moder. & antiquos erat multū uisuale: quod eius descriptio apud authorem authenticū non inueniatur. verū liber qui dicitur Aggregator Paduensis inquit. in illo cap. ubi hoc uale. oleum de capparibus ponit Gal. ad Glauconem. ego autem miratus fui, quia legi omnia cap. Gal. quæ sunt ad Glauconem, & id non reperiri, tamen ista descriptio fuit approbata in duritie splenis: quod multum ualet.

Cappares uis Kappares noti sunt. Sera. autem in ca. de cappare inquit. in fine ex autoritate Rasii. attulit mihi quidam amicus meus confessionem quandam capparum recēdium, & cum comessidem ex eis, induxerunt mihi tenafino nem, & consueui facere clystere ad sciaticam cum succo caprarum, & inuauit multum.

Tamariscum est arbor satis nota. Dios. dicit. myrice. i. tamariscus. Irido. myrice cum latini tamaricaria uocant ex amaritudine nominata gultus. eius nimis amarus est: hæc arbor in solitudine, & saxosa humo nascitur, ex qua etiam arbore maleficiis artis mynisteria. i. odia concitari dicuntur.

LXIII.

MOSCATVM officinis Muscellinum.

3. Olei communis lib. vi. aquæ lib. iiii. folii, spicæ, costi, masticis ana. 3. i. s. storacis calamitæ, croci, myrrhæ, cassiæ lignæ, xylobalami, an. 3. vi. guayophyl. carpobalsami, bdelli 2. 3. iiii. muscellaginis. 3. i. alii dicunt, quod debet dicere muscellaginis. 3. i. neregil. 3. ii. hæc omnia terantur grosso modo & bulliant simul ad consumptionem aquæ deinde coletur, & reponatur in uase bene obturato.

COMMEN. MANLI.

Istud oleum est in usu: dicitur autem muscellinū propter muscum quod recipit. quidā prauè putauerūt hoc esse oleū balaninum. i. de granis been, sed rectè, ille uero qui dedie mihi istam descriptionem istius olei: dixit quod ipsum inueni in autidatorio Galeni, & dixit quod Gale. coposuit ipsum.

Neregil. i. nux indica secundum Sera. in cap. de nuce indica, ut dictum est supra.

LXV.

DE CASTOREO bonum, & expertum.

3. Castorei, storacis, calamitæ, galbani, euphorbii, cassiæ lig. gnez, croci, opoponacis, carpobalsami, spicæ nardi, costi, an. 3. ii. cyperi, squinanti, piperis longi, bracteos, pyrethri, piperis nigri an. 3. ii. s. olei oliuarum lib. iiii. uini albi & boni lib. ii. bulliant omnia simul ad consumptionem uini, deinde exprime, & referetur.

COMMEN. MANLI.

Istud oleum est in usu: ualet enim in omnibus ægri tudinibus, & confert tremori, & tetano, & doloribus neruorum, & iuncturarum.

Castoreum autem secundum Serap. sunt testiculi animalis, quod castor appellatur, uide de ipso in diacastoreo.

Bracteos. i. saunia, sicut apparet apud Serap. in cap. de uinipero. idem est secundum intentionem Macri.

LXVI.

IASMINVM seu SAMBVCINVM, uulgo quam mendose sambucinum.

3. Florum Sambrach. 3. ii. ponantur in li. i. olei oliuarum, & dimittantur in sole per dies quinque: deinde bulliant cum lento igne, postea coletur, & uisui referetur in ampulla.

COMMEN. MANLI.

Istud oleū est in usu. Sambach uel zamach idem est: sed apud Sera. uocatur iefeminum, & inquit. iefemin. i. zambac. quoddam ex eo est album habens florē, & quoddā citrinum & citrinū est minus in caliditate, & siccitate quam album, & similiter est minus in operatione sua, & citrinum reperitur in Babylonia est etiā species alia ex eo cuius flos est celestis coloris: fm intentionē Sera. huius tres sunt species, sed apud nos credo, quod non reperitur nisi album, & a uulgo nominatur gesemin. Bulchasis. i. ferunt in lib. i. ca. de modo colligendi herbas medicinales ait. zambach. i. iefemin. Itē Christoph. Barzicui in cap. de cura cephalæ ait. & Rasius laudat epithima ex oleo sambucino, & fiat ex floribus sambuci uis gesemini. Aui. in. 5. cano. in tracta de colicis. in colliro quoddam sic ait: collirium iupamentum factum cum iefemini, & ait. R. acaciæ, & succi sambach. uide hic, quod loco iefemini hēt sambac, quod idem est. Gale. in. 7. simplicium ait. Ieuconia. i. iefuminū. Auer. in. 5. col. gesemini, id est uiola ultramarina, apud nos in hortis reperitur.

LXVII.

PVERORVM, pro doloribus optimum & expertum.

3. Olei aneti, olei camemillæ an. 3. vi. olei rutæ, storacis liquide an. 3. iij. pul. cimini. 3. ii. bulliant omnia una ebullitio ne deinde coletur, & uisui referetur: & quando oportuerit ungatur locus dolorosus, & expertum est.

LXVIII.

ATRAMENTVM uulgarè, officinis ENCAVS-STRVM nigrum.

3. Aquæ pluuialis bocalia. 64. galletii rupti lib. vi. coquantur ad consumptionem medietatis, tunc addantur gummi arabi. lib. iiii. vitreoli pisti lib. iiii. melle, & fiat secundū artem.

COMMEN. MANLI.

ENCAVSSTRVM autē scriptorum multis modis conficitur. nam Dios. in cap. de atramento scriptorum inquit, quod fit tedarum lignis cuius uncis tribus una admiscetur gummi, conficitur præterea ex ligno refinæ, & ex pistorum fauilla, eius enim centum & xx. 3. accipiunt gummi & taurini glutinis. 3. vi. & atramenti sutorii. 3. i. s. & adaptatur admixta stypticis medicaminibus quæ differenter cōueniunt. Itē Dios. aliud ca. facit de atramento sutorio: quod additur in metallis. Plin. atramentum sutorio, quod calcantum.

Lumi. Ma.

Q 3

vocat est uitriolum uiride de quo fit encauftrum . Papias autem dicit atramentum dictum, quod fit atramentum: cuius species picturæ, & quotidianio uſui neceſſaria eſt huius uas atramentum dicitur. Auic.in. 2. can. de atramento facit cap. & facit differentiam inter atramenta alba, & rubea, & citrina, & uiridia, & inter colcotar, & calcadis, & calchantum, & alſuræ nam colcotar eſt uitriolum citrinum, calcadis eſt album: chalcanthum eſt uiride, & alſuræ eſt rubrum .

LIX.

CASSIA FISTULA pro Clyſteribus.

Prunorum uiridium lib. iiii. tamarindorum lib. ii. paſſularum ꝑ. vi. liquiritiæ ꝑ. ii. uolam, capillorum ueneris bletæ, centaureæ minoris, mercurialis, malux ana. M. iis. hordei lib. i. bulliant hæc oia in. xvi. lib. aquæ uſque ad conſumptionem medietatis: deinde fiat bona contritio, & infuſio ſupradictarum rerum, & aquæ cui aque calidæ diſtemperantur caſiæ fiſtulæ extractæ lib. vi. mellis deſpumati li. xii. & omnia ſimul ponantur ad ignem, & coquantur uſque ad ſpiſſitudinem mellis, & uſu referuntur.

COMMEN. MANLII.

Hæc deſcriptio iſtius confectionis eſt multū in uſu. Ego non reperi aliquem authorem authenticum ponere eius deſcriptionem, ſed uidi aliquos eam componere ſecundum iſtam deſcriptionem, uerum ſunt ex hominibus qui faciunt ſecundum iſtam deſcriptionem & ſunt qui faciunt ſecundū aliam ſecundum diuerſa loca, & dicitur pro. clyſteriis, eo quod ea ut plurimum ponitur in clyſteriis, eo quod ipſa ponitur quodam inſtrumento facto de corio. Matt. Syl. dicit: clyſtere eſt quoddam inſtrumentum medicorum omnibus notum: & ſecundum aliquos debet dicere clyſtere per l, a clepo clepis quod eſt furor furaris, & ſtercus. inde hoc clyſtere huius clyſteriis, uel clyſterium eſt inſtrumentum quod ſtercus inſirmi in uentre induratum facit exire: ſic dictum clyſtere: quaſi colus ſtercoris, quia per ipſum colatur ſtercus extrinſecus, uel dicitur clyſtere a cleo cles quod eſt inclinari: quia ſtercus facit inclinari. Iſta habentur in Catholicon. in litera cly. uel dicitur criſtere per r. ſecundum quosdam, & componitur a criſi, & tergo tergis. nam criſis habet tria ſignificata ſcilicet, aurum iudaicum, & ſecretum. unde criſtere componitur a criſi quod eſt ſecretum, & tergo: inde criſtere id eſt ſecreta terſio.

LXX.

Ad frangendum Lapidem in Renibus.

Si queratur quanta ſit uirtus cuiuſdam auis quæ nomi-

natur trigulus in frangendo lapidem in renibus, dicarū, quod eſt æſtimata magni ualoris, & hanc auem allegat Ioānes Sera. in ſuo breuiario in ca. de illis in quibus generatur lapis, & magnificatur, & ſic inquit: ad frangendum lapidē in ueſica eſt auis quæ nominatur atrugulutus. Eſt enim auis in forma ſua minor reliquis auibus, præter auem quæ nominatur baſſica, cuius intentio eſt regulus. Ita Rainaldus de Villa noua, in ca. de uitio lapidis in renibus, & in ueſica laudat eam mirabiliter. Et ſic meo tempore uidi in ipſa mirabilem experientiam in illa ægritudine, & exiſtimo, quod iſta ſit illa auis ab Auic.in. 2. can. uocatur ſaſuruhum, & dicit, quod eſt auis: cuius nomen eſt hoc nomen in Francia de an ſit illa, aut non melius idem declarat in. 3. can. in ſen. xviii. in cap. de medicinis comminuentibus lapidem: ubi ſic ait, & melior omnium eſt auis quæ græce nominatur tragulidos, & auis eſt de genere paruarum minor omnibus auibus excepta aue regia, & color corporis eius eſt inter uiridem, & cineritium, & citrinum, & ſuper alas eius ſunt pennæ aureæ, & ſuper caudam ipſius ſunt alba puncta: & plurimum apparitionis eius eſt in hyeme, & apud piſcinas, & apud parietes. & ipſius uolatus apud parietes nō eſt fixio: immo uolat parū, & cantat, & garrit ſemper, & mouet caudā, & ipſa comeditur cruda ſicut eſt, & melius eſt, & comeditur elixata, & aſſata, & ſalutur & reſeruiatur, ut caro ſaſita, & quandoq; aduritur ſicut eſt in furno qui non ſit cum illa caliditate. ſic cum quantitate qua dominetur ei auſtio. & deſtatur uirtus, & ſit in uitreato uale, & ſecundum modū qui dictus eſt ad ſcorpiones &c. hæc uero eſt auis quæ apud nos nullum inuenitur in æſtate, ac hyeme. uerum in æſtate non uadit in ciuitates, immo in hyeme uolat in ciuitatibus & piſcinis, & eius forma eſt, ſicut dixit Auicē. & hæc auis apud Lombardos uulgo cauda tremula uocatur, & ab aliis quibus beuerina.

PERORATIO in xv. Sectionem ac uniuersum opus.

HAEC DISTINCTIO de oleis tractatum noſtrum concludit, in quo aggregauimus ex uariis auctorum uoluminibus ea quæ intentionis cuiuſlibet practicanſis uſatū facere, ac eis ſubſeruientibus apothecariis neceſſaria, uidebantur. Piſſimi Saluatoris: ac eiſdem glorioſæ matris auxilio mediante quibus infinitas habeo gratias, nunc equum eſt ut parum quieſcamus, ut quiete reſtaurati, ad alia non minus uſilia accingamur.

F I N I S.

TABVLA LVMINARIS MAIORIS

IN XV. DIVISIONES, IN QVAVM SINGVLA,

primus numerus medicaminis compositionem: secundus uero folium indicat.

SECTIONVM NOMINA.

PRIMA SECTIO. Ele-
ctuariorum, ac Confectiones et quam-
plurimas selectas auctoribus conti-
net.

SECUNDA sectio. Conditorum seu
eundem Mesuræ continet.

TERTIA sectio, eligmata, seu Illin-
tus officinis, Loch et Mesuræ & aliis
continet.

QVARTA sectio, Zulapia, uel cum
officinis Iulepion seu Iulepion et Mesuræ
continet.

QVINTA sectio, Serap. uel ut uul-
go syrupus ex quamplurimis auctori-
bus continet.

SEXTA sectio. Rob. uel robur,
hoc est fapas, uel fucus medicatos con-
tinet.

SEPTIMA sectio, Apozemata,
uel decoctiones ex antidotario Mesuræ
continet.

OCTAVA sectio, Pastillos, uel tro-
chiscos et quamplurimas auctoribus co-
tinet.

NONA sectio, Arida colliria, uul-
go Sief, continet.

DECIMA sectio, Catapotia, seu Pi-
lulas continet.

VNDECIMA sectio, Pulueres, uul-
go Suffus continet.

DVODECIMA sectio. Cerotæ,
continet.

TERTIADDECIMA sectio, Vn-
guenta ex quamplurimis auctoribus
continet.

QVARTADDECIMA sectio,
Emplastrum continet.

QVINTADDECIMA sectio. Olea
ex plurimis auctoribus continet.

PRIMA sectio Electuaria ac con-
fectiones et quamplurimas selectas
auctoribus continet.

1 Electuarium de Aromatibus Ga-
leni folio 1

2 Electuarium de Gemmis. 2

3 Electuarium ex granis tinctoris. 3

4 Electuarium E. xyloaloe uulgo con-
fectio ligni Aloes 3

5 Leticifcus Hamech filij Zacchi. i. Ra-
fis, uulgo faborreg. 3

6 Ex Citro. 3

7 De mosco confectio dulcis. 3

8 Testiculorum uulpis. i. faryion. 4

9 Testiculorum uulpis hoc est Dyaf-
tyrion 4

10 De Galanga 4

11 Diarrhodon commune 5

12 Aromaticum rosarum 5

13 Rosarum Gabrielis 5

14 Aromaticum Garyophyllatum. 5

15 Aromaticum Nardinum. 5

16 Dicyminon bonum 5

17 Dianifon. 5

18 Diambra 5

19 De Cinnamomo 6

20 De granis Myrrhi 6

21 Diacalamenthum 6

22 Diatrium pipereon 6

23 Diacyminum. 7

24 De Cytoniis. 7

25 De feminibus, uel Diaspermaton 7

26 De succo Cytoniorum. 7

27 De pomis 7

28 De persicis 7

29 Regium. 7

30 De fructibus. 8

31 De acetosis Galeni. 8

32 De prunis 8

33 De forbis 8

34 Teryaca diatefferon 8

35 Tryphera faracenica magna 8

36 Tryphera muscata alchanzi 9

37 Tryphera Galeni. 9

38 Tryphera minor phenonis 9

39 Tryphera minor descriptione co-
gnita 9

40 Diacurcuma magna 9

41 Diacurcuma minor 9

42 Diamorufon 10

43 Dialacca magna 10

44 Dialacca minor 10

45 De raudseni. i. ex rhabbarbo. 10

46 Diacostum 10

47 Ex inuentione nostra 10

48 Alkanzi. 10

49 De Alfa 11

50 Anacardinum, officini confectio ana-
cardina 11

51 Philonis ex inuentione propria 11

52 Philonis descriptione Hamech. 11

53 Egeta uel fazenea 11

54 Alganesia magna 11

55 Diaphlphur 12

56 Elytracæ uulgo de storace 12

57 Hiera picra Galeni 12

58 Hiera hermetis, uulgo hiera luf. 13

59 Hiera Archigenis descriptione et uni-
uersali 13

60 Hiera Archigenis descriptione Pau-
li 13

61 Diocoloquintidos 14

62 Hiera ex inuentione nostra 14

63 Hiera Constantini descriptione Ira-
ni, uulgo Diasracost, idest Dia-
manza 14

64 Tryphera persica 14

65 Alharif. 15

66 Indum maius 15

67 Indum minus 15

68 De dactylis, & est diaphænicus. 15

69 De Pilylo 15

70 Episcopi uulgo elefoph. 15

71 Amech uulgo confectio hamech. 15

72 Alterum hamech, uulgo confectio
alia hamech. 16

73 Rosarum 16

74 Diabryonias, e uite alba Democ-
officinis confectio de alphefæra. 16

75 Diamana Galeni, uulgo confectio
mannæ ex inuentione Galeni. 16

76 Dia coccutidii, et cocco canidio, 16

officinis confectio de mezereon, 16

uel rectius almezercon 16

De eupatorio 16

Alchelengi 17

Diaringiber, uulgo confectio de zin-
gibere 17

Diacodion ex papauere, Galeni,
officinis, confectio de Iacur. 17

Diacodion Andromachi 17

Diacodion Critonis 17

Diacodion Heræ 17

Diacodion Sorani 17

Diacodion Galeni 18

Diacarion, uulgo confectio de suc-
cis nucum 18

E practica Mesuræ. 18

De Schœcados 18

Tryphæx de Epithymo 18

Ad Epilepsia. 18

De Pyrethro. 19

Confectio conditi 19

Anacardinum secundum filium za-
chariæ 19

Diahirundinis 19

De Gentiana 20

De Orobo 20

Philonii persici 20

E Conciliatore 20

Leticifcus conciliatore 20

E Francisco de Pedemonium. 21

Diacasæ fitulæ 21

De Spica Romana. 21

Ex Nicolao 21

Aurea Alexandrina 21

Hadrianum 21

Alcharifum. i. sine munere 21

Athanasia, idest immortalis. 22

Angelocalon, uulgo alchaulalon. i.
Nuncium bonum. 22

Antimoron, uulgo Antamaron
.i. contra mortem 22

Hemagogon. i. sanguinem men-
strualens ducens 22

Blanca 23

Benedicta simplex 23

Aliptæ muscatæ 23

Cuminatæ Alexandrinæ 23

Diamargariton 23

Diacameron 24

Dianthos 24

Diasatyryon 24

Diaprunorum 24

Diaprasium 24

Dialibanu, uulgo Diaolibanu. 25

Diarrhodon Abbatis 25

Diapenidion 25

Diacyminum 25

Diadagracanthum frigidum. 25

Diacalothreum 25

Diacatolicon 25

Diacostum 26

Diadiridos, uulgo Diairis de mel-
le 26

Diacalaminthes, uulgo Diacala-
menthum. 26

Diacodion. 26

Diapapauer. 26

T A B V L A.

124	Diafen.	24
125	Diafen.	25
126	Efdra magna.	26
127	Ducis.	27
128	Pliris arcoticon.	27
129	De succo rofarum.	28
130	Diaphylopu.	28
131	Ad reftaurationem humidita- tis.	28
132	Contra lumbricos.	28
133	Philontripon magnum.	28
134	Gallia mufcata.	29
135	Iuftinum.	29
136	Kartharticum imperiale.	29
137	Lithontripon magnum.	29
138	Mithridatidum magnum.	29
139	Mufa Ennea.	30
140	Micleta, uulgo Micleata	30
141	Rofata nouella.	30
142	Rubea crocomagmatica.	30
143	Theriaca, uulgo Thyriaca.	30
144	Thrypha magna.	31
145	Triophyllon.	31
146	Triafandali.	31
147	Theodoretos Anacardina.	31
148	Vomitus ualēs tertianariis, quar- tariis, & quotidianariis.	31
149	Hierapicra, uulgo hierapicra.	32
150	Hierogodion Empoditlon.	32
151	Ex antidotario Ioan. Serap.	32
152	De lacuna liberans ex uenenis.	32
153	Altalifafar pro frigidi. Roma.	32
154	De Mace. pro frigidit. ftoma.	32
155	De heil pro frigid. ftoma.	32
156	De Vinea.	32
157	Thyriace, cōtra ſcorpionum mor- fus.	32
158	Ex Rafi ad Almanforum.	32
159	Ad ſcabiem & pruritus.	32
160	De nucleis fruſtuū ad erectionē uirgē.	33
161	De feminibus ad idem.	33
162	Thyriace de terra ſigillata.	33
163	Thyriace pro morſu rutellæ.	33
164	Læticans.	33
165	Ad omnem epilepfiz ſpeciem.	34
166	Diamuſcum precioſum.	34
167	De ſcoriz ferri.	34
168	De bacis lauri.	34
169	De Enule.	34
170	Ad rupturam, uel ad crepatos.	34
171	Ex Antidot. Auicennæ.	34
172	Theriaca prima Auicennæ.	34
173	Confeſtio Mithridatis.	36
174	Philonium Romanum.	36
175	Philonium Perficum.	36
176	Confeſtio de hyacinto.	36
177	De granis uiridibus.	36
178	De aniden.	37
179	De camphora.	37
180	Deſtenco.	37
181	Thrypha maior.	37
182	Ex.iii.ac.iii.can.Auicennæ.	38
183	De paſſulis.	37
184	De cineribus.	37
185	De Margaritis.	38
186	De Medullis.	38
187	De Marchaſia.	38
188	Ex Antidotario Guainerio.	38
189	Papienſi.	38
190	Mixturæ cordiales.	38
191	Manus chriſti cum perlis.	38

185	Diacorallii.	38
186	E Roſa Anglica Ioan. Anglici.	38
187	De Caulibus.	38
188	Diagariſt optimi.	39
189	Diacucubæ.	39
190	Dianafurtium.	39
191	E Petro Tuſſignana.	39
192	Diarob cum rheubarbaro.	39
193	Diarob cum turbith.	39
194	Diarob cum Agarico.	39
195	Diarob cum ſena.	39
196	Ex Antidotario Bartholo. Montagnanz.	39
197	De ſiſticiſ.	39
198	Diamuſci matricaliſ.	39
199	Confeſtio pro uermibus commu- niſ apoſtolorum.	39
200	Diaturbith cum rheubarbaro.	40
201	De ouis.	40
202	De lepore combuſto.	40
203	De ſebelten.	40
204	De Polypodio ad melâcholiâ.	40
205	Ex Nicolai Florentino.	40
206	Diacartami.	40
207	Electua. ſublime pro conſeruatio- ne oculorum.	40
208	Diabutyrum expertum.	40
209	Diapeganon , uulgo Diapiga- mum.	40
210	De ſcibus.	40
211	De cicadis.	40
212	De ſiſeleos.	41
213	De Iua.	41
214	De Anagalliſo ſylueſtri.	41
215	Confeſtio boli armeni.	41
216	De Moris.	41
217	Cyphoides Andromachi	41
218	Diapolliticon Galeni.	41
219	Adiſapparis ſecundum Gilber- tum de Anglia.	41
220	Diacaſeoſ.	42
221	Diagragantum calid.	42
222	Diapente.	42
223	Ex Ioan. Concoregio.	42
224	Diacaſia ſiſtula.	42
225	Lenitium.	42
226	De farſara.	42
227	Contra peſtem Benediſti. Nur- ſia.	42

SECUNDA SECTIO Conditorum Genere ſecun- dum Meſuz continet.

1	Saccul conditum.	42
2	Zingiber conditum.	42
3	Paſtinacæ , uulgo Bauciz condi- ta.	43
4	Acorus conditus.	43
5	Zuecharum roſatum.	43
6	Zuecharum uiolatum.	43
7	Zuecharum bugloſſatum.	43
8	Zuecharum roſmarinatum , uulgo zuecharum Alcluil.	43
9	Citri conditum.	43
10	Bugloſſi conditum.	43

TERTIA SECTIO Eligmata ſeu illinſtus, officiſis Loch, & Me- ſuz, ac aliis continet.

1	Ex pineis nucleis, uulgo, Loch de	43
---	-----------------------------------	----

pino.	43
De papauere, et eſt diapapauer.	43
De ſquilla.	43
Ex radice brioniz , uulgo loch de alfecera	43
Sanum & expertum	43
Ad caliditatem, & aſperitatem pe- toris, & ad tuſſim calidam.	44
Aliud.	44
Bonum conſerens heſticis, & con- ſumptis, & phtificis	44
Ad Aſthma bonum	44
De amygdaliſ	44
De alleis	44
De caulibus.	44
De pulmone uulpis	44
Ex Serapione.	44
De femine lini ad illum qui tuſ- ſit	44
Ex Auicenna.	44
Albotin	44
Ex officiſis	44
De farſara magiſtrale.	44

QVARTA SECTIO Zu- lapi, uel cum officiſis Iu- lebos, ſeu Iulepos, & Meſuz continet.

1	Roſatum ex infuſione roſarum, ſo- brium aduſtionis conſerens	45
2	Infuſio roſarum, & uiolarum.	45
3	Violarum ex infuſione uiolarū	45
4	Roſatum & ſucco roſarum	45
5	Violarum & ſucco uiolarum	45
6	Alcheſmes	45

QVINTA SECTIO Serapia, uel ut uulgo Syrupus ex quam plurimis authoribus.

1	De pomis ſimplex	45
2	De Pyris	45
3	De cydoniis	45
4	De ſucco acetofæ	45
5	De ſucco cucurbitæ.	45
6	De granatis acetofiſ.	45
7	De granatis dulciſ.	45
8	De corticibus citri	45
9	Ex acido citri ſucco	45
10	Ex omphacio, officiſis, de agre- ſta	45
11	De granis myrti	46
12	De dactilis uulgo albelac.	46
13	De papauere.	46
14	Brizatinus, uulgo Syrupus dinarii hoc eſt de bizantiis.	46
15	Acetofus ſimplex	46
16	Acetofus cum radicibus.	46
17	De canniſ	46
18	De portulaca.	46
19	Violarum , uulgo de Violis com- poſitus	46
20	De iuiubis	46
21	De papauere	47
22	Aqua muſta , uulgo aqua meli.	47
23	Oxymeli ſimplex, ſeu acetum muſ- tum	47
24	Oxymeli de radicibus , uulgo ſe- canabin de radicibus	47
25	De menta inuentione noſtra.	47
26	De abſinthio	47

- 27 Fumarie maior, officinis, de fumo
terre maiori. ibidem.
- 28 Glycyrrhizæ, uulgo de ligritia. ibi.
- 29 De hyssopo. ibid.
- 30 De pafio. ibid.
- 31 De calamento pro spleneticis. 48
- 32 De cupatorio. ibi.
- 33 De thimo. ibid.
- 34 De epithimo. ibid.
- 35 De ftecade, uulgo de ftecados. ibi.
- 36 Oenometri. vinum mulfum, uulgo
melicratum conditum. ibid.
- 37 Couditi ex cydoniis, uulgo miua
cytoniorum, sine speciebus. ibid.
- 38 Miua cytoniorum cum specie-
bus. ibid.
- 39 Acetum quilliticu, uel rectius scil-
linum. 49
- 40 Oxytel quilliticum. ibid.
- Ex Galeno.
- 41 Oxytel Iuliani. ibid.
- Ex Antonio Cermifono.
- 42 Acetum paffularum. ibid.
- Ex practica Mefue.
- 43 Ad ægri tudines melâcholicas. ibi.
- 44 De pyllyio. ibid.
- 45 Sabor. ibid.
- Ex Francifco de Pedemontium.
- 46 De berberis. ibid.
- 47 De endiuia. ibid.
- 48 De hepatica. ibid.
- 49 De nemuphare. ibid.
- 50 Ad quartanam. 50
- Ex Nicolao.
- 51 Diamoron, batu. ibid.
- 52 Rhodoniæ, uulgo mel rofatum.
ibidem.
- 53 Oxyzacchar, uulgo oxyfacchara
ibidem.
- Ex Raff.
- 54 De myrobalanis. ibid.
- 55 De Turbith. ibid.
- Ex Auicenna.
- 56 De vua. ibid.
- 57 De fructibus. ibid.
- 58 De fructibus aliis. 51
- Ex Antonio Guainerio.
- 59 Sancti Ambrosii. ibid.
- Ex Ioanne Anglico.
- 60 De pimpinella alio nomine Rofa
Anglica nominatur. ibid.
- 61 Delilio. ibid.
- 62 Digestiuis. ibid.
- 63 De raphano. ibid.
- 64 De Mezereon. ibid.
- 65 De rubia tinctorum. 52
- 66 Macedonicus. ibid.
- 67 De pulegio. ibid.
- 68 Columbinus. ibid.
- Ex Petro Tufsignana.
- 69 De fcolopendria. ibid.
- Ex antidotario Bartholo.
Montagnanæ.
- 70 De febeften. ibid.
- Ex antidotario Guliel.
Placentini.
- 71 De cicorea. ibid.
- 72 De oppio. 53
- Ex Raynaldo de Villa noua.
- 73 De Plantagine. ibid.
- Ex Nicolao Floren.
- 74 De lua. ibid.
- 75 De lilio. ibid.
- 76 Optimus ad hemorrofagiâ. ibid.
- 77 Armoniacus. ibid.
- 78 De cicorea. ibid.
- 79 De ficibus. 54
- 80 De artemiffa. ibid.
- Ex Gentile de Fulgineo.
- 81 De endiuia. ibid.
- 82 Ad matricem. ibid.
- 83 De artemiffa. ibid.
- 84 Cordialis. ibid.
- Ex Hieronymo de Cafali.
- 85 De Acoro. ibid.
- De officinis.
- 86 De fcabiofa. ibid.
- 87 De Bertonica. ibid.
- 88 De Lupulis. ibid.
- 89 De Bugloffa. 55
- 90 De fucco Endiuiz. ibid.
- 91 Rofatus: ex infufione rofaru. ibid.
- SEXTA SECTIO, Rob,
vel Robub, hoc eft fapas
vel fuccos medica-
tos continet,
- 1 De Ribes. ibid.
- 2 Omphaco, uulgo de Agrefia. ibid.
- 3 De Cornibus. ibid.
- 4 De Sumach. ibid.
- 5 De Moris. ibid.
- SEPTIMA SECTIO Apo-
zemata, vel decoctiones
continet.
- 1 Adianti, uulgo Capillorum vene-
ris. ibid.
- Ex Raff.
- 2 De epithymo. ibid.
- Ex Petro Tufsignana.
- 3 Communis. ibid.
- Ex Barth. Montagnana.
- 4 Pectoralis. ibid.
- OCTAVA SECTIO Paffilos,
vel Trochifcos, continet.
- 1 Galliz mufcatæ. ibid.
- 2 Galliz febellinz. 56
- 3 Galliz alephanginz. ibid.
- 4 Diarhodon. ibid.
- 5 De rofis. ibid.
- 6 De rofis, & eupatorio. ibid.
- 7 De rofis. ibid.
- 8 Such alahertis, id eft galliz magnæ
fe regalís. ibid.
- 9 Ramich. ibid.
- 10 De Camphora. ibid.
- 11 De Rheubarbaro. ibid.
- 12 De Spodio. ibid.
- 13 De Spodio aliis. 57
- 14 Oxyacanthæ, uulgo de berberis.
ibidem.
- 15 De Abfinthio. ibid.
- 16 De Eupatorio. ibid.
- 17 De Anifo. ibid.
- 18 De Anifo. ibid.
- 19 De Lacea. ibid.
- 20 De Terra figillata. ibid.
- 21 Colocynthidos, uulgo Alandahal.
ibidem.
- 22 De Sandalis. ibid.
- 23 De Cyperis. ibid.
- 24 De capparibus. ibid.
- 25 Ex electro, officinis, & charabe. ib.
- 26 E Veficaria, feu Helicacabo. 58
- Ex practica Mefue.
- 27 Alchadicon. ibid.
- 28 Orobi. ibid.
- 29 De Garyophyllis. ibid.
- 30 De Violis. ibid.
- 31 De Agarico. ibid.
- Ex Francifco de Pedemonte.
- 32 De Spica. ibid.
- 33 De Siliquis. ibid.
- 34 De Alumine. 59
- 35 De Dactylis. ibid.
- Ex Nicolao Floren.
- 36 Diarhodon. ibid.
- 37 Diaion e violis, uulgo Diani. ibid.
- 38 Hedyeroi, uulgo, idiocri. ibid.
- 39 Crocomagmatis, uulgo Crocma
gnetis. ibid.
- 40 Diacordallius, uulgo Diacordalli.
ibidem.
- 41 De Tyro. ibid.
- 42 De Eruo. ibid.
- 43 Mufcati. ibid.
- 44 De Olibano. ibid.
- 45 De Agno cafto. ibid.
- 46 De Balauftiis. ibid.
- 47 De Thure. ibid.
- 48 De Myrrha. ibid.
- 49 De Tamarifco, uulgo de Alcar-
mefcit. 60
- Ex Auicenna.
- 50 Alindaracon. ibid.
- 51 Squillæ. ibid.
- 52 De Viperis. ibid.
- 53 Gochion adminiftrati in Mitrida-
to. ibid.
- 54 De Mezereon. ibid.
- 55 De Rubea. ibid.
- 56 De Cufcuta. ibid.
- 57 Stellæ. 61
- 58 De Croco. ibid.
- 59 De Elleboro. ibid.
- 60 De Bdellio. ibid.
- 61 De Carta combufta. ibid.
- Ex Dino Florentino.
- 62 Alcadicon. ibid.
- Ex Antidotario Gulielmi
Placentini.
- 63 De Calamento. ibid.
- 64 De Chelidonia. ibid.
- Ex Nicolao Florentino.
- 65 De fcolopendria. 62
- 66 De Cicadis. 62
- 67 Phodillorum. 62
- 68 De Calce. 62
- NONA SECTIO. Arida
Colliria, uulgo Sief
continet.
- Ex Mefue.
- 1 Citrinum. 62
- 2 Rofatum. 62
- Ex Raff.
- 3 Album. 62
- 4 De Thure. 62

T A B V L A

5	De Plumbo.	62
9	De Rubrum.	62
7	Viride	62
8	De Calcano.	63
9	De Fellibus.	63
10	Menuthe.	63

DECIMA SECTIO. Capotopia, seu Pilulas, continet.

Ex Mesue.

1	Alephanginz.	63
2	Stomachicæ, uulgo stomachicæ.	63
3	Aggregatiuz ex inuentione nostrâ.	63
4	Aggregatiuz maiores.	63
5	De Eupatorio maiore.	64
6	De Rhabbaro.	64
7	De Halicacabo, vulgo de Alchemengi.	64
8	Indæ Haly.	64
9	De Sarcocolla.	64
10	Pœtidæ.	64
11	Sagapeni, uulgo de Serapino.	64
12	De Eupatorio.	64
13	De Rauedieni.	64
14	Ex Thymelea, uulgo de Meze-reon.	64
15	Lucis maiores.	64
16	Lucis minores.	64
17	Stomachicæ nostræ.	65
18	Exthrophicis colocyntidos, uulgo Pilulæ Alandahal.	65
19	De Agarico.	65
20	De Turbith, & dicuntur Aureæ.	65
21	De Lapide lazuli.	65
22	De lapide armeno.	65
23	Ad omnes morbos, catarrhi, cori-zæ, & tussis catarrhalis.	65
24	Ex Sagapeno, vulgo de Serapino.	65
25	De Bdellio maiore.	65
26	De Bdellio ex inuentione nostrâ.	65
27	Ex Colocynthide, uulgo de Colloquintida.	65
28	Ex Opopanace, uulgo de opopanax.	65
29	De Hermodactylis maioribus.	65
30	De Hermodactylis minoribus.	66
31	De Hermodactylis ex inuentione nostrâ.	66
32	Sebelliz.	66
	Ex practica Mesue.	
33	Bechicæ, uulgo Bichichæ.	66
34	De Croco.	66
35	Ad Rheumaticas passionēs.	66
36	De Storace.	66
37	De Hiera simplicî.	66
	Ex Petro de Ebano	
	Conciliatore.	
38	Maltichinz.	66
	Ex Francisco de Pedemonte.	
39	De Quatuor rebz.	66
40	De Benedicta.	66
41	De Spica.	66
	Ex Nicolao.	
42	Sine quibus esse nolo.	66
43	Aureæ.	66
44	De Castoreo.	66

45	Heptameræ, vulgo Optromeræ.	67
46	Stipticæ.	67
47	De quinque geueribus Mirobalanorum.	67
48	Artrithicæ contra podagram.	67
49	Ante cibum & post.	67
50	Ex Elaterio. i. ex succo cucumeris syluestris, vulgo, de electuario seu elaterio.	67
51	Cynoglotticæ, vulgo, de cynoglossa.	67
52	Arabiz.	67
53	De Hiera magna.	67

Ex Antidotario Ioan.

Serapio.

54	Ad febrem quartanam.	67
	Ex Rasi.	
55	Communes.	67
56	Cephalicæ, uulgo Cochiz.	67
57	De Hermodactylis.	67
	Ex Auicenna.	
58	De Tapfia.	68
59	De Dende.	68
60	De Garyophyllis.	68
61	De Sandaracha.	68
62	E Fumaria, vulgo, de fumoterræ.	68
63	De Opio.	68

Ex Bartholomeo Montagnanæ.

64	De Rhepontoico.	68
65	De Diamusco.	68
66	Affaiares.	68
67	De Hiera composita.	68
	Ex officinis, vulgo Magistralis.	
68	Imperiales.	68
69	Ad quartanam.	68

VNDECIMA SECTIO.

Pulueres, uulgo, Suffus continet.

1	De ligno Aloes.	68
2	Aromaticum.	69
3	Inpinguatium bonum.	69
4	De granis myrthi.	69
5	Capitalis.	69
6	Pro oculis.	69
	Ex Rainaldo de Villa noua.	
7	Pro Bortio.	69
8	Cordialis.	69
	Ex officinis, vulgo Magistralis.	
9	Ad proquocandum.	69
10	Sacculus temperatus.	69
11	Sacculus frigidus pro corde.	69
12	Sacculus carminatiuz pro stomacho.	69
13	Sacculus pro stomacho frigido.	69
14	Sacculus pro stomacho.	69
15	Sacculus ad fluxum ventris super quo infirmus sedere debet.	69
16	Pomum ex laudano.	69
17	Pomum odoriferum contra pestem.	70
18	Trazea confortans stomachu.	70
19	Trazea valens ardori urinz.	70
20	Medica de Turbith.	70
21	Puluis contra dolores post partum.	70
22	Puluis pro fluxu spermatis.	70
23	Puluis pro exitu intestini.	70

24	Puluis pro stomacho.	70
25	Puluis idulcis ordinatus per Illustrissimum dominum Robertum Sanseuerinatem.	70
26	Puluis Gelatinæ.	70
27	Puluis piperatus communis.	70
28	Epithema p. corde ex antido. Bartho. Montagnanæ.	70

DVODECIMA SECTIO

Cerota, uulgo Cerotos, continet.

1	Oesypatum, uulgo Hyflosi.	70
2	Oesypus, ut extrahatur, uel operatio Hyflosi humidæ.	70
3	Oesypî ex Philagrio, uulgo Hyflosi descriptione Philagrii.	70
4	Oesypatû ex Paulo, uulgo Hyflosi descriptione Pauli.	71
5	Hyflosi diarefaron.	71
6	Stomachicum Galeni, uulgo Cerorum Galeni.	71
7	Diapente.	71
8	Alexandrinum pro stomacho.	71
9	De Sandalis.	71
10	Album Galeni.	71
11	De Euforbio.	71

Ex Antidotario Barthol. Montagnanæ.

12	Pro capite.	71
13	Pro florace.	71
14	De Galbano.	71
15	Ad Hernias, uulgo ad crepatos.	71
	Ex Leonardo de Preda palca.	
16	De Bdellio.	71
	Ex Conciliatore.	
17	Coadunatum scissi Cranei.	71
18	Aliud confimilis intentionis.	71

TERTIADECIMA SECT.

Vnguenta continet.

Ex Mesue.

1	Diaphoenicon, uulgo Diaphinicon.	71
2	Diaphoenicum Arabicum.	71
3	Cerafeos magni, uulgo Cerafeos magnum.	71
4	De Arthanita magnum.	71
5	De Arthanita paruua.	71
6	Albariel.	71
7	Rofatum.	71
8	Violatum.	71
9	Basilicon magnum.	71
10	De Bdellio.	71
11	Philagros.	71
12	Aureum.	71
13	De Cerussa.	71
14	Aegyptiacum magnum.	71
15	Tripharmacum.	71
16	Poricum, uulgo Alsefericon.	71
17	Poricum, medicamen compositum, uulgo Compositio Alsefericon.	71
18	Palmeum.	71
	Ex Practica Mesue.	
19	De flore aris.	71

Ex Nicolao

Ex Nicolao.		69	De Pulegio.
20	Nardi spicati.	74	De Centaurea.
21	Marciaton.	75	71 Citrinum.
22	Aregon officinis Aragon.	75	72 De Hedera.
23	Dialthea.	76	73 De Vitro.
24	Citrinum quod fit in pomo Citri-	74	74 De Sandaracha.
	no.	76	75 De Vulpe.
25	Fustum seu nigrum.	77	76 Irinum.
26	Populeon.	77	Ex Petro Argillata.
27	Agrippæ.	77	77 De Mipio.
Ex Galeno.		78	De Ireos.
28	Diapompholygos.	77	79 Gratia Dei.
Ex antido.Ioan.Sera.		80	De Climia.
29	De Ziniar.	77	81 De vermibus.
30	De melle.	77	82 De Matrisyllua.
31	De flore æris.	77	83 De uespertilionibus.
32	De Calcantho , uulgo de Calca-	84	De Fornicis,
	dis.	77	
33	Rubcum.	78	Ex officinis uulgo Ma-
34	Apostolorum.	78	gistrales.
35	De Calce.	78	

Ex Guliel. Varignana.		85	De adipibus.
36	Committisse.	78	86 Gratia Dei.
Ex Antid.Dini Floren.		87	Staphisagrium.
37	Pilotrum.	78	88 De Anthera magnum.
Ex Ioan.Anglico.		89	De Anthera minus.
38	Genettricum commune.	78	90 Rubeum camphoratum.
39	De Talpa.	78	91 De Camphora album.
40	De Castorco.	79	92 Pectorale.
41	Ebulinum.	79	93 De Lapacio.
42	Quercinum.	79	94 Pro stomacho.
Ex Petro Tusignana.		79	95 Citrinum usuale.
43	De Euphorbio.	79	96 Ad scabiem.
		79	97 Mollitium quo Veneti utun-

Ex Antidotario Bartho.		Q V A R T A D E C I M A S E -	
Montagnanæ.		ctio , Emplastra continet.	

44	De Corticibus castaneorum.	79	1 Diachilon , uulgo Diaquilon ma-
45	Pro vermibus.	79	gnum.
46	Mucillaginibus.	79	2 De granis lauri.
47	Pectorale.	79	3 De Gallia.
48	De Elleboro.	79	4 Relatum ad Andromachum.
49	De Semperviua.	79	5 Sinapinum Democriti.
50	De succo Lunariz.	79	6 Diaphoenicon Alexandri.
51	De amylo.	79	7 Diaphoenicon confortatium sto-
52	Terebintina.	79	machi.
53	Viride secundum Chirurgiam.	80	8 De Allis Alexandri.

Ex Antidotario Gulielmi		9	Relatum ad Aritharcum.
Placentini.		10	De Meliloto.
		11	Mistura ad uulnera.

54	De Cerussa.	80	Ex Nicolao.
Ex Rainaldo de Villa noua.		12	Apostolicon.
55	Pro capite puerorum.	80	13 Oxycroceum.
Ex Nico.Floren.		14	Ex Rasi.

56	De Cicuta.	80	Ex Auicenna.
57	De Ranis.	80	15 Mirabile Andromachi.
58	Diuinum optimum.	80	16 Aureum.
59	De Lilio.	80	
60	Album.	80	

Ex Antidotario Bartho.		M o n t a g n a n æ ,	
------------------------	--	-----------------------	--

Ex Leonar. de Preda		17	De Violis.
palca.		18	De Eupatorio.

62	De Plumbo.	80	19 Vfusalis pro crepatis.
63	De Litargyrio.	80	20 De Cruſta panis.
64	Diabaution.	80	

65	De Cancris fluuiialibus.	81	Ex Leonardo de preda
66	De Dragantibus.	81	palca.
67	Incarnatium.	81	
68	De floribus salicis.	81	21 De Caricis.

81	22 De Pentadactylis.	86
Ex Petro Argillata.		
81	23 De Centaurea.	86
81	24 De Bertonica.	86
Ex Nicolao Florentino		
81	25 Bouinum.	86
Ex Galeno .		

DECIMAQVINTA SECT.

Olea ex Mefue Antidota-
rio continet.

1	Oleum de Amygdalis dulcibus: de	
	Amaris, de Nacibus, de auellanis,	
	de Crifomelis, de perficis, de Bœ,	
	de Cherua, de Chartamo, de Nu-	
	ce indica, de Ceraſis , de Amaca-	
	leb, de Granis Citri , et Citrangu-	
	lorum de Fiſticis , de Pineis , et ſic	
	de ſingulis.	87
2	Laurinum.	87
3	De Baſamo.	87
4	Oleum de granis ſiſami.	87
5	Roſatum completum.	88
6	Chamæmellinum, uulgo Cham-	
	mellinum.	88
7	Violatum.	88
8	Anethinum.	88
9	De Lilio compoſitum , uulgo cum	
	ſpeciebus.	88
10	Trinum.	88
11	Leucocii, officinis de Cheiri .	88
12	E meliloto.	88
13	Nymphetum , officinis , de Nenu-	
	phare .	88
14	Melinum, uulgo, de Cytoniis.	88
15	Myrtinum.	88
16	Ex pomis mandragoræ , uulgo de	
	pomis ſabrol.	89
17	Enulatum , uulgo de enula.	89
18	De Cinnamomo.	89
19	Rutaceum, officinis, de Ruta.	89
20	Nardinum benedictum.	89
21	Nardinum alterum.	89
22	Maſtichinum.	89
23	Styracinû officinis, de Storace.	89
24	Coſtium.	89
25	Cyprinum, uulgo , de alcanna.	89
26	Sampſuchinum, uulgo de Sanſu-	
	co.	89
27	Ex Thymelea, officinis , de Meze-	
	reon.	89
28	De thymo, uulgo, de Haſce , Oleû	
	Sericinum uocatum.	89
29	Sicyonium, officinis, De cucu-	
	re Afſino.	89
30	De pomis Ciercis, uel Arâcis, uul-	
	go de pomis Citrangulis.	90
31	De Croco.	90
32	De Piperibus.	90
33	De Euphorbio.	90
34	De Euphorbio ſecûdum alium mo-	
	dum.	90
35	Vulpinium .	90
36	De Scorpionibus.	90
37	De Scorpionibus ſecûdum alium	
	modum.	91
38	De Viperis , uulgo de Serpenti-	
	bus.	91
39	De Ranis.	91
40	De Ouis.	91
41	De Frumento .	91

TABVLA LVMINARIS MAIORIS.

42 Sinapium.	91	53 De Oleandro.	92	De officinis, vulgo, olea	
43 De Iunipero.	91	Ex Antido. Auicennæ.		magistralia.	
44 Fraxininum.	91	54 De Vinea.	92		
45 De Gagatæ sacratum.	91	Ex Ioan. Anglico.	61 De Hyperico mirabile.	92	
46 Philosphorum.	91	55 De Staphisagria.	62 De sulfure.	93	
Ex Petro de Ebano.		56 De Laudano.	63 De Capparibus.	93	
47 Balsaminum	91		64 Moschatum, officinis, Muscelli-		
Ex Nicolao.		Ex Antidotario Bartho.	num.	93	
48 Frigidissimum uiride.	91	Montagnanæ.	65 De Castoreo, bonum, & exper-		
			tum.	93	
Ex Antidotario Ioan.	57 Balsaminum.		92 66 Iasminum, seu Sambucinum, vulgo		
Serapionis.	Ex Guliel. Placen.		sambucinum.	93	
49 De Liliis purum.	91	58 Balsaminum.	92 67 Puerorum pro doloribus.	93	
50 Darisahan.	92	Ex Leonard. de Preda	68 Atramentum vulgare, officinis En		
Ex Rafi.		palca.	caustrum nigrum.	93	
51 Foenugræci.	92	59 De Calce.	92 69 Cassia fistula pro clysteribus.	93	
52 Ex Saliunca, vulgo Salmente.	92	Ex petro argillata.	70 Ad frangendum lapidem in reui-		
		60 De Tartara.	bus.	93	

Explicit Luminare maius, nunc ad maiorē perfectionem redactū, summo studio & cura peritissimi medici Nicolai mutonis Lucensis: qui multorum excellentissimorū doctorum medicinas inseruit, ut vere prius, Luminare minus, hoc nunc, Luminare maius, appellari possit, cum copiosissimo indice, ad minima quæq; in ipso contenta reperienda.

LV MEN APOTHECARIORVM

OLIM NON INFELICITER AEDITVM

a subtilissimo Artium & Medicinæ doctore domino magistro Quirico de Augustis de Torthona: nunc uero summis vigilijs
quàm accuratissime castigatum.

P R O O E M I V M.



MHI ipsi cogitanti quid memoria dignum mea hac iuuenili ætate commemorare, uenit in mentem hoc præfens institutum: ne ociole uita hæc nostra trāseat. Comperi fere materiam omnem occupatam eē ab illustribus doctoribus: tam antiquis quā modernis. Et nix petitiones Ioan. Fran. mi optime frater meum incidissent in mentem profecto tenera hæc ætas sine labore decur

rebat, & sine honore, & fama consumebatur. quare gloria tibi erit qui me sopitum excitasti, & inertem tuus arduis petitionibus accelerasti. Audias igitur quid Quirico Augusto fratri tuo scribere coegisti. Hoc n. meo in opusculo cōpōnes esse describam quæ aromataris necessarii sunt, quæque cōiter sunt declarando obscura uocabula: tam Græca, quā Arabica, & Latina, quæ ab antiquis doctoribus obscuræ sermone tradita sunt. Materia. n. utilis & necessaria. Heu summam ignauiam. Infiniti quidem errores & mortiferi solent sæpe accidere apothecariorum quorundam impericia, & uocabulorum obscuritate. Quanta uē infamia dominis medicis, & uiris egregie doctis inde eueniat excogitari uix pōt, qui credentes instrumenta fanitatis ritē cōpōta esse, ægro salutem promittunt. Sperantes huius artis artifices dispensas suas in mentem Mef. dispensare. Et ipsi aulæ temerario. Quid pro. Quo addunt & tunc medicinæ uirtus diuersificatur. ut princeps medicorum scribit Auic. ꝑ. can. ca. de tyria ca. Et cōsequenter uulgi infamiam apothecarij ignauia medici incurrit. Tu n. hoc meo opusculo non indiges, cū huius artis tandiū & doctrina & experientia comprobatus fueris. Sed uolui tibi tanquam cariori digniori, ad corrigendum destinare. Quare illum excutias, abijciasq; si quid in eo superfluum comperies: demum illum in lucem adire permittas, ut tuo ingenio libelli; doctrina rudes te imitari pōntur. Qui soles tua prudentia non solū apothecarios sed & nouos medicos in ordinatōe dirigere. Vale diu felix.

Opus inquit: ac decē distōnes partiū. Prima erit de cōfectionibus aromaticis. Et continet descriptiones. X X I I. Quarum prima est.

E Lecturium de gemmis, Mesue, cuius iuuentum est magnum ad egredines cerebri; cordis stomachi, hepatis, & matricis frigidas, & nos sumus experiti: inquit Mef. bonitatem eius ad tremorem cordis, & syncopim, & debilitatem stomachi, & quando aliquis tristatur, & nescit radicem, & ei qui diligit solitudinem, & sunt eo usi reges & magnates, trahit enim eos in consequentiam bonorum morum, & nobilium, & dilatat animam, & facit corporis odorem & colorem bonum.

Albarum margaritarum. ꝑ. ii. fragmentorū, zaphiri, hyacinthi, granati, & ferizegi. i. smeraldi. an. ꝑ. i. s. zedoariæ, doronici, corticū citri, mallicis, æ. alphenelhemifici. ozimū garyophyllati an. ꝑ. ii. corallorū rubeorū, charabz, limaruræ eboris ana. ꝑ. ii. been albi & rubei, sunt quedā radices quæ de Armenia deferunt, garyophyl. zingiberis, piperis lō gis, croci, spicæ, folij, hæc. i. caradomum maius an. ꝑ. i. Trochiscorum diarhodon, ligni al. an. ꝑ. i. cinnamomi, galan. zu i. ubet & radix aromatica an. ꝑ. i. s. foliorū auri & arg. an. au.

i. s. ꝑ. ii. & gr. v. Musci boni, ꝑ. s. Ambre. ꝑ. ii. Puluerizētūr & referuntur in uasē uitreato & obturetur eo uasīs.

In hac cōpōsitione multa sunt uidēda pro clarior ipsius doctrina. Primo qđ sit Radix est. n. lapis rubeus spissus cū subā peruia seu trāsparente. & dicit ꝑ eius uirtus est qđ accēdit animū ad gaudiū & acuit ingenij: iō merito in hoc electuario positum est. Sed quia cognitio huius lapidis non est apud apothecarios: iō loco ipsius ponuntur rubini. Et hoc consonū est cū dā receptæ inuēit in vno antiquissimo Mef. quæ dicebat quinq; generū fragmentorū cōiū ꝑciofora. & sic erit litera bona: quia si scriptū reperies quinq; generum fragmentorū cōiū ꝑciofora de quinq; supradictis deberes intelligere. i. de Zaphiri, Hyacinthi, Rubini, Smeraldi, Granati, fragmentis. & non de aliquibus alijs. De Al. scias qđ al per se nihil signat nisi articulum. i. hoc. Nā ubi nos dicimus hoc, Arabes dicit al & ideo qđ al miscetur cū aliqua dīctōe non signat articulū in illa dīctōne. ut alhazē. i. lo thimo. & c. Feleniemusc. dīa est de eo inter doctores, quidā dnt qđ est ozimum garyophyllatū. & illud dī semen citrini odoriferū qđ colligitur a basilicone habente folia minuta. & hæc opio uero est. Alii uero dicunt qđ est semen melissæ. Alij qđ est cinnamomū quæ duæ opiones a doctoribus reprobant & prima tenet. Præterita fragmenta & mineralia cū in aliqua cōpōne intrant sunt ultimæ cōterenda viqueque pōsint per satis spissam telā transire. hæc ēt oēs lapides: ut coralli, lapis iudaicus, & ita ea ad imitrat ut docet, nosq; monet Aui. cū lapide iudaicum in calculo iubet dari illum super cotem uel lapide molarē ducere & iubet ut magis subtilis sit. igitur nūq; in triturando eos festus sis: quia quanto subtiliores tanto perfectiores existunt. Zurbum non est zedoaria: ut Matt. Syl. exponit. cū Aui. a. can. diuersa de eis faciat capitula. sed zurbur est quedam radix similis cypero grossior zedoaria intus sub citrini odore aromatica & sapore acuto: mēn tū zedoaria: sed si caremꝑ ea. loco ipsiꝑ. zedoariā ponimꝑ.

De aureo pōdere dīa est iter doctores de eo & magna, quidam dicunt ut Gentilis qđ est pondus. ꝑ. i. s. & hoc affirmat Simon Ian. Alii dīct qđ est vij. pars uncie. Sed cōis & et oibus alijs medicinis non solutiū iē ē qđ ꝑ. i. s. In me dicinis uero solutiū iē reperit idē ē qđ vij. pars vnciæ qđ nō plus. Insuper quia cōfectio hæc & sequentes ꝑ ꝑ læsciam hominū fieri solent in morcellis: gñitas spērum ad zuchurū declarata est. Ideo ad oēm librā. i. zuchari apponi debet. ꝑ. i. spērum eribellata: & eribellata dico ꝑ ꝑ simplicia qđ eribellari nō possunt ut amygdalæ, dactylis, semina aia & c. Ad oēm uero li. i. mellis spēri eribellatū, ut supra. ꝑ. i. s. Et hoc mō faciēdo, hnt dīi medici & ægri uirtutē medicinarū a doctoribus limitatā. Secus aut facit apothecarij nostri capis auriatū ducti, qđ innotat illis Deus & c. nota in super ꝑ Mef. dī citricōice cū mel emblicorū & colatura geleniabini. Ideo si forte illa facere vis: scias qđ mel emblicorū hoc mō fit. Rē. myrob. emblic. ꝑ. ii. aquæ cōis li. ii. terantur subtiliter dicti myrobalani & insundant per dies. vii. in dicta aqua postea bulliant vq; ad consumptionē mediæ: etas: deinde colentur cū pāno lineæ manibus exprimendo, & in dicta colatura ad dā mellis boni lib. i. & bulliāt simul vq; ad consumptionē aq; & cōctōne mellis, & referet hoc n. dī mel emblicorū. Accipe ergo mel emblicorum, geleniabini. i. mel rosati. an. lib. s. suprascriptarū spērum. ꝑ. i. s. & simul misce, & habebis electuarium de gemmis in forma liquidi ut scribit Mef. & dōis est ab aureo medio vq; ad aureum unum. De geleniabini inter doct. est differentia. nam Aui. ꝑ. can. ca. de conditis

Lumi. apoth.

R

In Pandæ
ctis scribi
tur alibi
gemize. i.
ozimum
garyo -
phyllati
& in Mef.
alphenem.

dicir: geleniabin idem est quod rosa cōdita siue cum mel le siue cum zuecharo. Et sit tam zuecharū ros. quom idem rotatum: cum appellari potest geleniabin: & hoc idem tenet Halyabbas. Kālis uero. 3. Aluani. dicit: Geleniabin est mel rosatum. Quas opinioes reprobat Marr. Syl. dicens: geleniabin idem est quod mel rosatum. Sed geleniabin. i. zuecharum rosatum: geleniabin. i. tyrysus rosatus, & hac opinio ab aliis omnibus doctoribus tenetur. Igitur geleniabin. i. mel rosatum &c. & hoc de electuario de gemmis.

Descriptio. II.

DIAMVSCVM dulce Mesue faciēs ad pulsū cordis & xgri tudines melancholicas & ad eum qui tristatur sine causā, & confortat xgri tudines cerebri sicut est uertigo, & epilepsia, & tortura, & paralysis, & ad xgri tudines pulmonis & difficultati anhelitus.

R. Croci, doronigi, zedoariz, ligni alo. macis, an. 3. ii. alba. margarit. fete crude adustę, charabę, coralli rub. an. 3. ii. s. galliz musc. ozimi citrariz. i. meliliz, an. 3. ii. s. been albi & rubel. foliis, spicz, garyophyl. an. 3. i. zingib. cubebz, piperis lob. an. 3. i. s. musci fen. 3. ii. puluerizentur & conficiantur cū melle crudo q̄ fit quadruplū ponderis oīum hoc est q̄ dicitur Mel. in hac cōpositione, & dosis eius est a. 3. i. usq. ad. ii.

Circa hanc descriptionē. Nota de feta cruda adulta. Accipe de folliculis serici noui qui nondū pertransierūt annū, & aperi, & extrahe uermes quos int̄ reperies mortuos, & mūdā peroptime: deinde pone in olla nouā dictos folliculos: q̄ cooperito lapideo bā tegā: deinde in furno ponatur, & tū permittatur q̄ possint puluerizari: deinde extrahūt, & usui referunt. Hęc n. cōbūlitio fit vt desiccet, ac ut conteri possit. In una alia cōfectione infra repies subtiliter incidat̄ est ē ut bene terat̄: igitur p̄ hoc intelligas q̄ uterq; modus laudatur. Tū ego nō soleo hoc in electuario nec in aliis cōfectionibus cordialibus fetā cōbūrere, sed subtiliter incidere. Sed si cōbūrere uis ut uerba Mel. sonit. Caneas q̄ illa adustio nō sit incinerās immo prudēt̄ fieri debet, & taliter q̄ ferici solū sit puluerizabile & remaneat feta fin formam suā: dicit̄ est cruda, quia per cōctionē virtus eius extrahitur &c. De ozimo. Q̄b n. in cōpositionibus reperies scriptum ozimi garyophyllat: tunc idē est q̄ semen basiliconis citrini. Si uero ozimi simpliciter idē est q̄ semen basiliconis nigri, & hoc colligitur a planta basiliconis habet folia lata. Citrinū uero a plāta faciēte parua folia, & hęc est ipsorum dicta. Citrinū n. magis aromaticū est & cordiale magisq; calidum. Varia reperitur in litera de citrari. Vna. n. dicit̄ ut p̄ scriptū & hęc bona est: & idem est quod melissa. alia. n. dicit̄ citrati & alia citrati & ambe corruptę. Hic bene aduertendum est de behen. Behen enim scriptum duplici ee, & cum h, idem est quod radix alba & rub. quę ambe portantur de partibus Armenię. Sed ben scriptum solum cū uo e, & sine h, idem est quod semen caupetiz: quare bene nota literas ipas cum in cōposito reperies. Species aliquādo. n. reperitur scriptū spicz nardi uel spicz indr, & ambo idem sunt: aliquando spicz Romanę, uel spicz celticę: & hęc duo idem sunt. quare &c. Mel crudum est quod non est cōditum. Igitur si modo descriptio a Mesue facere uis. Accipe mellis puri lib. i. supra scripturum p̄fecierum 3. iii. & permisce: & sic habes mente authoris. Mel crudū qđ est quadruplū ponderis omnium. Si uero nō habes mel purū: potes hoc mō facere. Accipias unā quantitātē mellis quā uolueris & pone ad ignē ad bulliendū, & semp̄ illud despumabis quousq; mundū sit: deinde ad ignē amoueatur, & post frigida tiōē supra scripta p̄fecierū quantitas apponatur: & hoc modo habes mel crudum & a superfluitatib. depuratum. Alii uero dicunt quod mel crudum est illud quod manibus absq; igne exprimendo a fauo mellis habetur & extrahitur: & hęc opinio nō omnino sine ratione est fundata, illud uel p̄scriptum accipias quia conueniunt. Sed quia cōfectio hęc communiter fit in forma solida accipias zuech. cōcti lib. i. supra scripturum p̄fecierum. 3. i. & facias in morcellis.

Descriptio. III.

DIAMVSCVM amarū uulens ad omnia ea quę dicta sunt de diamusco dulci, & ad exsiccandā humiditates stoma

chi putrefactiones eius.

R. Supra scripturū specierū diamusci dulcis quantitatē omnem supra scriptā, & hus addas absinthii rosarū. Rub. ana. 3. iii. aloes optimi. i. succotrini ablut. 5. s. Mes. dicit. 3. iii. castorei Keisim. i. leuistici. an. 3. i. cinna. 3. ii. s. & confice cum melle crudo quod fit quadruplū ponderis oīum. Iqđ sit quā duplū ad summā p̄fecierū, & facias ut supra tibi monstrauim uel in forma solida uel melli &c. & dosis est dicta supra.

Aloes succotrinū dicitur aloes optimū. quia inter oēs aī spēs aloes est melius. Et lauat hoc mō. teratur quantitas aloes tibi necessaria, & rorabis illū aqua pluuiali uel endi. hęc n. lotio fit ut ipsius acuitas amoueatur, hęc confortatio augeatur donec tū ab aqua sit madefactū: deinde solū exponatur ad desiccandū, & permittatur usquequo possit de nouo puluerizari: deinde iterū contere, & cū p̄dicta aqua rorā & solū exponas. Et illud idē tertio facias: demū post exiccationē referua & utere illo. De aloē iterū est notandū qđ sunt qui illū cōbūrūt, quę ponere uolunt in hac cōfectione, & nō lauant, dicentes qđ per cōbūltionē amoueatur sua gōmitas p̄ quā laxabat & stomachū debilitabat: & p̄ hoc magis ei appropriatur alia uirtus & alia operatio q̄ est con fortare: & ideo tunc melius confortat. Et ob hoc notandū est, quod si aloes datur ad laxandū non comburitur, nec la uatur. Sed si ad confortandū datur illi abluatur uel comburatur quanquam combustio ipsius de raro fiat. Modus comburendi est: ponatur in olla munda & super nuptas permittatur donec aduratur. Semen leuistici in cōpositionibus apponendum est. Non autem planta neque radix neque folia.

Descriptio. IIII.

DIAGALANGA Mesualēs cōtra morbos uentositatē grossarū & acetosam eruotionib. & est medicina experta ad maliciam digestionis, & bonificat operationes stomachi, & hepatis frigidiorū: immo emendat defectionē ipsorū. **R.** Galāgē, ligni alo. an. 3. vi. garyoph. macis, Keisim. i. sem. leuistici an. 3. i. zingib. macropi. i. piperis lob. cinna. piperis albi. an. 3. ii. s. calamit. sicci, mēt. a. f. domesticę sicca. an. 3. i. leil. i. cardamomi maioris, spicz, sem. apij, sceniculi, anisi, carui an. 3. i. calami ar. 3. i. s. puluerizentur oia supra scripta debito mō: zuechari arabiz. albi uel illius puinciz. 3. x. melis colati & despumati. 3. x. Et fiat cōfectio decoquendo mēl & zuecharum debito mō. Sed quia cōter fit in morcellis: accipe lib. i. zuechari, & post decoctionē mēl & aliquale infri gida tiōnem addē supra scripturum p̄fecierum 3. i. & sic facias in sequeutibus, & dosis est an. 3. ii. usq. ad au. ii.

Intelligas quod in omnibus cōfectionibus & cōposi tionibus cordialibus. stomachicis, hepaticis & breuiter exceptis in medicis uomitibus: semper apponendum est cin namomum subtile. In uomitibus uero grossum apponendum est: eo quod illud uomitum prouocat, parumq; sustinet decoctionē & contritionē & minus subtile iterum sustinet.

Qđ simpliciter piper descriptū in cōpositionibus reperitur: de pipere usuali seu nigro intelligendū est. Calamentum & menta sicca in hac cōpositione ponuntur, quia sic cioris sunt complexionis. Et de menta domestica & calamento montano est intelligendum, non de aquatico.

Nonnūquā cōtingit apothecario reperire in quibuldā cōpōnibus mel tabazet. Ideo declarabo quid illud sit. Et dico quod est mēl album de celo cadens admodum roris. Et est albus quālibet mel apū, & quasi tendit ad naturā zuechari. Sed quia illo caremus, loco eius ponimus mēl albū uel zue charum secundā cōctē. Et hoc mel tabazet ponitur a Mes. in cōfectione de zingibere. distinctione quarta circa finē.

Descriptio. V.

AROMATICVM rosati descriptionē Gabrieles, ualer cōtra stomachi defectionē: & oia nutritionis membra p̄fortat: & est cōtra stomachi humiditatem & mollificationē medicamen expertū, & oīm putrefactionem in eo corrigit cerebrum & cor confortat, appetitum excitat, digestionē procurat, conualefcitibus, & debilibus mire subuenit.

R. Rosarum rubearū. 3. xv. ligurię rase & mundę. 3. vii. i. gni aloes boni, sandalorū macoziri. i. citrini. an. 3. iii. cinna. momi electi. 3. v. macis. garyoph. an. 3. ii. s. gammi ara. dragacan.

In Pandē. dicitur o. ximum. i. basilicon. scđ falso. herenge. misch. ar. ozimum. græce La. tine basilicon. garyoph. non ergo scri. batur p. c.

Mes. diu. zuechar. tabazet. vnc. a. i. i. s. despo. mazi. qui. cum. i. i.

In Mesu. antiquo. habetur. 3. ii. am. bre. feto. pulli.

gacathi an. 3. ii. & partes duas alterius. 3. i. & ii. nucis musc. cardamomi. l. maioris & minoris, galangæ, an. 3. i. spicæ. 3. ii. musci. 3. ii. ambre. 3. s. syr. rosati & de corticibus citri an. lib. i. & fiat electuarij puluerizatis prius puluerizadis. Si in forma solida facias ut in supracriptis tibi ostendi. Accipiedo lib. i. zuchchari & 3. i. spicieru &c. & dosis est a. 3. iii. vfq; ad. v.

Duplex solet litera reperiri in ac recepta de sandalis, una enim dicit sandali mazuchchari. Alia sandali mafurna. Et una & altera potest stare quia idem est quod sandali citrini, sed sunt qui exponunt & dicunt q. idem est quod sandali rubei, & expositio hæc falsa est: & prima uera. Quid autem intelligatur per duas partes alterius drachmæ ut alioth supraponit. Dico q. duæ partes unius drachmæ sunt. 3. ii. cum quælibet drachma ex tribus scropulis confect.

Aduertendum bene est adhuc propter communem apothecariorum errorem. Quod in quibuldam compositionibus in quibus scriptum reperitur Cardamomi tunc & maius & minus apponenda sunt, & de eis intelligendum est, sin uero de maiori solum intelligas. Et hæc fuit & est opinio Gentilis super quintum Auic. Et de hoc multi errores occurrerunt imperitia apothecariorum.

Descriptio. VI.

DIACYMINVM Mef. contra stomachi & uiscerū uē tositatem, digestione pcurat stomachū & uiscera calefacit.

Re. Cymini per diē in aceto infusi & exsiccati. 3. x. zingii. cinnamomi, an. 3. s. garyophyllorum, ligni aloes, macis, ana. 3. iis. s. galangæ piperis longi, cardamomi. l. maioris & minoris an. 3. ii. musci. 3. s. puluerizentur puluerizanda, mellis cocti & despumati lib. i. & 3. iii. fiat confectio in forma liquida, sed quia communiter fit in forma solida facias ut supra ostensum in aliis est &c. dosis est a. 3. iii. usque ad. i. iii.

Variz. n. reperitur receptæ de hac cōpōne, sed illa est melior & in uisū Reperitur quæ magnus error in hac compositione apud apothecarios & medicos: Aliqui. n. habent in suis receptis Cymini carmeni, & apothecarii dicunt q. carmeni, nihil aliud est q. provincia in qua dictū cymini nascit ut v. g. opii thebaici &c. Sed multum errant: ut uideri pōt a Mathæo Syl. c. de cymino. ubi dicit q. cyminum carmen idem est quod sileos, & sileos. i. silem mōtanum. Causa autē quare infunditur cyminum in aceto per diē est: quia acetū addit sibi in uirtute profundationis & incisionis, & temperat eius calorem aqualiter. Nota in super q. contritio medicinarum huius confectiois non debet esse subtilis sed grossa. Cū intentio ipsius medicine non sit nisi q. sit fortius in resoluendo & euacuando uētofitatem: q. si ultimate contereretur uentositatē non resolveretur sed per urinā educeret &c. hoc declarat Auic. in 3. can. cap. de diacymino &c.

Descriptio. VII.

DIAMBRA Mef. est medicina sublimis. cerebrum & cor confortans, & stomachum, & omnia membra: digestionem procurat, & urentem eo lētificat: & membra nutritionis calefacit: senibus quoq; conuenit: & frigidis natura & mulieribus & ægritudinibus matricum.

Re. Cinnamomi, doronici, garyophyl. macis, nucis musc. folii, galangæ, an. 3. ii. spicæ, cardamomi maioris & minoris an. 3. i. zingiberis. 3. s. sandali citrini, ligni al. piperis lon. an. 3. ii. ambre. 3. s. musci. 3. s. puluerizentur puluerizanda. Et cō fice cum syrupo rosato facto cum aqua ros. cum ualep rosato, & sit eius quantitas lib. i. & 3. iii. sed communiter fit in forma solida ut supra &c. & dosis eius est. 3. iii. vel. iiii.

Circa scripta & sequentia unū generale est notandū q. species huius confectiois & nē species medicinarū cōfortantiū mēbra & aperientium oppilationes debet subtiliter puluerizari: & eo maxime si ad longinqua membra confortanda debent transire. Non tamen ultimate. Vltima. n. contritio perdit uirtutem aromaticas, sed media fit inter ultimā & subtilem. Et si nostro tēpore hæc cōfectiones fiant in mortellis: maior operatio tamen & efficacior ut plurimum fit ab electuario quam a confectioe preparata, ut superiores. Et hoc multis rationibus. Prima propter meliorem fermentationem quæ fit aromatum in electuarijs quæ fieri pōt in confectioibus. Secūda quia de aromatibus plus ponitur in ele

ctuario construendo quam in confectioe.

Tertia quia melius & facilius euaporat & transit uirtus electuarii ad membra remota quam uirtus confectiois assump̃ta ut in p̃sionibus pectoris & cerebri. Et hoc uerificari potest in omnibus confectioibus & electuariis.

Descriptio. VIII.

DIACORALLI magistralis mirabiliter ualens ad cō fortationem cordis, & stomachi, & maxime cum ex longa ægritudine & calida sunt debilitata.

Re. Specierum diarhodon abbas. 3. iii. corallorum utriusq; fragmentorum preciosorum, margaritarum an. 3. s. puluerizentur subtiliter, & additis. 3. vii. s. zuchchari dissoluti in aqua rosa. fiat confectio in mortellis.

Intelligendū quod quando scribitur fragmentorum preciosorum absolute de quinq; descriptionibus supra in electuario de gemmis est intelligendum & non de aliquibus aliis. Secundo etiam est intelligendum q. quando dicitur specierum diarhodon abbas uel, specierum triafandalorum uel aliarum specierum de ipsis complete intelligendum est. i. de ipsis secundum integram descriptionem positam a doctoribus, non ut quidam fatui dicebant: qui cum scriptū inueniunt diarhodon abbas illas sine musco ponebant dicentes quod illa erat doctoris intentio & fatuæ.

Descriptio. IX.

TRIASANDALI Nico. taliter disti a tribus generibus sandalorum qui descriptionē ingrediuntur. Dantur proprie cōtra calorē hepatis & stomachi, phthificis & ictericis.

Re. Sandalorū alborū, rub. citrinorū, zuchchari albi an. solidos duos. i. an. 3. iii. rheubarbari. pōdii. fide cāna, succi ligritæ, semi. portulacæ. l. domestice an. solidum. i. s. i. ii. g. xv. amydi, gummi arab. dragacanthi, sem. melonum, semi. cucumeris, sem. citrulli, sem. cucurbitæ, sem. carioliæ an. solidum. i. idest. 3. i. s. camphoræ. 3. i. s. rosarum rub. 3. i. s. puluerizentur subtiliter, syrupo rosati, lib. ii. & fiat electuarium, sed communiter fiat in forma ut supra facilius solida.

Solidus. n. idē est quod. 3. i. s. & oēs doctores affirmant & exagii idē est, & non differt a solido nisi solum nomine. Oia simplicia ex quibus confectioes electuaria & cōpōnes oēs cōponuntur non sunt simul terēda, sed quælibet simplex medicina per se conterenda est puluerizanda. Et ratio est quia oia non sunt eiūsdē cōplexionis & subit. Immo quædā sustinēt multum de contritione, & quædā minus. Cinna-momum. n. & macis sunt rare substantiæ: garyophylli uero & gumme sunt densiores substantiæ. Quapropter ut ex contritione uirtus ipsorum non deperdat, omnia & per se debent puluerizari: quod locus faciunt apothecarii nostri tem poris & male. Ideo nimirum si composita non habent uirtutem a doctoribus limitatam. Et hoc idem in decoctionibus est aduertendum ut in tractatu syrupo rum te scire faciam.

Descriptio. X.

ELECTVARIVM de aromaticis Mef. q. scripsit Galen. expertorū iuuamentorū ad causas stomachi, & hepatis, & ægritudines in eis factas ex phlegmate grosso, & uētofitate digestionem cōfortat, inflationē remouet, & morbos ex ea factos curat. Retardat canos, colorē efficit bonū: & oris, & sudoris oderē. Renes quoq; calefacit & coitū excitat Acidosis rufus curat, & fastidium & abominationem remouet. Re. Ligni aloes crudī. non cocti, rosarum. an. aur. xii. idest. 3. xvi. galliæ mufcate, doronici, piperis lon. nucis muscate mētx siccæ, spicæ, casis lignæ, macis, garyoph. macis cinnamomi, allari. an. aur. xii. idest. 3. iiii. s. calami aromatici au reos. iiii. idest. 3. vi. croci, cardamomi. l. maioris, cardamomi minoris. i. melegretæ, rindarum sandalorum, rheubarbari, cubebæ, costizingiberis, seminis feniculi, semi. anis. & Keifim. i. leuistici ana. aur. xii. idest. 3. iii. & ii. gra. v. zuchchari. 3. vi. miuz aromaticæ. i. miuz cydoniorum cum speciebus lib. i. mel lis cocti & despumati lib. i. & 3. ii. & fiat electuarium puluerizatis prius puluerizandis. Sed si in mortellis facere uis, facias ut supra: dosis eius est a. 3. ii. vfq; ad aur. iiii.

Lignum aloes crudum est illud quod non est coctū. Arabes. n. solēt ipsum decoquere ac quando illud ad nos uenire permittant: decoquendo illud in aqua per quā decoctionē

quædam humiditas quæ in illo erat seu gümofitas amouetur quæ natans est super aqua: illam refervant: deinde mittunt ad nos illud coctum, quod est sine anima, & nulla habet virtutem vel bene paucâ: & ob hoc auctor dicitur: erudi. Cognito scitur quod sit crudum hoc modum. Nam si in igne ponitur emitit quandam humiditatem aromaticam: quæ illud a combustionem prohibet. secundo si in aqua prociatur subito fundum petit propter ipsius gravitatem, & talis est eius cognitio.

Descriptio. XI.

DIARHODON abbatris Nicolai a rosis quæ ibi intrat plus quâ de aliis spibus, nomē accepit abbatris ab abbate de curia cõpositum: datur aprie ictericis, hepaticis, phthisicis, hecticis, & cardiacis qui patiuntur ex calore, & ad calefactionem stomachi, pulmonis & totius corporis & conualescentibus ex lógis & acutis aggritudinibus mirabiliter auxiliatur.

℞. Sandalorū alborum, sandalorū rubicorū an. ʒ. iii. s. dragacanthi, güm̃i arab. spodiū an. ʒ. ii. assari, spicæ mali. cardamomi. f. maioris & minoris, croci, xyloaloes, ligni aloes, garyophyl. galliæ mulf. anisi. f. sem. marathri. f. sem. feniculi cinnamo. succi liquiri. rheubarbari. sem. balliconis, berberis, scariolæ. f. seminis feminis portulacæ. f. o. melitæ. sem. papav. albi. f. sem. citrulli. sem. meloni. f. sem. cucumeris. f. sem. cucurbitæ an. ʒ. i. losis de corde cerui, margaritarū. an. ʒ. s. zuchari cadi, rosarū. frubearū an. ʒ. i. & ʒ. iii. caphoræ tertiam partem vnius. ʒ. & gr. vii. mulf. graii. puluerizentur puluerizanda subtiliter. Et cū li. i. syrupi facti cū aqua ros. i. cū iulep rosato fiat confectio Et si in forma solida facere vis modum habes supra descriptū & dohis est a ʒ. iii. usq; ad. iii.

Nico. dicit quod hæc confectio debet dari cū rhodostoma vñ cū frigida ut igitur ois pars clara ficiat quæ cū rhodostoma re. i. cū decoctione rosarū, vel cū frigida. i. vel cū decoctione facta cū frigidis. Sed decoctio hæc hoc tpe nō est in usu, sed loco ipsius datur cū syrupo ros. De spodio inter doctores magna est cõtrouersia. Quidam dicunt quod est radix canna ultra marina: adulterata: quidam uero quod est spica cuiusdā arbu sculi in Alexandria crescentis. Alii quod est fuligo quæ in domibus inuenitur in quibus funduntur metalla: quæ postquæ ex cideat recto de spodio, quæ uero remanet dicitur pōpholus. Nōnulli uero dicunt quod est cinis qui inuenitur super fornaces argenteorū qui lauat ut ferrugo. Quæ oēs opinionones abiiciendæ sunt tanquā frivole: & dicendū quod spodium est os elephantes cõbustum. Elephas ossa habet solida ut lunc dentes, & illa non comburuntur, sed ad diuersa accidentia referuntur. Sed illa quæ medullam habent comburuntur, & cõbusta spodium de canna dicitur, & hæc uera est opinio.

Descriptio. XII.

CONFECTIO de florace magillralis. Illa Mel. & Ni cola. non est in usu propter opium.

℞. Passularum electarū & ultimate contritarum. ʒ. i. liquiritiæ. rasæ & munda. ʒ. vi. ligni al. nucis mulf. cinnamomi electi an. ʒ. i. s. storacis. f. calamitæ. ʒ. v. boli armelori & præparati. ʒ. iii. puluerizentur subtiliter oia, & cum ʒ. xv. zuchari dissoluti in aqua betonicæ & foliorum ulmarum fiat confectio in morfellis faciendo omnem morfellum de ʒ. iii.

Confectio n. nihil aliud est quàm cõpositio diuerforum. Modus lauandi & preparandi bolum armenū talis est. Accipe de eo quantitatē quā uolueris & tere subtiliter: postea infundatur super eum quantitas aque rosæ quæ irroretur: de inde in umbra permittatur exsiccari: & iterum post exiccationē contratur, & aqua rosifloretur, & ter ut primo hoc fiat postea referuatur: illud enim dicitur lotum & preparatum.

Storax simpliciter si scriptum reperitur de florace calamitæ intelligendum est tanquam de perfectiori.

Descriptio. XIII.

CONFECTIO de cinnamomo Mel. sana & experta ad humorositatem stomachi & putrefactionē in eo, phlegma digerit, & digestionem procurat.

℞. Cinnamomi subtilis & electi. i. cannellæ. ʒ. xv. siue darfeni. i. cinnamomi grossi. cymini. eule. f. radiciis an. ʒ. iii. dicte Mel. ʒ. s. galangæ. ʒ. vii. garyoph. piperis lot. cardamomi. f. maioris, zingiberis. heil. i. cardamomi minoris, & est melegeta, macis, nucis mulf. ligni aloes an. ʒ. iii. croci. ʒ. i. zuchari

ʒi tabarcei. i. albi. ʒ. v. mufci. ʒ. i. partes duas. i. ʒ. ii. puluerizetur subtiliter oia, mellis solari li. i. & ʒ. iii. fiat pfectio, & sit i forma solida, ut supra. ubi oltēsi ē. dohis est a. ʒ. i. usq; ad. v.

Confectio hæc licet in usu nō sit: tūa in ea apothecarii solent dubitare igitur quā in aliqua cõpositione scriptum reperis darfeni per se, semper debes apponere cinnamomū electum, si uero darfeni & cinnamomi ut in superiori uidisti, utrunq; f. & subtile & grossum est ponendum: nec auscultes illos dicentes quod per darfeni intelligit macis. hæc enim opinio reprobatā est a Christophoro honestis super Mel.

Secundo est intelligendū quod reperis in una recepta heil p. f. de cardamomo maiori semper est intelligendū: Si uero cardamomū p. f. reperiat ē de maiori est intelligendū. Si uero ambo reperiat ut in superiori. Et maiorē & minorē de bes apponere. Non aut garyophyllos ut quidā fatui dicunt.

Descriptio. XIII.

ROSAT Anouella Nico. d. rosata a rosis: nouella respectu ueteris quod recipiat sulphur uiuū uomit & subuersionē stomachi aufert, debilitatē & scim reprimat defectus cõpescit. ℞. Rosarū liqui. zuchari. f. albi an. ʒ. i. ʒ. ii. s. cinnam. ʒ. ii. ʒ. ii. gr. ii. garyoph. spicæ nardi. galangæ. zingib. i. nucis mulf. zedoaria. storacis. f. calamitæ. cardamomi. f. maioris & minoris. apii. f. sem. an. ʒ. gr. vii. puluerizentur puluerizanda mellis cōti & depumati li. i. & ʒ. vii. & fiat in forma liquida. Si uero in forma solida facias ut supra te affuesci.

Nardi fi reperiat scriptum in aliqua cõpositione ut in hac communiter reperitur: de spica nardi intelligendum est. Non autem de cõpositione cuiusdam unguenti preciosi ut quidam dementes ausi sunt dicere.

Descriptio. XV.

DIADRAGACANTHVM frigidū Nicolai a dragatō nomē accepit, sanat oē uitii pectoris & pulmonis, quod fit a colore & ficitate, & confert maxime phthisicis, hecticis pleureticis, peripleumōicis, & ad oēm tussim quod fit ex caliditate uel ficitate. Ad oēm linguæ & gutturis alperitacē, cū uero sumitur, tādū in ore teneatur donec ibi dissoluatur.

℞. Dragacanti albi. ʒ. i. güm̃i arab. ʒ. i. ʒ. ii. amygd. ʒ. i. li. gr. itz. ʒ. i. sem. melonis. f. sem. cucumeris. f. sem. citrulli. f. cucurbitæ an. ʒ. ii. penidarii. ʒ. iii. caphoræ. ʒ. s. syrpi uiolai i. iulep uiolai li. i. contundantur subtiliter omnia: deinde permiscantur bene in mortario paulatine miscendo & reuerteretur. Sed hoc cõmuniter fit in forma solida hoc modo.

De cõpōne ista est intelligendū, quod cum fit in forma solida nō debet fieri ut de superioribus tibi dixi. f. accipiedo spērū ʒ. i. zuchari li. i. eo quia pauca spēs cribellatæ in ea intrant. Sed de eis supra descriptis debes accipere. ʒ. iii. zuchari li. i. & facere in morfellis. Tm. n. zucharam quod pñctat spēs possunt simul teneri debet apponi & non plus. Igitur præscripta regula ab apothecariis tenenda est. Et ego oppositi uidi semper facere ab eis: quanquā sæpe ac sæpius a me moniti essent. Oēs doctores cõueniunt quod güm̃z debet dissolui in cõfectionibus: in quibus intrant & non cõteri eo quia puluerizari non possunt: & pistando uirtus illorum perditur: quare cū in aliqua cõfectione intrant dissolui debent in aqua appropriata: in ista. n. dissoluantur cum parum aque uiolarum in aliis uero cum aliis aquis fm diuersas intentiones.

Descriptio. XVI.

DIARHODON descriptione cõmuni Mel. confers ad dolorem stomachi, & hepatis & puncturā in eis a caliditate & acuitate cholere citrinæ faciens digerere cibum & est ex conferentibus stomacho & hepati debilibus.

℞. Rosarū rubearū. ʒ. xxx. trochiscorū diarhodon, trochiscorū de spodio, liquiri. an. ʒ. s. garyophyl. galliæ mulf. an. ʒ. iii. spodiū, croci, malicis, berberis, ligui. al. an. ʒ. ii. sandalorū alborum, sandalorum rub. sandalorum citrinorum an. ʒ. iii. assari, spicæ indæ, macis, cardamomi. f. maioris & minoris, sem. portulacæ, sem. lactucæ, sem. scariolæ, sem. citrulli, sem. meloni, sem. cucumeris. f. sem. cucurbitæ, margaritarum albarum alfelengemich. i. ozimari, rasæ eboris. dragacanthi. güm̃i arab. an. ʒ. i. caphoræ. ʒ. i. s. mufci. ʒ. s. puluerizentur subtiliter puluerizanda. Conscice cū li. iii. & ʒ. iii. syrupi facti

Si spodium est res curus origo non latet, res tamen adusta uidetur. Autem, dicitur radices canarum adustarum. Spodium est species thuciæ.

In aromtico res dicitur ubi reperitur crudum, intelligitur est de maiori & minoris, & diarhodoni cõmuni.

Mel. dicitur ʒ. iiii.

Facti ex ros.& aqua rosata, dosis est an. 3.ii. usq; ad aur. Sed
in forma solida fieri solet ut supra.

Syrupus factus ex ros. & aqua rosata cū quo debet confici hæc cōfectio in forma liquida facere volumus hoc modo fit. Rosarū viridum li.ii. posat in vase vitreato stridit orificiū. & super eas infundatur feruentis aquez ro.li.v. constringatur orificiū vase, & pmitatur refrigerari: deinde distillat ros. bene manus exprimitur: & duæ alie libræ rosarū viridū accipiuntur, & p̄dicta aqua ros. calefact bene & iterū supra eas ponatur: & inde coletur & exprimitur: deinde iterū & tertio hoc fiat in nouo uas rosas & aqua calefaciendi: deinde coletur. Accipe distillat colaturā, & adde liiij. zuchari ca rificati, fiat syrupus de quo fit prescripta cōfectio. De musco & opio in medicinis parū ponitur: muscus in modica quantitate est magnæ qualitatis & operationis, opium similiter. Et idē sufficit parū p̄ponere in magna quantitate non ceat, aut operationes aliarū medicinarū corruptas ut occultet. Et sic ut de opio & musco exemplifico: ita & de aliis medicinis fortibus est intelligēdi. Nota hæc de p̄tritione sp̄rum electuariorum & cōfictiōnū. Nam q̄s p̄s p̄ponuntur in electuariis confortantibus p̄ceptibus uel alitercantibus: vel alterantibus & confortantibus subtiliter debent conterri. Cāse ille qui non alterant nec confortant nisi attrahantur. 1. & idē ad hoc ut alterent membrū, uel confortent, indigēt ut attrahat a mēbris possint penetrare: facilius aut penetratio fit per contritionem posita. Secus autē est de medicina soluti ua. Nam ipsa manens quæta in stomacho fm cōem opinione euaporat ad membra. q̄ si attraherentur a mēbris esset malum. Et idē grosso modo debent conterri, & hoc respectu subtilis, nec citius debito transeat a stomacho, & hoc notato habes perfectam doctrinam conterendum.

Descriptio. XVII.

AROMATICVM rosatum Mes. stomachum & cor confortat, humiditatem viscerum exicat, appetitum excitat, & digestionem confortat. Vomitus & nauseam sedat.

℞. Foliorum rorarium rubearum. ʒ. i. s. ligni aloes, macis, gā
ryophyllorum, trochiferorum diarodon, gallicæ mæ. an. ʒ.
ii. s. liquiritiæ mundæ. ʒ. i. cinnamomi subtilis & electi. ʒ. iiii.
galangæ, zingib. nucis mæ. an. ʒ. ii. s. heil. cardamomi maio
ris, spicæ an. ʒ. i. puluerizentur subtiliter, & cum syrupo ro:
& de corticibus citri an. ʒ. viii. fiat confectio. aromatizan
do illam cum ʒ. s. optimi mædi. Sed in forma folida fieri so
let ut supra dōs est a. ʒ. iiii. usque ad v.

Si totarum in aliqua compoſe ſcriptum reperis ſine de
terminatione tunc de rubeis intelligendum eſt tanquam de
perfectioribus & melioribus. Hic & pro hac compoſitione
& pro antelſcriptis & infra ſcribendis eſt notandum quod
deſcriptiones trochiſcorum in iſtis ingredientiſ infra de-
ſcribentur in ſumma. 4. quæ de trochiſcis tantum erit.

Description. XVIII.

AROMATICVM roſatum minus Meſue, ſtomachum
& cor confortans, & eorum inflammaciones ſedans.

℞. Rosarum rubra. 3. x. ligni aloes, sandali macoziri. i. citri-
ni an. 3. ii. cinnamomi electi. 3. s. masti. 3. i. & 3. i. a. pbr. 3. ii.
musci. 3. i. puluerizentur subtiliter & cum 3. x. fyr. ros. fiat in
forma liquida. In forma solida fit ut supra, de cæteris dixi.

Inuenitur in hac cõpõne magna diuerfitas literę aliqua.n. dicit ut in fupiori annotati, & bñ litera fit. In aliquo Mef. fcriptum reperitur mactis exagiu vnũ, & hæc litera a corrupta eft, quia fuperior tendenda eſt. Inſuper intelligendum qđ aliqua in cõpõne fcriptũ reperies fandalide fandalis citri nis eſt intelligendũ, cum meliores ſint, eo qđ participat de utraq; natura: & quoddã mediũ lum inter alios & rubcos. Si vero reperiatũ fandalorumde oibus fandalis intelligas.

Descriptio. XIX.

AROMATICVM muscatū Mef. cōfert syncopi, & tūe
moti cordis, & confortat cerebrum & cor, & confort epile
psiz & pr̄focationi matricis, & facit oris odorem bonum.

℞. Ligni aloes. ʒ. vi. darfeni. i. cinnamomi fini uel subtilis
3. x. ambr. ʒ. iii. musci boni. ℥. ii. puluerizentur subtiliter,
& cum lib. i. syrapi rosati fiat confectio. Si in forma solida,
ut supra ostendi facias.

De musco nota quòd uim suam & odorem amittit si cum speciebus aromaticis confusatur: ferè ponitur, & uirtus sua àmilla recuperatur si in cloacha ponatur odorem recuperat queni amiserat: ex permixtione aromaticorū Confusatur autem si in suo folliculo teneatur uel in ampulla uireta, & cum eo permiscetur plumbum in parua tuitra incitum, sed ab aromaticis elongetur. Medicinè simplices plures ponuntur in composita, eo quia ex his simplicibus fiat una uirtus communis quæ in nulla simplici inueniebatur.

Description. XX

AROMATICVM garyophyllatū Mes. stomachū & cor confortat, nauscam & uomitum sedat. & ualet contra-
factionem in partibus stomachi: membra uero nutritionis calefacit, & uentositates dissoluit & carminat.

Rx. Garyophyllo .3. vii. macis, zedoariae, galangae, sandali, ma- Meſ. diſc.
coziti i. citrini, trochiferorū, diardhon, cinnamomi, ligni 3. viii.
aloes, ſpicie indæ, piperis lon. heil. c. cardamomi maioris ana
.3. i. rofarum. Rub. vnc. ſiquiritæ, galliæ muſcatæ an.3. ii. fo-
lii, cubebæ an. partes tres. 3. vnus. I.3. ii. & gr.v. ambræ.3. i.
muſci. 3.s. puluerizetur ſubtiliter omnia, & cum libr.i. &
vnc. ii. lyrupi citrini. i. uleup roſati fac confectio, ſed in for-
ma ſolida ut ſupra faciendum eſt.

De folio inter doctores magna est differentia, & p̄rouer
fia. Quidā n̄ dicunt quod est quēdā herba nascens in aquis
dulcibus abq; radice: & super ea nata quēdamodū lētigo
aqua. Alij quod est arbutum nāscens in India, & folia ipsius
est folium. Alij uero dicunt, & hæc opinio tenetur, q̄ sunt
folia garophyli, & sic res est. Partes tres unius dra. sunt du
3. & gra. v. Nam diuidendo drachmam per. iiii. omnis pars
erit gra. xvj. & sic te multiplicando. xv. erunt. iij. & gra. v.
Cum. x. mod. refuset fve sint gra. xx. quare &c.

Descriptio. XXI.

AROMATICVM nardinum Mes. stomachum & hep-
par & uiscera confortat, & renes, & uesicâ, & addit deside-
rium coeundi, oris & sudoris odorè bonum facit, & confor-

tar anhelitus, & facit digestionē cibi, & resoluit vīscositates.
R. Spīz ind. 3. ii. rofarū i. frub. vnc. s. liquiritiz. 3. ii. s.
galliz. fobelinz. & est quēdam confectio quē fit in trochi-
leis, cubebz, ligni alo. macis, garyophyllorum, foliū indi. cin
namomī, anizū, corticū citri, trochiscorum diarhodni an.
3. i. & 3. i. pīncarum purgatarū, amygdalarū purgatarū
& excoctatarū an. 3. v. dragacanti, gummi arab. an. 3. ii.
mufci 3. ii. pulverizentur subtiliter & conficiantur cum li. i.
& vncyrii pol. & fit in morisillis ut supra.

Purgentur pineæ, & amygd. hoc mō. Accipitur bacilonū sub quo sit ignis carbonū & in eo ponant amygd. & pineæ extorcatæ seu mundæ a subtili cortice, & manibus ducunt hinc & inde vsquequo sint bene calidæ & aliæ caliditate con sumitur ille humidū corruptū. Alio ē modo fieri pōt cum amygdalis & pineis ponant. m. iiii. uel. iiii. ℥m ipsorū quanti- tate tursitis, & bene supra dictā igne oia simul uolue quous- que bene calefacta sint, & ab illo fursure amouetur illa ran- ceitas & pure. sine malo sapore reddunt & hic modus me- lior est. Sebeliz est quidam compō quæ describitur infra in trac. trochiscorum quæ a Melgalia febelinz appellatur & dicitur. Item notandū est qd in p̄scriptis compōnibus in quibz Mescribit, & confice cu syrupo ros. uult quod cōponā- tur cum ulepo rosato, quia perfectior est & magis confortati- uum. igitur exponas confice cum syrupo ros. factō ex a- qua ros. uel. i cum ulepo. rosa. & hæc est authoris intentio.

Descriptio. XXII.

ELECTVARIVM de citro Mefuæ confortans ftomachum & procurans digeftionem & odorem oris facit bonum, groffas uentofitates expellit, & confortat cor.

Rx. Corticum citri aur.xx.i.3. xxx.garyophy.ligni alo.cinna
momi.macis.galangæ ana.ii. mufci.3.s. catdamomi.f.maio
ris& minoris,zingi.an.3.i.puluerizetur hæc non multum
subtiliter,mellis cocti depuma.3.viii.et fiat confectio. Sed
fieri solet in forma solida ut supra dosis est.vnc.s.

Vellē etiam postquā p̄uinciā hanc accepi Ioan. Fran-
cisco mi, partem omnem apothecarij necessariam declara-
re, ne illi sua ignorantia ad tenebras exteriores ducerentur.

Contingit nonnunq̃ ad eos accedere viros & hoies afflictoſ stomachi dolore petentes ab eis ſuffragium. Ipſi pietate mo ti exhibent vel aromaticum vel diacyminum vel dianifum non ultra conſiderantes de hora exhibitionis, quæ res q̃q̃q̃ ducit ægrū ad non parua pericula. Et pp̃ inducti me audiāt, notentq̃ digeſtionem hanc. Confectiones quæ dantur, aut danſ ad digereundum materiam facientem ægritudinē & de opiluladum, ac ad confortandum membrū ut tria ſandali, & tunc dari debent ante cibū ſaltem per horas quatuor vt poſ ſit a natura pparari, & ad loca neceſſaria tranſmitti. Si vero pp̃ ſtomachum aut propter proſtrationē appetitus dan tur, tunc parum ante cibum dandæ ſunt. Si vero propter vir tutem digeſtiuum exhibentur, immediate poſt prandū ex hibendæ ſunt. Si uero dantur ad confortationem cerebri & virtutis aialis poſt prædium & poſt cenam per longum tem pus ſaltem per duas horas dandæ ſunt. Si uero ad cordis cō ſortationem debent dari circa mediam noctem & tenendæ ſunt multum in ore vt paulatim reſoluantur. Si uero ad re ſolutionem ventofitatis ſtomacho vacuo a cibo & ſuperflui tatibus mundato exhibeantur. Et in hoc aduertendum eſt q̃ nullo mō exhibeantur, neq̃ tyriaca, neq̃ confectiones aperit iue ſeu diuretica cibo exiſtente in ſtomacho vel in ipſo repleto malis humoribus Igitur conſuetudo Vercellenſium quæ eſt accipere tyriacam cum aqua ardenti pp̃ nauſeam vi tuperatur. Ac corruptela Italicoꝝ qui eam cum maluati co aſſumunt. Et ratio eſt, quia cibus indigeſtus ac ſuperflui tates malorum humorum ducunt ſubtilitate maluatici vel aquæ ardētis ad hepar & opilationem faciunt: & ad prauas ægritudines homines præcipitant, quæ &c.

Huius electuarii ſpecies ſunt ſatis græſe tendē q̃ ſua virtus ſit in confortando ſtomachum & non tranſire ipſum, ſed vſoſitates reſoluit, & hoc propter cauſas aſſignatas in recepta diacymini.

Modus accipiendi cortices citri, & aliorum pomorum ſuauem & aromaticum habentium odorem, hoc mō facias, iſig̃ qui vult vti corticibus pomorum citri in compōitione eligat poma quæ habeant acetofitate maiore intrinſecus eo quia cortices eorum ſunt magis odoriferi, & oportet q̃ ex corientur illa die qua collecta ſunt ab arbore, & terantur ergo primo bene cum mantili aſpero, & mundo, & exorientur cō cutello acutæ acutiſ paulatim & leuiter, ne accipiatur ex carne cum cortice, & ſimili modo oportet fieri de cydo nis & aliis pomis. deinde in umbra exicentur.

Mota q̃ iſta oīa electuaria dulcia ſupra deſcripta per an num integrū ſeruantur & ultra oīa alia p̃ter electuariū quo utuntur reges & prelati, q̃ non pōt diu ſeruari, eo quia ran eſcit, ſed ſolum per dies xv. vel p̃ mēſem ad plus ſeruatur.

Ex his habentur deſcriptiones cōfectionum delectabi lium cum ſua declaratione, & eſt ſinis primæ diſtinctionis.

Incipit Secunda diſtinctio: quæ eſt de electuariis amaris, & continet 16 deſcriptiones. Quarum prima eſt.

TYriaca Andromachi quæ eſt ſublimior medicinarum compoſitarum, & melior earum pp̃ multitudineſ ſui iuuamenti & propriæ in venenis quæ ſunt & punctu riſ, ſicut ſerpentū & ſcorpionis, & canis rabidi, & venenis ebibitis interſcientibus. Et ad ægritudines phlegmaticas & melancholicas, & ad febres earum, & ad ventofitates ma lignas & paralifiſ, & apoplexiā, & ad epileſiam, & tor turam, & tremorē, & ad eū qui ſecum loquitur, & maniam, & ad leprā propriæ & albaras. Et confortat cor, & acuit ſen ſus, & confortat ſtomachū, & alleuiat anhelū, & delet pul ſum cordis, & retinet ſpūtū ſanguinis. Et conſert ad plures dolores renū & velicæ ex quacunq̃ cā ſint, & frangit lapidē p̃rie in uſica, & conſert ad ulcerā inteſtinoꝝ & durities ipſe in hepate & ſplene, & melior deſcriptionū huius medicinæ eſt deſcriptio radicalis Andromachi, & eī illa quæ fieri deberet, quāuis aliqui apothecarii noſtri t̃pis illā Ga leni ſentiant, hanc aut deſcriptionem repperi in quodā libel lo Gentilis de venenis, quē ut ipſe teſtat habuit & extraxit a quodam libello Andromachi propria manu ſcripto &c.

Re Trochiſcorū ſquillæ li. i. trochiſcorum viperæ, trochiſco rū alindaracharon. i. Andromachi, pipe, nigri, opii thebaici an. ʒ. vi. cinnamomi, ſeminis napi. i. ſylueſtris, ſcordeon. i. al liorū ſylueſtriſ, roſarum rubearū, i. reos. i. lilii cœleſtis. ſ. ra dicis, agarici, ſucci liqui. baſami. i. liquoris emanātis a ſtipi te, myrrhæ, croci, zingib. rheubarbari, pētaſphylloniſ. i. quin q̃; folii, calamenti mōtani, praſii. i. marubii, daronici, & ali qui ponūt ſem. macedonici, & aliqui petroſellini, ſcædos, arabici, coſti, piperis lon. pipe. albi, pulegii, oliſani, ſquina ti, ærebinthinæ, caſiæ lignæ, ſpicæ nardi, polii montani, na ſturtii an. ʒ. i. ſ. ſtoracis liquidi, ſe. apii, ſiſeleos. i. ſileris mon tani, ſemē accipiedū eſt, ameos, chamedryos, chamepityos, hypoquiſtiſ, ſpicæ celticæ, ſchæz mōtanz, folii gentianæ, radix ſumitris, ſeni. terrę ſigillatæ, colocotar adulti. i. uitrio li, amomi, acori. ſ. radiciſ, carpopoſſami. i. ſemē ſ. baſami hy periconi. perforatæ vel herbæ ſancti Ioan. rubæz tinctoriæ, valerianæ. i. radiciſ an. ʒ. ii. gummi arabici, cardumeni, aniſi achatiæ, dauci. i. paſtinacæ ſylueſtriſ, ſemen accipitur ā. ʒ. ii. b delii, ſubalbi, bēdegaur, albezar, aſpalpi, opoponacis, cō tauræ minoris, ariſtolochiæ. ſ. rotundæ an. ʒ. ſ. caſtorii, ſera pini an. ʒ. i. diſſoluantur gummx prædictæ in vino albo odo rifero. q. ſ. Mellis cocti & deſpumati. rub. i. & lib. xxiii. quod eſt pro oī lib. i. mellis ʒ. iii. ſp̃rum prædictarū, & hoc uoluit bonus Andromachus, & apponi debet ſi tyriacæ dēt habere virtutē deſcriptā a doct̃oribꝫ hoc aut exhibenda de tyriacā ſi unaquaq̃ ægritudine diuerſa & ſem diuerſitatibus ægritudinū.

In hac deſcriptione multa ſunt intelligenda. Et primo de opio thebaico, dicitur. n. opium thebaicum, quia factum & collectum eſt Thebis, quia illud eſt melius & perfectius quocunq̃: alio opio ubiq̃q̃ collecto: & eſt minoris peri culi & timoris uſus eiꝝ.

De calamento dicitur montanum, & ponitur hoc, quia habet maiorem caliditatem & ſiccitatem quam calamētum fluuiale quod naſcitur iuxta aquas.

Stœcados arabici, dicitur arabici quia in Arabia oritur, & illud melius eſt, & in illis partibus multū colligitur. Sed nos utimur ſtœcados, quod quidem colligitur in provincia Romana, & eſt perfectum.

Loco chamæpithyos ſi non haberetur, accipi poteſt iua muſcata, q̃d a Meſ. in cap. de ægritudinibus neruorum appel latur zizen.

Hypoquiſtiſ ſuccus eſt barbæ hircinæ, & ille ponitur non herba: non ſolum in hac compōne, ſed in omnibus medicinis in quibus ſimpliciter reperies ſcriptum hypoquiſti dos: & qui herbam ponunt male, immo peſime faciunt.

Centaura de minori intelligendū eſt, & illa in medicinis adminiſtrat, quia ſi ſimp̃r reperitur, de ea eſt intelligendū. Et radix accipi debet non herba ut quidam rudes faciunt.

Vitriolum ſeu colocotar hoc modo aduritur. Accipe de eo quantitatē quam uolueris & pone in patella ad ignem & continue ſub ea inſuſtulerit don: igniatur, & continue vitriolum uoluatur, & tantum hoc fiat q̃ eiꝝ naturalis color mutetur, & tunc moueatur, quia aduſtum eſt.

Species iſte tyriacæ debent ſubtiliter teri ſeu pulueriza ri, & bene cribellari per ſubtilem & ipſum ſetacium ut me lius & citius reſ ſimul fermentari poſſint, vt Meſ. & Auic. ſcribunt cap. de tyriacā.

Puluerizabile. n. eſt quod comminabile vel diuiſibile eſt in partes paruas, & eſt aliud quam frangibile.

Utilitas autem puluerizationis, eſt quia facit penetrare virtutes medicinarum ad partes, ad quas non penetrarent.

Ætates. n. tyriacæ ſunt quatuor. prima dicitur infantia, & incipit a die compoſi uſq̃ ad ſex meſes. ſecunda pubertas quæ incipit poſt illud tempus & durat uſq̃ ad 10. annos. ter tia adoleſcentia, & incipit poſt illud & durat uſq̃ ad 20. an nos. quarta ſenectus, & incipit poſt illud & durat uſq̃ ad 40. annos poſt illud expoliatur a virtute tyriacæ.

In uſe plūbi tyriacæ debet poni vel conſeruari vel argē ti in alio. n. uſe poſita facit quādā ferruginem, q̃ appellatur ziniar, & conſumitur humiditas eiꝝ naturalis & neceſſaria in tyriacā, quare in plūbo bene ſeruatur. Et uas in quo ponitur nū dēt repleti, ſed ſaltē tertia pars uaiſ dēt eſſe uagua vt medicinz

medicinæ possint respirare & exhalare ne sese suffocent.

Descriptio. II.

TYRIACA Gal. quæ communiter fit, licet non sit tan-
tæ perfectionis quantæ est præscripta Andro.

Rx. Trochi. de quilla lib. iiii. piperis lon. lib. ii. & 3. iiii. trochi.
tyridi. s. trochi. diacoralli li. s. x. xlo. i. ligni balsa. 3. iiii. & s.
opii thebaici. i. aliius provincie. agarici. rosarum. i. reos. i. radi.
lii. coelestis. leuistici. scordeon. i. alii. sylvestris. f. rapæ syl-
vestris. cinnamon. opobalsami. an. 3. vii. s. heubarbari. spica
nardi. colli. quinanti. croci. zingib. casia lignæ. storacis ca-
lamiz. myrrhæ. terebinthine. calamiti montani. churis. di-
prami. stoccardi arabici. polii. montani. pentaphyloni. pipe-
ris. an. 3. vi. folii petrosilii. gummi arabi. chalcantii vlti. i. vi
eroli. serapini. terræ sigill. rubæ. hypoquistidos. i. f. sc. barbæ
hirci. spica. celticæ. acori. f. radicem. chamædryos. gentianæ
f. radicis. sitræ. i. valerianæ. carpopalsami. i. sem. balsami an.
3. iiii. s. f. apii. ameos. amomi. f. feniculi. carui. sileris. mon-
tani. semen accipitur nasturtii. anisi. hyperici. an. 3. iiii. s. mi-
niz. calstori. opapanaci. asphaliti. galbani. centaureæ mino-
ris. f. radicis. aristol. f. longæ. dauci. an. 3. ii. & 3. vi. est pastina-
f. sylvestris. f. leminis. mellis costi & despumati Rubrica
v. & li. v. quod est oi pro oi. i. i. mellis 3. iiii. spærum. Sed apo-
thecarii avaritia ducti hoc tpe solum ponunt li. iiii. spærum
pro Rubrica. i. mellis. & male faciunt. & ob hoc tyriaca nõ
habet vires ut doctoribus descriptas. quare semp ponas.
3. iiii. spærum pro oi. lib. i. mellis. Et præscriptum mel fit costũ
bona coctioe. Crocus vero & hypoquistidos per se pulve-
rizeretur ac utriusque gumme vero in optimo uino albo dis-
solvantur. alia uero oia simul. Mel uero in frigidaturn. tere-
binthina. & hypoquistidos intus ponantur deinde oes aliz
species Crocus uero infundatur in uno boccali optimi uini
nigri. & dimittatur per tres dies. deinde cum dicto uino in
tyriaca ponatur. utriusque uero in uino dissolvatur & in ty-
riaca ponatur. & simul misceantur. Sunt qui addunt galleti
subtiliter pulverizati. 3. s. vt tyriaca maiore nigredinem ha-
beat. Sed hoc ego non laudo. cum extra mentem Galeni &
omnium doctorum fuerit. & nunc præsentium sit.

Hoc nomen tyriaca est nomen impositum ab effectu. idẽ
n. est dicere tyriaca qd confersens venenis serpentũ & alia-
rum medicinarum uenenosarum. Et ideo hoc nomen habet
duas partes. Tyri & significat serpentem. & aca quod signifi-
cat medicinas uenenosas. cum componitur. igitur tyriaca
est nomen qd signat rem quæ iuuat in uenenis serpentum &
medicinarum uenenosarum. & est uocata tyriaca a carne tyri.

Agaricus ireos. & radix acori ponuntur in hoc recepto. &
in aliis quia habent in se uirtutem conservandi alias me-
dicinas ne cito corruptantur. & augent eorum uirtutes. &
sic piper conservat & zingiber a corruptione.

Anacardi corruptum uirtutem trochiscorũ tyr. Didici
trochisci debent esse parui & bene compressi si conservari
debent. & nõ debet exsiccare in sole. Sol. n. habet virtutẽ dis-
solvendi & destruendi virtutẽ trochiscorũ tyr. & uiperarum.

Tyriaca nõ debet dari nisi sit fermætata. & fermentatio fit
in tempore vi. mensium. Quid autem sit fermentatio nota.
Nam compositum habens unam formam & uirtutem resul-
tantem ex simplicium compositione significat. hoc uocabu-
lum fermentata.

Vinum in tyriaca ponitur primo ut per ipsum fiat medi-
cinarum conservatio & cõmixtio. secundo ut per ipsum cõ-
fortetur cor. & est contra uenenum in exhibitione tyriacæ
istæ conditiones sunt seruandæ. Primo qd sit fermentata. Se-
cundo qd detur sanis in parua quantitate & raro. Tercio qd
non detur in tempore calido. sed in temperato uel frigido.

Quarto qd non detur pueris usq. ad xiii. annos. Quinto qd
non exhibeatur in complexione calida nec in homine para-
to inflammari. Sexto qd non detur stomacho repleto cibo.
Ethæ sunt conditiones attendende in exhibitione tyriacæ.

Dux præscriptæ descriptioes tyriacæ per annos. xxx. ac
etiam usq. ad xl. annos seruantur. dummodo sint conue-
nienter debite factæ.

Descriptio. III.

MITHRIDATVM Nicolai. mater omniũ antidõ

torum. siue a Mithridate rege dictum qui ipsum composuit
faciens ad oes passiones capitis uirorum uel mulierũ si fue-
rent ex infirmitatibus & maxime melancholicis & timidis
& epilepticis. & hemicanicis. & dolorem ciliĩ patietibus &
lachrymãtibus. oculis. & ad oia capitis uitia uel aurium sub
uenit dentium doloribus. & palato. & omnibus uitis oris
maxillarum medetur si super locum dolentem ponatur. &
iterũ ad modũ emplastri ponatur in tibus. unde fit discus-
sus. Quinantiũ soluit. apoplecticis. tussentibus. asthma-
ticis. & motpoticis. peripleuonicis. & oibus doloribus qui in
tra corpus humanũ fiunt. Succurrit iliacis. dysentericis. &
hentericis optimũ si detur cõ decoctione balauftia. exten-
sionem humerũ thetanos siue spasmos patientes & paralyti-
cos sine mora curat. diaphragmati & hypocondriis subue-
nit. renibus & uesicæ opitulat. calculos frangit. menstrua p-
uocat. omniaq. uitia matricis excludit. scilicet morbi patienti-
bus & podagricis singulis præsidium est. præcipue datur con-
tra uenena oia. Reprimt uenenatos morsus fies rabidi ca-
nis seu cuiuscuq. reptilis impositum fies bibitur. cum ma-
gna admiratione emendat. Quotidianariis & quartanariis
etiã ante horam accessionis datum mirifice prodest &c.

Rx. Gargophyllorum. storacis calamiz. spica nardi. xyl-
balsami. i. ligni balsami. orobi. lentifici. i. laccæ. alia litera ha-
bet leuistici. dragacanti. maticis. galbani. gumi cedri. & qd
nõ habentur loco eius ponimus gummi iuniperi. aspalci. ca-
stori. offi. gummi hederæ. belii. terræ sigillatæ. mellisori.
laudani. opopapanaci. armoniaci. opii. quillitiz. albulis vi-
ni. nitri. i. f. f. f. hypogistidos. achatie. rosarum. chamædryos.
hypericon. abrotani. pœoniæ. heleni. i. enulz. origani. hyssop-
pi. rami cedri. quida non reperiuntur loco ipsorũ ponitur flos
& folia fanien. quidam uero ramulos iuniperi. sed fanien
melius est daphnidem. i. laurus aristolochiz lon. epithymi.
peucedani. centaureæ. f. minoris. rosifmarini. radiciũ. ingo-
run. balustiarum. quilliz. cinarum myrti. i. quinquami. cori
cum granatorum. anisi. raphani. carpopalsami. f. semi. balsa-
mi. cymini. cardamomi. f. maioris. sem. feniculi. sileris. o. i. f.
leris montani semen accipit. f. apii. ameos. petrosilii. f. her-
bæ rutæ. i. herbæ. f. papauæ. nigricilla litera hæt alibi. dauci.
nafeos. i. sem. git. i. lapæ. f. rapæ. synaps albi. alia litera ha-
bet synaps ulualis. macropiperis. i. pipe. longi. ozimi. amo-
mi an. 3. iiii. acori. i. radicis ilafeos. i. berbenz. panis porcini.
i. cyclaminis. philis. i. capparis. zuchozariz. i. flos agni ca-
si. cornu cerui an. 3. iiii. balsami. i. liquoris emanantis ab ar-
bore balsami. cinnamonomi. croci. zingib. colli. quinanti. tere-
binthina. myrrhæ. olibani. casia lignæ. agarici. spica celti-
cæ. ireos reupoticis. affari. praslii. diptami. colloquintidæ. sil-
fei. i. cõfolidæ minoris. stoccardi. artemiz. calamiti. f. mō-
tani. scordeon. i. alii. syluestris. leucopiperis. i. piperis albi.
camepitoy melano piperis. i. piperis nigri. pêtaphylon. pe-
trofelli. idest. f. petrofelli. semi. anagodon. i. fumach. mala-
batri. i. folij idi. cardamomi. f. minoris. i. meligete an. 3. iiii.
baccarum lauri. 3. i. gra. vii. vini uetustissimi. 3. ii. pulverizen-
tur subtiliter omnia. Sed gumme dissolvantur in optimo ui-
no albo. quemadmodum dictum est in tyriaca. mellis costi
& despumati lib. viii. & 3. ii. & fiat in bona forma.

Laudanum non est terribile. immo si laboretur in eius tri-
curatione prius corrumpetur quam fiat malaxabile. ideo de-
bet dissolui & liquefieri in uino quemadmodum gumme lau-
danum res est cap. & sic in primo gradu.

Insuper scias qd oes gimæ parũ sustinent de contritione.
& oes medicinz subtiliz & acutæ & raræ. sicut scama-
monæ. aloes. & oes medicinz inflãmabiles. sicut gumme
bdellium & serapinum. Et rō est. quia per triturationem ac-
quiritur inflamatio. quæ inflamatio fit per motũ qui motus
calefacit. Et hoc quia istæ medicinz sunt aptæ inflammati-
oni rōne substantiæ & subtilitatis. & ex hac inflammati-
one motu duo fiunt. Vnum quia partes subtiles euolant. Aliud
quia ipsa intensa contrito corrumpit substantiam earum.

Aristolochiz oes spēs & de trituratione & decoctione re-
plenam sustinet. Ana. n. est dictio arabica. & tantum importat
in lingua latina: quantum æqualiter. Radix ireos debet in
umbra exsiccare & incidi in parua frusta. Et in filo infilari.

& partes seu frustra separata esse debent: ita q̃ una pars nō tā
 gr̃a aliā & referuēt. Peucedani colligi debēt de mēse No
 uem. Spica uero celtica colligi debet de mēse Iulii. Vnum
 vte in oibus cōpositis est intelligendum de ethnologia uo
 cabulj. Medicinis .n. cōpositis imponūt nomina varia.
 Q̃h̃q; .n. a medicina quæ est basis denominatur. Sicut dyaci
 donitema, carnisby cydoniorū. Aliqñ a quantitate licet nō
 sit basis, sicut diaphinicon a fenichis dactylis. Aliqñ a com
 ponente sicut philonium a Philone medico, & Mitridatū a
 Mitridate rege. Aliqñ ab effectu cōs, sicut benedicta, quia
 ab oibus fumentibus benedicitur. Aliqñ a p̃p̃riis effectibus.
 Sicut blanca: quia blancos. falsos purgat humores. Aliqñ a
 similitudine, ut diacurcuma, quia similatur radici curcumæ.
 Aliqñ a loco ut syrupus de bysantiis, Bysantium quidē est
 locus in confinis Macedonia. Aliqñ a quantitate medicī
 nę & auctore cōponente, sicut dicit diarhodon abbas, dia
 rhodon dicitur a rosis abbas, quia Abbas quidā cōposuit.
 Aliqñ ex effectu, & auctore ut ygia græca ygia .i. saluatrix
 græca quia græci eam inuenerunt. Aliqñ ex medicina & si
 militudine, quæ opopyra .i. rubicunda similis igni. Aliqñ a nu
 mero medicinarum, ut tyriaca diatesferon .i. de quatuor re
 bus. Aliqñ a loco in quo aliqua suarum medicinaum fuerit
 collecta, sicut medicina afuledario scripta in caue lepra, aful
 ledati est mons quidam super cuius lapides munciri hirci
 montani, & ibi colligitur. Et quia tantum duodecim modi
 sunt hic positi, tamē plurimum sunt alii modi impositionis:
 qui apud nos sunt noti, & qui ignoti: & qui procedunt a uo
 luntate hominis: ideo omnes describi non possunt.

Istę species subtiliter etiam sunt puluerizandę, & cribel
 landę. Nā cribellatio & puluerizatio subtilis dō facit pri
 mo quia transeunt ad loca remotosissima. Secundo a calore no
 stro aliterantur & preparantur. Michridatum si caonice
 & secundum artem factum est, durat usq; ad annos quadragin
 ta in sua uirtute & bonitate.

Descriptio. IIII.

AVREA Alexandrīa Nico. aurea dicitur ab auro qđ ingre
 ditur eius descriptio, uel ab auro, p̃p̃ eius excellētiā. si
 cut .n. aurū p̃r̃excellent oib; metallis, sic hac medicina aliis
 in multis passionibus. Alexandrina ab Alexandro peritissi
 mo philosopho inuentore. arietis propter ad oē capitis vitiū
 ex frigidityte. & ad oēm rheumaticam passionem quæ a ca
 pite, ad oculos, aures, & gingiua descendit. & ad grauedi
 nem omnium membrorum quæ fit de eodem humore.

Re. Asfari, iusquiami, carpopalsi .i. feminis planas, balsami
 an. 3. ii. s. garyoph. opii, myrrha, cyperi an. 3. ii. balsami .i. li
 quoris emanantis ab arbore balsami, cinnamo. folij, zedo
 rix, zingib. costi corallorum rub. casis lign. euphorbi, dra
 gacanthi, thuris, storac. calamiz. spicę celticę, quā pro salu
 ca ponimus, meui. f. e. anethi syluestris, uel sitive, cardamo
 mi .i. maioris & mi. fissilei sinapis, saxifragie sem. ane. fe. anisi
 ana. 3. i. ligni alo. rheubarba. aliptę muscatę, caloris spicę
 nar. galangę, opopana. anacardi. masti. sulphuris uiui, pœo
 niz, iuringorum, rosarum. f. rubearū, thymi, achori. f. radicis,
 pulegii: aristolochiæ rotund. alia licet habet lōgę, gentianę
 corticum mādragorę, chamedrys, ualerianę. f. radicis, bac
 carum lauri, ameo, dauci, macropiperis .i. piperis lon. leu
 copiperis .i. piperis al. xylobasi. l. ligni balsami, carui, amo
 mipe. troscilij .i. sem. petrosellij, rutę. f. seminis, leuistici, fe. si
 noni .i. petrosellij agre. an. 3. s. auri cocti, argenti meri, alia
 rum margaritarum, blatzę bysantię, osis de corde cer. an.
 3. i. gra. xiii. limaturę eboris, calami aro. pyrethri ana. gra.
 viii. puluerizanda puluerizentur additis libris. ii. mellis co
 cti & despumati, fiat confectio in bona forma, detur in mo
 dum aequalanz eunti dormitum cū uino calido non febrici
 tantibus, febricitantibus uero cum aqua calida.

Opium quod fit in nostris partibus ex capribus papau
 eris nigri fieri debet in mēse Maii uel Aprilis, & ita opium
 thebaicū illo in tempore fieri debet. De me magna inter
 doctores est differentia, quidā dñt qđ est peucedani, & hæc
 opinio ab oibus reprobat. Alii quod est radix cuiusdam
 herbę nascētis in India, & falsā est. Sed me idem est qđ
 semen anethi syluestris. Si nō habetur loco eius ponitur fe

mē anethi domestici hoc uoluit Christof. de hone. Pro balsa
 mo ponitur terbenchina subtilis, uel oleū laurini, uel oleū
 balsaminum: uel gummi hederę, uel qđam compō olei, quæ
 describitur infra i recepta diacurcumæ. De aristolochia ab
 solute scripta apparet magna cōtrouersia inter doctores, q
 dam dicunt qđ de rotunda est intelligendū, quidā uero de lō
 gā, dicentes qđ una est perfectior, alii uero aliam. Qui uero
 longā dicit esse perfectiorem, intelligunt in calefactio, ma
 gisq; terrestris est quæ rotunda. Qui uero rotunda perfectio
 re dñt, est quia subtilior aptior: & ad aperiendū est quā lon
 ga. Cū igitur absolute scripta inueniūt, de rotunda intelliga
 tur. Quia illa p̃p̃tior est ad oēs operatiōes & melior &c.
 Radices oēs in autumno sunt colligendę, & cyperi mēse
 Octobris. Et nota qđ si radices alicuius herbę uel arboris
 colligantur, tunc debent colligi quando flores habent.

Descriptio. V.

IUSTINVM Nicolai, taliter dictum, quia a Iustino
 Imperatore primo fuit inuentum, p̃cipue datur calculo
 sis & patientibus dolore illi, ualeat strangurij, & dysurię,
 & his qui mingunt mucos.

Re. Cinnamomi, colli. foliisq; nar. casis lig. arist. olo. lon.
 aristolochiæ rotund. enulz. f. radices, hyssopi, pulegij, artemi
 si, pentaphylonis, leucopiperis .i. piperis longi, albi, orobi.
 i. arbilis. Nota qđ frequens usus eius facit mingere sangui
 nē peti ofellii. f. sem. leuistici, macedonici, sem. urticę, millij
 folis. i. anisi syluestris, saxifrag. iuniperi. f. seminis, semi. aipa
 ragis, sleris montani, apii. f. sem. anethi .i. seminis, rutę agre
 stis, f. seminis, loco eius poni pōt demosticę, f. citrile. f. scen.
 anisi, baccarū lauri an. 3. i. s. puluerizentur oia subtilissime.

Mellis cocti & despumati lib. ii. & fiat electuarium.

Nota qđ hoc electuarium solum per annum seruāt. De co
 sto qñ in receptis scriptū reperitur absolute, de costo ama
 ro intelligendū est. Nec aulscutes dicentes dulce costū re
 peiri. Nam illos oīno vituperat Symon Ianuen. hoc modo
 dicens, Inueniunt autē in multis locis costum dulce scriptū
 i cōfectionibus, fed nec uidi nec audiui, ab aliquo dici. Sed
 quidā empirici dicūt costum dulce esse radicē enulz artifi
 ciose paratam. Igitur & si in receptis inueniatur scriptū co
 stum dulce, amarum ponatur, cum illud dulce in rerū natu
 ra non sit. Dux tñ reperiuntur diuersitates costi. vnus .n. est
 Indus & est rufus leu subniger, & alter Arabicus qui est al
 bus & est reparior, & illo utimur, quare nota, & hoc oēs
 clamāt doctores. A nullo .n. reperies dulce costum feribi de
 doctoribus medicinz, quare acquiescat tantis auctoribus
 uiri hi ignari dicentes costum dulce reperiri. De saxifragia
 est controuersia inter apothecarios. multi .n. ignorātes pro
 ea ponunt quādam herbam habentem folia similia fere che
 lidoniz siue pimpinellę, minus tñ lara, & habentem radicē
 grassam & errant. nam illa est paltinaca syluestris. Sed uera
 saxifragia est quādam herba nascens in montibus adhærens
 saxi, quę herba facit plantam multis foliis subtilissimis, sub
 tilitatis fere capillorum longitudinis digiti, & hæc uere sa
 xifragia est, & illa in medicinis debet apponi & non alia
 & ex hoc apparet corruptela apothecariorum, quare non
 habetur uirtus medicinz a doctoribus limitata.

Descriptio. VI.

ELECTVARIVM de baccis lauri. Rafis. 9. Almā. ca.
 colica, & appellat confectioem non electuarium, mirabiliter
 ualens in doloribus stomachi & intestinorum & a uen
 tosite factis, datur p̃cipue in dolore colico a ventosita
 te factō & per os & in clysteribus apponitur.
 Re. Foliorum rutę sicco. 3. x. ameo, cimini, nigeli, cheifm. i.
 sem. leuistici. origani carui, amygdalarum amararum, piper.
 nigr. macropiperis .i. piperis lon. menthali, dauci, acori,
 baccarum lauri, caloris an. 3. ii. lerapini. f. s. opoponacis. 3.
 iii. puluerizentur puluerizanda non multum subtiliter vt di
 ctum est de dyacimino, mellis cocti & despumati ad pondus
 omnium, & est. f. v. & 3. v. gumme uero dissoluantur in aqua
 rutnæ, & facias in bona forma. Et nota qđ Rafis dicit qđ nō ha
 bet parem in resoluendo uentositatem.

Ruta quæ in hac compōne intrat ac in oibus aliis debet
 exiccari cum mensura, & hoc ideo, quonia si exiccatur ve

hementer est calidissimæ complexionis, et eius calefactio est ultra mensuram. Et si non excutatur debito modo, remanet in ea humiditas persflua, quæ prohibet eam digerî & uentositatem facit, quare in ipsius excitatione diligentia habenda est. Et debet in umbra excicari, non autem in sole ut quidam empirici faciunt. De nigella multi sunt qui errant ponentes in receptis semen quoddam cinerulentum odori ferum facis triangulare pro ipsa nigella, & errant. Sed nigella est quoddam semen nigrum clarum, aromaticum multum, faciens folia fere similia fumiæ, & id in medicinis appendendum est. Origanum colligendum est in mense Iulii postquam sol tendit ad occasum, sive uesperis. Non autem ante mane ante solis ortum ut quidam fati faciunt.

Mel & omnes medicines triplici causa coquuntur. primo ut mundificetur ut mel, quia coquitur ut sua impuritas remoueat. secundo ut expellamus aliqua substantia nostro proposito repugnante, ut multa decoctio caulium, quæ illos stypticos facit. tertio ut uirtus ipsius in oleo uel aqua transeat.

Descriptio. VII.

DIACALAMENTVM Nicolai a calamento dictum ualeat pectus ad omne uitium pectoris ex frigidityte, & maxima his qui sunt senili etate, ualeat tussis et huiusmodi ex frigida ca.

R. Calameti syluestris, palegi, hyssopi, melano piperis. i. piperis nigri, sileos, sileos, fileris motani. i. feminis, feminis petroselin. an. 3. iiii. & 3. i. leuisti. 3. i. & 3. i. semi. apii 3. i. amos thymi, anethi. s. feminis, cinnamomi, zing. an. 3. ii. puluerizentur omnia subtiliter, mellis, cocti & despumati lib. i. et 3. iiii. & fiat electuarium, & detur post prandium & coena.

Calamentum quod in hac compoñe ingreditur, debet esse syluestre, eo quod magis confortatiuum & absterfuum est quàm domesticum. In mense Iulii & Augusti ista femina colligenda sunt. s. semine petroselin. laureole, cataputæ, rutæ, foeniculi, laus, milii solis, lactucæ, pastinacæ rapæ, & similia.

Anethum si simpliciter scriptum reperitur semper de semine est intelligendum, non de herba, ut est communis corruptela.

Descriptio. VIII.

DIACALAMENTVM Mef. de mente Gal. confert ad ægrotudines frigide membrum nutritionis, & ad malitiam digestionis, & facit penetrare cibum qui non posset penetrare ad hepar, & ad corpus reliquum, & hæc est eius proprietas, & confert rigori febrium, & emplastratum & inunctum in spina est ex maxime subiliatibus humiditates grossas & uiscosas, & ex resolutibus uentositates, & confert singultui uehementi frigido & uentoso, cuius diffinitionis est resolutio, & prouocat urinam & menstrua.

R. Calamenti motani & fluuialis, sileos. i. fileris motani, semi petroselin. ana. 3. vi. zing. 3. iiii. feminis apii, extrematum alacæ. i. thymi ana. 3. ii. Hicim. i. leuistici. 3. vi. piperis nigri. 3. i. s. puluerizentur omnia subtiliter, mellis cocti & despumati lib. ii. & fiat electuarium: dosis eius est. 3. i.

Calamentum tam montanum quàm fluuiale colligendum est in mense Iulii, & excicandum est in umbra: excicatio. n. facta in sole operatione eius debilitat, & eo tempore colligitur pulegium. Quing. de causis medicinarum miscentur simul. Primo ut uirtus earum fortificetur & hac de causa scamonea miscetur cum medicinis aloeticis, & zingiber cum tur bith. Secundo ut cito faciat alia medicinas transire ad locum debitum, & sic crocus admiscetur auro & argento: aurum. n. & argentum sua ponderositate ad intestina descendunt, nec ad uenas possunt penetrare: & crocus facit eas ad cor penetrare. Tertio miscemus ut cito medicina non transeat ad uenas, ut cum uolumus hepar deoipare per diuretica, quia illa sunt cito penetrantia ad uenas permiscemus aliam medicinam ut raphanum. Raphanus. n. habet proprietatem attrahendi humores ad stomachum. Quarto ut una per aliam stabiliretur: & sic miscemus cum uiolis, uel cum casia fistula myrobalanos. Quinto ut malitiam aliterius remoueat uel impediat, ut zingiber cum scamonea iunctum: scamonea enim debilitat stomachum, & zingiber confortat.

Descriptio IX.

DIANISVM Mef. ualeat grossæ uentositati stomachi & frigidityti & abundantie phlegmatis crudi in ipso.

R. Anisi. 3. xx. liquiritiæ, mastice an. 3. i. carui, macis, galangæ, zingiberis, feminis, foeniculi, cinnamomi an. 3. v. tritum piperum. s. piperis albi uigri & longi, calamenti. i. montani, pithetri, casia lignæ an. 3. ii. heil. i. cardamo. maioris, garyophyllorum, cubebæ croci, spicæ 3. i. s. zuchari. 3. ii. puluerizentur ista facis subtiliter: mellis lib. iiii. & fiat electuarium in bona forma.

Notandum quod in electuariis de melle ac de zucchero, semper in eis species aromaticæ ponendæ sunt post eorum aliqualem infrigidationem quia si ponentur de melle uel de zucchero existente adhuc ad ignem ut quidam mente capti faciunt, uirtus aromatum perderetur &c. Foeniculi & anisi cum simpliciter scripti reperitur in confectionibus uel electuariis: de iporum feminibus est intelligendum cum ea magis ad usum medicinarum conueniant.

Descriptio. X.

DIATRION piperum Mef. quod calefacit stomachum & uentrem. remouet dolorē eorum ex humiditate phlegmaticis multis & crudis, & mundificat stomachum ab ipsi, & ualeat contra acidos ructos, & digestionem procurat.

R. Trium piperum. s. albi, longi, & nigri an. 3. v. zingiberis, halse. i. thymi, anisi an. 3. ii. spicæ, ameos, amomi cinnamomi au. 3. i. casia lignæ, feminis apii, sileos. i. fileris motani, feminis affari, enulæ sicce, radices ana. 3. s. puluerizentur omnia satis subtiliter: mellis colati cocti & despumati. 3. viii. fiat electuarium, dosis est a. 3. i. usque ad. 3. ii.

Piper album non est illud quod est parum contractum, et quod habet corticem grossum. Sed est illud quod est magnum grauis poderis sine contractione subtilissimi corticis. Et illud plus confortat stomachum quod dux alia spes. Enula debet esse sicca: eo quia maioris est desiccationis quàm quod est res cæsa. Casia quoniam in libris authorum reperitur absolute scripta, considerandum est si compositio illa in qua intrat est solutiua uel lenitiua & tunc debemus ponere casiam fistulam. Si autem non est solutiua nec lenitiua, sed calefactiua confortatiua uel aperitiua oppilationum: tunc debemus ponere casiam ligneam, & hoc sit de generali regula & documento.

Descriptio. XI.

DIACVRVVM A magna Mef. cōferens ad ægrotudines antiquas & chachæ & hydropisum iuuamentum manifestum, & eradicat ægrotudines hepatis & splenis chronicas quæ iam indurate sunt, & cōfert ad fortitudinem coloris & corruptionem stomachi, & humiditatem frigidam & uentositates grossas in eis, & dolori renu et uesicæ, & urinæ prouocat.

R. Croci, affari, fem. petroselin. dauci, anisi, semi. apii. an. 3. s. raudeñi. i. rehbar. an. 3. i. semi. anethi syluestris. Aliqui dicunt quod radix est efficacia, spicæ nardi an. 3. vi. costi, myrrhæ, casia lignæ, quinanti, carpopalsami. i. fem. balsami, rubæ tingitorum, succi abstinthi, succi eupatorii, olei balsami. i. liquoris emanantis ab arbore balsami ana. 3. ii. calami aro. cinnamomi an. 3. i. s. scordeon. i. alii syluestris, scolopendriæ, succi liquiritiæ an. 3. ii. s. dragacanthi. 3. i. puluerizentur subtiliter omnia mellis despumati & cocti lib. iiii. & fiat electuarium in bona forma: dosis eius est a. 3. i. usque ad. 3. iiii.

Dicitur diacurcuma, quia color assimilatur curcumæ, uel dicitur a croco qui crocus apud Graecos dicitur crocō qui, in ea ingreditur in bona quantitate. Et quia uocabulum est corruptum dicitur diacurcuma. Sed debet dicere diacroccon. Insuper nota quod omnes medicines confortantes hepar, & ualentes hepati debent bene terri & subtiliter cribellari.

Balsamum est liquor emanans a stipite illius arbusculi, & dicit opobalsamum, uel oleū balsami, uel balsamum absolute. Et quia perfectum & uerum non nisi cum difficultate haberi potest, igitur loco eius ponitur illud oleum hoc modo factum: quod distribuitur a Guliel. Placen. dicente quod habet uirtutē balsami, & ponitur in omni compositione in qua balsamum intrat loco ipsius. Modus faciendi oleū illud talis est. **R.** Terebentinæ lib. ii. olei communis lib. iiii. olei laurini. 3. xvi. cinnamomi. 3. iii. euphorbi. garyophyllorum, baccarū lauri, gummi hederæ, serapini, galbæ, aroma. opoponacis, an. 3. i. thuris, masti. ana. 3. ii. terantur terenda & distillentur ad alembicum lento igne, & referua.

Mef. dicte
an. 3. viii.

Mef. dicte
3. iiii.

Mef. dicte
dra. xii.

Descriptio. XII.

DIALACCA magna Mef. conferens ad debilitatem stomachi, & hepatis, & aggritudines factas in eis, oppilationes hepatis aperit, & omnem duritiem resolvit, lapidem renum & vesicæ frangit, urinam promoucat, & est ad hydropisim & cachexiam medicina sublimis.

R. Lacæ ablutæ ravedeni. i. rheubarbari an. 3. iiii. spicæ nar. dii, malicis, s. em. apii, cinamur, squinanti. i. extremi taurum squinanti, absinthii, succi, eupatorii, ameos, faunæ, amygdalarum amararum, colli amari, myrrhæ, rubæ tinctorum, sem. feniculi, anisi, affari, aristol. s. rotundæ, gentianæ, radices, croci, cinamomi, hisopi sicæ, castæ lignæ, bdellii, an. 3. i. s. piperis. f. nigri, zingib. an. 3. i. infunde myrrhæ & bdellium in uino & cætera tere subtiliter & coëfic cu lib. i. & 3. viii. mellis colati cocti & despumati, dosis eius est aur. i. usq. ad. ii.

Modus lauandi lacæ, ponit a pandectis ca. p. pro de lacca in hunc modum. Tere gummi lacæ, & laua illam in mortario pulvis bene pistata fuerit lauationibus pluribus ex aqua fontis, in qua bullierint aristol. longæ & squinanti ana. partes æquales, & tādū lauetur cu hac aqua, q. clarescat semper cum pistello agitando, deinde dimittatur rehidere postea coletur aqua & in umbra permittat desiccare, quæ desiccata reseruet, & hic est modus. Et ex ista lotione lacca efficitur subtilitatem, & apteioris maiorem. Medicinarum ablutio fit quinq. de causis. Primo ut acutæque in medicina efficeretur, & hoc modo abluatur calx. Secundo ut sordes remoueat, & abiciantur, et hoc modo abluatur oleum & cera. Tertio ut possit melius cõteri, & hoc modo abluatur thutia. Quarto ut eius malitia auferatur, & hoc modo lauatur lapis lazuli, ut remoueat quædam uirtus nauseatua, & compressiua sola remaneat. Quinto ut acquirat maiorem subtilitatem, et hoc modo lauet lacca quæ efficitur subtilior ad aperiendū.

Descriptio. XIII.

CONFECTIO anacardina Mef. & est coëctio sapientum, & eorum qui desiderant scire. Acuit enim intellectum & subtilitatē sensum, & memoriam reparat, & confert dolori stomachi & uentris a frigidity factis, & clarificat sanguinem, & colorem bonum facit.

R. Piperis, macropiperis. i. piperis lon. myroba. Kebuturū. emblicorum, bellerico. indorum, uidebdu. i. castorei ana. 3. ii. colli, anacardi, zucchari tabaret. i. zucchari al. burungi. i. nigellæ, bacacarum lauri. an. 3. vi. cyperi. 3. s. Tere anacardios per se deinde medicinas alias & coëfic cum butyro uac cu melle an. lib. piiciendo primo butyrum, postea mel, deinde alias medicinas subtiliter puluerizatas, datur post sex menses, & dosis eius est 3. ii. cum aqua fœniculi & apii, & caucat assumens a labore ira, coitu, & ebrietate.

Oēs mirobalani ponuntur in hac coëctione ad frangendam malitiam anacardiorū. Nisi illi ponerentur, ipsorum malitia oēs alias medicinas corrumpere. igitur in hoc bene ad uertat apothecarii. Anacardi sunt fructus cuiusdā arboris, qui hñt similitudinem cum corde auium paruorum habentes intrinsecus rubedinem quandā ad similitudinem sanguinis, & nascuntur in Sicilia in montibus igneis qui cõtinue cõburent, & ab ipsis denominatur coëctio anacardina. Et nota q. isti fructus dum sunt recētes condiunt cu melle hoc modo. Liquefacto melle in eo ponuntur, et illud tale mel uocatur mel anacardinum, & habetur in usu absq. dictis anacardis. Et aliqui ingreditur in electuariis ut inferius apparebit. Et illud tale mel habet infiorescem gradum caloris et sic citatis q. mel purū, quia anacardi sunt calidi & sicci in quar to gradu. Nec sunt pediculi elephantis, ut quidā falsè dicūt. Burungi de eo est magna inter doctores differētia. Christof. de honestis super illū passum exponit q. est nigella, & q. nigella, & est semen nigrū odoriferum. Gentilis uero exponens illam coëctionem inquit. burūgi sunt grana similia piperi quæ non habemus, sed illorum loco grana quosdā ponit caputaria. alii uero dicunt quod est quedam herba habens folia similia rutæ faciens semen in uaginis similem nasturtii q. mordent linguam. Sed prima opinio est melior, magisq. ad mentem authoris, cum nigella cerebrum confortet, humiditatemq. ipsius desiccet quæ admodum coëctionis uirtus

est quare nigella poneuda est &c.

Descriptio. XIII.

CONFECTIO de scorïa ferri Rafis. 9. Almanf. cap. de hæmorrhoidibus. quam dicit mirabiliter ualere pro cõstrin gendo fluxum immoderato hæmorrhoidarum, retinens etiā fluxum exuberantem menstruum in mulieribus, afferens etiam inuamentum in fluxibus uen tris chronicis, & datur inquit ipse omni mane ad quantitatem castanæ.

R. Myrobalanorum emblicorum, nigrorū. i. indorum, belleri. ana. 3. s. spicæ, squinanti, cyperi, zingib. piperis. f. nigri, ameos, oliba. ana. 3. ii. scorïa ferri pparatæ. 3. i. s. puluerizent oia subtilissime, & conficiantur cum melle disp. quod sit coctū cum apozimate emblico. 3. x. & fiat in bona forma.

Præparat scorïa fer. hoc modo. Accipe scorïa fer. quantitatē q. uolueris, & eam infunde in aceto fortissimo p heb domadam. omni die acetum mutando, postea proiciatur luterum laminam ignitam & torrefat, deinde subtilissime puluerizetur & referua, hæc enim est ipsius preparatio quare &c. Mel cum apozimate emblicorum hoc modo fit.

R. Myrobalanorum Kebuturū, & emblica. ana. 3. xx. terantur & in tribus libris aque coquantur donec ad unam remaneat, & postea coletur, in colatura uero ponatur mel lis boni lib. i. deinde bulliant donec aqua a melle consumpta sit. Et hoc facto habes mel cum apozimate emblicorum quod in hac coëctione ingreditur.

Descriptio XV.

ELECTVARIVM de cineribus Aui. fen. decima octaua tertii. ca. xix. q. dicit esse medicamen forte, & ab ipso expertum in comminendo lapidem renum, & conueniens utrum lapidi uesicæ extrahens ipsum.

R. Cineris, nitri, cineris scorpionum, cineris radicum caulium, nabati sunt caules non transplantati, cineris leporis, lapidis pponis, sanguinis hir. exiccatis, & pparatis, cineris corticum ouorum a quo pullus egressus fuerit, lapidis iudaici, gummi nucis. i. fusialis, acori. radices, ana. 3. i. feminis petrosilii, dauci. i. semē paltinacæ syluestris, pulegii, gummi ara. feminis altheæ piperis. f. nigri. ana. 3. i. s. puluerizent omnia subtilissime, mellis cocti & despumati. 3. x. & fiat electuarium quod bene obturetur ac tpe cum spatula cõmifceatur, & dosis eius est usque ad au. ii. cum aqua tribulorum decoctorum cum cineribus nigris.

Vitrum cõbūritur hoc mō. Teratur bene deinde reponatur in crucibulo uel captia ferri, & pone super prunas semper insufflādū donec rubēū fiat, deinde ab igne remoueat. Si erit incineratū, bene est. Aliter iterū ponat super prunas insufflēt, & nō desinas sic facere donec incineretur & de eo utere. Scorpiones hoc modo combūrentur. Accipe scorpiones uiuos, qualitatē quā uolueris & pone in olla noua, claudē eā lutidō illā. cū passa uel cum terra, & pone illā in furno calido, & dimitte illā p diē et noctem, deinde extrahe, & cinerē ipsum habebis. Caules nabati. i. caules trāspan tati hoc modo cõburentur, extrahe radices a terra, mūdēt ab oī imunditia, deinde infusta incendantur & ponantur in olla, & cooperiatur olla coopertorio pforato, ita ut fumus possit exire, & ponantur in furno, & dimittatur per totum diem, in sero remoueat & reperies in dicta olla tāquā car bones postea dictos carbonēs tere bene, & in alia olla parua repone, & cooperi luto eam, & reponat in furno, & dimitte p diē et noctem, et tātum ac tā sæpe hoc facias q. car bones in cinerē alpiū esse cõuersum reperies, et de illo utere. Modus incinerādī leporē. Accipe leporē uiuū & decolla illū, & repone in olla noua cū toto sanguine, et pelle bene obturādō ollā, deinde ponatur in furno, et tñ dimittat q. incineretur, et dicta cinere utere in electuario supraferri pro. Cortices ouorum hoc modo incinerentur. Accipe cortices ouī a quo pullus egressus fuit, et bene pistentur, dein de ponant in olla noua quæ bene obturata sit, ponantur in furno et dimittantur per noctem in mane. si sunt incineratæ bene est, sin autem bene in furno dimittantur usquequo sint incineratæ, et nota q. quāto amplius coquantur: tanto magis albio res reddunt et incinerant, et de eis utere. Sera. a thor pandectarū uult q. differentia sit inter dauci et baucis

& dicit q̄ danci est pastinaca syluestris,baucie vero pastina ca domestica. Auicoro & Mes. inter eas nullā differentia faciunt tñ in vso est, & tenetur opinio pandectarum, & Serr. Sanguis hirci in hoc electuario ingrediens hoc mō praparandum est. Accipe hircum quatuor annorum in diebus canicularibus, qui sint dies caniculares infra describuntur herbo nucū, & nutriatur faxifrag,foeni.apio.petro. puleg. in dera,quinanto.genestra,capil.ven. polytricho vel lupulis. Potetur vero optimo vino,& si ad aliquale acetositatē tenderet,melius esset, semperq; in sole teneatur,& hoc modo nutriatur scilicet per dies quadraginta, deinde cū incipit vri na eius denigrari,sumatur alia noua, & fundat in ea aqua, & feruat donec auferatur ab ea terreitas quæ in ea est.

Deinde decolletur hircus,& accipiat ex medio sanguine qui currit ex eo in olla,& non accipiat primus sanguis neq; postremus,& non moueat donec coaguletur,deinde incidatur in partes duas coexistente in concuitate ollæ,& coope riat cū rete stricō,aut cū panno subtili raro. Et dimittat sub celo donec recipiat radios solis,& lunæ, & dimittatur ipsum:donec exiceat bene:& caue ne adueniat ei humectatio ex rore.Nec decollandus est nisi sanus sit hircus,& ex di cto sanguine vtire in oī medicina,& in oī loco in quo scrip tum reperis sanguis hirci. In collectione mineraliū tres co ditiones considerande sunt. primo eligatur a mineris notis & famosis.secundo q̄ non sit admixtum q̄ impediatur eius co gnitio tē.tertio quod non habeat substantiam transmutatam.

Descriptio. XVI.

DIASATYRON Mescie fere confectio testiculo rum vulpis, & est secunda descriptio, quæ est melior, & in vsu, faciens ad erectionem virgæ, & multiplicans sperma & desiderium coeundi.

Re. Secacul albi & mundi elixati. i. cocti in aqua cicerū, quo rum iuncta sit aqua prima li. i. fatyriorum. i. testiculorū vulpis qui abscinduntur a patre suo. i. a typite suo, & elixatorū in aqua dicta. j. viii. radicum rapha. f. syluestris. j. iii. ius. plani. i. serpentariz vel dragonetiz. j. ii. teratur hæc oīa & infundantur super eis lactis vaccini vel ouini quantitas quæ superemineat radicebus duobus digitis, olei siliamini, butyri vaccini recentis an. j. iiii. coquantur hæc oīa cū facilitate usq; ad ipsiusmodinem, & si adhuc radices non bene coctæ sint, fundantur iterū super eas ex lacte & oleo & butyro an. partes æquales usq; dū perfecte coquantur, post hoc infunde super hoc totū mellis boni & despumati. li. vi. succi pere humide. i. recentis li. s. decoq; oīa simul usq; ad perfectam cōctio nem, & post hoc remoueatut ab igne, & proiciet super ea puluerem huncicuius hæc est permix. Re. caudatū stinci cū renibus & semine. i. ab ymblico infra. j. i. feminis, cruce, zin gi albi & mundi, been albi & rube. lingue aus. i. semi. fraxi ni semi. natur. cinnamon. piperis long. baucie. feminis pastinae domestice, synapis. f. semi. napi. fem. alparagi. an. j. s. cō ficiantur cū eis, his primo subtiliter puluerizatis. vltimo vero ponantur hæc alia in medicina prædicta pinearum mun. lib. i. s. phillicorum mundatorum. j. x. cerebellorum passerū j. ii. pistetur tria hæc subtilissime oīa per se, deinde bene cō misceantur simul, & in fine aromatizetur cum. j. i. musci bo ni, & dosis eius est ab. j. s. usq; ad j. i. cum bono vino puro & pauco, & sumitur infero cum iur dormitum.

De fecacul inter doctores est diuersitas. Author pādēc. & Mes. dicunt, quod fecacul idē est quod iringus, & iringus idem quod fecacul. Simon vero Ian. Sera. in lib. de simplici medic. in. 7. lib. sui breuiarij. & Aui. dicit quod fecacul est radix sicut zingiber quæ apportatur ab India, versū in vsu est, & accipit iringus pro fecacul. quia eo caremus. Aliqui dñe quod fecacul est sigillum sanæ Maræ. Quare prima aqua ciceris abijcitur & in secunda lauatut fatyriorones & fecacul, quia prima est absterfusua prohibens inflationem & ventositatem generari. secunda vero est multum ventosa & inflata, & cum hoc portatur a aliarum medicinarū ad genitalia mēbra. Stenicus est quoddā animal simile lacertæ degens in ripis aqualis flumen Nilū. In hac confectione pro omni li. i. mellis cocti & despumati ponende sunt. j. iii. sp̄rum cū bellatarum, si habere debet uirtutem a Mes. scriptam, Irin-

gus & tassis barbassus colligendi sunt in mense Octob. Inci denter hoc notandum est. quod hoc electuariū duplici rōne solet dari hominibus. primo exhibetur corporibus exicca tis ad humectandum, & tunc debemus exibere de eo. j. s. in mane per horas quatuor vel duas ad minus, ante prandium datur, & secundo ad augmentum coitus & niriilis membri, erectionem, & tunc ipsum exhibere debemus uespere ante cenam per duas horas cum modico uini subtilis & odorife ri: complexio dicti electuarii est temperata inter calidum & frigidum, humida tamen ad secundum gradum.

Descriptio. XVII.

DIARIS Nicolai. sic dicitur a radice illa quæ ireos uocat, prodest dispniaci, orthonicis, & tussisientibus ex phlegmate grosso, & uocē depeditam restatur si fuerit ex frigidityte &c.

Re. Radicum ireos. j. i. pulegii, hyssopi, liquiritiæ an. j. vi. amygdalarum. f. amararum, dragacanti, pinearum, cinnamon. m. zingib. piperis an. j. iii. caricarum carnum, dactylorum, passularum enucleatarū an. j. iii. s. storacis rub. j. ii. & c. i. puluerizentur subtiliter omnia, mellis cocti & despumati lib. i. s. et fiat electuarium.

Hyssopi si simpliciter scriptum reperiatut de herba sicca est, intelligendum, et in umbra exicandum est & non solum ipsum, sed omnes herbz aromatzæ. fol. n. aromaticatam illam resoluerē facit uirtutem destruit. Pineæ et amygdalæ nisi sint rectes antequam in confectionibus et electuariis pectoralibus ponantur semper debent purgari ut supra ostē sum est, aliter rauceitas sua nocet pectori, et tussim prouocat, quare bene notent apothecarii in hoc et aduertant.

Descriptio. XVIII.

DIAPENIDION Nicolai. sic dicitur a penidiis, quæ ibi intrant plusquā de aliis speciebus: ualet ad omne vitiū pulmonis et tussis, ad rauceidinem uocis factam ex sic citate, et phthiſicis subuenit.

Re. Penidiarum. j. xvi. s. pinearum amygdalarum præparata. hoc est mundatarum, sem. papaueris. al. ana. j. iii. & i. garyo phy. cinnamon. zingib. succi liquiri. dragan. gummi arab. amy di. sc. citrullis. f. melonum. f. cucumeris. f. cucurbitæ mūda torum an. j. s. caphore tertiam partem vnius. j. i. gra. vii. syrapi uiolati. q. f. puluerizentur subtiliter puluerizanda, & conterantur cōterenda, deinde confice sic. In lib. i. aquæ flo rum uiolarum. j. iii. bulliant donec aqua aiquantulum inficiatur, postea coletur et colatur addatur lib. i. zuchari, et bulliant donec incipiant inspissari. Tūc addatur pineæ, amy gdalæ, et supradicta semina, unumquodq; per se bene con tusum, cum spatula semper mouendo. deinde addantur peni dii subtiliter puluerizati, et cū liquefacti fuerint illud gros sum quod supernatat cum cacia despumetur, & iterum in mortario proiciatur, et bene terendo, et cōmiscendo, dein de camphora admisceatur. Ad vltimum pulvis supradicta rum specierum cum supradicto syrapi in mortario semper agitadō moueatut, donec incorporetur. demum reseruetur in uase vitreato.

Gumme ingrediētes in hac cōpositione dissolui possunt in aqua florum uiolarū, uel in decoctione præscripta a Nico laeo, et pineæ etiam et amygdalæ cum altero prædictorū humectari possunt ad hoc ut bene conterantur.

Descriptio. XIX.

DIADRAGACANTVM calidum Nicolai. Tali ter dictū a dragacantū quod recipit, et dicit calidū ad dñam diadragacanthi frigidi alterius descriptionis. datur autē in strictura pectoris facta a materia frigida grossa et uiscosa.

Re. Dragacanthi triduo in aqua temperati li. i. hyssopi, pinea rum, amygdalarū mundatarū et exorciatarū sem. lini asfi. an. j. iii. foenugraci. f. semi. cinnamon. an. j. ii. zingiberis, liqui ritæ. f. radix, succi liquiritiæ. an. j. i. puluerizentur subtiliter puluerizanda, & conterantur, cōterenda, et confice sic, dra gacantum infusum in aqua per lintecolum extorque et cū li. ii. et j. viii. mellis cocti usq; ad ipsiusmodinē lēto igne femp cum spatula agitadō misceatur, deinde additis pineis, amy gdalis, semi. lini et foenugraci ab igne deponantur, et pul uis supradictarum specierum addatur, et usui seruetur.

Modus affandi femina lini in eo intrantia talis est. accipe patellam vel bernacium, & super ignem multū calefacias postquā bene fuerit calefactū remoue ab igne, & intus ponas lini femina semp mouēdo vsq;quo sint affata, & sit tūc bene affata non sunt, iterum uas calefat amotis feminibus, deinde ab igne remoto iterū femina supraponantur semp mouēdo usquequo sint bene affata, deinde referua, & fm hāc doctrinā oīa alia femina debent affari. Lini femina affatur ut amoueatur humiditas superflua & uisofitas, & plus affari debet quā alia femina. Ideo nota q; oīa femina per se affanda sunt, eo quia aliquid semen multū affandum est propter eius uisofitatem multam ut lini semen, & psyllii, quoddam minus propter eius paucam humiditatem ut semen anisi, & cymini, & hmōi, quare bene notent apothecarii. Confectio nes hæ amaræ per duos annos conseruatur, triaca uero magna longiori tempore seruatur, ut in ipsa scripsi.

Descriptio. XX.

TRYPHERA magna Nicolai cū opio & sine opio quæ taliter dicta est, quia magnā utilitatē, & fructū mulieribus confert. Datur contra dolorem stomachi virorū & mulierū cū aqua in qua cocta sint femina feniculi anisi, & mallicis, datur contra uitium matricis ex frigidityte si distemperata bibatur cum uino in quo cocta sit artemisia, prouocat etiā menstrua si ex ea cum artemisia bene trita & cum oleo muscelino cōmixta fiat pessarium ex bōbie quod ex istis inunctum in vulua mulieris immittatur, et prouocat etiam menstrua mulieri non concipienti si detur cum uino in quo cocta sit mandragora, uel sambucus, miro mō prodest pueris qui non possunt dormire, & in nocte nimis garrunt distem perata cū lacte mulieris in modū cicoris & bibita prodest. *℞.* Cinnamomi, galangæ, garophylis, cardii, zedoariæ, zingiberis, costi, storacis calamitæ, calami aro. cyperi iteos, f. radices, peucedani, corticum mandragoræ, cyperi celticæ, acorij, orosum, rubearum piperis, f. nigri, anisi feminis apij, feminis petrosillij, feminis feniculi, macedonici, apij montani, dauci, opij, iusquiami, cymini, diptami, an. 3. i. puluerizentur subtiliter omnia, mellis cocti & despumati lib. s. & 3. ii. & hoc modo faciendo nihil addendo uel minuendo erit tryphera fine opio. Si uero cum opio facere uis, addas prædictis omnibus opij thebaici. 3. ii. & cū opio tryphera erit. Sed in hac patria mulieres volunt illam in zucharo. Accipias igitur supra scriptarum specierum fine opio 3. i. zuch. li. i. & facias, & datur in modum castaneæ.

Confectio hæc danda est a stomacho vacuo, & differenda est comestio vsquequo de ea facta sit digestio, & dictæ species subtilissime sunt terendæ ac puluerizandæ. Dicitur. n. compositio hæc tryphera i. hominem iuuenem reddens.

Nota q; quis in multis cōfectionibus reperies scriptum mellis cocti, q; tamen etiam cum melle crudo & mūdo possunt cōfectiones fieri, & illud habet minus de spissitudine, & magis de penetratione. Igitur ab authoribus sæpe inuenies forpiti mellis cocti, & q;q; mellis crudi ut per hoc intelligas, q; utrunque potes ponere, & conuenienter.

Descriptio. XXI.

DIAOLIBANVM Nicolai dictum ab olibano ingrediēte descriptionem, ualet ad omnes capiti passiones. lachrymas potenter stringit dolorem hemicranium & supercilium sanatur, & lquinariam curat & c.

℞. Castorei, opij, thebaici, iusquiami. an. 3. ii. calsiæ lig. 3. i. et 3. i. solij, croci, thuris an. 3. s. rheupontici, amomi. an. 3. ii. s. pemoniæ, f. radices, macropiperis. i. piper longum, storacis, calamitæ, an. 3. s. myrrhæ. 3. ii. gra. v. spicæ, pyrethri, euphorbij, leucopiperis, i. piperis al. ana. 3. i. gra. xv. puluerizentur subtiliter omnia, mellis cocti & despumati 3. viii. & fiat electuarium in bona forma.

De iusquiamo cum scriptum reperitur semper de semine & non de herba est intelligendum, herba enim maioris est uenenositas quam sit semen.

Peonia si simpliciter scribatur de radice intelligendū est: cū illa magis vlui medicinæ cōueniat quā folia uel semina.

Descriptio. XXII.

REQUIES Nicolai. Sic dicta eo q; requiē patientibus

præstet & somnum, & maxime typicæ febricitibus quotidiana: tertianarijs, quaternarijs acutis & peracutis & c.

℞. Rosarum, f. rub. violarum an. 3. iii. opij, iusquiami. f. feminis papa. albi, corticum mandragoræ, scariolæ, feminis lactu cæ, feminis portulacæ, psyllij, f. feminis nucis musc. cinnamomi, zuchari an. 3. i. s. sandalorum alb. sandalorum rub. sandalorum citrinorum, spodij. f. de canna, dragacati an. 3. ii. gra. v. puluerizentur subtiliter puluerizanda mellis cocti & despumati lib. i. & 3. iiii. & fiat electuarium.

Ista compositio a multis corrupte & male componitur, multi enim addunt & in suis receptis reperiūt ultra præscripta Miconis: & exponunt q; est papauer nigrum & falsæ. nā idem est q; papauer album, ut uult Gentilis super quintum can. sed litera debet stare ut præscripti.

Vfus istorum opiatorum nō debet esse nisi transactis sex mensibus. Et inueterata ultra, sex annos non uigore ele-ctuaria hæc operantur, immo declinant ab eius uirtute, maxime stupefactus seu opiata.

Descriptio. XXIII.

ZAZENEA Mesue, experta ad dolorem stomachi a frigidityte factum, & ad omnes dolores factos a simili causa, & a uento sitate grossa, & ad dolorem colicæ, & difficultatem urinz, & dolorem dentium, & ad uentositates matricum, & confert iuuamentum maximum ad sterilitatem bibita, & supposita cum lana & oleo de lilio.

℞. Castorei, myrrhæ, opij piperis, macropiperis, i. piperis longi, galbani, costi cinnamomi. phu. i. valeriani, meu. i. feminis anethi Syluestris. Aliqui dicūt quod radix est ponenda & non semen, dauci, affari, croci, an. 3. i. puluerizetur subtiliter omnia, mellis cocti & despumati lib. s. & fiat electuarium in bona forma, dosis eius est aur. i.

Mel ponitur in ista medicina, & non solum in ista, sed in omnibus alijs triplici ratione. Primo ut placet horribilitatem medicinarum. Secundo ut mundificet & resoluat. Tercio ut conferret species sua uisofitate.

Stupefactio est dispositio inducta in membro a frigidityte: per quum, membrum, non sentit, aut obulse sentit.

Descriptio. XXIII.

ATANASIA Mesue sic dicta, quia hominē a morte præseruat, confert ad dolorem hepatis & splenis, & oppillationi in eis, & ad dolorem stomachi, & ad asthma, & ad tussim antiquam, & mundificat pectus, & ad fluxum uentris antiquum & ad dysenteriam, & ad fluxum sanguinis, & est in fe datione doloris sicut Philonium, & confert ad dolorem renum & hæmorrhoidarum, & Galenus quidem præcepit misceri in cōfectione hæc hepar adib. ualet. n. sua proprietate ad morbos hepatis.

℞. Croci, opij, myrrhæ, castorei, iusquiami, costi, carui, feminis papaueris nigri, spicæ, eupatorij, hepatis adib. i. lupi, cornu dextrum capræ uel cerui. ana. 3. i. puluerizetur subtiliter omnia mellis cocti & despumati lib. s. & fiat electuarium in bona forma.

Hepar adip. i. lupi preparatur hoc modo & conseruatur, primo debet optime lauari cum uino albo optimo, & bene mundari ab omnibus immunditijs, deinde saliatu fer uapatur sandalis citrini bene & subtiliter puluerizatis, deinde permittatur excicari, demum in uoluatur absinthio, omni hebdomada absinthium mutando.

Lupi uero intestinum hoc modo præparatur & conseruatur, lauetur optimo uino albo, deinde tumefat & ponatur ad excicandum, sed caueatur a fumo, & puluere, deinde etiam in absinthio inuoluatur, & referuetur, ualet. n. colica mirabiliter.

Descriptio. XXV.

PHILONIUM Perficum Mesin sua pra. de spu san guinis in fine capituli, quod dicit esse uehementis uirtutis ad emanationem sanguinis undecunque & sreatum eius cum tussi & sine tussi, & ad superfluitatē menstruorum dolorum, & hæmorrhoidarum, & ad egestionem sanguinæ, & ad mulieres prægnantes: quibus erumpunt menstrua, & conseruat foetum in matricibus earum.

℞. Papaueris albi. f. feminis, iusquiami. f. semi. ana. 3. xx. ter

re sigillatæ, opii, an. 3. x. f. c. hedengi. i. femi, canapis, croci, an. 3. v. castorei, spicæ, euphorbiæ, pyrethri, margaritarū non perforatarum charabæ, zedoariæ, doronici, ramich, est quædam compositio infra descripta. an. 3. i. camphoræ. 3. i. puluerizetur subtiliter oia, mellis rosati colati lib. ii. & fiat electuarium in bona forma, dosis est a 3. s. usq; ad 3. i. cum succo arnoglossæ, aut cum aqua rosata & modico uini puri.

Differentia. n. est in feedenegei & fcehdengei, feedenegei n. id est qd lapis hæmæthitis. fcehdengei i. semen canapis, quare bene cõsideratæ sūt literæ in oio cõpõne et uocabulo.

Castoreū. n. in hac cõpõne ponit, ut prohibeat cõgelationē ab opio. Margaritæ uero ad confortationē mēbrorum principalium, p. p. lationem opii. Margaritæ a natura perforatæ, meliores sunt quā non pforatæ. Et rō est quia per illud foramen supilitates ipsarū non sunt consumptæ, et purgatæ.

Philonium enim dicitur a Compositore, quia Philon medicus illud composuit.

Descriptio. XXVI.

PHILONIUM Mes. descriptio prima, quæ in usu est: quod est expertorum iuuamentorum in sedatione doloris ex separatione a casibus mortis, et proprie dolori stomachi a frigidityte factio, aut humore crudo, aut uentositate grossa extendente, et sedat dolorem colicæ, et uiscerū, et dolorē renū, et matriciū, et dolorē laterū, et praefocationem anhelantē, et diffultatē urinae, et singulum uehementem. R. Piperis albi, iulquiami. f. feminis an. 3. xx. opii. 3. x. croci. 3. v. spicæ, pyrethri, castorei an. 3. i. puluerizetur omnia subtilissime, mellis cocti colati et despumati lib. ii. et 3. xi. et fiat confectio in bona forma.

Medicinæ aut omnes opiatæ quomodo stupefaciunt. Nota. omne enim membrum sentiens habet quandam mensurā frigoris terminati, cum suo calido; in quo frigore, si fiat additio in cetera mensura membrorum stupefacti, et hoc modo medicinæ omnes opiatæ stupefaciunt.

Contritio. n. medicinarum oium stupefacientium debet esse subtilissima, ad hoc qd possit p. paruas venas penetrare ad ardua loca, aliter. n. membrum ab eis non posset stupefieri, neq; sensus ipsius obrundi. In actu practico, notent iuuenes medici, et non solum de hac cõpõsitione, sed de omnibus narcoricis et stupefactiui, tam simplicibus qd cõpõsitis. Quod si intentio medici est somnium provocare: illa danda sunt post coenam in sero, transacta hora. Cum autem intendimus sedare dolores, seu fluxum sanguinis prohibere, non nisi vacuo stomacho a cibo et superfluitatibus suis exhibenda. Neque post per quinque horas est cibis assumendus, et sic de tyrica noua intelligitur. Et his imponitur finis distinctioni secundæ, quæ fuit de medicinis amaris etc.

Incipit tertia distinctio quæ est de medicinis solutiuis, et continet descriptiones 31. Quarum prima est.

HERAPICRA Mes. de mēte Gal. hiera. f. sacra, picra. i. amara: habet. n. nomē amaritudinis, et est medicina sublimis, in qua aggregantur virtutes et operationes nobiles. est. n. subtiliatiua et resolutiua materierū malaram grossarum et uiscosarum, et exiccatia earū quæ imbibitæ sunt in poris & angustationibus, sicut imbibitur in spongia, & percutitur ab ea solutio bona & conueniens, & est cal factiua & aperitiua oppilationum & absterfina, & uirtus huius medicinæ affert iuuamentum multa experta ad ægritudines capitis, stomachi, hepatis, iuncturarum, renum, & matricum, & membrorum frigidas.

R. Cinnamo. masti. affari, spicæ, carpobalsi, croci, xylobali fami. i. ligni balsi. calsiæ lig. an. 3. Aloes succotrin. 3. ii. mel lis colati & despu. 3. iii. fiat electuarium in bona forma.

Quantitas mellis in hac cõpõsitione debet esse pauca. f. specierum & mellis an. partes æquales, eo quia mel frangit uirtutem aloes. Et non solum de hac cõpõsitione est intellegendum sed & de omnibus aliis in quibus aloes est basis.

Basis in medicina dicitur illa medicina simplex, cuius operatio principaliter queritur in medicina composita. Et per cõsequens operatio, cuius alia medicinæ intendunt, fuit

finem, & ipsa est efficiens principale. Et sic ratio essendi basis est ratio finis intenti. Vel illud dicitur basis in medicina per quod laudes medicinæ ei conueniunt, quare bene nota. Hieram non exhibenda est ilico cum est facta, & hoc contra indoctos medicos & ignaros apothecarios. Albucafi enim uult quod postquam est facta sepeliatur per sex menses in hordeum ut fermentetur, & debet confici in mense Iulii vel Iunii, & non in frumento, quia calore æstatis & frumenti corumpetur. Cuius contrarium faciunt apothecarii nostri temporis. De aloes succotrinio & hepatico differentia est in ter doctores. Aui. Mes. & quidam alii laudant succotrinum. Halyabas hepaticum. Igitur nota quod aloes hepaticū magis est solutiuum, & hoc est qd Halyabas dicere uoluit. Sed in aliis succotrinum hepaticū in bonitate superat. Et ideo cum aloes simpliciter scriptum reperitur, de succotrinio est intelligendum tanquam de perfectiori.

Descriptio. II.

HERA simplex Gal. 7. therapeutice, quæ est illa quæ in usu est. Et de qua intelligunt doctores, qui tantas laudes tribuunt. Sicut in anteposita hiera dictū fuit, & dicunt qd dosis est. 3. i. qd non intelligant de præscripta satis pateat, eo quia de ea exhibui & exhibere uidi a famosis doctoribus. 3. i. & aliquando 3. x. & parum operabatur.

R. Cinnam. masti. affari, spicæ nardi, croci, xylobali. i. ligni balsami ana. 3. i. aloes succotrin. 3. c. mellis colati & despumati. 3. c. & sex, ita qd est æqualis quantitas cum speciebus & hæc descriptio hieræ quæ heri debet non alia.

Si reperitur scriptum hiera simplex, uel hierapicra Galeni, uel hiera ex octo rebus, uel hierapicra, uel hiera, semper de nunc præscripta est intelligendum, non de alia.

Hieræ omnes seruari possunt a sex mensibus usq; ad quatuor annos in sua bonitate. Cum uero dictum tempus transierit, a bonitate & perfectione declinant & c.

Descriptio. III.

HERA cõpõsita Gal. quæ in clysteris apponitur, & pot etiam per os exhiberi, & est descriptio Nicolai. Quæ facit ad diuersas capitis passiones, & ad aurium & oculorum distemperantia, stomachi quoq; optime purgat, causas hepatis emendat, splenis durities remouet et extenuat, renibus & uescæ proficit, & matricis distemperantia emendat & c.

R. Cinnamo. spicæ, croci, squinant, affari, calsiæ lig. xylobali. i. ligni balsami, carpobalsi. i. femi. balsami uoluarum, abanthii, epithymi, agar. an. 3. i. aloes succotrin. 3. ii. mel lis colati & despumati. 3. viii. qd est ad pōdus ipserū & confice.

Squinantum per se terendum est puluerizandum, eo quia multum sustinet de cõtitione & si permisceretur cum aliis

medicinis ad puluerizandum ante ipsius puluerizationem euanescebat virtus aliarum medicinarum, & bonitas deperderetur per se conterendum est. Hieræ species sunt omnes subtilissime terendæ, ut sua subtilitate virtus alois transeat per angustas vias, & hoc uoluit Albucafi particula quinta cap. hieræ antiquæ, cum dicit & unaqueq; pars teratur & cū panno serico triconizetur, & pulsus in aliquo uale vitro reponatur. Mel in electuariis solutiuis parum uel nihil decoquendum est. mel enim quanto magis coctum tanto magis restrictiū, ac etiā quia per cõctionem magis viscosum redditur: mel enim coctum magis nutrit & minus laxat.

Descriptio. IIII.

BENEDICTA Nicolai, sic dicta quoniam ab omnibus a quibus sumitur benedicitur, si detur habentibus infirmitates contra quas inuenta fuit, ualeat ad guttam arthriticā & podagram ex frigidityte, & renes & uescam purgat. R. Esulæ, turbiæ, zuch. an. 3. x. diagrydii, hermodactylo. rosarum an. 3. v. garyophyllorum, spicæ nardi, croci, apii laxigæ, p. i. peris longi, cardamomi, amomi, alifigemæ, zingiberis, galangæ, macis, scarui, fœniculi. f. semi. agarici, feminis asparagi, polypodii, milii, solis, bruci, an. 3. i. puluerizentur subtiliter omnia, mellis colati & despumati lib. iii. & fiat electuarium in bona forma. Aliqui addunt huic descriptioni, masti, ameos, lapidis lincis ana. 3. i.

Benedicta dicitur ab effectu, & ab eo denominatur, quia Lum. apoth.

bonum effectum inducit. vnde ab omnibus fumentibus benedicuntur. Foeniculi, si simpliciter scriptum inuenitur de se mine ipsius intelligendum est, nõ autem de radice, neq; de herba, ut fol. 5. supra etiam scripsi.

Sextaria multiplicia sunt & diuersificantur fm diuersitate rerũ. Si n. dicitur aquæ sextarii vnum: tunc idem est q̃ li. ii. Si aut vini sextarium vnum idem est quod lib. ii. §. viii. Si vero sextarium unum olei, & idem est q̃ lib. i. ultimo sepe inuenitur sextarium unum mellis, & idem est q̃ lib. iii. quare nota has differentias, quia sepe videtur errores contingere in cõpõne medicinarũ, & non a vulgaribus apothecariis.

Descriptio. V.

ELECTVARIVM indum Mef. maius, educens solutione superfluitates humoꝝ & proprie phlegmaticoꝝ & putridorũ a stomacho, & a membris nutritionis, vctositatẽ grossam in eis resoluit, & morbos factos ab eorũ exuberantia curas, sicut est dolor stomachi, & uiscerũ & colica, & dolorum renum: & educit materias quæ sunt in iuncturis.

R̃. Cinnamomi, garyophyllorũ spicæ, rosarũ, casis, macis, cyperi an. 3. s. sandalorũ citrinorũ. 3. ii. s. ligni aloes su. mus. an. 3. ii. turbith albi & boni. 3. i. zuecha. al. pe. an. 3. xx. galangæ, heil. i. cardamomi, maioris cardamo. f. minoris i. melege tæ, affari, masti. an. 3. i. s. diagrydi. 3. xii. oia hæc fricentur manibus cũ oleo amygdalarũ dulciũ, deinde accipe fucci cydoniorum, succi granatorũ, fucci apii, fucci fœni. an. lib. s. puluerizentur puluerizanda satis grosso modo. Mellis colati & despumati lib. iii. s. misce, & fiat electuariũ in bona forma.

De cassi. hoc est notandum, q̃ secundum doctrinam supra tibi datam in diarion pipeorẽ, cassia filigula ponenda est, cũ sit electuariũ solutium. Nec cassi. hic in electuario est ponenda, q̃ tamen secus esse quidam tenent. Ego enim apponi facio cassiam fistulam. Cum nullum solutium sine lenitio esse debeat, ut uolunt doctores.

Nota q̃ doctores non ponunt in electuariis a remotis at trahentibus penidos in suis receptis, sed diuinaat in illis quorum intentio est a stomacho & intestinis, & uenis magnis attrahere, ut in diaphoneicon, & hoc electuario.

Affarum cum simpliciter scriptum reperitur radix ipsius ponenda est, quia radix melior pars est plantæ.

Licet Mef. in litera ponat q̃ dosis huius electuarii est usque ad aureos tres, hoc intelligendum est quando ad lib. i. mellis ponuntur. 3. iii. ut apothecarii nostri teporis faciunt, & male, maior quantitas dari potest.

Descriptio. VI.

ELECTVARIVM indum minus Mef. habens intentionem maioris.

R̃. Turbith albi & gũmi. 3. c. zuechari. 3. c. macis, garyophyllorũ, piperis, zingib. cinnamo. heil. i. cardamomi maioris, nucis musc. an. 3. vii. scamoneæ. 3. xii. puluerizentur omnia satis grosso modo, mellis colati & despu. lib. ii. & 3. ii. misce, & fiat electuariũ liquefaciẽdo zuecharum cum melle.

Nota hic unum generale intelligendum in oĩ cõposito q̃ scamonea acuitur. Medicina. u. q̃q; fit in principio veris, & acuitur ut per totum annum possit seruari & dari q̃ uolumus. Et tunc cũ scamonea nõ cocta acuenta est ne sua uirtus longa mora debilitetur. Nec timetur eius malitia eo quia per temporis diuturnitatem fatis aufertur: Aliqñ aut acuitur, medicina, non quæ dẽt diu conferuari sed quæ infra tres ut quatuor dies debet exhiberi. Et tunc cum scamonea cocta debet acui, ut sua malitia coctura remoueat. Et idẽ intelligas tam in electuariis quam pilulis & cõfectionibus.

Si simpliciter scriptũ reperiat electuariũ indum, de minori est intelligendũ tanquã de meliori & perfectiori, & si non de perfectiori, saltem de eo q̃ magis est in usu.

Insuper nota q̃ Mef. acuit hoc electuariũ cũ scamonea, & nõ cũ diagrydio, eo q̃ intentio est q̃ longẽ tẽp. conferuetur. Si uero dare illũ intendimus oĩ die, acuitur cũ diagrydio & nõ cum scamonea propter causam supra assignatam.

Descriptio. VII.

CONFECTIO amech Mef. prima, quæ i usu ẽ, & ualet oĩ passioni quæ fit ex phlegmate falso & cholera, & pprie q̃ est sicut ipetigo & scabies, lepra, & cãcer corrodes, & fistia.

R̃. Myrobalanoꝝ citrinorũ. 3. iii. Kebulorũ, nigroꝝ. 3. i. indorũ, rheubar. boni an. 3. ii. agatice, colloquinidæ, polypodii an. 3. xviii. ablinihii, halcæ. fricti orificii, & obturetur eo sius. Et dimittatur per dies quinq; deinde bulliant ebullitione una, & fricentur manibus, postmodũ coletur, & tali colaturæ infrascripta addantur casis fistulæ mundæ. 3. iii. tamarindorum. 3. v. tereniabin. 3. ii. non inuenitur apud nos, sed loco eius ponitur manna. Fricentur manibus, & dissoluatur cũ decoctione predicta deinde coletur. Et proiciantur super ipsum zuechari albi lib. i. s. scamoneæ. 3. i. s. confringatur seu puluerizetur satis grosso modo. Et hæc oia simul coquantur donec habeat spissitudinem mellis deinde puluerizentur super istud myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorũ an. 3. s. bellericorũ, emblicorum, rheubar. fumiter. an. 3. iii. uel herba, uel succus poni debet, semi. anis. spicæ. f. nardi an. 3. ii. Et in uase uitreo ponatur & referuntur.

Tereniabin est spēs manne, quæ apud nos non reperitur, sed loco ipsius accipimus manã. Est n. tereniabin ros qui de nocte cadit in quibuldã partibus. Aegypti super frondes aliarum arborum, & sic colligitur. In ista confectione intelligendũ est, q̃ author coquit scamoneã ut amoueatur malitia eius, eo quia i præparata esset non deberet decoqui, sed re seruari: deinde puluerizare eã debito mō: & cum aliis rebus puluerizatis opponi, q̃ si decoqueretur uirtus solutiuã ipsius deperderetur. Incidẽt de aqua lactis hic intelligendũ q̃ ponitur ad serenum, ut eius acuitas remoueat: frigida. n. assumenda est. Et quæ in usu est aqua lactis capræ.

Descriptio. VIII.

ELECTVARIVM electos Mef. Quod educit superfluitates a toto corpore, & expellit ventositatem & ualet ad iuncturarum dolorem, & laterum, & colicam, & mundificat renes & vesicam, & addit in coitu.

R̃. Scamonea antiochiæ, turbith albi an. 3. vi. garyophyllorum, cinnamomi, zingiberis, myrobalanorum emblicorum, nucis muscæ. polypodii an. 3. ii. s. zuechari albi. 3. vi. puluerizentur omnia grosso satis modo: mellis despumati lib. i. misce, & fiat electuariũ in bona forma.

Scamonea dicitur antiochia. i. illius provincie, eo quia melior & perfectior est. Insuper nota q̃ si in medicinis solutius reperit scriptum scamoneæ, intelligendum est de præparata nisi in duobus sequentibus casibus. Primo si in dicto electuario coquantur, ut in cõfectione amech, & electuario rosa. & tunc scamonea ponatur non cocta, quia coquendo præparatur. Secũdo si illud compositum longo tempore referuari debeat, & hoc modo nõ præparata ponitur propter causam supra allegatã. In aliis uero si reperitur litera Mef. suppleatur & dicatur scamoneæ. f. cocta.

Descriptio. IX.

DIACATOLICON Nicolai. Quod datur in acutis & peracutis, quia mollificat, digerit, & confortat, & ualet hepaticis, & splenicis.

R̃. Foliorũ fenæ, casis fistulæ, tamarindorũ an. 3. ii. rheubarbari, uoluarum, polypodii, anis. semi. an. 3. i. liquiritice, seminum cõium frigidorum, penidiarum an. 3. ii. puluerizentur puluerizanda. Dissoluantur tamarindi & cassia fistula cum aqua decoctionis infrascriptarum rerum, polypodii, liquiritice, prunorum, seminis anis, fœniculi. f. sem. ana parum zuechari albi lib. ii. & fiat electuariũ in bona forma.

Species electuariorum solutiuum sunt grosso mō conerendæ, & per satis rarum cribrum transire debent. Et non oĩ electuaria solutius, sed & cõfectiones solutius, ut diaob & diacartamum. Et grossi hæc puluerizatio duplici causa fit. Primo ut diu in stomacho maneant, & ibidem diu operentur. Secundo ut uirtus eorum cito non erubescat, & ne sua subtilitate ad membra transirent, quia maximum nocummentum inducerent ut supra declarauimus.

Medicina solutiuũ dñr, eo quia habent corruptos humo

res soluere. i. educere & euacuare.

Descriptio. X.

ELECTVARIVM rosarum Mef. Solutione educens cholera in sua molestia, & ualet ad ægritudines ex ea factas: & ad ægritudines iuncturarum calidas, & ad sodam calidam & uerriginem. Ad oculorum dolores, & ad icteritiam citrinam, & est sanum & expertum.

℞. Succi rosarū rube. cōpletur. i. in maturitate lib. iiii. zucchari tabarēth. i. illius regionis li. s. tereniabin puri et recentis: loco ipsius ponit māna. j. i. scamonea antiochiē. j. i. s. cōteratur grosso satis modo: coquantur oia super prunas vsq; dū mellis habeat spissitudinē: deinde proice super illud trochiscorū de spodi. j. i. gallie mus. croci an. j. ii. trochiscorū de berberis. j. s. & repone i uase uitreo & referua.

Succi rosarū cōpletarum eo quā rosæ seu succus earum magis est solariū quā succus cōpletarū, & ideo explicauit de completis, & nulli sunt apothecarii ad hoc aduerentes.

Nota insuper quod de hoc electuario reformari debent pilulæ aggregatiuz Mæfuz ex inuentione nostra, & pilulæ de hermodactylis minores, et pilulæ de hermodactylis inuentione nostra ipsius Mæfuz. Non cum electuario de succo rosarum, ut quidam bestiales faciunt.

Descriptio. XI.

ELECTVARIVM de succo rosarum Nicolai, ab eodem succo dictum. expertū contra guttam calidam, cholera rubeam purgat, & cōualefcitibus ex ægritudine tertianariis et quotidianariis, mirifice prodest purgando eos sine molestia, & reliquis malorū humorū potēter educit.

℞. Zucchari albi, succi rosæ an. lib. i. & j. iiii. sandalorum alb. citri. rubeo. an. j. vi. spodi. i. de canna. j. iiii. diagrydii. j. i. s. camphoræ. j. i. Misce, & fiat electuariū in bona forma, puluerizando prius puluerizanda.

Succus rosarum hoc modo fit. Accipiatū rosæ cōpletæ, & post earum collectionē permittant p diē deinde in marmoreo uase cū pistello ligneo bene terant: deinde in pecia inuoluatur, & in torculari ad exprimendū ponant: postea colet, & in uitreato uase reponatur, & soli p aliquos dies permittat: deinde a resistētia seu facie facta amoueatur, ponendo in alio uase, & sup eū ponat parū olei oliuarū, & referua. Conferuat enim in sua bonitate per annos duos & recetua.

Electuariū. n. idē est quod electū ex uariis: quia ex multis & uariis rebus electuaria cōficiuntur. Et electuariū dicitur ois cōpō non reducta ad soliditatem, siue cū zuc. siue cū melle fiat. Cōfectio uero dī qd durescit, et in dura forma fit.

Descriptio. XII.

DIASENE Nico. Sic dicit, quia plus de sena ingrediū descriptionē quā de aliis spēs. Valer pprie melācholicis maniacis, cardiacis, et tristibus, quartanariis et spleneticis.

℞. Folliculorū fenæ. j. iiii. auellanarū affatarum. an. j. s. ferici cōbusti. j. ii. lapidis arm. j. i. lapidis lazuli loti. j. iiii. zucchari. j. vi. cinnamomi. j. i. garyophyllorum, galangē, piper. spicē, ozimi. s. feminis basiliconis, zingiberis, foliū, cardamo mi. i. maioris et minoris, croci, zedoariæ, floris rorisnarini, macropiperis. piperis longi an. j. ii. puluerizentur subtiliter omnia. Mellis colati et desummati lib. i. et fiat electuariū in bona forma hoc modo. Auellang subtiliter conterantur: deinde ad bulliendum cum melle ponantur, semper spumam a melle amouendo: post uero aliqualem cōctionem mellis remoueantur ab igne. Et species ponantur.

Lapis lazuli & lapis armenus hoc modo lauantur: terant ambo p se subtilissimē: deinde accipe mortariū lapideum, et proice ipsorum alterū et aquā clarā in eo, et cum pistello agitando sst mifceant: et hoc facto p aliquod tempus permittant se identitā facere, et primam aquam abiciat, et sic ter facias, semper aquam inuouando. Postea loco aquæ claræ accipias aquā rosā, et sic facias ut de cōi aqua dixi. Et tantum cum dicta aqua lauet qd aqua remaneat clara. Et tunc ipsorū perfectā erit lotio, sed per se conterī debet et lauari.

Descriptio. nota qd ferici qd apponit in medicinis cordialibus p cōfortationē cordis, nullo mō debet cōburi, sed minutissime incidi et teri. Quod uero ponit in medicinis ad materiz consumptionem, ut in hoc electuario ponitur:

tunc comburendum est. Modus combustionis positus est supra fol. i. ibi recurras.

Descriptio. XIII.

CŌFECTIO de manna Mefide mente Gal. Solutionem faciliē efficiens, et educēs cholera citrinam sine molestia: et ualet ad ægritudines ex ea factas: et est medicina de lectabilis laporis: cuius pmixtio remanet pure errectis li. i. scamoneæ anti ochene. j. i. succi rosæ. lib. i. dissoluat māna cū succo rosæ, et coquant simul debito mō vsq; ad spissitudinem mellis: deinde remoueant ab igne, & ponatur sup illud masticis puluerizati. j. iiii. et referuetur. Inquit Gal. olēdit cōpositio huius medicinz nobilitatem eius, est. n. cōposita ex partibus conuenientibus complexione & proprietate.

Tereniabin syracost et manna inter se differunt, nec sunt species ut quidam dicunt. Immo differunt & secundum patriam, & secundum locum in quem cadūt, & secundum uirtutem & complexionem syracost enim et tereniabin calidiores & humidiores sunt manna, sed quia ad nos non portantur, ideo ipsorum loco ponimus mannā.

Quidam doctores uolunt quod diagrydium & non scamonea hoc in loco ponatur. Sed sūz, semper pace salua: si poneretur & decoqueretur, uirtus solutiua fere in totum deperderetur. Cōctio. n. est preparatio dictæ scamoneæ: quare illa non diagrydium est ponenda.

Descriptio. XIII.

ELECTVARIVM de psyllio Mef. Solutione educens cholera citrinam: & confersens ad febres difficles, et ad sodam & uerriginem, quæ sunt a fumis cholicis.

℞. Succī buglos, domesticæ & syluestris, succi eduliz succi apil. oium cōctorum et desumatorū, an. lib. ii. piice sup ipsi cūscu. anisi, folliculorū. fenæ an. j. s. capil. uene. an. i. succi sumiteræ. j. iiii. affari. j. iiii. spicæ. j. ii. infundantur hæc oia in dictis succis per diem ac noctē, deinde bulliant bullitione & una: post dictā ebullitionē proiciatur super ea vi. j. iiii. epith. j. iiii. & iterū alia bulliant ebullitione: deinde oia colentur & bene exprimant. & in dictā colatura ponat sem. psylli. j. iiii. & permittatur per diē & noctē omni hora: ramen agitando illud cū spatula: deinde exprimat uiscositates eius tota: deinde accipiantur huius uiscositatis lib. iiii. et proiciantur super eam zucchari albi lib. ii. s. scamoneæ cōctæ in pomo. j. iiii. s. coquant omnia simul cum facilitate: post uerum cōctionem addantur trochiscorum diarhodoni, trochiscorum de spodio rheubar. an. j. i. trochi. de berberis. j. s. puluerizentur hæc facis subtiliter & mifceantur & referuentur in uitreato uase: & dosis est a. j. iiii. vsq; ad aurii iiii.

Viole si simpliciter scriptæ aliquē in composito reperiantur de ipsis ficcis intelligendū est, quæ colligēdz sunt in mense Martii, exicandæ n. in vmbrā, & referuandæ in loco sicco: humiditas. n. in eis putrefactionem inducit.

Sunt aliqui textus qui dicunt scamoneæ nō cōctæ: & hæc litera magis consona est, quia ponēdo scamoneam cōctam & illam iterum decoquendo uirtus solutiua deperditur. Sed nota quod quando præparata coquitur: intentio est ut illud electuariū sit lenitium et non solutium. Potest igitur cum in his electuariis reperies hanc literam. f. Diagrydii, & iubet illud iterato decoquere loco ipsius scamoneam ponere, et coquere, uel diagrydium puluerizare grosso modo: et cum aliis speciebus in fine in electuario ponere sine cōctione: et altero duorum modorum facias &c.

Descriptio. XV.

MICLETA Nicolai. i. expēda: ualet proprie ad morrhoidas et ad uentris tortionem et rugitum lienteriz, & disenteriz: & optima est omni solutioni uentris.

℞. Myrobalo. citrinorū, indorum, chebulorum mundarum & affatorū an. j. iiii. s. cimini, anisi, marathri. i. semen feniculi an. j. i. s. bellericorū, embli. affatorū an. j. ii. nasturtii. j. i. s. ameos, carui an. j. i. s. infundant hæc oia in fortissimo aceto per diē & noctē: deinde extrahant, & exicari permittant: deinde puluerizēt spodiū, balauit iarū, masticis, sumach, gūmi arā. an. j. i. & gra. xv. fricentur hæc oia manibus cum oleo ros. Et postea puluerizentur subtiliter, & cū lib. i. & j. iiii. syrapi myrrini: fiat electuariū in bona forma.

Lumi. apoth.

S 2

Myrobalani omnes afflatur hoc modo. Infundant myrobalani qui affari debent in succi cydoniorum uel granatorum deinde linteo exicca eos: postea madesant in oleo ros. uel masticino: deinde eos alla super patellam ferream bene calefactam semper ducendo & nouendo. Et anteq̃ incipiāt nigre fieri ab igne siue a patella calida, amoueatur ne cōbūrat̃. & sic sunt affati, & hoc modo in usu administrantur.

Sextus fuit modi præparationis medicinarum. primus est coctio. secundus contritio. tertius adustus quartus ablutio. quintus congelatio. sextus commixtio. et causam omnium istorum hoc in libello reperies descriptam.

Descriptio. XVI.

DIAPHOENICON Mef. & est confectio de da stylis quæ scripsit filius Zazar: conferens ad febres compositas. & chronicas. & est medicina securitatis, & confert ad colicā, & dolorem uentris, & humorem crudum & frigora.

R. Dactylorū heyron infusorum in aceto tribus diebus & noctibus. 3. c. penidiarū sifari. 3. sacchi ex zuchca. albo infuso in aqua decoctionis hordei. 3. i. amygdalarum mundatarum. 3. xxx. turbich. 3. xxxv. scamoneæ. 3. xii. s. preparate, zingipiperis lon. foliorum rutæ siccorum, cinnamon. macis, liginis alo. semi. anisi, fœniculi. s. feninis, dauci, galangæ añ. 3. iis. conterant subtiliter dactyli penidii, & amygdalæ. Cætera uero puluerizentur non multum subtiliter. Mellis colati & desumati lib. i. & 3. i. s. fiat electuarius.

Dactyli heyron dicuntur heyron ab illa regione in qua dactyli multum abundant, & qui in ea nascuntur, sunt meliores omnibus aliis aliarum regionum. Alii uero dicunt quod est una maneries dactylorum quæ melior est quæmadmodum sunt pruna damaf. quæ meliora sunt aliis prunis: & una & altera opinio bona est.

Penidii & dactyli hanc in compositione ponuntur, ut inuiscant & ingrossent medicinas solutiuas, ne ad longinqua penetrent & hac de causa ponunt in hac compositione a Mef. & in omnibus aliis medicinis solutiuis in quibus ponuntur.

De hac cōpōne uaria reperit litera, & paucissimi sunt apothecarii qui vsq̃ adeo cōpōitionem hanc rite cōpōuerint ob literæ uarietatem. reperio. n. in aliquibus Mef. scriptis sifari in aliis sifant, in aliis sifant in quibusdam sifari in aliis sifari: & in aliis sifari & sifari: quæ omnes corrupte sunt præter illam quæ penidiarū sifari dicit, & multiplicitate exponitur. Quidā. n. dicūt q̃ penidii sifari sunt penidii sacchi ex zucharo illius puiciz, & quod sifari est pro uincia & hæc falsa est. Alii dicunt q̃ sunt penidii qui sūt ex zucharo prius infuso in aqua hordei: cū sicut fuit q̃ hordei: & tunc illo mō sacchi sic appellandi sunt, magis lenitiui sunt et absterfui, minusque viscosi et oppilatiui. Alia expō est: q̃ sifari idē est q̃ solidi albi & leues: & hi sunt ex bono zucharo: & duæ hę opiniones bonæ sunt, sed prima magis ad mentē doctoris & fuit & est mea opinio. Igitur cum cōpōitionem hanc facere uis, accipe zucharum album et infunde in aqua decoctionis hordei per horas sex: deinde zucharam coque illa in aqua, et penidos fac: & habebis perfectā et uerā descriptionē diaphœniconis, s̃m auctoris mentem.

Penidii sunt ex solo zuchca. ultimate ducto, & ex longa & continua distillione, & manibus pertrahatio ne dealbantur, & de bono zucc. facienti sunt, non de puluere zuchari ut quidam faciunt apothecarii.

Diaphœnicō dicitur a fenichiis. i. dactylis: de quibus plus intrat quam de aliis medicinis: basis tamen non sunt in hac medicina. Sed turbith & scamonea sunt basis.

Descriptio. XVII.

DIAPRVNIS nō solutiu Nicolai. Datur acutus et pcutas patietibus. et maxime causis et synochē, in priecipio in augmento, et statuz ægritudinis, et sine diagrydio pot̃ exhiberi in omni hora diei: et diagrydio uero in hora matutinali, & cum cautela quoniam est solutiuum forte.

R. Prunorū damascenorū quātitatē quā uolueris aquæ claræ in quantitate cōuenienti, quā dicta pruna coquantur. Ponantur duo hæc in uase ad ignē, & tandū bulliant usquequo dissoluti uideatur, & dissoluti ab igne deponatur: deinde in cribro perforato ponantur, et rādū magnus siccant,

q̃ pulpa dictorū prunorū transeat, et solum offa et cortices remaneant, deinde de dicta pasta accipe lib. i. zuchca. lib. ii. aquæ in qua cocta sunt pruna lib. vi. uiolarū. 3. s. bulliāt leui ebullitione in dicta aqua: deinde coletur, et in ea colatura ponat zuchcarū et pasta prunorū præscripta, et usquequo ad spissitudinē oīa ueniant simul bulliant semper agitando, et tūc addatur casisē subtilis, tamarindorum an. 3. i. duo hæc dissolui debet cū aqua prunorū in qua uiola bullierit. Postea tandū simul bulliant usquequo reducatur ad perfectā cōctionē, et electuarii habeant formā, et ab igne remota in frigida pmitantur: demū infrascipit spēs sup. piciantur. R. sandalorū alb. sandalorū rube. spodiū, rheubar. cinnamon. an. 3. iii. uiolarū ross. semi. portulacē, scariozē, berberorū, succi liquiritiz, dragacā. hi an. 3. iii. semi. citrulli, melonū. s. seminis, semi. cucurbitæ mundato. au. 3. i. puluerizentur oīa satis subtiliter et bene pmisceant. Et habes diaprunis.

Descriptio. XVIII.

DIAPRVNIS solutiuum. R. diaprunis non solutiui cōpositi in omnibus ut supra lib. ii. diagrydii. 3. ii. misce, & sic habes diaprunis solutiuum. Aliqui textus habent, & sic laxatiuum facere uolueris, ponatur in unaquaque lib. 3. vii. diagrydii quando ab igne deponitur.

Pruna et sic fructus colligendi sunt quī iā maturitatem acciperunt, et anteq̃ cadāt ab arbore: et sic debent conservari.

Pruna ex quibus supra scripta cōpō fit, debet esse medio cris maturitatis, non multo matura uel mura. Muzum autē propriē dicit̃, cuius sapor est cōpositus ex dulci & aceroso.

Descriptio. XIX.

DIACASSIA inuentione mea, quæ est lenitiua uentris et leuis, et est medicina pro delicatis: carens acuitate et mordacitate, et omni excessu ledente.

R. Cassiæ munde et electe lib. ii. tamarindorū. 3. i. prunorum. xii. uiolarum, hordei, anisi, polypodii, cartami, liquiritiæ, capil. uene. thimi, epithymi an. s̃. s. passularū. 3. i. semi. fenici. 3. ii. semi. portulacē, seminis malarum an. 3. iii. cinnamon. 3. s. misceantur et confringant omnia grosso modo, et ebulliant in lib. xii. aquæ secundum artem: deinde coletur manibus exprimendo: de qua colatura: cassiæ et tamarindi extrahatur, & dissoluantur: Et addatur lib. i. zuchchari: deinde coquantur, et usq̃ ad formam electuarii reducantur lento igne cum spatula semper agitando.

Drachma nomen est ponderis, et ponderat non nam partem uincit, et est accipiebatur antiquitas, & illa est uera drachma. Moder. uero octauam partem uncie pro drachma accipiunt, quæ est scropuli tres. Et drachma græcæ idem est quod manipulus uel fasciculus moder.

Grana ex quibus medicinx pōderant debet esse grana uel hordei uel frumenti. Si uero frumētī debet illud granū esse a superiore cortice mundatū. Si uero hordei, illud granum esse debet cū cortice: et sic habebis debitū ordinē pōderū.

Descriptio. XX.

CASSIA FISTULA pro clysteribus magistralis. R. Florum uiolarum, foliorū earum, malarū, mercurialis, bletarū, parietariæ an. s̃. i. ab sinthii romani, s̃. s. omniū uiridum: fiat omnium decoctio in sufficienti quantitate aquæ secundum artem, postea coletur manibus exprimens do de qua colatura cassia extrahatur, quæ extracta, pro omni nib. i. distillat cassiæ addatur mellis electi s̃. s. & coquantur usque ad spissitudinem, & reseruetur.

Hæc omnes præscriptæ ex quibus decoctio hæc fieri debet uirides esse debet, eo quia sunt magis lenitiuæ. Si uero haberi non possunt, sicce ponantur.

De absinthio nota, quod ipsum diuersificatur secundum diuersitatem loci et patriæ in quibus orit. Ideo quī dicitur: et reperitur in receptis absinthii romanibos est, quia illud est melius aliis, una tamen & eadem est species. Sed quia illud haberi non pot̃, eligat illud quī in montibus et locis saxosis oritur quia melius est q̃ nascitur in locis humidis & umbrosis et colligi debet in Iulii mense, et umbra excicari.

Inter enema et clyster dñā est. Nam clyster est instrumentum quod decoctio in intestinis impellitur. Enema autem est ipsa decoctio et medicina quæ inicitur.

Descri-

Q̃to est
in omni
bus
promissu
Mef. & h
colat ab
dicuntur
huius est
m. v. n. a
& ubi e
dicit. p. m.
ponit s̃
i. & lib
in m. locis
a margi
repenit
dotes lib
fuit & h
co. & h
medic
more m
quo.

Descriptio. XXI.

DIAROB cum turbith & rheubarbaro magistralis, quæ est confectio delectabilis in forma solida, & euacuat choleram & phlegma, & humores viscosos putridos a stomacho, & a partibus remotis & iuncturis.

R. Zingiberis. 3. galangæ, piperis longi, cardamomi. s. maioris & minoris, an. 3. i. croci. 3. i. macis. 3. s. turbith albi & gummosi. 3. x. rheubar. boni & electi. 3. s. diagrydii infusi in aqua ros. per diem unum. 3. s. zuchari boni. 3. xvi. & fiat confectio in morfellis faciendo omnem morfellum de drach. vi. & hæc est visus dosi.

Pondera communia ex quibus medicinz commensurantur et ponderantur sunt sex. primo libra: cuius talis est figura lib. secundum unciaz et talis est figura. 3. tertio drachma, & talis est. 3. quarto scropulus, & talis est 3. quinto granum, & talis est gra. Manipulus, & talis est M. & his sex ponderibus communiter omnes nensuræ mensurantur medicinarum

Descriptio. XXII.

DIAROB sine rheubarbaro magistralis. Cum uirtute superioris, plus tamen euacuas phlegma quam Colera.

R. Turbith albi gummosi. 3. i. zingiberis 3. s. cinnamo. garyophyllorum an. 3. ii. galangæ, piperis longi, macis an. 3. i. diagrydii. 3. s. zuch. albi lib. i. fiat confectio in morfellis dissolvendo zucharam cum uino cydoniorum et aqua simplicis, & si omne morfellum de. 3. s. puluerizando hæc solutio. rum more &c. Inter antiquos modernos de ponderibus est differentia. Ideo intelligendum quod libra modernorum constat & resultat ex xii. 3. vncia constat ex viii. drachma ex iii. 3. scropulus ex gr. xx. & sic medicinz a medicis & apothecariis commensurantur hoc tempore.

Descriptio. XXIII.

DIACARTAMVM magistralis ualens in euacuatione cholerae, phlegmatis.

R. Medullæ cartami. 3. i. & 3. i. specierum diadragacanthi frigidi 3. ii. carnam cydoniorum. 3. ii. s. zingiberis albi. 3. i. turbith. electi. 3. ii. diagry. 3. ii. & 3. i. mannæ granatæ: mellis ros. an. 3. i. zuch. alb. 3. vi. et fiat confectio in morfellis uel in forma manus christi de 3. s. pro singulo. Cuius est dos.

Dosis. n. est limitata mensura uel quâritas simplicis uel compositionis medicinz solutiue uel nō solutiue, q̄ de se apta nata est capere sufficienter operationē non diminuat nec superflua.

Carnes cydoniorum. i. pulpa cydoniorum debent subtiliter conterri cū cartamo a quo amotus sit cortex exterior: & hoc mō dicit medulla, deinde anuo debent dissolui cū mel le rosato & māna & zucharo fere cocto bene miscere, in fine uero spēs præscriptæ misceri debent, & confectio fieri.

Medicinz omnes solutiue consensuantur per duos annos in aqua bonitate & solutione: elapso uero dicto tempore amittunt uirtutem suam solutiuam.

Descriptio. XXIIII.

PILVLAE alephangine Mes. quæ dicuntur pilulæ de aromatis: & ualent ad dolorem stomachi ppter phlegma, & sunt uehemētis iuuamētī in mundificatio stomachum & cerebrum, & infusa sensui ab humoribus grossis & putridis. R. Cincamomi, cubebe, ligni aloes, calami aroma, macis, nucis muscatæ, cardam. s. maioris & minoris, garyophyllorum, assari, masticis, squinanti, spicæ, carpopalassi an. 3. i. abinthii sicci, rosarum an. 3. v. terantur hæc oīa contritione grossa, & fundant super ea aque lib. xii. & coquantur usque ad consumptionem durati partium: deinde frizentur manibus, & colentur exprimendo aquositate eius: postea accipe aloes succorū lib. i. lauet in succella lapidea uitreata lauationibus pluribus cū aqua pluuiali. Postea remota aqua piciatur super eū de prædicta decoctione lib. ii. & ponatur i sole, & permittat desiccari omni die cum spatula agitando: deinde post ipsius excicationē conterant subtiliter, puluerizent myrrhæ, aloes, masticis an. 3. v. croci. 3. iii. Et ea pmiſce cū aloel alois, & ter e contritione bona. Et postea residui decoctiōis expressiōis adeo, & soli expone oīe cōmīſcē do cū spatula, & tñ pmitant stare q̄ exiccatē sit, et serua.

Istæ pilulæ nō possunt confici nisi semel in anno. Spilulæ alephangine, in citate. i. in mense Iunii & Iulii: & sic tñ ista

spēs pilularū p annū cōseruatur in sua uirtute, et nō plus.

Magna diuersitas reperitur in Mes. de dosi rosarū & abinthii: quidam ponunt an. 3. v. quidam uero an. 3. & ista litera uerior & melior est. Nam rosæ ponuntur ut expellant malitiam caliditatis aloes a stomacho & capite abinthium uero ut aggreget sua stypticitate partes lassatas ab alois: quare. 3. v. est dosi quæ in dicta recepta apponi debet.

Aloes lauatut cum aqua pluuiali propter hanc causam, quia illa subtilior est quam communis: ideoque magis penetrat per omnes partes aloes quam posset communis face re propter grossitatem suæ substantiæ: quare cū illa lauetur.

Aloes lauatut hoc mō. Accipe de alois succorū mōdo cito frangatur & bonisfidi odoris quantitate cum uolueris, bene terat & cribelletur: deinde piciatur in succella lapidea uitreata & roret aloes ex aqua pluuiali: donec imbibat ea per totū: deinde soli exponatur, et exiccari pmitat ab illa aqua. Et cū desiccatus fuerit: iterat terat & sc̄t: & iterū ibibat ex aqua pluuiali, & dimitte siccare ficut prius.

Descriptio. XXV.

PILVLAE masticæ. Petri de Abano sup additio nibus factis Mesuræ, ca. de medicinis appetitus corrupti, in fine capituli. Quæ præseruant stomachum ab omni læsione intrinseca nec permittunt humores putrefieri in eo, & multas alias laudes eis attribuit.

R. Masticis boni. 3. s. aloes electi. 3. x. agarici boni. 3. iii. confice cum succo altiz. i. cum uino cocto uel sapia uel rob quod idem sunt prius puluerizantur omnibus.

Dfia. n. est inter rob, robub, & syrupum. Nā rob. idē est q̄ uinū ultimare decoctū. Robub idē ē q̄ succus inspissatus uel caliditate soli uel ab igne. Syrupus uero ē decoctio in spissata ab igne cum qua ponit zucharū uel mel uel sapia.

Descriptio. XXVI.

PILVLAE aureæ Nicolai: sic dicit pp earū excellētiā: pprie purgant caput, lumen oculorū accunt, uicostitit stomachi, et intestinorū expellūt, et sine molestia purgāt.

R. Aloes electi, diagrydii an. 3. v. rosarū, semi. apii an. 3. ii. s. semi. anisi, semi. feniculi an. 3. i. s. croci, interioris colloquintidæ, masticis, an. 3. i. puluerizetur non multū subtiliter, & formentur pilulæ cum aqua infusionis dragacanthi.

Dicuntur pilulæ aureæ per metaphorā, quia sicut aurum preciosius est cæteris metallis: itæ pilulæ ad complendos effectus ad quos faciendū dant sunt preciosiores aliis cōparatis ad suos effectus cōplēdos, & multū in usu habentur.

De colloquintida inter docto. est dīa: multi ponunt quādo reperitur interiora colloquintida & femina & pulpam ut uile Circassianis & malefaciat. Alii uero ponunt pulpam sine femine, ut alii omnes scribunt doctores: & isti melius faciunt & sic communiter ab omnibus ponitur ut seruitor de modo preparationis ponit sic Mesur in descriptio ne trochiscorum aland iubet illam a granis mundari.

Descriptio. XXVII.

PILVLAE turbithathæ & dicuntur aureæ Mesuræ: quæ cholera & phlegma sine molestia purgant stomachum & hepar confortant, & digestionem procurant: turbithathæ a turbith, & sunt primæ quæ sunt in usu.

R. Turbith boni. 3. xvi. aloes. 3. i. s. masticis, rosarum an. 3. vii. myrobalarum citrinorum. 3. x. croci. 3. iii. puluerizentur, & confice cum succo abinthii.

In istis pilulis non ponitur zingiber, & hoc est ut debiliores sint & a longe non trahant: q̄ secus facerent si in eis poneretur zingiber enim permixtum cum turbith fortificat ipsius solutionem, & facit quod a longinquo attrahat.

Descriptio. XXVIII.

PILVLAE aggregatiue ex inuentione Mes. descriptione nostra ut ipse inquit. Expertorum iuuamentum ad febres antiquas: & ad febres diuersitatis, & ad ægritudines capitis, stomachi, & hepatis: & educit putrefactiones utriusq̄ cholerae, & phlegmatū, & mūdicat infusa sensum.

R. Mirobalarum citrinorum, raueseni, an. 3. s. succi eupatorii, succi abinthii an. 3. ii. diagrydii. 3. vi. chebulorū indorū agarici, colloquintidæ, polipodii an. 3. ii. turbith boni, aloes an. 3. vi. masticis, rosarum, salis gemmæ, epithymi, anisi, Lumi. apoth. S 3

zingiberis an. 3. i. misce, & reformetur cum electuario rosato omnibus prius puluerizatis.

Nota quòd si succi intrantes in istis & aliis pilulis seu confectionibus hoc modo fuit accipitur absinthium et bene conteratur deinde in pecia rara inuoluatur: postea cum torculari exprimatur, & absque alia colatura in uesica ponatur & soli ad exsiccabulum permittatur: enim parua grossa colatur in uesica nihil remaneat, eo quia pars aquea a sole coarseretur, & vt de absinthio dico, ita & de aliis omnibus herbis intelligatur &c. & per annum conseruatur.

Nota quòd istæ pilulæ & pilulæ de hermodactylis descriptio nostra Mesuæ: & de hermodactylis minores reformantur cum electuario rosato, quamquam quidam ignari apothecarii reformant cum electuario de succo rosarum, & ualde errant, & hoc avaritia ducti.

Nota insuper quòd simpliciter scriptum reperis pilularum aggregatarum de his supra descriptis est intelligendum, quæ sunt perfectiores aliis magisque correctæ.

Descriptio. XXXIX.

P I L V L A E de fumore ræ Auic. li. 4. fen. 7. ca. de scabiei cura. Valentes ad prurium & scabiem, & ad aggritudine de materia adusta.

R. Myrobalarum citrinorum, chebulorum, nigrorum, indurum, an. 3. v. aloes succorri. 3. vii. scamoneæ 3. v. puluerizentur omnia non multum subtiliter. Et confice cum aqua fumieræ irrorando ea & dimittant donec exsiccentur, & imbibant uice altera, et dimittant donec exsiccentur, & fiat tribus uicibus sic, & in omni uice fiat ficut forbitio: deinde dimittantur donec inspissent, & coapdam fiat, & fiat inde pilulæ.

Hic intelligendum est, & in omnibus aliis locis in quibus scribitur Myrobalani quòd solum cortices amotis offibus accipi debent myrobalarum.

Modus faciendi suprascriptarum pilularum fere uidetur obsecutus, sed hoc modo fieri debent: reteratur præscripta in eis: deinde irrorentur aqua fumieræ: in tantum quòd omnes partes ipsarum penetrent: deinde in sole ad exsiccabulum ponantur & ante perfectam exiccationem, sed post aliqualem suctionem iterum aqua fumieræ irrorentur & soli exponantur, & hoc iter fiat ultimum in sole exponantur, & tantum permittantur donec pilularum formam accipere possint: deinde remoueantur & conseruentur.

Descriptio. XXX.

P I L V L A E de mæzere Mes. quæ sunt mirabiles ad hydropisim, educunt aquam citrinam, & sunt expertæ.

R. Folioi. mæzereon preparatorum. 3. v. myrobalarum citrinorum. 3. iiii. chebulorum. 3. iiii. misce & puluerizetur omnia non multum subtiliter. Et cõfice cū aqua endiuie, in qua dissoluti sunt tamarindi, & terenabi. i. māna an. 3. i. et fiat massa.

Mæzereon preparatur hoc modo infundatur in fortissimo aceto & per diē dimittatur, et excicari permittatur: deinde conteratur, & administretur. Hoc enim modo præparatur ut sero sitas & inflammatio que in eo est amoueatur: parum enim sustinet de decoctione, & laboriosa contritio uirtutem eius destruit & resoluit.

Descriptio. XXXI.

P I L V L A E de hiera simplici Gal. septimo therap. ca. 12. Quæ sunt sublimes, & laudes earum sunt dictæ superius in capite de hiera.

R. Specierum hieræ simplicis. Gal. 3. i. Et conficiantur cū melle rosato, & fiat massa. Nec aliud est addendū nec diminuendū, & hoc modo Gal. describit loco allegato supra.

Necessitas compositionis pilularum fuit: quia medici uolentes dare substantiam medicinæ in forma, in qua diu moretur in stomacho oportuit eas aptare in forma pilularum: cum solidum inagis in stomacho ita, quia quæque alia forma.

Descriptio. XXXII.

P I L V L A E de hiera composita siue de hiera cum agarico magistralis, quæ sunt maxime inuamentis solutione edcentes utramque coleram, & phlegma, & humores uiscosos & putridos, & earum proprietas est mundificans cerebrum & membra sensuum.

R. Specierum hieræ simplicis Galeni, agarici trochiscati ana.

3. s. aloes boni subtiliter puluerizati, seu contriti 3. i. misce cum melle rosato, & fiat pilulæ fæ massa.

Hoc melle libello notandum est, quòd aliquibus in descriptionibus & compositionibus reperitur terant, & in aliquibus conterant. Illa differentia est inter terant & conterant. Terant. n. idem est quod rem aliquam diuidere per partes grossas. Conterere uero idem est quod rem diuidere per partes subtilissimas. Ideo quod intendo species subtilissime teri debere, scribo conterantur. Cū uero uolo quòd grossius modo puluerizent, dico & scribo terantur: quare et insuperscriptis et infrascriptis compositionibus ad hæc bene aduertatur.

Descriptio. XXXIII.

P I L V L A E fœtidæ maiores Mes. quæ expellunt humores grossos, & cõferunt ad dolorem iuncturarum, & podagras, & ad eòdem dolorem ex humore crudo, & ad dolorem stomachi & colicam, & ad albas, & morpheam, & lepram.

R. Serapini, armoniaci, opoponaci, bdellii, colloquintidæ, harmel. i. semi. cicutz, aloes, epithymi ana. 3. v. alsebram. i. esule: colligida est in mense Octobris. hermodactylus an. 3. ii. scamoneæ. i. preparatæ. 3. iiii. cinnamomi. spicæ. croci, castorei an. 3. i. turbit. 3. s. zingibe. 3. i. s. euphorbii. 3. ii. teantur omnia & gumme dissoluantur in aqua porri, & fiat pilulæ fæ massa.

Nota de mente auctoris pandectarum quod harmel scriptum cum h, idem significat quòd semen cicutz: quando uero scribitur cum a, idem quòd semen turbi. Ex hoc igitur intelligas quod diuersus modus scribendi diuersificat nomen uocabuli: quare semper respiciendæ sunt literæ, & syllabæ, uocabulorum componentes in medicina scriptum: eo quod uariatur locundum uarietatem compositionis literarum: quare bene nota.

Descriptio. XXXIII.

P I L V L A E fœtidæ minores Mesuæ, & sunt eiusdem uirtutis cum maioribus.

R. Serapini, armoniaci, opoponaci, bdellii, myrrhæ, an. 3. v. turbit. 3. x. colloquintidæ. 3. vi. dissoluantur gumme in aqua porri &c. terantur, & cum ea conficiantur.

Vnum generale hic nota, & incidenter, quod illud quòd de natura sua est aromaticum quāto est aromaticius, tanto melius, & quòd est fœtidum, quāto fœtidius tanto melius, ex cepto aloes. Siste etiam omne quòd debet habere aliquem saporem, quāto in suo sapore est intensius, tanto melius, excepto oleo. Nam cum sit de natura rerum amaritudinem habentium quāto minus amarum tanto laudabilius &c.

Gumme dissoluntur in aqua porri uel in aceto uel in aliquo alio liquore hoc modo. Infundunt in aqua uel aceto per noctem, & debet aceri uel aqua esse in tanta copia quod est tegat: in mane si gumme totam biberint aquam uel acerem & duræ sint adiungatur ipsorum alterum: & postea accipias eas & fricabis manibus super fetaciū, quia fricatione, bona transibit suba: palæ uero & imuditiæ remanebunt, et sic utere.

Descriptio. XXXV.

P I L V L A E de sarcocolla Mes. in ca. de sarcocolla, & in antidotis: solutione educentes phlegma, & conserunt ad aggritudines phlegmaticas.

R. Sarcocolla preparatæ. 3. iiii. turbit. 3. s. interioris colloquintidæ, zingiberis an. 3. i. s. falsi gême. 3. i. dissolue sarcocollam in aqua rosata: cætera terantur, & cum ea fiat massa.

Sarcocolla hoc modo præparatur. Infundatur in lacte sine per dies quinque, semper & omni die lac innoandus, & primum abiciendo, demum dissoluitur in aqua rosata, ut in superioris pilulis tibi monsttraui.

Descriptio. XXXVI.

P I L V L A E de bdellio maiores Mes. expæ ad fluxum hæmorrhoidarum & ulcerum in eis, & ad fluxum menstruorum.

R. Bdellii. 3. i. sameos, chebulorum, indorum, bellericorum, emblicorum, ueneriarum adularum. i. radicis acori, charabæ, an. 3. iiii. Infundatur Bdellium in succo porri, cætera terantur, & cum eo fiat massa. Et dentur pilulæ in modum ciceris & cætera.

De porro nota, quoddam est porrum capitati. i. transplacatū, & esui illud cõpetit. Aliud est scitile. i. non transplacatū, et illud usui medicinæ cõpetit: igitur de isto fit succus de quo istæ pil. reformant: ex his est fit aqua vt p sublimationem

Mes. dist. 3. iiii.

Mes. dist. 3. iiii.

ne vel per decoctionem, & iste ultimus modus magis mihi placet. de qua reformatur & dissoluatur gumme intrantes in pilulis foetidis: quare nota.

Diuersitas magna reperitur in receptis harum pilularum. Mefure oēs dicunt uenarum adfufur. Et hanc literam reprobat Matth. Syllin fynonymum ponitur sub cap. 690. dicens qd error scriptoris, & qd debet dicere auellanarū adfufur: Sed falsa semper pace, in errore est. Sed debet dicere ueneriarum adfufur, ut in quodā antiquissimo Mef. scriptum reperitur. Et qd sic dicere debet, patet eo quia uenerix. i. acorus. radix, & quæ radix supra aliquem portata illum conferuat a fluxu sanguinis, ut ipse ponit ca. 12. i. quare seipm corrigat.

Radix acori hoc modo aduritur: post ipsius exiccationem per grossa satis frusta incidatur deinde super laminā ferreā igitur incessanter reuoluatur, donec & quouique color eius de toto mutetur, & tunc remoueat, quia adfusa est.

Descriptio. XXXVII.

PILVLAE lucis Mef. maiores: quæ addit in uisus, & corroborant eum, & absterunt instrumentum sensuum, & expellunt superfluitates, & custodiunt sanitatem corporis.

R. Rosarū uolarū, absinthii colloquintidæ, turbith, cucubæ, calami, arom. nucis musficæ, epithymi, carpopalsami, xylobalfami. i. ligni balsami, sileris, montani, sem. rutæ squinantii, assari, masticis, garyoph. cinnamonomi, anisi, foeniculi, f. seminis apij, f. seminis casie lignæ, croci, macis, an. 3. ii. myrobalano. citrinorū, chebulorū indorū, bellericorū, emblicorū, raucedeni. i. rheubarbari an. 3. s. agarici, fenæ, an. 3. v. euphragie. 3. vi. aloes succotrinæ pondus omniū. Teratur omnia, & conficiatur cum succo foeniculi, & fiat massa.

De colloquintida, pauci sunt qd in receptis ponant colloquintida, fundantes se super dictū Mef. in descriptione trochiscorū alandal, qui dicit. Trochisci alandal qui ponuntur in hiera Hermetis & in aliis confectionibus loco colloquintidæ: ac et propter suā uenenositatē dicunt non esse aut in receptis ponere. Alii uero ponūt colloquintidā & nō trochiscos alandal dices qd magis solutiuū est & qd a doctoribus ponitur in cōpositionibus tanq. calcari, ut et faciunt diagrydium, & sic his rationibus uariū uariis cōpositiones faciunt. Ego uero soleo hoc fieri facere, si in receptis authorū reperio, considero si in eis, ipsius malitiā frangentia sunt posita uel non: si sic audacter illā apponi facio, ut in ista recepta, si non loco ipsius pono trochiscos alandal. Et hoc est quod dicit bonus Mef. & propter hoc in hiera Hermetis posuit in qua multa & multa sunt medicinz uenofæ & pauca eorum uenenositatem corrigentes & tu hoc considera.

Descriptio. XXXVIII.

PILVLAE de hermodactylis maiores Mef. expertæ ad dolorem iuncturarum & podagræ frigide.

R. Hermodactylorū, aloes, myroba. citrinorum, turbith, col. Iogntidæ, bdellii, serapini an. 3. vi. castorei, sarcocol. euphorbij, opop. harmeli. i. sem. cicutæ, se. apij, ana. 3. iiii. cro. 3. i. s. Conterantur omnia, & cum succo caulium fiat massa &c.

Colloquintida anteq. in cōposito ponatur debet ultimæ cōtineri ut iubet Mef. in ca. de rectificatione medicinarū per trituratiōē. Cū dicit oportet qd colloquintida ultimæ puluerizetur, nec fit cōtēntus aliquis in trituratiōe eius.

De contritiōe iterū nota, qd dupliciter est: quæ d. n. multa quadam pauca. Multa contritio fit duabus de causis. Primo ut per illam contritiōē remoueat malitiā medicinz quā faceret qd grossa esset, & ob hoc bene conteritur pulpa colloquintidæ. Secunda est, quia membrū quod curare uolumus, est situatum in remotis partibus, & ideo bene cōtērendæ sunt medicinz renū & hepatis. Grossa uero contritio fit duabus de causis: una est ut ultimata cōtēritiōe uirtus medicinz, & operatiō eius propria corruptatur, ut scamonea, si in ultimo contritu deperdit uirtutem solutiui. Secunda est ut multo tempore remaneat in stomacho & inuet digestiōem, uel magis attrahat, & sic medicinz stomachicæ & solutiue grosso modo conteruntur.

Descriptio. XXXIX.

PILVLAE de rheubar. Mef. qd conferentes ad febres antiquas ex diuersis, generatas humoribus viscosis & putri-

dis multarum putredinum, & ad dolorem hepatis, & principium hydropis.

R. Raucedeni. i. rheubar. 3. iiii. succi liquiritiæ. succi absinthii masticis an. 3. i. myroba. citrinorū. 3. iiii. sem. apij, sem. foeniculi ana. 3. s. trochilorum diarhodon. 3. iiii. s. specierū hieræ picræ. i. hieræ simplicis. 3. x. Terantur terenda, & conficiantur in magdaleone cum aqua foeniculi.

Pro reformatione pilularum. Nota qd nisi pilulæ reformantur cum aliqua re uiscosa, non possunt simul teneri ut faciunt istæ pilulæ cohiæ, quæ reformantur cum uino albo. Ideo si istæ reformantur cum syrupo acetofo uel cum oxymelle simplici, non esset inconueniens, ut pilulæ cohiæ cum melle rosato. Igitur ut dico de istis, & de aliis etiam intelligas, quæ cum aqua uel uino reformantur &c.

Descriptio. XL.

PILVLAE de hermodactylis minores Mef. expertæ ad dolorem iuncturarum, & podagræ calidæ.

R. Hermodactylorum. 3. v. scamoneæ. 3. iiii. s. præparatæ myrobal. citri. 3. iiii. rosarum. 3. ii. aloes. 3. x. Confice cum cathartico. i. cum electuario rosato, terendo prius terenda.

Catharticum. i. purgatiuum ut doctores exponunt igitur catharticum rosatum idem est quod purgatiuum factum cum succo rosarum. Et sic electuariū rosatum dici potest catharticum rosatum. Verum ego magis laudo reformari debere cum electuario rosato, quia illud magis benignum est & minori uenenositatē participat.

Descriptio. XLI.

PILVLAE indæ Mef. quarū iuumentū est ultimum ad ægritudines melancholicas, & ad cancrū, & lepram, & morphæa nigra difficilis: & sunt bonæ melancholiz, & timorū, & ad dolorem splenis, & icterici splenalem, & ad quartanam. R. Myrobal. nigrorū. i. indorum, ellebori nigri, polyopidij ana. 3. v. epithymi, f. cecados an. 3. vi. lapidis lazuli loti. Modus laudandi supra esset colloquintidæ, salis, indi. an. 3. s. succi eupatoriij, picræ an. 3. ii. garyophyl. 3. i. specierū hieræ picræ. i. simplicis 3. i. s. teratur, & fiat massa cum succo apij.

Nota qd pilulæ oēs conseruant cum bona earū uirtute & operatione usq. ad sex menses. Et debet teneri in magdaleone & non in puluere, quia non conseruantur, immo nullam uel remissam faciunt operationem, & nō debet conseruari in loco excessiue calido, nec prope ignem, nec ad solem, quia in excessiua duritiē & lapideitate cōuerteretur, & tūc nullo mō debet apothecariæ eas exhibere, eo quia si darēt, torquerent corpus, & nullā penitus operatiōē facerent.

Descriptio. XLII.

PILVLAE sine quibus esse nolo Nico. taliter dictæ propter summam efficaciam, mirabiliter a cholera phlegmate & melancholia purgant, & ualent proprie ad cataractas, & obscuritates oculorum, uisum custodientes, & aurium dolorem sanant, & iliosis mirabiliter conserunt.

R. Aloes electi ablutif. eum aqua communis. 3. xiii. myrobalanorū citri. chebul. bellericorū, emblicorū, indorū, rheubarbari, rosarū, masticis, absinthii, uolarū, fenæ. f. folliculi, agari, cuscute. an. 3. i. terantur hæc omnia, deinde accipe scamoneæ. f. præparatæ subtiliter puluerizatæ. 3. vi. s. ligetur in petia dicta scamonea: deinde infundatur in succo foeniculi quantitate qua pilulæ possint reformari: deinde exprimitur dicta scamonea, manibus prius tamen inunctis oleo uoluto uel communi. Et tantum dicta scamonea exprimitur & manibus pertractetur, qd in lactis similitudinē a panno exeat tota eius humiditas, & de illa expressiōe pilulæ formantur: abiciendo quod intra peciem de scamonea remanebit. Succum foeniculi cum expressiōe facta de scamonea accipiendo & pilulæ formando.

Aloes quando simpliciter ponitur pro succotrinio & de succotrinio intelligitur, ut ponit Mat. Syll. ca. proprio &c.

Pilulæ a pila dicuntur, quia sicut pila est rotunda, ita pilulæ debent esse rotundæ.

Pilulæ quare dantur in forma rotundæ. Est quia figura spherica non agit planū nisi in puncto. Sed concuum ipsum tagit undiq. qd ergo pilula ponitur in stomacho quod est concuum ipsa, æqualiter tangitur a qualibet parte stomachi.

& ideo undiq; & in omni sui parte ad actum reducitur propter calorem stomachi: & ideo ipsa in qualibet sui parte reducta ad actum attrahit undiq; & qualiter a membris omnibus: ideo datur & dari debet in forma rotunda.

Descriptio. XLIII.

PILVLAE cochiz Nicolai probare ad hemicanem dolorem, & ad dolorem stomachi, & iliorum.
℞. Aloes, scamoneæ. ꝑ. præparatæ absinthij, pulv. colloquintidæ, an. masticis dimidij unius prædictorum conficiantur, cum succo absinthij, vel fœniculi, vel folari.

Quare enim hæ pilulæ dicuntur cochiz: Cochiz. i. capi tales a cochos quod est caput.

Pilulæ quare dantur in impari numero est. Pythagoras enim posuit in impari numero uirtutem multam: & dixit numerum imparem masculinum: igitur perfectiorem. Et ob hoc uulgares sequentes eum credunt ꝑ dando eas in numero impari sit maior perfectio, & multi errant. Numerus enim non est principium actionis & passionis, ut. 5. Metaph. comment. 2. Et ideo facta dosi convenienti medicinx potest formari numerus pilularum par & impar &c.

Descriptio. XLIIII.

PILVLAE cochiz Almanforis. i. capitales. cochos. n. græce idem est quod caput latine: caput. n. mirabiliter mundificant, & maxime ab humoribus grossis & frigidis, conferunt cephalæ, & hemicanæ.

℞. Specierum hieræ simplicis. 3. x. colloquintidæ. 3. iiii. Di. scamoneæ præparatæ. 3. ii. s. turbit, stocados, an. 3. v. terantur hæc, & conficiantur cum uino albo.

Pilulæ fuerunt inuentæ: primo propter earum minorem displicentiam in gustu, cum uniuersaliter componantur ex rebus amaris: secundo ut magis a remotis attrahant, quanto enim medicina longiori tempore stat in stomacho, tanto magis a longinquis attrahit.

Descriptio. XLV.

PILVLAE arabicæ Nico. contra omnem dolorem capitis purgantes mirabiliter omnes humores, generantes letitiam, & mentem acutes, uisum, auditum, & memoriam restaurantes: scotomiâ, vertiginem, oculos, deters gingiuas stomachum, splenem purgant, omnibus conferentes.
℞. Aloes electi. 3. iiii. bryoniæ. i. radices cucurbitæ saluaticę quinque generum myrobalanorum, masticis, diagydy, alfari, rosarum an. 3. i. croci. 3. i. costorei. 3. iii. Terantur omnia, & conficiantur cum succo fœniculi vel absinthij.

Si in pilularum descriptioe reperitur scriptum scamonea suppleatur. i. præparata. Nec ullo modo non præparata ponatur, quia longa morâ non potest præparari, ut in electuariis supra declarauimus, eo quia earum uirtus non transit sex menses. Sed semper diagydydum est ponendum.

Descriptio. XLVI.

PILVLAE assiaerit Aui. in. a. sen. tertij in ca. de canonibus uniuersalibus curationis capitis, & exponitur a Gentili in hunc modum, quæ facilliter sine molestia caput purgant & mundificant.

℞. Pulueris hieræ. i. specierum hierę simplicis. 3. ii. myrobalanorum citri. masticis an. 3. i. aloes boni. 3. s. Terantur & cum uino optimo fiat pilulæ seu massa.

De myrobalanis nota quod aliquando reperitur scriptum in receptis myrobalanorum absolutæ: & tunc de omnibus myrobalanis est intelligendum. i. de quinq; generibus myrobalanorū. Si uero scriptū reperiat myrobalani absolutæ: de ceteris est intelligendū, tanq; de melioribus & perfectioribus.

Descriptio. XLVII.

PILVLAE stomachicæ Mes. descriptioe sua, q; inquit, dari & accipi possunt omni tempore, & sunt illæ quæ sunt in usu, quæ caput & stomachum miro modo mundificant.

℞. Turbith. 3. x. masticis 3. s. rosa. 3. iiii. aloes optimi. 3. xvii. quod est ad pondus omnium. Terantur & conficiantur cum succo absinthij, & referua.

Tres alias descriptioes pilularum stomachicarum ponit Mesuæ, quas uide si placet.

Hic nota, quod si zingiber cum turbith poneretur fortificaret operatione eius. Nā turbith sui uirtute, & de se phlegma sub

tile trahit, sed si cum eo zingiber admiscetur fortificando ipsum facit quod attrahit etiam phlegma grossum.

Descriptio. XLVIII.

PILVLAE imperiales magistrales: & sunt illæ quæ sunt in usu, & bonæ ad digestionē, & uirtutem digestiuam confortandam, mundificantes stomachum ab omnibus putridis & prauis humoribus, & dicuntur imperiales, uel quia fuerunt a quodam Imperatore inuentæ, uel quia sunt multum in usu apud reges & principes.

℞. Nucis mulspicæ, croci, ligni aloes, cardamomi. f. maioris & minoris, garyoph. amomi, cinnamomi, zingiberis galangæ zedoariæ, cubebæ, anarum, masticis, anisi, masticis, fœniculi. f. lem. carobalsami, quinq; generū myrobalano. turbit electi, manna, agarici, feniculi. folliculi ana. 3. s. rheubarbari, ad pondus omnium scilicet. 3. xiii. s. aloes ad pondus omnium. f. 3. xxvii. Terantur omnia & aloes de per se: deinde conficiantur cum optimo uino albo, & inunctis manibus cum oleo laurino reformetur, & referuentur.

Senæ cum simpliciter scriptum reperitur in compositis solutiuis uel lenitiuis: de folliculis semper est intelligendum cum magis solutiui & meliores sint.

Descriptio. XLIX.

PILVLAE communes Aui. prima fen. quarti tractatu. iiii. ca. v. & sunt de illis ex quibus fit præseruatio & euasio a pestilentia, & consimilem descriptioem posuit Rasis in iiii. Alman. in cap. de pestilentia & eius cautela.

℞. Aloes electi. 3. ii. myrrhæ, croci an. 3. i. Terantur, & cum uino optimo fiant pilulæ.

Pilulæ oēs præscriptæ & infra scribendæ exhibendæ nõ sunt immediate post ipsarū compositionem: sed saltem standū est per quindecim dies, ut possint simul commisceri. Et tunc agent operationem suam ratione compositionis. Secus autē faciunt si ante dictum tempus exhibeantur: utrum autem in illo tempore fermentetur, & nunquid dici possit uera fermentatio. Satis in quaestiucla mea de narcoticis per longum processum declarauimus: quid uideat ad illam recurrat.

Descriptio L.

PILVLAE de agarico Mes. mundificantes pectus ab humoribus grossis & putridis, & conferentes asthmati, & tussis antiquæ.

℞. Agarici electi masti. an. 3. iiii. radices lili cœlestis. i. iroos, prasij. an. 3. i. turbit. 3. v. spērū hierę picræ. i. simplicis. 3. iiii. cologintidæ, sarcocollæ. a. 3. ii. myrrhæ. 3. i. terant oia, & cōficiant cū uino cōcto. i. cū sapa uel rob uel tilla, q; idē signat.

In istis pilulis soleo apponi facere loco agarici agaricū trochiscatū, eo quia in eis sunt multæ medicinx uenenosæ, & ferè nullæ sunt medicinx earum uentositatem refrangentes: & ideo refractæ esse debent medicinx appondendæ, ut sunt trochisci alandæ, & agaricus trochiscatus, & tu nota.

Descriptio. LI.

PILVLAE bilichiz Mes. in sua de appropriatis cap. de cura tussis sicce, quæ sunt fiendæ sicut lupini, & tenendæ sub lingua, conferentes raucedini uocis, & asperitati, & tussis calidæ & sicce.

℞. Succu liquiritiæ, zuchari albi, ana. 3. ii. amydi, dragacanthi, amygdalarum dulciū exorticatarum ana. 3. iiii. s. terantur oia, & cum mucillagine feminis cydoniorum fiat massa.

Species omnium pilularum grosso modo sunt terendæ, & per raram stannicam transiri debent, & melior est sua operatio. & a longinquo iuribus partibus attrahunt: ratio supra est assignata in electuariis solutiuis.

Ex his finis fit tertiz distinctio, quæ fuit de medicinis solutiuis. Cū in q; minori iactura Io. Frāmi. pilulæ ab apothecariis exhibeant q; cōfectiones. Si tpe debito non exhibentur: ideo modo exhibitionis infirmitatem, ne sua impericia ac temeritate uiri ad aliquas graues ægrotudines incurrant.

Pilulæ q; dantur quantum nunc nostro proposito spectat aut dantur ad euacuandū aliquale materiā in stomacho existētē, & tunc dari debent ante cœnam immediate. Aut ad euacuandum aliquam humiditatem cerebri: & tunc post cœnam per duas horas saltē exhibendæ sunt, & hoc intelligatur de pilulis. nõ scamoneatis, & leuibis, ut masticis, elephanti-

nz, de hiera. f. &c. Aut dantur ad purgandum humorem loco medicine, & tunc dari debent facta digestionē cibi in ſto macho, & poſt ea tardando eſt cibus ſaltem per horas ſex, & hoc modo doctores exhiberi iubent.

Incipit quarta diſtinctio, quæ eſt de trochiſcis, & continet xxxi. deſcriptiones.

Quarum prima eſt.

TROCHISCI Diarhedon Meſ. quorū iuuamentum eſt magnū ad febres antiquas, & febres permiſtionum, & febres phlegmaticas, & febres in quibus corrumpitur forma.

R. Foliorum roſarum rubearum aureos. vii. 3. ix. ſpicæ aureos. ii. i. 3. iiii. liquiritiæ aureos. iiii. i. 3. iiii. ſigni aloes aur. ii. i. 3. iiii. ſpodii. de canna aurearum. i. deſt. 3. i. s. croci aurei. s. i. 3. ii. & gr. v. maltici. 3. ii. conterantur omnia, & conſiciantur cum uino albo optimo in forma pilularum, ſed in medio deprimentur.

Quid ſit trochiſcus nota. Eſt trochiſcus compoſitio quædam ex diuerſis pulueribus & ſpeciēbus mediante aliquo li quore aggregatis, & dicitur trochiſcus a trochos quod eſt rota, quia trochiſcus eſt ſimilis rotæ curruſ.

Deſcriptio. II.

TROCHISCI de roſis minores Meſ. ſolutiui, qui ſtomachum, & hepar confortant, & conſerunt febri heclicæ enacuando & abtergendo humorificat ſtomachum.

R. Foliorum roſarum. 3. x. liquiritiæ. 3. v. ſpicæ. 3. ii. ſcamone præparatæ. 3. iiii. conterantur hæc, & conſiciantur cum uino albo optimo.

Quare autem trochiſci ſiant eſt ut medicinz poſſint melius conſeruari: acquirunt etiam iſta permixtione aliquam uirtutē confortandi quam prius per naturam non habebat.

Deſcriptio. III.

TROCHISCI de roſis maiores Meſ. plurimorum iuuamentorum, quorum maius eſt ad dolorem ſtomachi, & malitiam digeſtionis, & eis propriæ quibus corrumpitur forma & principia hydropiſtis, & ad febres antiquas.

R. Foliorum roſarū. 3. ſigni aloes. 3. ii. malti. 3. s. abſinthij, ſpicæ, cinnamomi, caſtiæ ligneæ, ſtorum ſquincanti an. 3. i. conterantur, & ſiant trochiſci cum uino albo optimo.

De floribus principia nota. Non enim ad nos portantur, ſed ipſorum loco ponuntur rami partem.

Deſcriptio. IIII.

TROCHISCI de eupatorio & roſis Meſ. expertorum iuuamentorum ad febres antiquas & compoſitas, & ad dolorem hepatis, & opilationem, & icteritiam.

R. Foliorum roſarum. 3. i. ſpicæ. 3. iiii. raudeni. i. rheubarbæ tri. i. ſpodii. 3. i. s. liquiritiæ. 3. iij. ſucci eupatorii. 3. x. terebinthin, & accipitur eius loco manna diſſoluta in ſucco præſcripto. 3. ii. & ſiant trochiſci. Conterendo prius omnia.

Liquiritia ſi ſimpliciter ſcripta reperitur, de radice ſiccæ ſemper intelligitur, de qua duæ tantum partes, uſui medicinz conueniunt. Radix & ſuccus.

Deſcriptio. V.

TROCHISCI de rheubarbo Meſ. conferentes ad dolorem hepatis, & opilationem ipſius, & ad apoſtēmatia eius & antiquas ægryndines in ipſo, & hydropiſm, & corruptionem formæ & icteritiam.

R. Raud. boni rheubarbi. 3. x. ſucci eupatorii. 3. s. roſarum. 3. iiii. ſpicæ aniſi. ſeminis rubæ tinctorum, ſem. apij, abſinthij, aſſari, an. 3. i. amygdalarum amararum 3. s. conterantur, & ſiant trochiſci de aureo uno pro ſingulo.

Nota quod iſti trochiſci quia non poſſunt reformari cum ſupraſcriptis humida tibus in ipſis ingredientibus: id addidit de ſucco eupatorii in tantum quæ reformari poſſint, & quæ ad modum dixi de iſtis: ita de cæteris intelligatur ſequentibus.

Deſcriptio. VI.

TROCHISCI de camphora Meſ. ualentes ad febres multæ inflammationis, & ſitum uehementē, & incēſionē cholericæ, ebullitiōē ſanguinis, & ſup calefactionē ſtomachi, & hepatis, & icteritiā, & coſtūē heclicæ & phthiſis.

R. Foliorum roſarum. 3. s. ſpodii de canna. 3. ii. ſandalorum

citrinorum. 3. ii. s. croci. 3. i. ſeminis citrulli, ſeminis cucumeris, ſem. mellonis, ſem. cucurbitæ, dragacanthi, gummi. ſ. arabici, ſpicæ, an. 3. i. ligni aloes, cardamomi. ſ. maioris, & minoris amydi, camphoræ an. 3. ii. zuchari albi, terebinthin, loco eius accipitur manna an. 3. iiii. conterantur, & conſiciantur cum mucillagine pſylli facti in aqua roſata.

Ad faciēdum mucillaginē pſylli accipiēdum eſt. 3. i. ſeminis. & 3. iiii. aquæ, & non ſolū de hoc ſemine intelligas, ſed de omni re de qua mucillaginē facere intendis. Nota inſup quod ſunt quidā ignari apothecarii qui frangūt dictū ſemen ad faciēdū mucillaginē, & male: eo quia interior & medullaris pars eſt calida: ſuperior uero eſt frigidiffima. hoc in loco quærimus inſrigidationē, & hēremus intēſiſſimā calefactionē, & non ſolū cōfrangēdū non eſt: ſed nec diu in aqua debet dimitti pp cauſam ſupra allegatam de contractione.

Deſcriptio. VII.

TROCHISCI de ſpodio Meſ. qui ſunt ultimi ad febres acutas, & inflammationem ſtomachi, & hepatis, & ad ſitum uehementem.

R. Spodi. 3. s. roſarum rubearū. 3. vii. ſem. portulacæ, ſucci liquiritiæ an. 3. ii. quatuor ſeminum communium frigidorū maiorum, gummi arabici, dragacanthi, croci an. 3. i. s. conterantur omnia & fac trochiſcos cum mucillagine pſylli.

Quatuor ſemina cōia frigida maiora ſunt iſta: ſemen melonum, cucumeris, cucurbitæ, & citrulli: quare ſi quatuor ſemina cōia maiora ſcripta reperiant, ſupraſcripta ponantur.

Conſice cum mucillagine pſylli, uel cydoniorum, uel alterius cuiuſvis, & eſt intelligendū quod ſeri debet in aqua comuni: & hoc intelligas in omnibus in quibus non ſpecificatur liquor, in quo ſeri debet &c.

Sunt qui in iſtis trochiſcis non poſnūt niſi quatuor res a ſue co liquiritiæ ſupra. Sed non ſunt tūc uirtutes, quare poſſent da ſunt alia quatuor, & ſiant ut ſupra & erunt eſſicaciſſimi.

Deſcriptio. VIII.

TROCHISCI de ſpodio cū ſemine acetofæ Meſ. cōſerēt ad febres cholericas cū quibus eſt ſolutio uētris, & ſedāt inflammationē ſtomachi, & hepatis, & ſitum continuū.

R. Roſarū rubearum. 3. i. s. ſpodii. 3. x. ſem. acetofæ. 3. vi. ſem. portulacæ, ſeminum coriandrorum præparatorum & torrefactorū, ſumach. an. 3. ii. s. amydi, aſſi, berberorum, balauſtarum ana. 3. ii. gummi ara. aſſi. 3. i. s. conterantur omnia, & conſiciantur cum ſucco agreſte. i. cum ſucco uiz acerbæ.

Modus aſſandi gummi arabicam & oēs gummas: gumma franguntur in fruſta ad magnitudinem ciceris: deinde accipe patellam uel bernacium, ut caleſcat forti calefactione, de inde ab igne remota ponantur ſupra gumma, & ſine intermiſſione miſceantur: & ſuper dictam laminam calidam ſem per miſcendo permittantur donec aſſeſcant, & ſi illa caliditas non ſufficit, caleſcat denuo remotis tamen gummiſ: deinde caleſcatis ſupra gumma ponantur, & miſceantur donec aſſeſcant & albeſcant remoueantur, quia aſſate ſunt, & hoc modo facias de omnibus gummiſ.

Coriandrorum ſemina hoc modo præparantur: bene cū aqua comuni lauentur, ut ab eis pulvis amoueatur: deinde ab aqua extrahantur: & ſupra ea in fundatur acetū fortiſſimū, & in eo dimittantur per dies nouē, & omni die eo uendo, & elapſis nouem diebus ab aceto remoueantur, ſo li ad exiccandum apponantur, & ſic præparati dicuntur. Sed unum nota quod bene exiccari ab aceto permittantur, aliter acquirere malum ſaporem.

Semina coriandrorum hoc modo torrefiūt. Caleſcit bernacium uel patella ad ignem mediocri caliditate: deinde ſupra ſemina ponantur quæ torrefieri debent, & ſic ſupra ponantur, & ducantur hinc & inde donec calorem undiq; ſentiant. ſ. per omnem eum ſubſtantiam: deinde remoueantur & hoc modo omnia ſemina torrefiunt.

Præparantur autem coriandrorū ſemina, ut quædā uenenoſitas quæ in eis eſt amoueatur. Torrefiunt ut magis typica reddantur. Torrefactio enim idem eſt quod ſemicoctio.

Amydum aſſatur ut ſunt gumma, dicendo ſuper laminam bene calidam. Et cum incipit eius naturalis color alterari, remouetur, & aſſum eſt.

Descriptio. IX.

TROCHISCI Id e berberis Mef. primig. sunt i usu boni ab febres infamatiuas, extinguit. n. eas, & sicum angustiosā. *R.* Berberorum, aut succi eius, spodi, succi liquiriti, sem. portulacæ, an. 3. iiii. rofarum. 3. vi. spica, croci, amydi, dragacanthi an. 3. i. sem. citrulli. 3. iiii. s. camphora. 3. s. conterantur omnia & conficiantur cum. 3. ii. mannæ dissolutæ in succo berberorum. Et si succus non reperitur, dissoluantur cum decoctione ipsorum, & reformentur.

Gummi si simpliciter scriptum reperitur, de gumma arabica est semper intelligendum.

Trochisci a pilulis in tribus differuntur. Quantitate operatione, & exhibitione. In quantitate differuntur, eo quia in maiori quantitate formantur. Vnde trochisci semper debent formari ad quantitatē. 3. i. vt dictū est de trochiscis de tyro, pilulæ. n. a remotis trahunt trochisci vero nō atrahunt, tertio differuntur in exhibitione, quia trochisci semper debet exhiberi cū aliquo liquore uel succo habente respectū ad proprietatem trochiscorum, non autem pilulæ.

Descriptio. X.

TROCHISCI de absinthio Mefuz: qui conferunt febribus antiquis, & aperunt oppilationes hepatis, & stomachi & confortant stomachum, & conferunt dolori membrorum nutritionis, & confortant appetitum.

R. Absinthij fidei, rofarū, anisi, an. 3. ii. raed. i. rheubar. succi eupatorii, assari, amygd. amararum, spica, masticis, folij, an. 3. i. conterantur, & fiant trochisci cum succo endiuæ.

Necessitas & causa compositionis trochiscorum est cōseruatio aliquid rei lōgo tpe, & cōmoditas portadi. Alia est, q̄a medicis aliqui uolebant dare aliquas res cum tota substantia & puras, & hoc modo præparari iusserunt. Alii uero dicunt quod trochisci fiant ut medicinz possint melius cōseruari: acquirunt etiam aliquam uirtutem confortatiua per artem quam prius per naturam non potuerunt habere.

Descriptio. XI.

TROCHISCI de alchechengi Mef. mirabiliter conferentes ad ulcera in renibus, & uelica, & dolore q̄ mingit. *R.* Granorum alchechengi. 3. iiii. sem. citrullorum, sem. alba thecæ, sem. cucurbitæ an. 3. iiii. s. boli armeni, gummi arabici, thuris, sanguinis draconis, sem. papaueris albi, amygdalarum amararum, succi liquiriti, dragacanthi, amydi, granorum pini, ana. 3. vi. sem. apij, charabæ, boli. i. terræ sigillatæ, iusquiamij, opij, ana. 3. ii. conterantur omnia, & conficiantur cum aqua mellis, uel iulep uiolato.

Bateæ semen, est semen cuiusdā mellonis indi uiridis ad similitudinem cucumeris bene maturi, qd̄ anguria alio nomine appellatur, sed si semen illud nō reperitur apud nos ipsum loco accipere possumus semina mellonum nostrorū.

Amygdalæ amaræ & quatuor semina ponuntur in hac de descriptione trochiscorū hac ratione bolus. n. armenus & sanguis draconis habet stationē & morā in primis uenis & sua uirtute illas non transcendunt, sed quia in hoc casu indigemus q̄ ad cōsolidandū cū sua stypticitate ad uelicā uadant, & per se non possunt: ideo posuit author amygdalas & semina frigida ut penetrationem faciant, & ad locū ducant.

De bolo nota, quod bolus idem est quod terra sigillata, quæ in multis proprietatibus est similis bolo armeno, & ad hoc habet excellentiorem uirtutem & operationem.

Descriptio. XII.

TROCHISCI de caparibus Mefuz: resoluentes du rritum splenis & uentositatem. *R.* Corticum radicum capparorum, sem. agni casti, an. 3. vi. nigellæ, calamenti, succi eupatorii, acori. i. radici, amygdalarum amararum, nasturtij, foliorum rutæ, aristolochiæ rotundæ an. 3. ii. cyperi, scolopendriæ, ana. 3. i. armoniaci, 3. s. dissoluatur armoniacum cum aceto forti, & cum dicto aceto trochisci reformentur conterendo omnia alia.

Capparorum radix & genestæ flores colligendi sunt in mense Decembris.

Trochisci præparantur usq; ad sex menses, & debent formari in forma rotundā, & de primi in medio, & habent bonā uirtutem, & cum transeunt dictum tempus amittunt uirtutē

& hoc de omnibus trochiscis est intelligendum. Exceptis trochiscis stellæ qui conferantur usq; ad duos annos.

Descriptio. XII.

TROCHISCI de eupatorio Mef. conferentes ad febres antiquas, & rigorem earum, oppilationem hepatis & splenis aperient, & sunt medicina bona apostematum in ipsis & ictericis, & principio hydropisis.

R. Tereniabin si est. si non, loco eius accipitur manna, succi eupatorii, an. 3. i. rofarum. 3. s. spica. 3. iiii. raed. i. rheubarbari, assari, anisi, an. 3. i. s. spodi. 3. iiii. s. conterantur omnia & fiant trochisci cum succis herbarum, & referetur.

Succi herbarum sunt succi ex quibus componitur syrupus de bizantiis. Et sunt quatuor. succi endiuæ, succi apij, succi lupulorum, succi boraginis uel buglossæ: & ex his succis dicti trochisci reformentur, quod si haberi non possent ipsum loco accipere possemus syrupum de byzantiis.

Descriptio. XIII.

TROCHISCI de charabæ Mefuz abscondentes sanguinem de omni emanationis eius.

R. Charabæ. 3. vi. cornu cerui adusti, gummi arabici adusti, corallorum adustorū, dragacanthi, hypocistidos, balauisti, malaccæ, papauæ, nigri assari, an. 3. ii. thu. cor. opij ana. 3. i. s. cōterantur omnia, & fiant trochisci cū mucillagine psyllij.

Modus cōburendi oēs gūmas & cornu cerui & corall os talis est. Terantur & ponantur in olla terrea, & ponant in furno, & dimittantur p̄ totā noctē: si quod posuisti siue coralli uel cornu cerui uel gūma tunc cōbustæ extrahe, aliter iterū in sequenti nocte in furno apponantur, & tū apponant q̄ cōburantur & referua, & habes cōbustionem modum. Et hoc modo cōchilia oia cōburantur, & ossa animalū &c.

Operatio ignis in medicinis est triplex, qdam. n. torrefiunt, & cognoscitur q̄ sunt torrefacti, quia cum calor penetrat totam substantiam medicinz: tunc operatio est perfecta, & per illā remouetur qdam parua humiditas quæ in medicina erat. Secūda operatio est assatio per quam remouetur pars humida & viscosa subtiliatur ut in semine lini, sius assatio cognoscitur, quia q̄ incipit in superficie colorē mutare, & ad contrariū quod ante erat reducitur assata est. Tertia operatio est cōbustio, & hoc fit transmutando uirtutem unā: & fortificando aliā ut in rheubarbo & myrobalanis: q̄ cōburuntur pars subtilis solutius debilitatur, & terreftris styptica augetur. Et ipsius cōbustio cognoscitur quando naturalem & proprium colorem in tota ipsius substantia perdit, & alium acquirit, tunc combusta est. Et hoc notent bene apothecarii.

Medicina sex de causis aduritur. Prima ut eius acuitas amouetur, vt de uitriolo. Secūda ut per adustionē acuitas acquiratur, & sic lapides aduruntur, & in calcē transmutantur. Tertia q̄ ipsa est ualde grossa, propter quod ipsa ad partes remotas non pōt penetrare nisi subtilietur, ut cornu cerui. Quarta ut melius possit conteri ut sericū. Quinta ut malitia medicinz remouetur, & sic scoriones aduruntur. Sexta causa ut humiditas superflua cōsumetur, & sic myrobalani & omnes medicinz quæ dantur contra fluxum ventris aduruntur, ut asferuntur gummositas illa per quā laxabant.

Papauer si simpliciter scriptum reperitur semper de albo intelligatur: & de semine non de alia parte plantæ. Modus uero assationis eius est sic: cætera femina: supra in diadragachan calido, clare modum reperies.

Descriptio. XV.

TROCHISCI de myrrha Rasis in. 9. Almanso. cap. de prouocatione menstruum, optimi & efficaces in prouocatione menstruum.

R. Myrrhæ. 3. iiii. lupinorum optime tritorum. 3. v. foliorū rutæ, mentali, pulegij, cimij, rubæ tinctorum, asæ. i. asæ foetidæ, serapini, opoponacis an. 3. ii. conterantur omnia, & conficiantur trochisci cum aqua in qua bullierint & coctæ fuerint. 3. ii. feminis iuniperi.

Notent apothecarii ut suis erroribus corrigantur. Nā reperitur in rebus alia simplicia scriptū, & idē est qd̄ alia fortida. Et assa duplici, si idē est quod thymus: quare hāc notate differentia. Et ideo in cōpositione multi errant ponē

tes thymum pro assa foetida.

Si reperitur scriptum in receptis simpliciter rubeæ uel rubeæ, semper debes intelligere de rubea tinctorum quæ est quædam radix, cum qua tinctorum in rubrum tingunt.

Descriptio. XVI.

TROCHISCI de terra sigillata Mes. inuentione nostra qui sunt in usu: ultimi inuementi ad spumæ & ad egressum sanguinis, & proprie sumpti cû aqua arnoglossæ, & leniti super frontem sedant fluxum sanguinis, ex naribus & liniati super matricem sedant fluxum mensesuorum, & quoniam inijciuntur in matricem, & in uesciam, & liniuntur partes peccatis, & omne membrum emanationis sanguinis.

R. Sanguinis draconis, gummi arab. ass. ramich. i. cuiusdâ compositionis infra describenda, foliorum rosarum, seminum earum. rosarum, amydi ass. spodi, achacæ, lapidis hæmatitis, eusistidis. i. hypoquistidos, balautiæ, boli armeni, seu luti armeni quod idem est: terræ sigillatæ, schedengi. i. seminis canapis, coralli. rubei, charabæ, an. 3. ii. margaritarum, dragacanthi, papaueris nigri, an. 3. i. s. e. portulacæ assæ, cornu cerui ussi, thuris, gallarû, croci, ana. 3. ii. conterantur oia & fiant trochisci cum aqua arnoglossæ. i. cum aqua plantaginis & hi sunt fuscæ opio. Sed si cum opio facere vis, addas supra scriptis opii thebaici. 3. ii.

Differentia est inter sedenagi & schedengi, sedenagi est lapis hæmatitis, schedengi uero idem est quod semen canapis, contrariæ tamen opinionis fuerunt Gentilis & Christophorus de Honestis exponentes de mente aliquorum qd est fumus terræ schedengi non semen canapis. Ego uero apponit factum semen cum magis hoc in casu conueniat.

Varia est opinio inter homines de semine rose: quidam enim dnt qd semina rose sunt quedam grana quæ reperiuntur inclusa in illa parua grossitie qd sustinet folia rose, & sunt piolosa. Quidam dnt qd non illa, sed illa sunt quæ reperiuntur in medio rose habentia colorem glauci, & ista opinio est falsa. Nâ illa a doctoribus appellatur anthera. Prima ergo opinio est uera, ego qd semen alius dicitur esse: illud quo seminato producit sibi simile, sed hoc facit illud semen pilosum grossitudinis grossi milii non rotundum, sed cõpofum, qd reperit apud illa parua grossitie, ut supra dictum est, & uulgo dicitur grataculo. Et colligendū est de mense Maii vel Aprilis.

In receptis quando simpliciter scriptum reperitur coral i. rubei appendendi sunt, de eis intelligendo, & non de aliis. Si uero scriptum reperitur corallorum, et de rubeis & albis est intelligendum.

Hypoquistidos, id est succus ipsius herbæ in medicinis apponitur ut supra dixi: qui fieri debet in mense Aprilis & Maii, & usui reseruari.

Descriptio. XVII.

TROCHISCI de aniso Mesqui auferunt febres antiquas, & aperit opilationes, & emendat malitias hepatis.

R. Anisi. seminis, eupatorii an. 3. ii. seminis anethi, spicæ, masticis, folii, abinthii, assari, apii. s. seminis, amygdalarum amaranum an. 3. s. aloes. 3. ii. conterantur omnia, & fiant trochisci cum succo abinthii.

Amygdalarum si simpliciter scriptæ reperiuntur & absoluunt, tunc de amaris est intelligendū, & non de aliis nisi expriment. Eo qd dulces cõpõte essui. Amare uero usui medicæ.

Medicinæ quæ sumuntur a superfluitatibus animalium de bent sumi ab animalibus uiuentibus sanis, et tempore ueris, ut cornu cerui &c.

Descriptio. XVIII.

TROCHISCI de agarico extracti ex dictis Mes. cap. de agarico, & sunt incolumes, & hoc modo agaricus cõter preparatur & dicitur agaricus trochiscatus cuius magnificata operatio. De quo Democritus dixit, qd est medicina familiaris, quia ad singulas partes corporis cõmoditat affert. R. Agarici electi & mundi. 3. i. s. salis gemmæ. 3. s. zingiberis mundi. 3. i. 3. ii. conterantur omnia, & cû oxy melle simplici fiat trochisci uel in pasta permittant.

Aliqui sunt qui hæc compositionem faciunt, & relinquunt in pasta, & dicunt quod rube appellari debet agaricus trochiscatus. Si uero reformantur ad formam trochisci, qd tunc ap-

pellandi sunt trochisci de agarico. Sed ipsorum salua pace sub quacunque forma appellari possunt & agaricus trochiscatus, et trochisci de agarico.

Descriptio. XIX.

TROCHISCI alaudal Mes. qui ponuntur in hiera Hermetis, & in aliis confectionibus loco colloquintidæ, & sic generaliter faciunt apothecariis.

R. Colloquintidæ albæ & bonæ mundatæ a granis interioribus. 3. x. incidatur cû incisorio incisione minuta, & fricetur, manibus prius tamen inunctis cum oleo rosato: deinde accipe dragacanthi, gummi arab. bdellii an. 3. s. & gra. xv. aquæ rosatæ. 3. iiii. infundantur præscriptæ gumme in dicta aqua, & dimittantur per dies quatuor, & cum dictis mucilaginis fiat trochisci de dicta colloquintida subiliter incisa, et exiccantur in vmbrâ. Deinde iterum terantur contritione bona, & iterum cõfice cum glutine eoruni, & facias trochiscos, & iterum exicca in umbrâ, & reserua.

Gummæ colligendæ sunt antequam indurentur & minorentur, quia si non colliguntur illo tempore reducuntur in puluerem, & virtus ipsarum deperditur.

Quare autem medicinæ coagulentur est ut virtus calida quæ in eis est extingatur uel in totum remoueat.

Descriptio. XX.

TROCHISCI diacoralii Nicolai, qui ingrediuntur descriptionem triacæ de mente Galeni.

R. Coralli rubei, cinnamomi, myrrhæ, amomi, papaueris albi. an. 3. s. squinanti, croci. an. 3. ii. calami aromatici, xylobal sam, calisæ lignæ, folii, masticis, spoli, fu. i. valerianæ, assari, pedis colubini. an. 3. i. Conterantur omnia, & cum uino optimo formetur trochisci de solido uno pro symbolo.

Hic incidenter est notandum qd habens defectum appetitus nunquam debet uti croco, & hæc est regula generalis, quoniam malum fastidium generat, hoc Ioannes de sancto Amando in fine opusculi sui dicit.

Descriptio. XXI.

TROCHISCI de tyro Nicolai, qui etiam in magnayriacâ Galeni ingrediuntur, & inde fortia est nomen triacæ.

R. Tyros longitudinis unius palmi existentes, oculis habentes rubeos, & linguam mobilem, & cornua in modum grani frumenti. Caput & caudam tribus digitis mensuratis abscedit medium quod remanet excoria. Et intestinis proiectis optime dulci aqua laua, & in dicta aqua pura & munda coqui donec spinæ a carnibus separætur, postea spinis proiectis carnē in marmoreo mortario tere. Et cõmixta eiusdē ponderis farina orobi uel panis frumenti, assu cum iure suo tempera, & fac inde trochiscos, & reserua.

Trochisci isti non debent esse multæ quantitatis, & bene in medio sunt cõprimendi, & in vmbrâ exiccandi. Et in sua bonitate & uirtute per annum seruantur, assu cum iure suo.

Descriptio. XXII.

TROCHISCI de squilla Nicolai qui etiam ingrediuntur compositionem triacæ.

R. Squillam integram, & diuide interiorem, & posteriorem partem abiciendo, medium uero partem inuolue in pasta fermentata, & in furno coqui, coctâ abstrahatur de pasta, teratur in mortario bene, & tantundem farinæ orobi adde, & exinde trochiscos reforma cû uino uel melle puro & mundo & in umbrâ exiccantur. Et si deest orobum tantundem panis assu subtilissimè triti pone.

Mel purum & electum hoc modo cognoscitur & habet sex conditiones prout infra scriptum. Primo debet esse uer nale, quia illud melius est hyemali. Secundo qd sit rubrum. Tercio qd sit graue, unde quod in fundo est melius est. Quarto qd sit dulce, quia quanto dulcius tanto melius. Quinto qd sit densum, quia quanto densius tanto perfectius. Item mel apum melius est quam mel canne.

Cõmemorare in super, qd infra tãgetur, qd squilla cû cutello ferreo non est incidenda, nec interior & exterior pars accipienda, cã aut infra assignabit ut tractatu syropæ & loch.

Descriptio. XXIII.

TROCHISCI Alindracarô. i. Andromachi Aui. 5. cã. & est tertia descriptio, qui ingrediuntur compositionem triacæ.

ex magnæ Andromachi.

R. Affliber. i. arboris cornuæ uel mespillû 3. vi. quinanti 3. i. calami aromatici, myrrhæ, affari, xylobalfami. an. 3. vi. cin namomi, amomi. an. 3. iii. cassiæ lignæ. 3. vi. amaracôn. i. ma ioranæ. 3. xx. spicæ indæ. 3. xvi. polii. 3. vi. myrr. 3. iii. ma. 3. vi. cro. 3. i. s. cōterantur oia p se, & fiat trochisc. cum uino albo.

Species trochiscorum omnium subtilissime conterende sunt, & per spissum setatium transeundæ, & uenas per omnia membra transire possint & per paruas uenas.

Afflibet dicit Gentilis q ignoratur quid sit, sed eius loco dicit poni xylocarates, xylocarates notis i. arbor cornuta q est arbor portans cornales vel mepilos loco summatis al teri accipi pōt, ut ab antiq. doctorib. colligere potuit &c.

Descriptio. XXIII.

TROCHISCI de vipera Aui. 5. can. qui sunt trochisci de tyro qui ingrediuntur tyriaci, Kasis cū & Andromachus melius ostendunt de forma vipæ quæ faciat Auic.

R. Viperas nouiter captas, & absciant a parte capitis eius quatuor digiti, & similiter a parte caudæ ipsius, medium ve ro qd remanet cōseruet, & aperiat, & extrahatur viscera eius, & ppræfel eius. Et bene abluatur cū aqua salita ablu tione exquisitissima, hoc facto decoquantur in aqua bene sa lita, & cū eis addatur anethū, & coquantur leui cōctione, do nec leuis fiat collectio carnis ab osse ipsarū, & carnes earū in mortario lapideo bene pistent, deinde mīscant cū quā titate æquali tortellarū defeni bene contritarū, & fiant tro chisci cū iure earū, & qui eos facere uult ungat digitos suos oleo balsami, et fiant trochisci parui bene cōpressi, qui exi centur in umbra, p annū cōseruantur, et administrantur &c.

Vipera de qua supra scripti trochisci fieri debet debet ha bere hæc cōditiones. Primo debet habere planū & latū, apud propinquitatē colli debet esse minuta & subtilis ualde. Cau da curta strepitū faciens & sonitū in incessu, uel oxy motu, & aspectus eius prolumptuosus & audax & flaua & de flauis foecima. Cuius cognitio est, quia masculi hūc unū dētem in oī latere, & foemina plures, & capi debent in loco sicco, hu mido. n. sunt malæ, & sint velocis mortui, tenentes caput altū ac eleuatū, & ut capiunt, illico inciditur pars capitis & cau dæ fm quantitatē in trochisci dictam, & si ab eis currit san guis plurimus fuerit motus eius in illa dispositioe plurimus & mors ipsius tarda, tunc facias qd electa. Ex vipera igitur supra scripta signa habentia trochisci fieri debent.

Trochisci sunt parui, immo minuti, subtiles, exciccentur in umbra & reponantur. Custodiuntur etiam a radiis solaribus ante et post exciccationem. Sol enim destruit, et priuat eos a uirtute appropriata carnis uiperarum &c.

Descriptio. XXV.

GALLIA mulsata Mef. quæ cerebrum & cor confortat, & ingreditur in descriptionibus medicinarum, & facit cor poris & oris odorem bonum.

R. Xyloaloes crudi. i. ligni aloes crudi. 3. v. ambre. 3. iii. mu. fci boni. 3. i. gūmi dragacanthi liquefacti in aqua rosata. q. f. & fiant trochisci conterendo conterenda, & sigillentur.

Mulsus. n. & ambra terēda nō sunt, nec puluerizanda. sed dissoluenda sunt cum aqua, & eo quia puluerizando euaporat uirtus sua ut de gummis, dixi in recepta diadraganthi.

Descriptio. XXVI.

GALLIA febelia Mef. quæ stomachum & cor cōfortat, & hepar debilitat, et ingreditur in medicinis magnis.

R. Foliorum rosarum recentium et humidarum quæ iam in cipiunt referre nodos. i. quæ quasi sunt completæ, dilatatæ. 3. i. s. terantur contritione ultima in mortario lapideo, dein de accipi ligni aloes boni et electi, garyophyl. gummi arabi. spicæ indæ. an. 3. i. s. sādālorum citrinorum. 3. ii. ramichi. i. cuiusdam compositionis. 3. iii. Terantur omnia hæc subtilissi me, & mīscantur cum supra scriptis rosæ, et simul pistando bene mīscantur humectando omnia cum paucā aquæ rosæ infusionis gummi arabici, et iterum terantur, deinde iterum humectentur et terantur, et hoc facias per totam unam diē, postea aromatizetur cum 3. ii. musci, ambre, & camphoræ. an. aureū mediū. i. 3. ii. et 3. v. et fiant trochisci, et sigillentur.

Gallia omnes species sunt subtilissime terendæ, et per

spissum cribrum transeundæ, ut ipsarum confortatio ad longinqua membra penetrare possit.

Ista compositio est illa quæ intrat in aroma. nardino Mefi et de ista intelligitur quod scripti reperitur gallia febelia etc.

Descriptio. XXVII.

GALLIA alefangina Mef. quæ plurimi loquuntur ce rebum, cor, stomachum, et hepar confortans, et omnia mē bra nutritiosa, et sinitur super neruos debiles, et confortat eos, et ingreditur in medicinis magnis.

R. Myrobalanorum emblicorum abiectis ossibus. 3. iii. con terantur contritione grossa, et ponantur in uase vitroe stri cti orificii, et super eos fundatur aquæ rosæ li. s. in qua prius fuerit infusum per diem et noctem rosarum siccarū, et corti cū citri. an. 3. ii. et stringatur eo uasis, et dimittat p dies tres deinde iterū infundantur. 3. iii. aquæ rosæ præparatæ ut su pra super eos, et iterum per triduum dimittatur, postea et tertio iter. 3. iii. de dicta aqua rosæ præparatæ ut supra super eos ponatur, et per triduum dimittatur obturādō eo uasis ut su pra usquequo uirtus in dicta aqua rosata myrobalanorum relicta sit: deinde colentur, et aquæ referentur, postea acci piatur ligni aloes boni. 3. i. Ramich. i. illius compositionis 3. i. s. rosarū. 3. x. garyophyl 3. x. spicæ indæ. 3. iii. sandali citri ni aromatici. i. odoriferi. 3. s. gūmi arabi. 3. vi. Terantur oia subtilissime, et fundatur paulatim super eos de supra scripta aqua rosata a myrobalanis et tantum conterantur, & dicta aqua tota permisceatur cum dictis pulueribus, ultimo uero aromatizetur cum camphoræ. 3. i. ambre. 3. ii. musci bo ni. 3. i. et fiant inde trochisci, et sigillentur.

Si fm doctrinam tibi supra datam non uelles camphorā dissoluere sed puluerizare, tūc ne tota curam mortario de perdat hoc uel modo facias, primo sic, in dicto mortario pi stabis duas uel tres amygdalas a quibus exit quæda unctio sitas, quæ circūuoluta mortario, non permittit camphoram mortario adherere, pistatis amygdalis abiciatur, et cāpho ra itra ponatur et pistetur, et sic nihil de ea deperditur, hæc an notare uolui propter iuuenes, quoniam ego antiquos quandoq. in hoc errare uidimus, non sine risu etc.

Descriptio. XXVIII.

GALLIA magna iure regalīs, seu zucha alertif. Mef. quæ stomachum, cor, & hepar, & omnia membra nutriticia con fortat, appetitum excitat, & digestionem procurat.

R. Succī albelah lib. i. bulliat ebullitione vna, deinde con tritatur & proliciat super ipsum, gallarum recentium contritarum contritione vltima 3. iii. & simul bulliant donec fiant sicut mel. deinde accipe rosarum. 3. i. cardamomi. i. s. maioris & minoris, linguz auis. i. sem. fraxini, garyophyl. nucis mu sca. masticis, ligni aloes. an. 3. vii. s. darfeni. i. cinnamomi ele cti. 3. iii. sandali mazachari. i. citrini. 3. v. croci. 3. s. gummi ara. 3. i. Terantur contritione subtilissima, & cribellentur, deinde misce cum prædicto succo, postea expandantur omnia hæc mixta super marmor inunctum oleo amygdalarum, & dimittantur donec siccantur, deinde puluerizantur subti lissime, & aromatizentur cum aureo. s. musci dissoluti in a qua ros. & cum dicta aqua fiant trochisci, qui exciccentur in umbra, & sigillentur & referentur.

Inter doctores magna est diuersitas de albelah, quidā. n. dicunt qd est flos palmæ ut Aui. quidam qd est species dacty lorum. Alii qd sunt dactyli immaturi, & hæc opinio uera est. Sed quoniam portantur nostra in patriam ita uirides, qd nucis ab eis extrahi possit, igitur hoc modo faciendum est. Accipias dactylos immaturos quantitate quā uolueris, ut li bras duas bene pistentur vel minutissime incidantur, & post incisionem apponantur ad ignē cum lib. duabus aquæ cōis, & permittantur simul bullire donec aqua remaneat in lib. s. deinde dicti dactyli exprimentur bene in pecia vel stami nea, & succositas ab eis exiens referetur, & utatur in con fectioe. & hoc facias si succum dactylorum habere non po tes, qd si haberi pōt succus magis conueniens esset: quanquā. n. ab ipsa decoctione uirtus ipsorum extrahatur, tū per dictā decoctionem de uirtute eis indubie resoluitur.

Descriptio. XXIX.

CONFECTIO seu trochisci ramich. Mef. quæ est me dicina

dicina composita, & recipitur in aliis medicinis, & confortat stomachum, cor, & hepar, & ualet ad lubricitatem uiscerum, & intestinum, & fedat acuitatem, & silitur fluxum cholericum, & uomitum.

Succi acetose uel cydoniorum, *f. xvi. rosarū, f. i. granorum myrti, f. ii. bulliant simul ebullitione una, postea coquantur, & colaturæ miscantur gallari recentii & humidarum contriturū contritione ultima f. iiii. & iterū coquant, dein de puluerizetur super ea foliorum rosarū, f. i. sandali mazachari, f. i. citrini, f. x. gūmi arab. f. s. fumach, f. spodiæ canna. an. f. viii. succi agrestis, f. viii. succi granatorū myrtillorū tritorū ultima cōtritione an. f. s. ligni alio, garyophyllo. mais nucis muls. an. f. s. miscantur omnia simul in scutellapidea, & illic permittant donec exsiccent. Postea puluerizentur subtilissime, & cū. f. s. campboræ dissoluti in aqua rosata fiant trochisci. ad pondus, f. i. & referua.*

Hic multi hantant propter falsitatem literæ, una enim litera dicit succi granorum, myrtillorū, & illa falsa est. Sed dicere debet ut præscripsi. succi granatorum, myrtillorum tritorum, & sic bene fiat, & in hac patria fieri possunt &c.

Descriptio. XXX.

TORRELLAE de feni scdm Mattheum, Syl. quæ in grediuntur descriptionem trochiscorum de uipera, & in emplastro diaphaniconis, & in aliis descriptionibus.

Barinæ tritici bene purgatæ a tritico seu furfuræ lib. i. im pastetur cum aqua infusionis masticis, ponendo pro omni uincit. aquæ communis, f. i. masticis electi, & de dicta farina fiant placentæ parue quæ in furno decoquantur, & coctæ puluerizentur, & cum prædicta aqua iterum reformentur ad formam trochiscorum & decoquantur, postea referuntur.

Appellat compositio hæc torrella de feni nam torrella. i. panis azimus bœ coctus, de feni de terra Hierusalē: qm̄ ibi Arabes ipsam eas cū aqua masticis, habes igitur ex his modum faciendi & etymologia uocabuli torrellarū de feni.

Descriptio. XXXI.

MODVS sigillandi trochiscos.

Asides duas planas longitudinis & latitudinis æquales quæ sint ex torti ligno & plauo. Et dictas asides concuuias ad formam unius trochisci, & concuatio sit profunda secundum quod intendis q trochisci remaneant grossi, & illa concuatio sit æqualis in dictis duabus asidibus. Et postquam feceris passam tuorum trochiscorum inunge dictam concuatiōem quæ in asidibus elect oleo amygdalorum dulcium deinde impleas pasta, & postea dictas asides æquabis, & ambas fortiter comprimēs, & quod superfluum erit amoueabis, & ita habes trochiscos factos.

Sed sunt qui uolunt aliquod signū uel figuram in trochisci imprimere. Igitur scribas quicquid tibi uidetur in dictis cōcauitatibus, & istud idē in trochisci imprimetur. Et hic ē modus sigillandi omnes trochiscos. Et his præscriptis & intellectis hinc ē quartæ distinctioni quæ ē de trochiscis.

Incipit quinta distinctio quæ est de pulueribus. Et continet 11. descriptiones.

Quarum prima est.

PVLVIS pro epithymate cordis magistralis. Et ego eam fieri facio.

Florū buglossi, florum boraginis, florum melissæ an. M. s. sandalorū omnium rosarum rubearum. an. f. ii. doronigibee albi & rubri, Karabe, osis de corde cerui. an. f. iiii. corticum citri, sem. acetose ligni, aloes, garyophyllorum an. f. i. s. croci. f. s. margaritarum f. s. musci. gra. iiii. campboræ gra. vi. fragmentorum pretiosorum omnium f. i. corallorum uiriusq spodiæ an. f. s. conterantur omnia per se, deinde miscantur & usui referuntur.

Flores omnes in umbra exsicari debent. Nam si in sole exsiccentur pars uirtutis ipsorum perderetur: sol enim resoluit partes subtiles & uaporosas. Apparet & quibusdam extraneum quod in hac compositione frigida & quæ ad infrigidandum facta est crocus apponatur. Sed hoc factum est ut dirigat uirtutem aliarum medicinarum ad cor, & sic illustret Auicēna quarta primi cap. &c.

Descriptio. II.

PVLVIS cordialis magistralis.

Rx. Corallorum uiriusq terra sigillatæ an. f. s. rasuræ eboris, cornu cerui an. f. ii. margaritarum f. i. seminum coriandrorum preparatorum spodiæ rosarū an. f. ii. seminis acetosæ, fragmentorū pretiosorum omnium, osis de corde cerui, ana. f. s. zuchchari albi f. iiii. foliorum auri & argenti numero. xxv. conterantur oia per se subtilissime & referuentur.

In hac compositione zuchcharum apponitur duplici causa primo ut fiat magis gustu delectabilis. secundo ut citius a natura attrahatur.

Præscripta autem quomodo cor confortat uel ratione nutrimenti uel qualitatibus uel occulte proprietatibus in questione mea de remouentibus uenenositatem & maliuam narcoticorum a membris principalibus subtiliter excusis. Quantum uero ad locū istum pertinet. dico q agūt & rōne qualitatis, & rōne proprietatis occultæ, & hoc magis &c.

Descriptio. III.

PVLVIS contra uermes magistralis.

Rx. Cornu cerui vlti. gallæ præparatæ, diptami, semi. caulium, sem. acetosæ, seminum coriandrorum preparatorum sem. portulacæ osis de corde cerui ana. f. s. fragmentorum pretiosorum omnium f. i. rheubarbari electi. f. s. foliorum auri numero. f. s. seminis leuistici. f. iiii. conterantur omnia subtilissime & referuentur.

Gruella hoc modo preparatur. Mundetur ab omni immunditia, & super eam proiciatur tantum acetum quod cooperiatur, & omni die acetum permuetur, & hoc fiat per dies nouem, deinde extrahatur ad acetum, & super asidem dilatur & permittatur in umbra exsicari.

Descriptio. IIII.

PVLVIS pro bocio Montagnanæ efficacissimus. Rx. Auellang spongiz, combustæ, palæ, marinæ. i. balæ marinæ, chartæ combustæ, osis sepis, sem. plantaginis. ana. f. s. trium pipereon. salbi, longi, & nigri, zingiberis, falis gemmæ, pumicis, lapis elect perforatus, nucis muscatæ, gallarum aristolochiz lon. cinnamo. ellebori albi ellebori nigri, ana. f. iiii. limaturæ acis præparatæ, cineris corticis ouorum an. f. s. Conterant subtilissime, & detur oī die. f. i. cū aqua saluiz p duas horas ante cibum, & uidebis optimum effectū.

Spongia hoc modo comburitur. primo bene laueur & purgetur a lapillis interioribus. deinde in furno temperato excicetur, deinde comburatur, & cognoscitur eius combustio quando omnis eius pars puluerizari potest, & hoc modo comburitur charta. Causa quare hæc duo comburuntur est, ut sint magis corrosiua & penetratiua.

Modus incinerandi cortices ouorum positus est supra in electuario de cineribus.

Limatura uero acis preparatur eo modo quo scoria ferri sicut in electuario de scoria ferri ostenditur.

Descriptio. V.

PVLVIS nucis magistralis pro stomacho.

Rx. Cinnamomū subtilis et electi. f. i. zingiberis galangæ, an. f. i. garyophylli, nucis muls. cardamomi. i. maioris & minoris, cubebæ, pipereon lon. ana. f. i. zuch. albi. f. vi. misce & fiat pulvis, pistando prius species, deinde zuchcharum ad faciendum compositionem hanc bonum pro omni. f. i. specie rū apponi debet. f. i. zuchchari si perfecta & bona esse debet.

Descriptio. VI.

PVLVIS sene Montagnanæ in antidotario, educens cū facilitate melancholiam et cholera adusta, mundificans cerebrum, & mēbra sensum, et aperit oppilationes uiscerum. Rx. Folliculorū fenæ. f. i. zin. macis. an. f. iiii. cinnam. tartari, an. f. s. terant oia satis grosse nō, & dosis eius elect. f. i. &c. Folliculi pondēti sunt hac cōpositiōe q meliores totū plāteq magisq solutui. In foliis uero uirtū ē debilis ualde &c.

Descriptio. VII.

PVLVIS sene magis soluens magistralis, habens uirtutem superioris plus tamen solutius propter diagrydium debet tamen exhiberi in minori dosi.

Rx. Folliculorū fenæ. f. i. x. tartari. f. iiii. macis. f. iiii. cinna. f. i. s. falis idi. f. s. diagrydii. f. s. terant oia et fiat pul. dosi. f. s. s.

Luni. apoth.

T

Tartarum quod apponi debet in hac compositione est tartarum uini albi, eo quia magis solutiuum est & penetra-
tium quam tartarum uini nigr i.

Decriptio. VIII.

PVLVIS pro mingentibus in lecto Montagnanz ef-
ficax multum.

℞. Stomachorum gallinarum preparatorū .j.s. agrimonie
j.i. cineris heriti cōbusti, j.iii. conterant oia, & detur pa-
tienti, j. cū pauco uini uel brodi quando uadit dormitum.

Stomachi gallinarum hoc mō preparat. Accipe aquam
capitelli calidā. I. liciui quantitatē conuenientē, & infun-
das romachos gallinarū uel cāponē per horā, postea abluē
duabus uel tribus uicibus, deinde abieciō liciui infunde
in uino nigro sicut dictum est de aqua. Et iterum infunde
in aquas, ut supra: & iterū infunde in uino, ut dictū est abluē
duo, postea ponantur in furno a quo nouiter panis fuerit ex-
tractus, & permittantur exsiccare, & referuentur vsui &c.

Hieritium comburitur eo modo quo lepus comburitur.
Modus cōbustionis postus est in electuario de cineribus.

Decriptio. IX.

PVLVIS restrictiuis magistralis.

℞. Boli armeni lib. i. myrtillorum lib. s. sanguinis draconis
j. iij. thuris, masticis, an. j. i. rosarū rubearū, bualaustiarū an.
j. i. conterant omnia subtilissime, & vsui referuentur.

Os pēs puluerū in hac spuma supra descripta subtilissimē
me sunt cōterendā & p spissum letaciū sunt trāseundā, &c.

Decriptio. X.

PVLVIS pro faculo capitis magistralis. Qui est potius
sine faculo apponi sup caput in loco cōmissura coronalis
in pauca cum quantitate, & alternatis uicibus, & potest
etiam diuersificari scdm diuersitatem dispositionis capitis.

℞. Florum camo. succo d. s. maioranz. an. M. s. macis, ma-
sticis, cubebazarum, nucis mosc. corticū citri. ros. an. j. i. coral-
lorum rub. j. ii. salis uisti. j. iij. i. conterantur hæc, & in pe-
tia sunt, & capiei approximenter.

Quantitas suprascriptarū & infra scriptarū spūū in facu-
lis apponendā est. j. j. pro singulo, v. l. s. ad plus, forma facu-
culi capitis debet eē quadrata ad lēitudinē palmæ manus
facculus uero pro corde debet habere formam cordis &c.

Decriptio. XI.

PVLVIS pro faculo cordis magistralis, qui satis rē-
peratus est, pot tñ fieri & magis calidus & frigidus etiam se-
cundum exigentiam & diuersitatem dispositionis cordis.

℞. Florum bor. buglossi, melissæ, an. M. i. rosarū rub. M. i.
florū camemillæ, anθος. an. M. s. sandalorū oīum bene al. &
rubi. oīs de corde cerui. an. j. i. coralloorum rub. sem. ace-
tosa, corticū citri an. j. s. ligni aloes, garyoph. an. j. ii. mi-
s. e. & oia grosso modo puluerizantur, & ului referuentur.

Dux pscriptæ cōpositiones spūū sunt terendā grosso mō,
& per cribū me dicinarū trāseundā, ut cōmodius possint
in faculis stare, ac ut uirtus ipsarum longiori tēpore duret.

Et sic finis imponit gntē distinctioni q̄ fuit de pulueribus.
De pulueribus fuit opinio quorundam quod uirtus earum
duraret vsq̄ ad sex menses, sed huic opinioni ego nō
adhæreo eo quia in spatio sex mensium uirtutes puluerum
resoluntur, & efficiuntur debiles. Igitur dicas quod per
duos menses conferuantur in boiitate sua & non plus.

Incipit sexta distinctio quæ est de loch. Et continet nouem
descriptiones.

Quarum prima est.

L OCH de pino Mesug. conferens ad tussim anti-
quam ad asthma, & sputi uiscositatem, & constrictio-
nem anhelitus.

℞. Granorum pini mundatorum & recenterium. j. xxx.
amygdalarum dulcium excoctitarum, auellanarum assa-
turum, dragacanthi gummi arabici liquiritiæ. f. radices, succi
liquiritiæ, amyli, capil. ven. radicū lili cœlestis. i. iteos. an.
j. s. carnium dactylorum heyron. i. illius provincie. j. xxxv.
amygdalarū amararū etiā excoctitarū. j. iij. mellis passu-
larū, zuc. tabazeth, butyri recentis, an. j. s. mellis tabazet,
quid sit supra declaratum est l. ii. & j. v. s. & fiat loch, mel co-

quendo & depurando.

Auellanz affiantur quemadmodum semina, igitur facias
ut supra dictū ostendi de seminibus, & hoc modo habes do-
ctrinam affationis earum. Affiantur autem quoniam affatæ
maturant catarrhum, sed cortex interior abicitur, & hoc
modo affando remouetur quedam superflua humiditas.

Dragacanthum, quod ponitur in omni loch preparatur
hoc modo. Accipiatur mellis & aqua, an. quantum sufficit,
& in eis infundatur dragacanthum, & permittatur, deinde
per setacium fricando transeat, & hoc mō utatur & sic
facias de omnibus gummis in loch intrantibus.

Nucleus si simpliciter scribitur, de nucleo pini intelligit q-
dam uero alii de nucle o oliu intelligit. Aui. uero. 2. can. de
nucleo dactyli itellexit. Sed pria opinio uerior et melior ē.

Mel. passulatum fit hoc mō. Exprimantur passulæ donec
ex eis exeat succus, et accipe de dicto succo partē unā, mel-
lis ptes duas, uidelicet succi passularū. j. i. mellis. j. ii. misce,
& bulliant simul vsq̄ ad consumptionem succi, & tunc erit
mel passulātū. Et hoc mō ostendit facere Gal. mel. myrtinū
quod fit ex duabus ptribus mellis & una myrtillorum. succi
In suo antidotario minori in confectione, quæ incipit. Coa-
fectio mellis myrtini Quod si succus earum haberi nō pot,
hoc modo facias, Passulæ. j. ii. aquæ. j. vi. bulliant simul
vsq̄; fere ad consumptionem aquæ, deinde exprime passulas
& adde duplum mellis, & coque & erit mel passulatum.

Varia reperitur litera in hac cōpositione, quæ dā. n. dicit
ut supra annotatum est, & ista litera bona est. Alia uero di-
cit mel cannz. q. f. & idē est q̄ puluis zuchari, eo quia pul-
uis ille exarhat ex cannis, & condenari nō pot, & anti-
quū mel cannz appellabatur. Alia uero dicit zuchari tabazet
& idē significat q̄ zucharam illius regionis quod est
albissimum, purum, & bene coctum, uerum quia non cognō
scitur ipsorum diuersitas accipitur zucharam me deræ.

Decriptio. II.

LOCH de papauere seu diapaupere Mes. Conferens ad
tussim calidam, et pectoris asperitatem, et cuius spūum est
tenue ingens ingrossatione & immaturatione, & confert
ad febrem calidam, et dolorem pectoris, & pleurisi.

℞. Seminibus papaueris al. j. xxx. amygdalarum dulcium ex-
coctitarū, granorū pini, gummi arab. dragacanthi, succi
liquiritiæ, an. j. s. amydi. f. sem. portulacæ, feminis lactu-
cæ, feminis cydoniorum, ana. j. s. croci. j. i. penidiarum alba-
rum. j. iij. syrui de papauere hoc modo facti lib. i. & fiat
loch in bona forma.

Syrupus ille debet hoc mō fieri. ℞. capita papaueris al-
bi & nigri, & an. M. s. sem. lactu. uiolarū an. j. i. bulliat hæc in
libris. iij. aquæ secūdum artem, deinde coletur, & additis
lib. ii. zuchari fiat syrupus, de quo fiat loch præscriptum.

Decriptio. III.

LOCH sanum & expectrum Mes. conferens ad tussim
& raucedinē uocis, quæ est propter frigiditatem, & phleg-
ma grossum quod in pectore continetur & pulmone.

℞. Cinnamon. hyposi sicca, liquiritiæ, an. j. s. iuiubarū, sebes-
ten, ana numero. xxx. passularū enucleatarū, sicū siccarum
dactylorum pinguiū ana. j. ii. senegræ. i. reos. f. radices cala-
mentis. montani, sem. lini. ana. j. s. hæc oia coquantur fm ar-
tem in lib. iij. aquæ vsq̄ ad consumptionem medietatis, de-
inde coletur, & in colatura addantur penidiarū lib. ii. &
coquant vsq̄ ad spissitudinē mellis, deinde prouiciantur su-
per eis pinearum mundatarum. j. v. amygdalarū mundata-
rum, liquiritiæ, dragacanthi, gummi arabici preparati ut su-
pra. amydi, an. j. iii. iteos. j. ii. misce oia simul, prius tñ bene
contusis conterendis, & puluerizatis puluenizandis, et re-
ducantur ad formam loch, bene omnia commiscendo.

Coqui secundum artem est plus et minus res bullire se-
cundum quod fuit natura plus et minus sustinent de deco-
ctione. Quæ uero sint illa quæ sustineat multum de decoctio-
ne, q̄ 12 uero minus in ultima distinctione declarabitur pro
nunc his suis contentis.

Decriptio. IIII.

LOCH ad asthma. Mes. bonum etiam ad constrictionem
anhelitus, et ad tussim antiquā, et subtiliat humo. ē grossum

℞. Squilla

R. Squilla affata. \mathfrak{z} . s. i. reos. f. radices. \mathfrak{z} . ii. hyssopi. prasi. an. \mathfrak{z} . i. myrrhæ. croci. an. \mathfrak{z} . i. mellis cocti & bene despumati. \mathfrak{z} . ii. & fiat loch prius conterendo subtiliter præcipra.

Modus affandis squilla talis est. Accipe cepæ squilla me diocris magnitudinis, & amoue cortices exteriores & interiores obiciendo ambas. Quæ uero in medio sunt inuoluas in pasta hordei, & sit pasta grossa grossitudinis digiti, deinde ponatur in furno, tādū dimittat, q̄ pasta effecta sit rubea, deinde extrahe, & dimitte infrigidari, post infrigidationem aperiat, si bene affata est, contere subtiliter, & utere. Aliter, iterum inuoluas in alia pasta, & in furno ponas, & tantum hoc facias quōd bene affata sit, nam nisi bene assentur, remanet in eis acuitas mala, quare nocent stomacho & uentri ualde, uomitumq̄, & nauseam faciunt.

Mel, nota q̄ bene despumari dēt in quacūq̄ cōpōne ponatur, & maxime in loch, & p̄fectionibus pectoralibus, eo q̄ quā spuma ab eo nō est ablata, facit tussim, & laxat uentrē, quare noceat apothecariis, quia quōq̄ sunt cā magni detrimenti.

Descriptio. V.

LOCH de squilla Mes. qd̄ est medicamē iuamētī magni eius quibus materia grossa & uiscosa & difficilis maturatio nis exuberat in mēbris anhelitis, reddēs cā faciliē ad expellēdū, & p̄fert difficultatē anhelit̄ & dolori pectoris, & laterū. **R.** Succī squillæ, mellis colati & bene despumati an. \mathfrak{z} . vi. mi sce, & simul coq̄ usq̄ ad formam loch, & reseruetur.

Modus extrahendi succū a squilla talis est. Mūdes squilla a superiōribus, & interioribus corticibus, quia uenenosā, sūt & mediā sumatur. Et bene inuoluant in pasta factā cū fari na hordei uel filiginis, v̄t frumētū, nō autē ex luto ut quidā faciunt faciūt. Et notat̄ dictū est i pasta hordei filiginis, uel frumētū, nō autē in luto. Lūtū. n. hēt fortiditē, immo addit in uirtute earū, & subtiliat & mūdificat ipsas, & post inuolutio nē in dicta pasta ponatur in furno tēperate calido, & pmit tant usq̄ ad cocturā pastæ in qua lamine squillæ sunt, deinde extrahant, & abiecta pasta accipiant laminæ squillæ ita calide, & piciant in mortario lapideo prius calefacto, & pistello ligneo bene pistent, nō autē cū pistello ferri, ferrum. n. facit eis rubiginē quæ rubigo uenenosā ē, & post p̄fectā pistationē cōfessum ante infrigidationē ipsarū in subtili petia inuoluantur, & expriment fortiter, & sic succū habebis. Nec infrigidari pmitant, eo quia infrigidatū succus haberi non possit, propter maximā uiscositatem quā faceret &c. Quod si squilla careremus, apponi potest loco eius raphanus.

Descriptio. VI.

LOCH de pulmone uulpis magistralis. Et Mes. cap. de phthisi ponit ipsum de mēte Gal. Aui. & t. \mathfrak{z} . ca. de cura ulcerū pectoris, & est ex medicinis mirabilis iuamētī aggregantibus uirtutē cōfortationis & mūdificationis pulmonis. **R.** Succī liqui. pulmonis uulpis præparati, sem. fœniculi, ca pil. v. an. \mathfrak{z} . i. mellis lib. i. coquantur, & bene despumat, & commisceantur &c. prius bene conterendo.

Pulmoni uulpis hoc mō præparatur & cōseruatur, munde tur per optime ab oibus suis immūditis, deinde illum bene laues cū aqua uitæ, & postea illum aspergas zucchero opti mo bene puluerizato, deinde pmitatur exiccare in stupha uel furno leuiter calido. Et post ipsius exicationē inuoluatur in absinthio, cōseruatur. n. illi a corrosione uermiū. Alio modo cōseruari & præparari pōt hoc mō. Accipe pulmōnes uulpis numero. v. scindantur per uenas & cannas, postea abluantur cum uino albo dulci & calido & odorifero, quatuor uel quinque uicibus per horam pro qualibet uice, postea exiccantur in absinthio, & modus ille melior est.

Descriptio. VII.

LOCH de althea magistralis. Cōferēs mirabit̄ in plenitudine pectoris, & pulmōnis, facilitādō spurā, abstergēdo & rescindēdo materias grossas, & prohibēdo ab apostemate.

R. Radicū altheæ quantū placet, lauent̄ optime, & a ligno interiori mūduntur. Postea inciduntur per transfuersum minutissimē, & coquantur in aqua cōplera decoctione, postea optime pistent, deinde flammigant cū sua decoctione, si per se non possent manibus transire fortiter cōprimant: de hac colatura accipe lib. iiii. mellis bñ despumati li. ii. liqui.

mundæ & bene puluerizatæ. \mathfrak{z} . vi. passularum bene confusurum. \mathfrak{z} . iii. pulmonis uulpis sem. cocti. ana. \mathfrak{z} . iii. Conterantur omnia subtilissime & misceantur, & bulliant usquequo habeant formam loch, & in fine post aliqualem infrigidationem apponatur præcipra species &c.

Species omnes in loch intrantes debent subtilissime cōteri, & per spissum setacium transiri, & non tantum species loch, sed omnes medicinæ pectorales. Loch omnes in sua bonitate per duos annos seruatur propriæ delectabiles, horribiles uero usque ad tres annos seruari possunt.

Descriptio. VIII.

MIXTVRA pectoralis per me composita. **R.** Zucchari uiolati, zucchari buglossati, zucchari boraginati, manu Christi uiolati, an. \mathfrak{z} . iii. diariis zucchari penidiarum, dragacanthi. an. \mathfrak{z} . vi. diacalamentis, loch de althea an. \mathfrak{z} . ii. mi sce, & cum syrupo uiol. fiat mixtura, & reseruetur.

In ista cōpōne est notandū q̄ si debita formā habere debet, necesse est q̄ manu Christi, penidi, diadragacanthi & diari, subtilissime prius per se terantur, deinde cum aliis rebus misceantur, & cum syrupo prædicto humectentur.

Descriptio. IX.

MIXTVRA cordialis per me composita. **R.** Diaboraginati, diabuglossati, zucchari uiol. ana. \mathfrak{z} . iii. zucchari. ro. vnc. ii. amari natæ vnc. vi. zuc. candidi. vnc. ii. conteratur subtilissime zucchari candido, deinde omnia misceantur & cum syrupo de acetositate citri fiat mixtura.

Candi si simpliciter scriptum reperitur, uel candi uiolati uel rosati. Illud est zuccharam rosatum uel uiolatum in duratum quod reperitur in fundo uasis ubi reconditur ualep rosatum, & de eo est intelligendum.

Ista componentia hanc mixturam debent multum bene commisceri in mortario semper & paulatim syrumpum addendo, donec ipsorum debita fuerit facta permixtio. Et sic fit conclusum de sexta distinctione quæ fuit de loch &c.

Incipit septima distinctio quæ est de syrups. Et continet 46. descriptiones. Quorum prima est.

SYRVPVS acetosus simplex Mes. cuius iam magnificata est uirtus, & excellentia in communitate, & posse ipsius in materias calidas, & frigidās, & subiles & grossas & uiscolas siue adherentes.

R. Zucchali. v. aquæ lib. iiii. & cū ea clarificet zuccharam, quo clarificato cū igne lēto semper spumā abiciendo, deinde proiciatur sup illud aceti uini albi lib. ii. in leui & forti partequatuor. \mathfrak{z} . lib. iiii. & in mediocti partes tres. \mathfrak{z} . li. iii. & da ei post illud p̄fectionem decoctionis. Sed usitatus modus est ponere lib. ii. aceti & facere syrupum, & hic in usu est.

Multi dubitant in hac recepta, & apparet eis ambiguum id quod Mes. dicit, & refertur illud forte, & illud debile, & illud leue ad acetum. Et non debet referri ad acetum, sed ad uirtutem syrups. Et sic clara est litera.

Descriptio. II.

SYRVPVS magistralis de duabus radicibus efficax & conueniens in digerendo materias mixtas cholicas & phlegmaticas, usus tamen eius est plus ad materiam phlegmaticam, aperit etiam oppilationem splenis & renum.

R. Radicū petrosilii, radicū fœniculi an. M. i. bene lauent, & a ligno interiori mūduntur, & abradantur, deinde bulliant in lib. viii. aquæ usq̄ ad consumptionē mediæ partis, deinde colatur, & p̄dictæ colaturæ addantur zucch. clarificati li. ii. & bulliant usq̄ ad p̄fectā decoctionē & formam syrups.

In isto syrupo sunt qui ponūt radicē apii loco radicū petrosilii. Sed quia apii hēti se hāc p̄prietatē q̄ epilepsia mouet ideo mihi suspectū est, & loco ipsius poni facio petrosilii.

Descriptio. III.

SYRVPVS rosatus Mes. ex infusione, conueniens ad extinguendā sitim in febribus acutis, & ad remittendū excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepatis furem calefactum, & cor, resists putredini, & conueniens tempore pestilentia, & resists uenenositati. **R.** Aquæ infusionis rosarum lib. iiii. zucchari clarificati lib.

terz diuerificat rem.

Omnes syrpus facti ex succis, semper zuecharum debent recipere clarificatum, & coctum per se, postea uero succi sunt addendi. & ratio est, quia per longam ebullitionem succi uirtus perditur, & hoc intelligas de succis fructuum & uinis aromaticis, quia hi parum sufficient de decoctione. Succu uero radicum quanto decoquantur tanto puriores redduntur. Herbarum uero succi mediocrem sufficient decoctionem, & illa mediciori purificantur.

Pomum simpliciter si scriptum reperitur, de malo est intelligendum, ut Math. Syl. scribit.

Descriptio. XIII.

SYRVPVS de pomis compositus Mef. in sua practica ca. de soda frigid: ab humore melancholico, conferens ad sodam dictam, & quartanæ, & oppilationi splenis, & omni ægri tudini de melancholia, & est expertus.

R. Capil. ve. radicū buglossæ domesticæ, radicū buglossæ sylvestris, foliorum ambarum, polypodii, epythymii, an. ʒ. i. folliculi fenæ, champhythos, camæ. Itocadit an. ʒ. vii. camædryos quinque. ellebo. nigri. an. ʒ. iiii. fumi terræ. ʒ. i. eupatorii. ʒ. s. succi pomorum dulcium ʒ. viii. omnia præscripta præter epythymū, succum pomorum, & capil. ven. bulliant in lib. iiii. aquæ usque ad consumptionem medietatis, deinde bulliant cum eis ebullitione una epythymum, & capilli ueneri postea coletur & cum succo pomorum, & zuechari clarificati lib. ii. fiat syrupus debito modo decoquendo.

Zuecharum quod in syrupis ingreditur semper debet clarificari & purgari, & non solum in syrupis, sed in omnibus compositis in quibus zuecharum intrat. Modus igitur clarificandi talis est. quod per omni lib. zuech. accipienda sunt duo albumina ouorum uel unum ad minus, & lib. i. aquæ & simul aqua & albumina ouorum manibus sunt contentienda. Illa confusione multa spuma resultabit. & quanto magis concutitur tanto maior fiet. In illa igitur spuma & aqua proicias tuum zuecharum, & igne exponatur, & diu bullire permittatur, usque ad consumptionem medietatis. deinde per istaminum pannu bene lotam illa colabis, & sic erit zuech. clarificatum. Sed si quis clarificari syrupos & iulep sine albuminibus ouorum, ita quæ remaneant clarissimi & auri coloris, diu coquant, ponat i uase succi granatogū acetosori i sine decoctionis ʒ. s. i. mirabiliter. n. clarificat.

Idem facit parum uini boni electi quando granatorum non habetur.

Descriptio. XIII.

SYRVPVS de myrtis magistralis, ualens præcipue contra omnem fluxum uentris antiquum, & maxime excoctarium, & contra omnem fluxum sanguinis a renibus, uel a pectore, uel a matrice.

R. Granatorum myrtillorum, carniū cydoniorum, sumachacæ, rosarum, an. ʒ. i. spodiū, hypoquistidos. an. ʒ. ii. masticis. ʒ. s. bulliant hæc omnia in lib. iiii. aquæ secundum artem usque ad consumptionem tertie partis, deinde coletur & colaturæ addant zuechari clarificati lib. i. & fiat syrupus.

Syrpus de myrtis Mef. non fit, eo quia succus myrtillorum haberi non potest apud nos, quod si haberi posset melior & perfectior isto esset.

Descriptio. XV.

MEL uiolatum Nic. Quod ualete tepide febricitibus, corpus humectat & relaxat, & ualeat ad siccitatem pectoris. R. Mellis electi & purificati lib. x. uiolarum. lib. v. bulliant duo hæc simul leui ebullitione, deinde coletur, & coquantur postea ad debitam coctionem & referentur.

Mel de quo fit mel rosatum & uiolatum anteq uiolæ uel rosæ in eo ponant debet bene purgari ponendo in eo aqua & bulliendum cum ea debet continere desumpsi, demum, cum aqua per decoctionem fere electi consumpta, uiolæ uel rosæ sunt intus ponende, & post pusillum colari, debet, deinde in integrum decoqui, & hoc modo mel purificatur.

Descriptio. XVI.

MEL rosatum Nicolai, stomachum confortans & mundi ficans, & est digestium materiem phlegmaticarum in stomacho, & mellea ca contentarum.

R. Mellis purificati lib. x. succi rosarum recentiss. lib. i. ponantur in chababo ad ignem, & cum bullire inceperint, uiridium rosarum cum forficibus uel cum cultello incisarum lib. iiii. addantur, & tandiu bulliant, quousque ad succi deueniant consumptionem, & dum bullierint, semper agitentur cum spatula, & cum coctum fuerit recondatur.

Et si istum modum deberet fieri etiam mel uiolatum sua præscriptum, sed apothecarii hodierni temporis auaritia ducti, nec hoc, nec illud, hoc modo faciunt, sed accipiunt solum mel & rosas ut supra de uiolato dictum est. Quidā sunt qui ad purificandum mel non faciunt ut supra ostensum est. Sed illud clarificant cū ouis quemadmodum dixi de zuecharo. & hic modus non est, inutilis facias modo ut ibi placet.

Descriptio. XVII.

SYRVPVS de acetositate citri Mef. cuius iuuamentum est magnum in extinguendo inflammationes cholere rubæ, & febres inflammationes uehementes, & confert ebrietati, uertigini & siti uehementi.

R. Succu acetositis citri lib. xii. Decoquantur in uase uitreato super prunas usque ad consumptionem tertie partis deinde coletur, et permittat clarescere, postea accipe ex eo claro lib. vii. zuc. albi clarificati lib. v. misceantur simul, & coquantur ad ignem usque ad perfectam coctionem.

Ego aut aliter soleo fieri facere, & pauci sunt apothecarii qui sciāt illud facere: immo fere oēs errant facientes hūc syrupum: quia diu in formā syrupi non pot. stare, sed congelatur tanquam gelu, & hoc aduenit imperitiam facientum. Sic igitur est faciendū. Accipiat acetositis citri, & ipsam in pecia subtili & spissa ponas, leuiterque pecia exprimas non uiolenter exte liquor clarus non mucilaginosus. Accipe igitur de dicto liquore ʒ. iiii. de dicta zuc. al. bene clarifica ti & debito modo cocti quantitate ut supra. & cum eo pone acetositatem, & soli exponas. Sol. n. cōsumet paruo tpe humiditatem & superflua acetosificat, & remanebit clarū & lustr. tanq aqua: hoc. n. mō Cipriani faciūt, & ab eis accipi.

Nota quod Mef. dicit accipe de iulep claro & depurato i. accipe de zuecharo clarificato & iulepizato, non autem de iulep intelligit, ut quidam apothecarii fatue credunt.

Descriptio. XVI.

OXYMEL simplex Mef. cōferēs in materie phlegmaticis grossis, et uiscosis, subtiliādo, incidēdo, et abstergēdo, apiendo & diuidēdo, & digerit materias febriū longi tps. R. Mellis boni lib. i. aquæ fontii lib. iiii. misceant duo hæc, & bulliant lenito & claro igne usque ad consumptionem aquæ, deinde his addat aceri boni lib. i. decoquantur usque ad perfectam decoctionem, et referetur in uitreato uale.

Secanabin. i. syrupus factus ex melle, aceto, & aqua. Squingibain est syrupus factus ex aqua, aceto, & zuech. Hyeleniabain est quod aqua mellis.

Descriptio. XIX.

SYRVPVS uiolatum cōpositus Mef. conferens tussi calide, et pleuresi, digerit enim materiā subtilē, cholericā, & elect alteratius malæ complexionis, calidæ, & sicæ.

R. Violarum. ʒ. ii. sem. cydoniorum, sem. maluz. an. ʒ. i. iuiubarum, sebesten, an. numero. x. Coquantur hæc cum lib. vi. aquæ cucurbitæ secundum artem usque ad consumptionem tertie partis, zuechari clarificati lib. i. et. s. et fiat syrupus debito modo decoquendo.

Aqua cucurbitæ fit incidendo cucurbitas in grossa frusta, deinde ponantur in alembico, & aqua extrahatur.

Descriptio. XX.

SYRVPVS de iuiubis Mef. cōferēs ad raucedinē uocis, et tussim, et pleuresim.

R. Iuiubarum numero. 40. et plures textus habent lib. x. uiolarum, sem. maluarum, an. ʒ. v. capil. uenæ. ʒ. i. sem. cydoniorum, sem. papaueris albi, sem. mellonum, sem. lactucæ, dragacanthi. an. ʒ. iiii. liquiritiæ, hordei mundi extriccati. an. ʒ. i. decoquantur in lib. iiii. aquæ fontium secundum artem, uel aquæ pluuialis usque ad consumptionem medietatis, deinde coletur, et colaturæ addantur zuechari clarificati lib. ii. et fiat syrupus debito modo decoquendo.

In hac cōpositione fere oēs textus sunt corrupti, litera. n.

Lum. apoth.

T 3

multorum dicit iuiubarum lib. x. Quod hæc litera falsa sit, apparet cum dicit, coquantur in lib. iiii. aquæ non n. possibi le est, cum maior sit quantitas iuiubarum quam aqua.

Dicit insuper in aqua fontis coqui debere, eo quia post pluuialem subtilior est, & penetratior aptior aqua fontis, infra de aqua pluuialis male dicentur.

De hordeo, nota q̄ author uult q̄ excorticetur, amoto enim cortice exteriori tollitur uirtus uis absterfus, & remanet uirtus lenitiua cum aliqui siccitate.

Descriptio. XXI.

SYRVPVS de scabiosa magistralis, de qua scabiosa nota uersus.

Vrbanus per se nescit pretium scabiosæ.

Nam purgat pectus, comprimit ægra senectus.

Pulmonem lateris similiter & regionem.

Rumpit apostemat, lenit uirtute probata.

Emplastrata foris necat antracem tribus horis.

Intus potatur, & sic vulnus euacuatur.

R. Hordei mundi a cortice superiori. M. ii. radicis scabiosæ. M. i. corallorū rubeorū. j. ii. aquæ pluuialis lib. x. bulliant oia simul usq; ad crepaturā hordei & cocturā radicis deinde colatur exprimendo, cui colaturæ & expressioni addatur succi scabiosæ lib. i. Et iterū cū prædictis bulliat succus usq; ad ipsius purificationem, deinde coletur, & his addatur zuch. clari. lib. ii. pulvis corallorum rubeorum j. ii. coquantur usq; ad perfectam coctionem & referuentur.

De aqua pluuiali & de corallis in isto syrū. cū refrigerat & syrupus iste dilatat partem pectoris, ratio dicitur in syrū de liquiritia, ubi ponitur aqua ros. quia eadem est rō.

Descriptio. XXII.

IVLEP Mef. conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remediendū excessum caliditatis in eis, confortatiū stomachi relaxati & hepatis super calefacti, & cordis, & resists putredini.

R. Aquæ rosæ lib. iiii. zuchari albi clarificati & cocti lib. ii. & fiat iulep lento igne, debito modo coquendo & leuiter.

Apothecarii nostri temporis non faciunt hoc mō, sed clarificat zucham cum aqua cōi, cum propinquum est coctioni, addunt pro oi lib. i. zuchari aquæ rosæ j. ii. & iste non est modus, & ideo non habetur utilitas a doctoribus posita, & hoc propter auaritiam apothecariorum.

Quoties n. scriptū reperitur iulep absolute, de iulep rotato semper est intelligendū tanq̄ de perfectiori & meliori.

Descriptio. XXIII.

IVLEP violari Mef. conueniens acutis febrientibus, & habentibus hepar calefactū & cor, & confort asperitati canax, & gutturis, & pleurisi, & tussis sicce.

R. Aquæ florum uiolarum lib. iiii. zuchari albi clari & cocti lib. ii. misce, & fiat iulep.

Iulep omnes sunt parum decoquendi, eo quia si multum decoquantur candescunt. Nec propter leuē eius coctionē timetur eorū corruptio, eo quia aqua est aromatica & eos a corruptione conseruat. Et nota q̄ dico q̄ non sunt multum decoquendi: coquendi tamen sunt.

Differt syrupus a iulep dupliciter. primo, quia syrupus longe melius de coquit q̄ iulep, secundo, quia iulep absq; alicui rei commixtione decoquitur, secus autem syrupus.

Descriptio. XXIII.

SYRVPVS violatus ex infusione Mef. pueniēs ut supra.

R. Aquæ infusionis uiolarum li. v. zucham clarificat lib. iiii. misce & coquantur cum facilitate, & referuentur.

Modus infusionis uiolarum hoc modo fit. Accipe uiolarum recentium lib. vi. ponantur in uase uitreato stricti orificii, & postea fundantur super eas aquæ pluuialis bullientis lib. xv. & stringatur orificium uasis, deinde permittatur per horas nouem. His elapsis coletur aliquoties exprimendo, denuo in uase prædicto tantum de floribus uiolarum recentium ponatur, & denuo eadem aqua bene calefacta super eas mittatur, & stringatur orificium uasis, & sic per horas ix. dimittatur, & iterum tertio hoc fiat seruando modū bis per te seruatum, & dimittatur per horas nouem & postquam aqua infrigidata fuerit, coletur a uiolis, & si illam con-

seruare uolueris ponatur in uase uitreato stricti orificii, & distilletur parum olei in orificio eius & stringatur caput eius, deinde solus exponatur per dies. 40. deinde remoueat & conferuetur.

Violæ sunt colligende in Mense Martii, et de eis syrū faciās, & omnia alia necessaria.

Syrupus uiolatus si simpliciter reperitur scriptū de syrū po isto, ex infusione semper intelligendū non de composito.

Descriptio. XXV.

SYRVPVS de granatis Mef. ualens contra febres cholicas & phlegmaticas multæ inflammationis.

R. Vini gr. dulcissimi & acetosorum, an. lib. v. coquantur simul usq; ad consumptionem mediæ, & dimittantur postea per duos dies dum clarescant & resideant, postea remota a residua coletur, & his addantur zuchari clarificati lib. iiii. & coquantur ad formam syrū, & in medio coctionis addantur setæ tintæ in Kermes. i. in grana. j. ii. & permittatur usquequo facta sit perfecta decoctio.

Vinum granatorū fit: Accipiendo grana granati munda a corticibus, inuoluuntur pecia, & sub torculari ponuntur, & exprimentur, & facta expressione, colatura colatur & in ampullis ponitur, & soli exponitur per aliquos dies, deinde a residua seu fecce mundatur, & post modum oleum oliuarum super illud ponitur & referuatur bene, per annos tres conseruatur in bonitate.

Hic notandum q̄ zucharam quod ingreditur in isto syrū debet esse ab aqua de toto purgatū, ita q̄ in eo nulla uel bene pauca sit aqua quando vinum prædictum granatorum cum eo miscetur, eo quia si longa coctione cū aqua coqueatur, uirtus eius deperderetur.

Descriptio. XXVI.

OXYMEL squilliticum Mef. uirtuosum cōtra materia frigidas, difficles, & submersas in locis difficilis eradicationis, & eruptionem acetosam.

R. Mellis depumati & purificati lib. iiii. aceti squillitici lib. ii. coquantur usq; ad perfectam coctionem & referuentur. Ad purificandum mel debet esse dupla quantitas aquæ ad mel, ut mellis lib. iiii. aquæ communis lib. vi. & simul debent bullire usq; ad consumptionem mediæ, semper spumam abiciendo, et hoc modo purificatur.

Modus faciendi acetū squilliticū talis est. Accipe laminas squille quæ in medio sunt abiectio primas & ultimas, quia venosæ & malæ. primæ sunt venosæ, quia est sunt multæ calidæ. Interiores uero sunt abiectio, quia mortifere sunt nimia frigidiæ. Mediæ uero sunt temperatæ. Diuidenda est igitur squilla, & tot tunice sunt ab exteriori parte abiectio, qd. interiori, & mediæ referuandæ. Accipe igit de mediocrib' q̄ritatē quæ uolueris, & sue eas i filo cū stilo ligneo, & sit distatia inter eas & dimitte siccare sic in umbra p dies 40. postea icide eas i frustra mediocria, cū incisorio ligneo.

Et pone ad oēm libram dictarum corticum squillæ acetū albi boni lib. viii. & ambo pone in uase uitreato stricti orificii, & obtureturis eius, & exponatur soli per dies. 40. post illud cola & referua administrando ubi oportet.

Incisio & perforatio squille cum instrumento ligneo est, ne insurgat ex ferro in ea rubigo, quæ excitat sui acuitate, et ob hoc doctores dubitantes, cū instrumento ligneo fieri faciunt &c. Miua hæc sine speciebus durat in sua uirtute per annum, & forte per annos duos.

Descriptio. XXVII.

MIVA cydoniorum sine speciebus Mef. cuius iuuamēta inferius in eadē miua cydonio x. cum speciebus dicetur. R. Succu cydonio x. acetosorum lib. x. vini boni lib. x. coquantur omnia cum facilitate simul usquequo consumpta sit tertia pars, semper auferendo spumam, deinde coletur, & residere permittantur, demum residua amoueatur, deinde addatur mellis depumati & purificati lib. vi. coquantur usq; ad perfectam coctionem & referuentur.

Succus seu uinū cydonio, hoc mō fit. Cydonia cum grata tussa rasantur usq; ad interiore aiam, deinde pecia inuoluunt, & cū torculari expriment, & colatura præparatur uinū granatoꝝ, durat. n. in eius uirtute per annos tres &c.

Nota

Epithymi hortensis, dicitur hortensis. eo quia hortense minus; urosini est quia quo in montibus nascitur, & consequenter minorem habet malitiam. Et hoc scribit Sauonarola in sua practica. capit. de hydrophi ascite, de succo radicis ieros, & ru vide. & Aunc. lib. 2. cap. 6. ubi dicit, quod res syluestres sunt omnibus domesticis fortiores, & de syluestribus montanæ sunt fortiores.

Passulæ in hoc syrupo ponuntur ut vigorem operatione epithymi, & remoueat malitiam ipsius, quæ timetur ex sua nitrositate, & ut confortent operationem myrobalanorum, & remoueat, ab eis malitiam hanc quæ est ut non remaneant in villis stomachi & intestinorum.

Folia colligenda sunt, quando habent quantitatem debitam, & non sunt parata ad casum, & non amiserunt colorem suum proprium.

Descriptio. XXXIII.

SYRVPVS de thymo, conferens ægritudinibus pectoris, & pulmonis frigidi stomachi & hepatis, & confort frigidus quæ sunt in hyme, & frigida complexionem.

R. Extremum thymi 3. ii. calamenti, mēthæ sicce. an. 3. v. auis, feniculi, s. seminum, apii, dauci an. 3. s. passularum nucleatarum. i. ab omni immunditia purgarum. 3. iiii. bulliant hæc omnia fm artem in lib. x. aq. usq; ad consumptionem medietatis, deinde colentur, & colaturæ addantur mellis purificati lib. ii. & fiat syrupus debito modo coquēdo: & aromatizetur cum galliz. 3. ii.

Si in receptis reperitur gallia absolute scripta, de gallia magna est intelligendū tāquam de digniori & perfectiori. Passulæ in hoc syrupo ponuntur ut corrigant & vigorem virtutem thymi, quemadmodum de epithymo supra dictum est.

Descriptio. XXXV.

Syrupus de artemisia magistralis: efficax & multū valens in prouocatione menstruum.

R. Artemisæ, capit. v. s. fauinæ, camædryos, chamæpithyos, origani, ozymi, lampfuchi, calamenti, scolopendri, betonice, scabiosæ, hypericon, cyperi, squinanti, lupuli, polydii, gëtanæ, rubæz tincto. an. m. i. spicæ, asfari, thymi, epithymi, cœmarum uiolurum, an. 3. i. sandalorum ru. seminum cōmunium frigidorum maiorum, an. 3. s. apii, s. fenici, sem. p. troscilli, ameos, carui, iuniperi, mylii folis, rute, an. 3. ii. s. seminis, bulliant omnia hæc in aqua sufficientis, quantitatis secundum artem, & stent prius in ea infusa per horas. x. cinnamom. 3. i. s. serapini, armonia. an. 3. s. dicte gumme ligentur in pecia. Et omnia simul bulliant usq; ad consumptionem medietatis, deinde colentur, & colaturæ addantur mellis purificati lib. vi. & fiat syrupus debito modo coquēdo.

Coqui fm artem hoc modo intelligitur. Eit. n. aliqua medicina quæ multum sustinet de decoctione, ut sunt radices. Aliquæ minus illa, ut sunt, stipites plantarum. Aliquæ iterum minus, & sunt folia. Aliquæ adhuc minus, & sunt fructus. Aliquæ iterum minus, & sunt femina. Aliquæ minus & minus, & sunt flores. Igitur cum tu decoquere vis aliquem syrupum vel aliquam decoctionem primo ponas ad bulliendum radices, secundo stipites plantarum, tertio folia, quarto fructus, quinto sem. sexto flores, & hoc modo coques fm artem. Ista regula non generalis est, sed ab ea excipiuntur quedam herbe & femina, ut inferius declarabitur ubi numerabuntur, & femina, & herbe parum sufficientia de decoctione, sed hanc regulam posui, quia sic ut in pluribus euenit, & fieri debet, inferius clarius dicitur, declarabitur; sigillatim quæ medicinae sufficient, & quæ non &c.

Semina omnia colligenda sunt quando sunt matura, quia tunc aquositas propria ab eis est separata.

Descriptio. XXXVI.

DIAMORON Mef. conueniens ad apata gutturis & uulnæ, & ad omnia genera p. frocationum.

R. Succum mororum dulcium. i. domesticatarum, succi mororum de se. i. mororum ru. i. saluatorum, an. lib. i. s. rob. i. vini. cocti, mellis purificati. an. lib. i. coquantur omnia simul usq; ad mellis spissitudinem, & referetur.

Rob id est quod sapa seu vinum vltimate decoctū. Rob aut proprie est quicumq; succus inspissatus uel caliditate so-

lis uel ignis. unde litera Mef. in distinctione sexta ubi loquitur de speciebus robur quæ dicit rob, est corrupta ex defectu translationis, debet enim dicere robur, igitur quando Mef. dicit rob. i. robur suppletur.

Descriptio. XXXVII.

DIACARIDION seu rob nucum Mef. conferens eis quibus a capite ad pectus catarrhus acutus & subtilis deflatur ad cannam pulmonis, & est causa apatum & p. frocationum & mortis, & est ad hoc medicamentum subtile.

R. Succum interiorum corticum nucum in diebus canicularibus lib. iiii. Decoque ipsum ebullitione vna, deinde adde mellis purificati lib. ii. & coque usque ad spissitudinem mellis, & referua.

Nota q. rob durat per duos annos in sua bonitate & perfectione ut uoluerunt antiqui: moderni uero dicunt per annum solum, sed durat & plus & minus secundum ipsum succorum purificationem.

Nux simpliciter prolata uel scripta, semper de nuce communi intelligatur.

Dies caniculares, sunt dies in quibus apparet quædam stella meridionalis. Canis appellata ab astrologis, in matutinis apparet, & solis ortu antecedit, & hoc est in medio æstatis. Incipit aut canicularis tps. x. die Julii inter circa, & durat usq; ad 20. Augusti: ita q. in summa dicti dies sunt 34. seu 40. Illis igitur diebus nux colligenda sunt q. hac compōne.

Dies, quidam dicuntur naturales, quidam artificiales: naturales dies sunt a prima hora usq; ad 24. artificiales uero ab ortu solis usque ad occasum.

Descriptio. XXXVIII.

MIVA cydoniorum cum speciebus Mef. stomachum & hepatis & oia uiscera confortans, & appetitum excitans, & digestionem procurans, uomitum & uentris solutionem sedans, & est medicina experta & famosa.

R. Succum cydoniorum acetosorum lib. xx. uini boni lib. x. Coquantur oia cum facilitate: donec consumpta sit eius tertia pars, semper auferendo spumam: deinde colentur, & permittantur residere & facta residua, ab ea amoueatur: deinde addant mellis purificati lib. vi. Et iterum bulliant semper auferendo spumam eius. Demum procipientur super ipsa infra scriptæ spēs ligatæ in subtili pecia q. fuerint grosso modo cocta &c; & dimittantur usquequo fuerit facta perfecta decoctio, & reductio, ad formam syrupi, uidelicet cinnamomi. heil. i. car damomi, an. 3. iiii. garyophyl. 3. ii. zingiberis, masticis an. 3. i. s. croci. 3. ii. ligni aloes, macis, an. 3. i. oia præter crocum terantur contritione grossa: crocus uero permittatur ut est deinde inde ligentur in pecia ut supra: & permittatur simul bullire, postea iterum peciū in qua ligata sunt aromata præscripta, in locali q. uis dimittere potes & post perfectam decoctionem aromatizetur cum mulci boni. 3. i. galliæ muf. 3. ii. & referua in uitreato uase bene obturato.

Mixa hæc aromatica durat per annos tres in sua virtute & bonitate.

Species præscriptæ ad bulliendū non sunt ponendæ usq; se re facta sit decoctio, uel sit bene propinquū coctio, eo quia ista parum sustinent de decoctione, & hoc bene nota.

Descriptio. XXXIX.

SYRVPVS de stoeacis Mef. expertus ad omnes ægritudines neruorum frigidæ, sicut est paralysis, epilepsis, spasmus, tremor, & torтура.

R. Florū stoeacis 3. xxx. aff. i. thymi calamenti, origani. an. 3. x. anisi. s. fl. pyrethri. an. 3. vii. zingibe. 3. ii. passularum 3. s. & plures textus habent 3. iiii. bulliant hæc fm artem in aqua sufficientis quantitatis secundum artem usq; ad consumptionem tertiæ partis: postea colatur, & colaturæ addantur mellis purificati lib. v. & fiat syrupus debito modo coquēdo. Et facta quasi perfecta decoctione, uel parum distante a decoctione, ponantur hæc grosso modo confracta in pecia ligata, uidelicet cinnamomi, calami aromatici, spicæ, croci, zingiberis, piperis nigri, piperis longi, an. 3. i. s. & referuntur in uitreato uase in quo si uis peciam potes relinquere in qua sunt aromata.

Bulliat in aqua sufficientis quantitatis. Nota q. ista sufficiēs

quantitas diuificatur multum: nam quando sunt res quæ multum solumine de decoctione tunc pro omni. in. i. ipſarum apponi debent aquæ locales quatuor. Si uero mediocrem, medietatem: si parum, localem unum tantum. Si uero men ſuretur vncius, debes pro omni libra rerum, ponere lib. vi. aquæ si multum ſolumine de decoctione: si mediocrem lib. iiii. si parum lib. i. s. Et ideo caueant uiri in manibus rudium apothecariorum ſe ponentes, & domini medici bene conſiderent, quis apothecarius ſit, qui ſuas ordinationes diſpenſat, quia ſi ſignarus, ne & animæ & honoris ſuo parcat.

Deſcriptio. XL.

SYRVPVS de corticibus citri Meſ. qui confortat ſtomachum, & facit oris odorem bonum.

Et Corticum pomorum citri recentium lib. i. ſeiz tinctæ in Kermes .j. s. in grana, corticum cydoniorum lib. s. Decoquantur in aquæ fontium lib. v. vſque ad conſumptionem duarum partium: deinde addatur zuchari clarificati & cocti lib. i. coquantur vſque ad formam ſyrupi, & in fine aromatizetur cum muſci gra. iiii.

Aduerte hic, quod cortices cydoniorum debent poni in fine quaſi decoctionis, eo quia parum ſolumine de decoctione, & hoc ratione aromatizatiſ ſunt.

Ad clarificandum zucharam apponenda eſt pro omni lib. i. zuchari, aquæ communis lib. i. d. kta quantitate bene clarificatur & purgatur &c.

Deſcriptio. XLII.

SYRVPVS de radicibus compoſitis magiſtra ſis, confereas ad febres antiquas, & diuidit, & abſtergit choleraem groſſam, & phlegma, aperit oppilationes omnes, & proprie ſtomachi, hepatis, & ſplenis, & prouocat urinam.

Radicum apij, ſœniculi, petroſilli, endiuiz ana. ſi. i. de radicibus intelligitur, feminis apij, ſœniculi, aniſi, a. meos, aparagi, an. j. s. de feminibus intelligitur, acetæ boni lib. ii. Omnia præter acetum bulliant in lib. xx. aquæ vſque ad perfectam coctionem: deinde colentur, & colaturæ addantur mellis purificati lib. iiii. & acetæ quantitas præſcripta, & coquantur ad perfectam coctionem, & appellatur ſyrupus iſte de radicibus cum aceto. Si uero faceret ut illum ſine, aceto remoueas acetum, & erit factum.

Triplex ſunt neceſſitates ſyruporum compoſitionis. Prima ſunt conſeruatio uirtutum rerum in toto anno. Secunda exhibitionis rerum in forma potabili, uolendo uirtutem rei præter eius ſubſtantiam. Tertia propter infirmos qui non poſſunt ſumere medicinas niſi in hac forma, & propter has cauſas ſyrupi reperiuntur.

Radices æquæm exiſcent, bene lauandæ ſunt, et ab interiori ligno mundandæ: deinde ad ſolem ſiccari debent, re ſeruandæ quæ a fumo & humiditate ſunt, & ita ſere omnes herbe exiſcantur & conſeruantur. flores uero in umbra.

Radices ſimpliciter prolatæ ſunt. v. nu. i. radix ſœniculi, apij, petroſilli, bruſci, & aparagi.

Semina quatuor frigida communia minora ſunt iſta, ſemen endiuiz, lactuæ, ſcariorum, portulacæ: ideo ſi ſimply ſcriptum reperitur, ſemen communium frigidorum minorum, de iſtis intelligitur. Si uero ſcriptum reperitur quatuor ſemen communium calidorum iſta maiorum ponantur, ſemen aniſi, ſœniculi, carui, a. meos, quia iſta ſunt. Semina uero quatuor communia minora calida ſunt, iſta, ſemen apij, petroſilli, cimini, naſturtii. Ideo ſi ſimpliciter ſcribatur quatuor ſemina cõia minora calida, de iſtis intelligitur.

Syrupus factus cum melle ſimply melius ualeat quàm factus cum zucharo. & quadruplex eſt cauſa. Prima eſt, quia mel ſine uſu coſuiſ melius coſeruat medicinas cõponentes ſyrupum quàm zucharu. Sed & ratio, quia mel magis mndificat materias, regi: quæ horribilitate medicinarum quàm zucharu. Tertia, quia mel eſt dulcius, Quarta, quia melius digerit quam zucharam, et licet ſyrupus factus cum melle melior ſit ad digerendum & mndificandum: tamen ad inſrigidandum & coſortandum melius ualeat ſyrupus factus cum zucharo quam cum melle. Vnde ſi inuendimus digerere, abſtergere, calefacere, & mndificare fortiter: debemus facere ſyrupum cum melle ſi inſrigidare, confortare, leuiterque aperire cum

zucharo bono: ſi utrūque fiat, cum utroque. Ideo notent ignari & trouantuli apothecarii qui ſuos ſyrupos propter auaritiā cum faciunt. Maior. n. intentio ſyrupi eſt confortare, inſtigidare, & leuiter digerere quam aliud facere: quare &c.

Deſcriptio. XLII.

SYRVPVS de hyſſopo Meſ. conferens aſthmati, & tuſi, ſi, dolori pectoris, et laterum.

Hyſſopi ſiccæ, radicum apij, radicum ſœniculi, radicū petroſilli, liquiritiæ, an. j. x. hordei mundi, j. s. ſemi. maluz dragacati, ſemi. cydoniorum an. j. iiii. capil. uene. j. vi. iuii bæ, ſebeste an. nu. xxx. paſſularum. j. i. s. ficum ſiccum, daſtylorum pinguum ana. nune. x. coquantur omnia ſecundum artem in aqua ſufficientis quantitatibus, in aqua pluuiali vſque ad conſumptionem duarum partium: deinde colentur, & colaturæ addantur albarum penidiarum lib. ii. & fiat ſyrupus debito modo coctus.

Radices colligendæ ſunt cum folia ceciderint quia tunc et natura & uirtus foliorum reuertitur ad radicem: et tunc fortior eſt uirtus radicis. Radix ſi ſimpliciter ſcripta reperitur, in compoſitis de raſano domeſtico eſt intelligendum. Sic enim & Romani & Graeci hodie accipiunt.

Syrupi oēs iſti. ſ. violatus, de hyſſopo, de ſcabioſa, de liquiritia, de praſio, de iuiubis, & omnes decoctiones pectorales cum aqua pluuiali faciendi ſunt: non cum aqua communis, & ratio eſt, quia aqua pluuialis eſt magis ſubtilis: & ratione ſubtilitatis magis penetratiua, facitque uirtutes alia rum medicinarum ad partes pectoris penetrare: quæ cum alia aqua non penetrarent. Et ad dominum Auic. dicentem quæ aqua pluuialis ratione ſubtilitatis ſua ſubſtantia citius putrefcit: quod uerum dicit, et hoc propter impreſſionem aeris ab extra ſed ab intra ſecus eſt: quare bene nota.

Albarum dicit author penidiarum, eo quia penidii ſieri debent ex zucharo albo, non cum puluere rubeo, ut quidam faciunt apothecarii noſtri temporis.

Deſcriptio. XLIII.

SYRVPVS de liquiritia Meſuz, conferens tuſi antiq & mndificat pectus, & pulmonem a materia phlegmatica, quæ tñ non ſit multæ quantitatibus, tenacitatis, et uſcoſitatis.

Liquiritiæ raſæ et mundi. j. ii. capil. ven. j. ii. hyſſopi ſiccæ. j. i. proſice ſuper his aquæ pluuialis lib. iiii. et dimitte per diem et noctem: deinde coquantur ſecundum artem vſque ad conſumptionem medietatis, deinde colentur, & colaturæ addantur, mellis purificati, zuchari clarificati, penidiarum ana. j. viii. aquæ roſ. j. vi. bulliant et coquantur uſque ad formam ſyrupi, & reſeruetur.

Hic notandū quod abſurdum eſt quod in iſto ſyrupo author ponat aquam roſatā cū ipla reſtringat, & hic ſyrupus debet dilatare partes pectoris, et hoc non ſolū ſi contra rōnem, ſed et etiam contra facientes hunc ſyrupum, eo quia nulli ſunt qui aquam roſatam in eo ponant. Ad hoc dicendū quod reſte ponitur, & qui non ponunt, multum errant. et ratio eſt: nā ad hoc quod ſyrupus iſte ualeat tuſi antiquæ, et pulmonem & pectus mndificare, non ſolum oportet quod in eo ſint dilata tia partes pectoris, lenientia et maturatiua catarrhi, ut per liquiritiam, capillos ueneris, & hyſſopum ſit. Sed etiam neceſſe eſt, quod in eo ſint ea quæ partes relaxatas adunent, et uirtutem expulſiuam confortent atque reſocillent et fortificent, et hoc ſit per aquā roſatam: iſti rationabiliter poſit.

Tribus modis uel altero trium modorū cognoscitur quæ ſyrupus eſt coctus. Primo quæ accipitur cum ſpaula diſtillat continue ſicut oleum. Secundo quando adhæret ſpatulæ. Tercio ſi ponatur ſuper unguem una gutta, ſi remanet et non diſcurrit huc uel illuc, eſt uera cognitio coctionis.

Deſcriptio. XLIII.

SYRVPVS de eupatorio Meſ. conferens febris anti quis, et proprie eis quibus corruptum forma ſtomachi & hepatis, oppilationes aperit, et confert frigiditatem, et molliſicationem, et uentofitatem in eis, & inceptiōem hydropiſis.

Radicū apij, radicum ſœniculi, radicū endiuiz, liquiritiæ, quinarij, culcitrae, abſinthij, roſarū, an. j. ii. capillorū ueneris, bedeguar. i. radicis cardonis bñdicti maſculi, ſucaha. i. radicis cardonis bñdicti foemine, florū bugloſſæ, aniſi. f.

femi.foeniculi.ſſemi.cupatorii.an.3.v.raued.i.rheubarbari,malti.ana.3.iii.spicæ,affari folii ana.3.ii.coquatur in lib. viii.aquæ fm artem vñq; ad conſumptionem tertæ partis: deinde colentur,et colaturæ addantur zuchari clarificati li.iiij.fucci,apii fucci endiuiz depurati li.lib.iii.&3.ii.

Et.iii.& gra.xii.& fiat ſyrupus debito modo coquendo.

De bedeguar et ſucaha eſt magna diuerſitas inter doctores Aui.Matth.Sylua.Dioſ. Simon Ianuen.Plinius & Gentilis exponunt quòd eſt ſpina alba. Gentilis etiam expones recepta Soritz quæ ſ.canoeſcitur,dicit iterũ q̃ eſt marineris ſpinæ,pro qua cõiter ſumitur alba ſpina. Et infra eo lib.pro expoſitione pilularum dicit,& bedeguar eſt modus ſpinæ,& creditur quòd fit ſpina alba,hoc eſt quòd a doctõribus elicere potuitiqui conſule loquuntur,qui dato quòd fit ſpina alba,non ponunt quam partem ipſius plantæ apponere debeamus.Communitè apothecarii ponunt quandam rem habentem ſimilitudinem ſpongiæ,quæ reperitur adhære per plantæ roſæ ſylueſtris,et dicunt eſſe bedeguar, &c.

Succaha de ſucaha dicit Simon Ianuen. q̃ eſt nomẽ arabicum,& idem importat q̃ ſpina arabica,& hoc idem dicit Gal.Kaſis,Halyab.Matt.Syl. Paulus uero uolens offendere qd fit,dicit,Sucaha eſt herba dulcis quæ extendit ſuper terram & facit capita groſſa:et flores ſanguinei coloris,ſed hæc apud nos reperit. Alii uero dicũt q̃ ſucaha eſt bedeguar, & bedeguar eſt ſucaha, & ſic exponunt ignori per ignotum.

Alii uero poſtponentes tantorum uirorũ ambiguitates, ſolent hoc in ſyrupo apponi facere Juncos marinos, & radiciſ cardonis benediçti, & dicunt,quòd duo hæc uidentur de mente authoris, cum illa ſint aperitiua uinũ, confortatiua hepatis,quæ omnia quæuntur a ſyrupo de cupatorio, & quòd reperiunt experimento bene eis ſuccedere &c.

Sed & hi & illi a ueritate ſunt multũ diſtantes. Igit ſcias q̃ bedeguar eſt radix cardonis bñdiçti,q̃ maſculus dicitur, nullũ florẽ faciens nec tiſſum, ſed folia extẽdunt ſup terram & folia ſtrictiora ſunt, & breuiora ſucaha.magisq; incila.

Sucaha uero eſt radix cardonis bñdiçti florẽ facientis cũ groſſo capite cũ paruo tiſſo:immò a radice non extenditur per longitudinem ſpinnæ ſed eleuatur, et in futura & propinqua pluuia conſtringitur,& in ſereno dialatatur: diſſert a ſuperiori cardone per folia, tiſſum & florẽ. Apud nos non reperiuntur uel raro duo hi cardones, ſed portantur a montibus Belinzon in conſubis Theutoniorum et Ducis Mediolani in montibus & ſaxis oriuntur, & hæc eſt hæc expoſitio et declaratio bedeguar, & ſucaha &c. & dux hæc radices in hoc ſyrupo ponuntur, et non aliud &c.

Pauci inſuper ſunt qui hunc ſyrupum ſciant facere. Meſue.n.dicit,ſiat ſyrupus cum ſucci apiũ & endiuiz quantitate ſufficiant, nulli ſunt qui hæc ſufficientem quantitatẽ eligere ſciant. Igitur uota,per hanc ſufficientem quantitatẽ intelligit proportionatã quantitatẽ zuchari ad ſuccos:quemadmodum proportionauit & poſuit in ſyrupo de bizantiis.ſ. ſucci lib.iiij.zuchari lib.ii.s.quod eſt pro omni lib.zuchari,ſucci depurati.3.xix.cum.3.i.3.i.gran.xvi.nec plus nec minus. Illo igitur modo proportionando, reſultat ſucci quantitas præſcripta ſupra,nec plus nec minus:& hæc fuit & eſt opinio doctõris:quæ bene nota,quia pauci ſunt facientes hunc ſyrupum ſecundum rationem.

Flores colligendi ſunt quando perſecte ſunt maturi, & antequam cadant, & antequam dimittant colorem ſuum &c.& ſic ſumma ſyruporum in his concludit &c.

Deſcriptio. XLV.

DECOCTIO pectoralis magiſtralis, leniens pectus & conſerens ad tuſſim,& raucedinem uocis.

Hyſſopi ſiccæ,capil. uenæ, ſcum, dactylorum, ſeben, paſſularum,hordei,liquiritiæ ana partes æquales, bulliant hæc in aqua ſufficientis quantitatẽ ſecundum artem: deinde colentur & reſeruentur.

In hac decoctione ſunt qui his addunt, ireos, ſed ego quanquam pectoralis ſit,non laudo illam apponendam eſſe propter eius horribilitatem & malum ſaporem.

Deſcriptio. XLVI.

DECOCTIO cois,quæ in acutis febribus et aliis paſ

ſionibus calidis,& tempore calido eſt multum in uſu ad diſtemperandum medicinas quæ in his temporibus & paſſionibus affumuntur:uariantur autem iſtæ decoctiones a mediis peritis ſecundum diuerſitatem ægri tudinum magis & minus calidarum, & in exigentia diſpoſitionum.

R.Prunorũ tamarindorũ,paſſularum,uolularum,liquiritiæ,hordei ana partes æquales, bulliant hæc in aqua ſufficientis quantitatẽ ſecundum artem, & colentur, & reſerua.

Decoctiones iſtæ & omnes alie per tres uel quatuor dies conſeruantur & non plus: & maxime in æſtate, & inter oēs hoc incidenter dicam de inſuſione facta in aqua lactis ſeu caſei, quia minus conſeruat quia niſi per unum uel per duos dies conſeruari poteſt.

Syrupi uero conſeruantur ſi ſunt de melle per duos annos.Si uero de zucharo & bene cocti & in uafe bene obturato per annum durant.

De conſeruatione iulep. Scias quòd iulep aquoſum & male decoctum pauco tẽpore conſeruat, & maxime tẽpore æſtatis.Iulep. uero bene coctũ per annum ſeruat, & non plus ſub forma iulep. Et hic concluditur ac completur ſumma ſeptima quæ fuit de ſyrupis, & decoctionibus, & iulep.

Incipit octaua diſtinctio,quæ eſt de unguentis,& continet xxiii.deſcriptiones.

Quarum prima eſt.

VNGVENTVM ſtomachicum inuentione magiſtri patris, mei, confortans ſtomachum, & ualens in paſſionibus frigidis eius, et doloribus factis a uicoliſtate,et ad debilitatem uirtutis digeſtiuæ,appetitum excitans,& digeſtionem procurans.

R.Olei nardini.ſpicæ, olei malti,olei camæmillæ, olei mentæ,olei de abſinthio an.3.ii.olei cydonio.3.iiij.olei roſæ.3.ii.s.macis,malti,garyophyllorum, nucis muſcatæ, cardamomi.ſ.maioris & minoris,galangæ,ſigni aloes an.3.ii.corallorum rub.ſeminum coriandrorum præparatorũ,roſarũ ru.an.3.ii.s. ſummitatum abſinthii,mentæ,florum camæmillæ, ſummitatum ſquintanæ ana.3.i.s. contereantur omnia ſubtiliſſime, & cum pauco ceræ fiat unguentum medium, tenens inter duritiem et molliſſimam. Addendo panis bruſti lati prius in aceto inſuſi et bene expreſſi.3.s.

In omni unguento ſpecies debent ſubtiliſſime conterĩ, Niſi.n. bene puluerizentur non poſſet uirtus earum per poros penetrare,nec a calore præparari.

Necelſitas unguentorum et emplatratorũ oleorũ fuit, ut rei alieuus uirtus applicaret in ſuba adherenti et non ſtatim ſolubili.ſed o,quia medicinz ſimplices non faciebant effectũ,tertio propter debilitatem medicinarum ſimpliciũ.

Deſcriptio. II.

VNGVENTVM ſandalinum Meſue, & cerotum ab eo dicitur ultimum,ad ſedandum inſtammationes & apata calida, & ſup calefactiones, quæ ſunt in ſtomacho et hepate.

R. Roſarũ an.3.i.s. ſandalorum rubeorum,3.x. ſandalorum rub.ſandalorum alborum, ſandalorum citrinorum an.3.vi.boli armeni.3.viiij.podi3.s.caphoræ.3.ii. ceræ albæ.3. xxx.olei roſæ lib.i. Liqueſcant ſimul oleum et cera: deinde lauentur cum aqua frigidifſima pluribus uicibus:deinde præſcriptæ ſpecies ponantur.

Si vis facere unguetũ in forma ſatis dura, debet ponere pro omni 3.i.olei ſpecierum.3.iii. ceræ.3.ii.s. Si uero molle,pro omni 3.i.olei.3.ii. ceræ et 3.ii.ſpecierum,et iſta eſt,doliſ ſpecierum olei et ceræ ad faciendum unguenta.

Deſcriptio. III.

VNGVENTVM Galeni Meſue: et ab eo appellatur cerotum ultimum inſrigatione, ualens ad febres acutas & ſodam calidam puſſantem.

R. Ceræ albæ, lib.i.olei roſæ lib.iii. et ſit factum ex oleo omphacino. i. ex oliuiſ imaturis. Liqueſcat oĩa ſimul: deinde lauentur cum aqua frigidifſima lauatiõibus pluribus uſque quo bene abſceat. Et q̃to magis lauaf ratio fit pfectior. In fine uero congaſſetur ſeu lauetur cum pauco aceti boni.

Iſtud unguentũ ego lauari ſoleo facere cũ aqua roſacea loco aquæ communis, & eſt magis confortatiuum renũ

Vnguentū ab emplastro differt: eo quia vnguentū est magisterū suū liquidū seu liquabile, sed emplastrum est solidū, licet vtrūque cum oleo & cera componatur &c.

Descriptio. I. III.

VNGVENTVM populcon Nic. taliter dictum quia fide oculis populi, & ualet contra calorem febris acutæ, & his qui dormire nequeunt inuicibus temporibus, & pulsibus, & plantis manuum, & pedum.

R. Oculorum populi lib. i. s. papaueris rubei, foliorū mādræ goræ, cinaurum rubei tenerimorum foliorum iusquiami, foliū, vermicularis, lactuca, semperuius, bardenæ, uolarum umblicæ ueneris an. vnc. iii. axungie nouellæ porcine sine sale li. ii. oculi populi p. le bene pillentur: & iterū postea cum axungia repillantur, & magdaleones formetur, & per duos dies sic dimittantur. Tertia uero die herbæ per se bene terantur: deinde his addas magdaleones, & simul ante terantur: & postea iterū omnia in magdaleonibus reducantur, & per mittantur per dies nouem, & elapso termino dicti magdaleones in caldario uel captia cum li. optimi uini reponantur, & simul ad ignem bulliant, usque ad uini consumptionem, semper cum spatula agitando. Et postea colentur per sacculum & colatum permittit refrigerari, & ultimo in uase recondere.

Oculi populi in mense Aprilis sunt colligendi, & cū axungia miscendi, & conservandi sunt usque in mensem Maii, cū axungia eos miscendo usquequo alie herbæ colliguntur.

De foliis mandragoræ nota, quia apud nos non reperitur, sed ipsum loco apponimus uel cortices mandragoræ, uel papauer nigrum, uel iusquiamum.

Descriptio. V.

VNGVENTVM citrinum seu mundificatiuum magistrale, quod in usu est.

R. Terbinthina bene lota in aqua hordei li. s. uitellos ouorum nu. vi. mellis rosati. vnc. iii. farinæ hordei quantum sufficit, & fiat unguentum in bona forma sine igne.

Terbinthina lauatur in aqua hordei, primum ut infrigidetur: deinde ut magis absterfus reddatur & minus uiscosus. Multis aliis modis diuersificatur hoc unguentum a chirurgicis, sed iste præualet aliis.

Descriptio. VI.

VNGVENTVM ægyptiacum Mesuræ, conferens ad uulnera antiqua, & fistulas quæ indigent mundificatione, abstergit enim eas, & mundificat a carne mortua.

R. Floris æris. 3. v. mellis. 3. iiii. acetii fortissimi. 3. vi. Coque super ignem donec inspissetur: deinde ab eo ablato, ad oleibani bene puluerizati. 3. ii. s. terendo supra terenda.

Hoc unguentum duobus modis fit: qui enim uoluit illud multum corrosiuum, faciunt ipsum sine olibano. Qui uero modico, olibanum ponunt.

Descriptio. VII.

VNGVENTVM apostolorum Aus. 5. can. tract. 1. 1. qd̄ in usu est, rectificans cum facilitate fistulas difficiles & scrophulas paruas, nec est aliquid simile ei, & mundificat uulnera ex carne mortua & plus ea consolidat, & dicitur quod est medicina. xii. apostolorum.

R. Terbinthina, ceræ albe, resinæ pini, an. 3. iiii. armo. 3. xiii. opop. 3. ii. floris æris. 3. ii. aristolo. lon. thuris an. 3. vi. myrrhæ, galbæ an. 3. s. bdellii. 3. vi. lithargy. 3. ix. infundantur bellium & aliz gumme in aceto forti & dissoluantur: cætera uero conterantur, & fiat unguentum addendo olei lib. ii. in æstate, & in hyeme lib. iii.

Oleum, si simpliciter scriptum reperitur, de oleo oliuarum semper est intelligendum: quod oleum est materia omnium oleorum, ut in tract. de oleis manifeste apparebit.

Descriptio. VIII.

VNGVENTVM basiliconis magni Mesuræ, q̄ conferens uulneribus, in quibus est calefactio, & proprie in uulneribus neurosis: mundificat enim & incarnat ea.

R. Ceræ albe, resinæ pini, s. p. uaccini, olibani, myrrhæ, picis græcæ, colophoniz, an. 3. i. s. picis. 3. iiii. olei cois lib. ii. conterantur contreda, & fiat unguentum in bona forma.

Pix si simpliciter scripta reperitur, semper de nauali intelligitur. Si uero pix græca, de colophonia semper intelligit.

Descriptio. IX.

VNGVENTVM de cerussa crudum magistrale conferens ad additionem ignis & excoarationem.

R. Cerussa lib. i. s. olei ros. lib. ii. & vnc. iii. lithargyri. 3. i. s. conterantur omnia subtilissime, & fiat unguentum in mortario bene omnia miscendo.

Et hic est communis modus. Ego uero soleo lauari facere cerussam & lithargyrium cum aqua rosæ, ea enim lotionem remouetur ab eis acuitas & mordicatio.

Descriptio. X.

VNGVENTVM de cerussa coctum magistrale, conueniens quibuscumque malis complexionibus calidis, factis caliditate solis, uel quomodolibet, & fricationi seu excoarationi, cum calefactione mala.

R. Cerussa lib. i. s. lithargy. vnc. i. s. olei ros. lib. ii. & vnc. iii. ceræ albe vnc. iii. conterantur olei subtilissime, & fiat unguentū decoquendo illud lento igne usque ad perfectā coctionem semper cū spatula agitando, & in magdaleonibus reducat.

Parum acetii potest apponi ut magis alteret, & sine aceto ut supra fieri potest, & tunc conuenit in omnibus membris, non autem cum aceto, quia in locis neruosis noceret, & in uulneribus profundis.

Descriptio. XI.

VNGVENTVM de dragancanthi magistrale.

R. Gummi dragancanthi mundæ vnc. iii. aquæ florum uolarum lib. ii. infundatur in ea gumma per horas. xii. postea ita mignetur, & addatur olei uiolati, olei amygdalarum dulcium, ceræ albe an. lib. i. liquefiant oleum & cera: deinde apponatur gumma ipsius infrigidatis, & miscantur.

Vnguentum hoc nisi ingenio fiat, nunquam bonā formā habere potest, sed ita in magdaleonibus grossitudinis fabæ. Igitur hoc modo facias, post liquefactionem ceræ & olei, & ipsum infrigidatum. Adas gummam stamignatam paulatine illam stangelizando, ac si uelles stangelizare manulchristi, & non cesses addere gummam & stangelizare, donec habeat bonam formam, & quanto magis elaborabis in ducendo, tanto meliorem formam accipiet.

Descriptio. XII.

VNGVENTVM pectorale magistrale, lenitiuum, & humefaciuum pectoris, & pulmonis, conferens tussis siccæ, & siccat gutturis & pectoris cum ipso partes extirpatae pectoris ubi cordis situantur inunguntur.

R. Olei amygdalarum dulcium vnc. iiii. olei camæmilæ, olei uolarum an. 3. iiii. butyri recentis. vnc. vi. adipis gallinæ vnc. ii. adipis anatis. 3. ii. iros subtiliter puluerizati. 3. i. croci. 3. s. ceræ albe. vnc. iii. misce, & fiat unguentū, omnia simul liquefaciendo, in fine uero iros & crocus ponantur: deinde lauetur. iii. vel. iiii. lotionibus cum aqua hordei tepida.

Butyrum, melius uaccinum, & cum medicinis ponitur. i. ad opus medicinz datur, debet esse sine sale, & conservatur usque ad sex menses, uel usque ad annum ad plus.

Adeps gallinæ debet esse recens & non antiquatus, amittit. n. complexionē & uirtutem, & efficitur rancidus, & amittit temperamentum, & liquefactum melius conseruatur.

Adeps anatis & anseris quanto antiquiores tanto meliores sunt, & cum in medicinis administrantur, nullo modo sale condendi sunt.

Pinguedines omnes si aspergantur zucchero subtiliter puluerizato diu conseruantur absque corruptione: hoc ego sæpe uidi & experimēto approbauit: pinguedines enim quæ pro usu medicinz sunt nullo modo sale salandæ sunt, sed modo prædicto preparandæ: quare &c.

Descriptio. XIII.

VNGVENTVM committit Gulielmi de Varigana in sua practica ca. de his quæ communi natura magis sunt mentrua mulierum, quod in usu est.

R. Corticū medianorum arboris glandium, myrtillorum, caudæ caballinæ, gallarum, corticum fabarū, acinorum, alias arillorum, uuarū, sorbellarū siccarum, acinorum mespillorum immaturorum, radicū chelidoniz, foliorū pini syluestris, ana. M. i. terantur & coquantur in aqua plantaginis perfecta coctione: deinde colent, postea accipe ceræ, olei myrt.

vnc. vii. s. liquefiant simul, & lauentur in prædicta colatura nomēs semper colaturā in nouando quaq; uice postea accipere corticem mediorum cultaneorum, corticem medianorum arboris glandium gallarum, an. ʒ. i. cineris crurum ofsis bouis, myrtillorum, acinorum siue arillorum uuarum an. ʒ. s. trochiscorum de charabe, ʒ. ii. olei myrtini lib. ii. s. & alii qui addunt oleum masticinū, puluerizent subtiliter puluerizatum. Et cum prædicta cera lota cum superscripta decoctione fiat unguentum.

Per cortices fabarum auctor intelligit cortice in quā fabæ oriuntur, crescent & maturantur scilicet illa regula.

Modus lauandi cerā talis est: primo debet cera ad ignem liquefieri: deinde in aqua munda ab oī sapore debet proici: & in aqua illa debet manibus malaxari, & aqua a cera manibus exprimi, deinde ad ignē debet liquefieri, & in aqua munda proici, ut prius, & sic iterum atq; iterū est faciendum, quousq; aqua sine sapore exeat, & tūc erit signum lotionis.

Descriptio. XIII.

VNGVENTVM Montagnæ pro uernibus in anti dotario suorum consiliorum quod in usu est.

ʔ. Centauræ minoris, absinthij, lupinorum ana. ʒ. s. ligni aloes, cornu cerui usq; diptami, an. ʒ. ii. aloes ad pondus omnium, quod erit. ʒ. vii. s. olei absinthij, ʒ. iii. fellis tauri, ʒ. ii. ceræ. ʒ. i. conterantur omnia contenda, & fiat unguentum.

Lauatur enim cera duplici causa. Primo vt acuitas sua amoueatur. Secundo ut acquirat uirtutem quam non habet & quam habet deperdat, ut in unguento comitissæ, quia lauatur ut efficiatur stipica.

Si scriptū reperit ceræ lotæ, tunc dicta cera lauanda est in aqua cōi, aliter lauetur in decoctione de qua describitur.

Descriptio. XV.

VNGVENTVM Mefæ pro scabie.

ʔ. Axungia munda a tela sua, ʒ. v. olei laurini, argenti uiui extincti ceræ munda, turis bene puluerizati an. ʒ. ii. falis. ʒ. viii. succi plantaginis, succi fumeritæ an. ʒ. vi. cōfice sic, cerā olei laurini, & axungiam pone in captea ad ignem cum succis & bulliant donec omnia simul liquefiant, deinde adde salis, olibanum, & masticem, & bulliant omnia simul usq; ad consumptionem succi, postea deponantur ab igne, & addatur argenti uiuium extinctum, ut supra, & utere.

Axungia porci melius conseruatur liquefacta, & adeps renum caprarum hoc etiam modo melius conseruatur.

Argentum uiuium, hoc modo extinguitur & præparatur.

Accipiat argentum uiuium, & ponatur in una ampulla uitri, ut supra, & ponatur tanta salina q̄ cooperatur, deinde cōcuiatur tantum sub & supra semper saluā addendo q̄ toto tunc confrangatur, ita quod possit aspergi tanquam lac, & partibus cui imponitur adhaereat, & hoc modo extinctum erit, aliter tantum conseruatur, quod in illā formā ueniat.

Descriptio. XVI.

VNGVENTVM pro scabie aliud pro pueris & prægnantibus & delicatis, Montagnæ.

ʔ. Terebinthina bene lotæ, ʒ. iii. butyri loti, ʒ. ii. fal. ʒ. i. succi cytragulorum, uittellos ouorum an. nu. iii. olei ros. ʒ. i. mifceantur omnia simul, & fiat unguentum.

Sal, si simpliciter seipsum reperiat in compositionibus, semper de comuni sale est intelligendum.

Terebinthina & butyrū lauandi sunt in aqua cōi, & sic facias de omni alia re lauanda in aqua cōi solum dicitur lauetur, & non exprimat, cum qua res cōmuni aqua lauanda est.

Descriptio. XVII.

VNGVENTVM de arthaniam magnū Mef. quo unguit uenter & lumen & illa, & solutione soluit cataractū, & unguit ex eo stomachus & facit uomere, & educit uermes & conserit hydropisū, & solutione educit aquam citrinam, & est propinandum non ualentibus fumere medicinam.

ʔ. Succus arthanice, i. ciclamini uel panis porcini lib. iii. succi cucum. asini lib. i. olei irini lib. ii. butyri uaccini lib. i. pulvere colloquintid. ʒ. iii. polypos. ʒ. vi. euphor. ʒ. s. quæ sunt terenda cete, & submerge in succis & oleis, & pone in uase uitreo stricti orificij, & stringe caput eius, & permittit p̄ dies octo, deinde bulliant oēs ebullitione una & colatur: deinde

proiciantur super colaturam, serapini aur. v. myrrhæ aur. ii. duo hæc dissoluantur prius in forti aceto: deinde, proiciant in dicta colatura, & bulliat simul semper agitando q̄ spaciua usq; fere ad succorū consumptionem, & tūc proice super eā ceræ. ʒ. v. fellis uaccini aur. vi. serueat cū eis usq; diu fiat cera: deinde pulueriza super id scamoneæ, aloes, mezeoreon, colloquintida an. aur. v. falsigemmæ aur. iii. euphorbiæ aur. ii. tubiculi aur. v. piperis lon. ʒ. ng. camemillæ an. aur. ii. misceantur omnia bene ut permisceantur & utere.

Modus extrahendi succū a cucumere asinino talis est. Accipiant in fine Iulij in diebus canicularibus & in mense Augusti, qñ sunt citrini, quia illi sunt maturi, & ponantur in uase, & permittatur per noctē: deinde forsetur cultello acuto. Exiet aquositas quedā clara & subera pulposa. Illa aquositas colligatur cum spongia uel bombyce & abiciatur. & substantia pulposa referetur, & utatur ad libitum ponendo illam ad solem, & permittatur exicari donec possit educi ad formam trochiscorum: deinde remouetur, & referetur.

Descriptio. XVIII.

VNGVENTVM diathæa magistrale, ualens proprie ad dolorem pectoris ad frigiditate & pleuresi, & super petus unctum sanat omnia loca, infrigidata calefacere molificat, & humectat.

ʔ. Radicum altheæ. M. iii. sem. lini, sem. foenugræci, cæpe squillæ, an. lib. s. ex his fiant mucillagines in communi aqua: de quibus accipe lib. vi. olei communis lib. iii. ceræ lib. ii. terebinthinæ, ʒ. vi. gummi hederæ, galbani, ana. ʒ. i. butyri. ʒ. viii. resinæ pini, colophonie an. vnc. iii. medullæ bouis, vnc. vi. croci. ʒ. ii. sepi uaccini lib. s. & fiat unguentum, dissolue digummas in aceto forti.

In receptis qñ reperitur scriptū olei loti. Modus lauandi talis est: primo ponatur oleū in uase mudo stricti orificij, & supra fundatur aqua clara calidissima: deinde abiciatur aqua, & totiens reiteretur proiectio dictæ aquæ feruentis, quod finaliter exeat eiusdē coloris & saporis sicut ante proiectionem: & tunc oleum erit mundum. Et nota quando fit debet lauari in uno uase q̄ fit in fundo foratum ut aqua possit exire, oleū n. remaneat semper super aquam & natat, quia est corpus aerium. Ideo quanto leuior, tanto melior & c.

Descriptio. XIX.

VNGVENTVM marchiō Nic. in suo magno antidoto. Et quanquā hoc unguentū & duo le quæritā nō declari sint in usu, quia in eis sunt multæ difficultates, ideo o multare proposui, qd̄ facit ad dolorem & frigiditatem capitis, & pectoris, & stomachi, & ad glycyrosim, & splenis, & hepatis, & ad illi dolorem, subueniens paraliticis, ciaticis, nephreticis, & podagricis, tumores reprimere: & contra oēs dolores medetur. ʔ. Ceræ albæ lib. ii. olei cōis lib. viii. rosifmarini, foliorum lauri an. ʒ. i. rutæ. ʒ. vii. amarici. i. maioranæ. ʒ. vi. esbrij. i. fioris saluiz, laui. balsamitz. i. mente aquaticæ, liliifagi. i. sylue. ozimi. polij, calamitæ, artemisiz, enulæ, betonicæ, branchæ ursinæ, spergulæ. i. parietariæ, pimpinellæ, agrimonia, absinthij, herbæ paralytis, herbæ sanctæ Mariz, cimarroni sambuci, crassulæ. i. uermicularis: alij uero fabam grossam, dicunt, millefolij, semperuius, camedrei. i. chamædrysos, centaureæ. i. maioris, fragariæ. i. herbæ portantis fragas, quinque folij, herbæ tetraet. i. orobi an. ʒ. iii. s. euicif, radicis. i. radicis altheæ, cimini, myrtæ. i. folia myrti an. ʒ. iii. foenugræci. ʒ. i. s. butyri. ʒ. i. & ʒ. ii. urticæ, uiolarū, papaueris nigri, mētæ facenicæ: alterius mētæ. i. mētæ domesticæ, polyctici, lapacii lib. i. lapacii acuti, carduicelli. i. cardonis benedicti, marifissulæ maturæ. i. caprifolij, herbæ mulsatæ, aleoia. i. panis cuculi linguz ceruinæ. i. scolopendriæ, crispaluæ, caphoræ, storacis calamitæ, medullæ cerui. an. ʒ. s. adipis vrsi, gallinacis, masticis an. ʒ. i. thuris. vnc. s. olei nardini vnc. ii. herbæ omnes præscriptæ colligantur in medietate mensis Maii, & oēs in una die uel duobus diebus, & ab hora tertiari usq; ad meridiē. Consecratur sic herbæ terantur subtiliter, infundantur per dies vii. in optimo uino odorifero octaua uel die ad lectū ignē ponantur. Et cum unum aliquantulum erit consumptū addatur his oleū prædictum, & bulliant donec incipiant diminui: deinde cum diligentia colentur, & proiectis herbis ite

rum super igne ponantur. Est cū inceperint bullire pone fteraz, & cū modicum bullierint pone butyrum, & axungias, & pinguedines fuprafcritas aliquidantum tonfas & oleū nardinū, & masticē, & olibanum, & poſtea ceram, ſem per cū ſpatula agitando, & cū cera liquefacta fuerit ab igne deponatur & cum coagulatum fuerit reſeruetur in uafe.

Paralyſis herba eſt cuius folia inſcruent tempore hyemis q̄ ſe extēdunt in terra, quaſi alba, & criſpa, hīs fiores albu.

Herba ſanctę Marię eſt quędam herba ad albedinem ten dens nigroſis foliis aliquid perſicariam dicunt.

Mēta laracnica, habet folia longiora & acutiora quā menta domeltica ſeu hortēſis: mentę enim plures ſunt ſpe cies, ut Math. Syl. cap. 143. oſtendit.

Herbę muſc. hęc herba eſt illa herba quę ſe expādit per terram, odorē hīs muſci, quę ſatis aſſimulat agrimoniz, ſed eſt minor ea, quidā dicit q̄ eſt ualeriana, & quidā q̄ eſt roſtrū ciconiz. Inter unguentū & emplaſtrum eſt dīa. Nā ad compoſitionem unguenti, requiritur cera & oleum: in emplaſtris autem non eſt expediens ſemper ponere ceram.

Deſcriptio. XX.

VNGVENTVM aragon Nic. ualen ad dolorē ex frigiditate, ad ſpāſmū, & tetanum, ad dolorē illi & renū, arthriticis & ſciaticis multū p̄deſt, & quartanariis ſi ſpina inuagat an. horā accēſſiois mirifice p̄deſt, dēt tē ſemp bñ caleſciat.

✠. Roris marini, maioranz, radicū iari. i. ſerpentarię ſerpil li, rutę, radicū ficidę. i. cucumeris aſſini an. 3. iiii. s. foliorū lauri, ſaluię, fauinę an. 3. iiii. polycarię maioris & mino. i. el-lebori albi & nigri. 3. ix. aliquid dicit q̄ polycaria maior eſt thymus & polycaria minor eſt ſatureia, bryoniz. i. radicis cucurbitę ſaluaticę. 3. iiii. laureolę. 3. ix. nepitiz l. i. ſ. maſti. oli bani an. 3. vii. pyrethri, euphorbię, zingib. pipe. an. 3. i. olei muſcellini. 3. s. olei petrolei. 3. i. adipis urſi, olei laurini an. 3. iiii. butyri. 3. iiii. olei cōis li. v. cerę li. i. Herbę & radicę colligant p̄ & hora ſcripta in p̄dicto unguento, lauentur, & mudent, & ſubtilient: deinde cōterant, & per vii. dies in oleo inſuſandofocula uero die ſup ignē ponant, & coquant vſq; ad p̄ſectam cōctionē: poſtea ſacculū colent fortiter exprimēdo: deinde dicta colatura ſuper ignē ponat, & cū bullire cęperit, addat oleū laurinum, butyrum, & adeps, ac cera, quę liquefacta: adde petroleum & muſcellinum: & poſtea masticem & olibanum, zingiber, piper & euphorbium, & pyrethrum, & poſt ab igne deponatur, & recondatur.

Inter doctores magna eſt dīa de laureola & mezecon: nam eadem ſunt, & ſalaz, Nam mezecon eſt planta lacticia, & dicitur alio nomine oliuella: laureola uero eſt arbutum, & non habet lac, ſed folia laureolę ſunt ſimilia lauro.

Polycaria eſt herba quę habet folia, ſimilia oliuę, ſed aſpera, & pinguia, & uiſcoſa: & ſunt duarū ſp̄rum. ſ. maior & minor: maior eſt grauiſ odoris, & in ſine fructe maior eſt: uirgas hās lōgitudine cubitis duobus. Minor uero unius ped lōgitudine porrecta, ſtorem fragilem, & mellini hīs colorem, amarum ſaporē: & cū floruerit flores uelut capillos facit. Radix ipſa eſt inutilis, ſed quia nſo hinc in climate non reperitur: nec cognitio habet: ideo loco ipſorū ponit elleborus albus, & niger: & aliquid loco polycarię maioris ponit thymū maiorē uſuale: loco minoris ponit ſaturegiā.

De oleo muſcellino magna inter doctores eſt cōtentio: quidam. n. dicunt quōd dicitur muſcellinum, quia in eius cō poſſio nē intrat muſcum: item muſcellinū uocatur, quia fit ex humiditate inuenta in tuberoſitatibus vlimi. Item muſcellinum uocant multi oleum de ben. i. de ſemine cataputiz.

Alii uero hoc mō oleū muſcellinū faciunt ſm hęc receptā, & ponitur a Galeno in ſuo antidotario & iſtud eſt in uſu.

✠. Olei li. iiii. aquę lib. ii. folii ſpicę, coſti, macis, an. 3. i. & o racis calamitę, myrrhę, croci, caſię lignę an. 3. vi. garyophyllorum, bdelli ana. 3. s. nucis inde, muſci ana. 3. ii. conquaſſentur: deinde bulliant ſimul vſq; ad conſumptionem aquę: deinde colentur & reſeruentur: aliquid ſuperaddunt huic deſcriptioni xylobalſamum & carpoolbaſamum.

Deſcriptio. XXI.

VNGVENTVM Agrippę Nicolai in magno antidotario, quo Agrippa rex Iudeorum utebatur, ualet ad hydro-

pyſim, & ad omnes tumores in quęunque parte corporis fuerint, & ad neruos indignatos, urinā puocat, & inunctū ſup uentrē laxat, & dolori renum ex frigida cauſa optime facit.

✠. Bryoniz. i. radicis cucurbitę ſylueſtris li. i. radicem ebuli, ſpēs eſt fambulci facies quędam ſemina nigra ſerotentia, tribuli marini an. vnc. ii. radicū ſacydę. i. cucum. aſſini li. i. ſquillę, vnc. vi. ieros. i. illi coeleſtis v. iiii. radic. ſilicis. v. ii. Oēs radicę ter uel quater bene lauentur in ſiſa marmorea bñ terantur, olei ſquillę li. iiii. ponantur in dicto oleo, & per dies viii. permittantur. Nona uero die ad ignē ponantur omnia hęc, & tandū bulliant, quōd radicę diuidantur: deinde ponantur in ſacco exprimendo & colando, & cum colatum fuerit ad ignem ponatur, & cum fuerit debite fere cōctum, intus proiciantur cerę albę, vnc. v. et liquefacta cera ab igne deponatur, & poſt inſrigidationem reſeruetur.

Antidotarium eſt quodlibet includēs diuerſas deſcriptiones medicinarum ad diuerſas et uarias paſſiones, dī antidotarium. i. contra uitium datum, quia contra ægritudines principaliter. Vel aliter antidotarium dicitur. i. contra datum, ab anti quōd eſt cōtra, inde dicitur antidotarium quōd eſt liber continens experientia contra morbos data.

Tribuli marini ſunt quidā fructus naſcentes in aqua cornua hñtes, & intus hñt quandā medullam ad ſimilitudinē caſtaneę, & iſti gallici pauperes ſolent ſuper pileos ſuos portare. Borim eſt duarū ſp̄rum domeſtica et ſylueſtris, domeſtica eſt arbor terebinthi. Et ſylueſtris lenticiſ arbor in montibus naſcens. ex cuius ſemine fit oleum lenticiſ: ſi ha beri non poteſt, eius loco ponitur olei masticis, uel terebinthina, uel oleum de leuco. i. album, antiquum.

Deſcriptio. XXII.

VNGVENTVM marciaton: q̄ in uſu cōiter habetur Nicol. ut ſupra habens uirtutes unguenti marciaton ſupraſcripti.

✠. Foliorum lauri li. iiii. rutę lib. ii. s. amarici. i. maioranz lib. ii. coriſmarini li. i. s. foliorum myrti li. i. eſcribi. i. floris fal uiz. baſſamiz. i. mentę aquaticę, ozimi ana. li. s. butyri, vnc. v. masticis, ſtoracis calamitę, medullę ceruinę, adipis urſi, adipis gallinę ana. vnc. i. thuris vnc. i. s. olei nardin vnc. i. olei uiridis. f. ex oliuiſ immaturis lib. vi. & fiat unguentum prout in unguento alio marciaton tibi oſtendi.

Oleum uiride eſt oleum omphacium. i. oleum oliuarum immaturarum, & dicitur a uirido, eo quia maiorem uiriditatem habet quam cetera olea ſimplicia.

Deſcriptio. XXIII.

VNGVENTVM ſtaphisagriz magiſtrale.

✠. Axungię, ſaponis mollis, ſtaphisagriz ana. vnc. iiii. olei linolę vnc. iiii. argēti uiui extincti v. ii. cōterantur ſubtiliter contereā, & miſceantur: ualet hoc unguentū ad interficiendū uermes ſeu pediculus capitis palpebrarū et inguinum.

Axungia ſi ſimpliciter ſcripta reperiat, ſemper de axungia porcina eſt intelligendum. Hic utiliter eſt notandum, q̄ ſtomachus et hepar non debent aliquid unguento ungi, aut aliquid emplaſtri uel cerotum ſupra eos ponendū eſt, poſt cibum quia attrahendo calorem a loco diſtentionis impedire cibi diſtentionem, et naturā a ſua diſtentione ſu operatione ne diuerteret. Vnguenta emplaſtra et cerota ut plurimum conſeruantur per annū in ſua uirtute et bonitate, & non plus, quia elapſo anno paulatim humiditas ortu naturalis deperditur, et terreſtreſtas acquirunt, quare notē apothecarij, & hic completur diſtinctio octaua quę fuit unguentorum.

Incipit IX. diſtinctio, quę eſt de emplaſtris, et continet vi. deſcriptiones. Quarum prima eſt.

EMPLAſTRVM de meliloto Meſſie mollificans omnem duriciem quę fit in ſtomacho, & hepate, & ſplenē, et omnibus uiſceribus.

✠. Meliloti vnc. vi. ſtoracis camēmil. ſoenugraci. ſ. ſeminiſ, baccarum lauri, radicem altheę, abſini ana. 3. iiii. ſepi, cordumēti. i. carui agre. ieros. f. radicis, & cyperi, ameoſ ſpicę, caſię lignę, an. vnc. i. s. ſamplici. i. maioranz 3. iiii. aromatici. 3. x. ſtoracis, bdelli ana. 3. v. terebinthinz. 3. i. s. ſcūu pinguium nu. xii. ſepi caprini, refinę ana. vnc. ii. s. cerę vnc. Lum. apoth.

vi. olei famplici. i. maiorane, olei spicæ an. li. ii. conficiat sic. Ex semine foenugræci, radice altheæ & ficum fiant mucilagine in aqua decoctionis alterius foenugræci, camæmil. & meliloti an. q. s. & de dicta decoctione et gümæ præscriptæ dissoluantur. Cætera uero puluerizentur, & additis oleis, cera & adipibus fiat emplastrum. Potes et alio modo facere, decoquere radices altheæ, & ficus in præscripta decoctione, & post ipsarum perfectam coctionem bene illa pistare, & gümæ in decoctione dissolvere: cætera uero puluerizare: deinde cõ oleis prædictis q. remansit de decoctione miscere, & his addere & radices & ficus & gümæ dissolutas, & iterum simul eam bullire q. decoctio consumpta sit: postea ad flores, & leui bullitione bulliat: deinde terebinthina resina colata sepium & cera ponantur & bulliant usq. ad liquefactionem cære: deinde ab igne deponantur, & puluis præscriptarum rerum addatur, & bene oia misceantur & referantur, & hic melior erit modus quamquam etiam superior fit bonus.

Ea quæ in emplastris ponuntur non multum sunt contenda, eo quia uirtus ipsius solum agit in membrum quod tangit, & diu uirtus eius durat. Et debet esse emplastrum grossum quando super locum ægrum ponitur.

Aliqui empirici apothecarii puluerizant semen lauri exteriori cortice non amoto & male quare in quocunque loco ponuntur, semper a superiori cortice münduntur.

Cordumeni. i. carui agreste. Sed si haberi non possit, eius loco apponi possunt carui domestici.

Descriptio. II.

EMPLASTRUM Galeni positi à Mes. emendans uitia stomachi, confortans stomachum, & emendans eius uitia quæ ex frigidityte sunt, confortans digestionem, & appetitum procurans, & confortans hepar, & sedans dolorem eorum.

R. Rosarum 3. xx. foliorum absinthii sicci 3. xv. masticis 3. xx. spicæ indæ. i. spicæ nardi 3. x. terantur seu conterantur hæc, deinde accipe ceræ mundæ 3. iiii. olei rosæ li. i. s. dissoluantur duo hæc ad ignem & lauentur post earum coagulationem cum aqua rosæ lautionibus pluribus: deinde iterum dissoluantur: & post congelationem lauentur in uino ueteri, succo cydoniorum & parum acetide inde misceantur cum puluere rerum præscriptarum, & fiat emplastrum.

Modus iste est bonus, sed ego soleo illum lauri facere post prædictas lotiones in uino optimo nigro ut maiorem stypticitatem iterum habeat & confortationem.

Descriptio. III.

EMPLASTRUM diaphœnicon Mes. est confortatiuum stomachi & hepatis in quibus accidit uehementes debilitas, & viscerum, quibus accidit lubricitas & mollificatio, & cõfert ad fluxum ventris, & ad fluxum hepaticum.

R. Ceræ 3. ii. olei nardini, olei rosæ an. 3. iiii. masti. 3. ii. s. laudani. 3. i. puluerizentur puluerizanda, & liquefacta cera cum oleis misceantur, & reducantur ad formam ceroti: deinde accipe dactylorum siccorum num. xl. tortellarum de feni. 3. v. duo hæc fundant per duos dies in optimo uino nigro subtiliter incisa & tortellæ confractæ, carnium cydoniorum coctum in uino 3. i. terantur dactyli contritione uicima, carnes cydoniorum & tortellæ de feni oia per fœcende iterum infundunt, deinde misceant cõ supra scripto ceroto, & contundantur in mortario donec aggregent: deinde piciantur super ea, olibani, absinthii sicci an. 3. ii. s. ligni alo. macis, myrrhæ, alo. loti, spicæ, acaciæ, galliæ mus. ramich. calami aro. an. 3. i. puluerizentur subtiliter hæc: deinde cum aliis rebus nisceantur, & conterantur in mortario bene donec omnia commisceantur, & fiant in unum, formam habens emplastri.

Calamus uel calami si simpliciter scriptum reperitur, de calamo aromatico semper est intelligendum.

Aloes quod ingreditur in emplastris, unguentis et cerotis semper debet esse lotum, cum magis confortatiuum sit, magisq. delicatissimum, & minus mordacissimum.

Descriptio. IIII.

EMPLASTRUM de granis lauri Mesue cõferens ad dolores ex frigidityte factos et uentositates, & proprie ad dolorem uentris & stomachi, & renum, & matricum, et uescicæ, & aliorum uiscerum.

R. Olibani, masticis, myrrhæ an. 3. i. granorum lauri. 3. ii. cyperi, costi, an. 3. s. mellis cocti li. s. conterantur, oia præscripta, & reducantur cum melle ad formam emplastri, & et si uis emplastrum ualere in hypodermis, his præscriptis omnib. addas cyperi. 3. i. steroris caprarum, uel uaccarum sicci puluerizati. vnc. vii. s. quod est ad pondus omnium, mellis lib. ii. est enim multum cõueniens, uti Mesue uideri potest eo loco.

Ad faciendū emplm cõ melle p omni li. i. mellis dare debes. 3. iiii. spærum cribellatarum si debita formâ habere det.

Mel in emplastris nullo modo coquendum est, eo quia coctura multum tenax ipsum facit: ideo ponatur in eis crudum.

Descriptio. V.

EMPLASTRUM Montag. contra fluxum q. in vñ est, ualens in oibus fluxibus antiquis diaricis, & ex calido totum myracha scuto oris stomachi usq. ad illa & femur.

R. Eupatorii. M. i. squinanti. M. ii. spicæ indæ quartâ partem. M. i. masticis, macis an. vnc. s. ligni al. 3. iiii. myrr. emb. chebu. assafœtorum an. vnc. i. boli arm. lapidis hematitici, terræ sigil. an. 3. vii. sem. corian. præparatorum vnc. i. s. podii. 3. ii. rosarum. vnc. i. farinæ hordei. vnc. ii. spærum triafandalorum sine camphora. vnc. s. scoriz ferri præparatæ. 3. i. olei masticis, olei myrrillorum an. li. s. contundatur subtiliter eupatorium. Cætera uero puluerizentur, & fiat emplastrum in bona forma. Mirabiliter enim ualeat in fluxu uentris.

Camphoram non iussit apponi spæbus triafandalorum hic in emplastro intrantibus propter intensam ipsius frigiditytatem. Intestina enim sunt debilis caloris, nec multum frigida sunt apponenda circa ea regulariter operando.

Descriptio. VI.

EMPLASTRUM de crusta panis Montag. ualeat in uomitu puerorum, & in non potentibus cibum retinere, multum in usu est: quod actu calidum in omni uomitu sedat eum in media hora.

R. Masticis, mente, spodii, coralli, rub. sanda. albo. sanda. rub. an. 3. i. crustæ panis assæ & infusi in aceto per medium horam. vnc. ii. olei masticis, olei cydoniorum an. vnc. i. farinæ hordei. vnc. i. cõteratur subtilissime panis. Cætera puluerizentur deinde misceantur, & fiat emplastrum sine igne.

Utiliter hic est notandū q. membris principalibus & maxime cordi & stomacho nullo modo apponenda sunt frigida actu quauis potenter uirtutaliter frigida sint: sed aliquantulum tepesciendi, & proprie pueris quare bene notetur hic ut queant instruere medicamenta accipientes, quia quando domini medicis inaderenter non explicant de forma approximationis, doctus apothecarius supplere potest. Et his emplastrorum communium distinctio completur quæ fuit ix. distinctio.

Incipit distin. X. quæ est de cerotis, et continet nouem descriptiones. Quarum prima est.

CEROTUM diachylon magnum Mes. quod ab eo appellatur emplastrum, uerum quia communiter fit ad formam ceroti, ideo in eorum summa ponam, expertum ad resolutionem, & ad maturationem omnis duritiei.

R. Lithargyri mundi triti & cribel. li. i. olei irini, olei camæmil. olei anethi an. 3. vii. mucil. f. lini, mucil. f. foenugræci, mucil. agnisi radicem altheæ, mucillagi. ficum pingulum, mucillag. passulorum, succi ieros, succi quillæ, hyssopi humidæ, glutinis alzanach an. 3. xii. s. terebinth. vnc. iii. resine pins. ceræ citrinæ an. vnc. ii. confice hoc modo. Accipe lithargyrium & supra scripta olea, & diu in mortario lapideo cum pistello ferreo conqaescentur, & elaboretur in eorum conqaescentia per medietatem horam saltem: deinde bulliant super ignem cum facilitate semper, & incessanter agitando cum spatula, donec coaguletur lithargyrium, tunc deponantur ab igne, et permittantur infrigidari: deinde accipe mucillagines, gluten, succum, & hyssopum, & terebinthinam, & inter eos aliqui ebullitione bulliant: deinde in mortario cum lithargyrio & oleis prædicta ponantur, et cum pistello tantum conqaescentur, donec condecens fiat eorum permixtio.

Tunc iterum oia reponant super ignem, & cera addita tan-

eum coquantur, quod ad debitam formā ueniant. f. quod habent solidiorem coctionem quam habere debeat unguentum, et nihil ultra ne adatur.

Sunt qui male scribunt et proferunt hanc compositionem et dicunt diachylon et males, debet enim scribi diachylon. i. compositio facta cum succis et mucilaginisbus qui sunt siccus. Nam chylus. i. succus.

De alzanach inter doctores magna est cōtrouersia: quidā dicit qd est mucilago radicis enule, et hoc facis cōsonū est: eo quia ē mollificatiua & resolutiua. Alii dnt qd est mucilago radicis altheæ, et scribūt alzanach. Nec hoc remōtū est a psonātia, cum et illa sit mollificatiua, resolutiua, & maturatiua. Nōnulli alii dnt qd est mucilago radicis aristol. & hoc ē de apparētia hęc, cū illa ualeat in resolouendis apostematibus, & in extrahendo ossa fracta, & scribunt alkanach. Sunt & alii dicētes qd est colla piscis, quia Ma. Syl. dicit qd alchanach est nōmē cuiusdā piscis, & alibi, qd est spēs cuiusdā piscis. & alibi qd est quoddā genus piscis: quero colla sit remanens in decisū, & nisi cōpositū hōhēret in se attractiōē pōtēt, sane magis adherere scēz opioni & dimittere hanc collā: Sed qd medici cōpōnē hanc attractiū dnt, ut experimēto iā cōprobātū ēst, & extractiō nō fit nisi mediante hac colla igit pōni facere potes collā piscis dissoluēdo illā prius in aqua, & hoc idem faciunt cōiter praticantes in apothecis.

Descriptio. II.

DIACHYLON minus Mes. cuius iuuamentum est ad apostemata dura, & ad duritiem hepatis, et splenis, et isto machi et ad omnem duritiem, et scrophulas exorciatiuas et in omni fluxu hepatico et proprie cum emplastratur.

Pulvis radicis ieros. f. i. Accipe ergo lythargyrium et pulue ieros, et diu in mortario agitentur, et ut supra tibi ostendi in alia facias. Commemorando qd coctio sit media inter unguentum et cerotum.

In oī cōpōne in qua intrant lythargyriū et mucilagines pōst coctiōē lithargyrii cum oleo, antequā muculagines ponantur, semper debemus expectari infriigidatiōē uel saltem tepēdationē olei in quo est lythargyrium Si. n. ipsis scruentibus apponeretur mucilagines, adeo exsterceret super captum qd maior pars in ignem perderetur. Et hoc se pōtē uidē contingere famulis apothecariorū nō expertis & tūc iudicabam illos indoctos huius artis, & qui se magistros esse dicebant, ineptissimi discipuli esse, compesciebantur.

Descriptio. III.

CEROTVM p renibus meo ingenio repertū: utile atque mirabile ad prohibendū aborsum in muliere pgnante uidi de eo utilia experimēta, & maxime in Illustrissima nūc quondam comitissa Brixiæ in partibus ultramontanis uxore Illustrissimi Philippi dñi de Sabaudia quæ habuit duos aborsus approximato ceroto, aliquo tempore portauit. Et illo semel relicto iterum ad aborsum uenit. In multisq; aliis matronis & mulieribus, illum compolui dum Illustrissimę suæ dominationi seruirem anno. 1480.

℞. Malticis electi. f. i. laudani. f. vi. ceræ citrinæ. f. s. bifloræ, nucum cupressi, hypoquitos, achacæ, sanguinis dra. rosarum, ruf. corallorum rubeorum, sandal. mentæ siccæ feminum coriandorum præparatorum, galliæ musc. terræ sigillatæ. an. f. ii. olei oliuarum incompletarum lib. iiii. puluerizentur, puluerizanda, & fiat cerotum in bona forma, quod si tenax non est addatur parum terebinthinz.

Cerotū dī a cera, quia oē cerotum recipit ceram, uel aliquid loco ceræ, & est quoddam mediū inter unguentum, & emplastrum, spissius unguento, & liquabilis emplastro.

Descriptio. IIII.

CEROTVM de gummis Mesue.

℞. Galbani. f. i. armoniaci. f. ii. viridis eris. f. ii. aristol. longæ, aristol. rotundæ, thuris, opoponaci, malticis, ceræ. an. f. i. olei oliuarum. f. vii. lythargyrii aur. lib. s. myrrhæ voc. i. bdellii. f. ii. lapidis calamitæ, lapidis hematis. an. f. i. puluerizentur, puluerizanda, & gummez in aceto dissoluantur, et fiat cerotum in bona forma.

Lithargyriū si simplr scripserim reperitur, de lithargyrio autē intelligat, quāquā Circa instās aliter sentiat, dicit. n. qd li

thargyrium. f. sex stāni in usu ēst, & cōiter eo utimur, & sit p excoctionem, cū sit stānum ex uena terræ, & hoc uerum est qd eo uti debemus quando intendimus multum infriigidare.

Descriptio. V.

CEROTVM de laudano magistrale mirabilis iuuamēti pro stomacho infriigidato, & debilitato: cōfortans uirtutem digestiuiam, & ualens in passionibus frigidis eius, & remouens dolores factos a uentositate digestiua.

℞. Mēte, rosas, abfin. lig. aloes, maff. cinn. picē nardi, myrtillorum an. f. iiii. garyoph. galangæ, nucis mu. macis, zing. gallic. musc. colti an. f. i. s. cyperi, calami aro. oliba. aloes, myrrhæ, corallorum ru. an. f. i. zedoariæ, terræ sigil. abrotani, cētonici, centaureæ maio. an. f. i. s. laudani boni. f. ix. ceræ citrinæ lib. ii. terebin. f. vii. liquefiant cera terebinthina, & laudanum simul: deinde suprascriptæ alia species apponantur.

Aliqñ scriptū repies mēte siccæ, & abfin. sicci, & aliqñ mēte & abfin. simplr, qd eret aliquis quid in diuersitate dicta ē faciendū. Iō in hoc dico qd autores ipi intelligit de ipsis siccis quāuis aliqñ nō exprimat, & aliqñ sic, & ppter expōitionem uolunt postmodū te intelligere de siccis, & ideo expulserunt in aliquibus mēte uel abfinthii sicci id qd uolunt qd tu in ceteris intelligas. Nam qñ uolunt dictarum humiditatē herbarum, dicunt succi abfinthii uel succi mēte; quare bene nota.

Descriptio. VI.

CEROTVM pro crepatis. Gentilis in suis consiliis, consilio primo: preciosisimum & expertum, qd in usu est, & est consolidatiuum dydymi dilatati: per quem intestina descendent ad ossem suū bursum testiculorum.

℞. Picis liquidæ, colophoniz, ceræ, aristol. lon. aristol. rotū, uerniū terrestris, aloes an. f. iiii. lithargyrii, armoniaci, opoponaci, galbani, malticis, bdellii sumach. an. f. i. terebinthinz, f. sapini, consolide maio. cōsolidē min. an. f. i. uisici quercinisi, lapidis hemathicis, olybani, gyphi, myrrhæ, thuris an. f. s. gallarū, nucū cupressi, boli ar. hypoquitos, mūmiz an. f. vi. sanguinis dra. f. vii. sanguinis humani lib. ii. pñce sic accipe pellē arietis cum pilis inde remotis. coquantur in aqua tandū donec tota liqueat, & postea permittit aquā infriigidare & ressi dēre: deinde accipe species bene tritas & cribellatas & galbanū, prius tamen dissoluantur in aceto fortissimū, quæ dissolutæ sanguine cōmisceantur, & hæc oīa permisce in colatura aquæ arietis pellis in cacabo, & fac ut simul bulliant donec ad nigredinem & formam ceroti ueniant & utere.

Sanguis humanus debet extrahi ab homine sano sanguinæ complexionis, & post extractionem debet in ceroto illi cōponi, & eo quia longa ipsius extractio corruptionem inducit. Aliqui uolunt quod prius excicetur.

Descriptio. VII.

CEROTVM p colitis magistrale ualens pprae ad dolorem pectoris ex frigidiitate, mollificans et sanas lora infriigidata.

℞. Malticis, galbani, opoponaci, serapini, armoniaci, thuris, picis naualis, hyssopi humidi, an. f. ii. terebinthinz, ceræ, abfin. foenugraci, sem. camemil. an. f. i. croci. f. s. mucilaginis foenugraci, mucilaginis sem. lini, mucilaginis altheæ, an. f. ii. s. milce, & ex his fiat cerotum dissoluendo prius gummas in aqua de coctionis altheæ, foenugraci, & feminis lini, puluerizanda etiam puluerizanda, reducatur ad formam ceroti.

Camemillæ si simpliciter scripta in compositis reperitur, semper de flore est intelligendum.

Mucilago altheæ si simpliciter scribatur uel scriptum reperitur, de radice facienda est ut doctores uolunt.

Descriptio. VIII.

CEROTVM oxycroci Nic. in magno antid. ex aceto & croco nomen habet, ualeat pprae ad fracturas ossiū, & ad membra, quæ dolore aliquo affliguntur, & apostemata dura in quacumq; parte corporis fuerint remollit & dissoluit.

℞. Croci, picis, colophoniz, ceræ an. f. iiii. terebin. galbani, armoniaci, thuris, aloes, aliqñ terebus nō hnt aloē, malticis. an. f. i. s. iiii. cōficiantur sic. Galbanū & armoniacū aliqñ cōfusa ponant in sufficiēti quantitate acetī p noctē: mane uero ponant ad ignē usq; ad liqfatiōē dimittēdo: post liqfatiōē colent & iterū decoquantur donec acetū cōsumatur, & tunc addant picis naualis liquefactæ & colatz, cera, co-

lophonía, & terebinthina, & intervallo factó ponat mastic olibanum, myrrha, & aloes semper cum spatula agitando. Ad ultimum cum coctum fuerit in aqua frigida funde, & ex tracto ab aqua manibus exprimitur ut tota aqua exeat. Et super marmor unctum oleo laurino pulvere croci superposito malaxetur. Et factis magdaleonibus resecretur.

De croco hoc in ceroto a variis diversimodo ponitur, quidam post perfectam coctionem ceroti, & postquam amoti est ab igne. Crocum intus ponunt, & cum aliis rebus bene incorporant & modus iste magis a doctoribus laudatur. Alii uero supradicto modo faciunt nec inutilis est.

Descriptio. IX.

CEROTVM de mucilagibus magistrale: lenitium & mollificatum omnis duritiei.

℞. Mucilaginis altheae, mucilaginis foenugraeci, mucilaginis seminis lini. an. ʒ. vi. bdellii, armoniaci, opoponaci, an. ʒ. ii. olei de lilio, sczicis olei linosae, an. ʒ. iiii. lithargyri, terebinthinae, an. ʒ. iiii. storacis ʒ. ii. picis nualis ʒ. iiii. cerae nouae lib. ii. medullae bouis, uel sepi calstrati. ʒ. iiii. puluerizentur puluerizanda, & ex his fiat cerotum in bona forma.

Nota qd qñ storax simpliciter reperitur, de calamita est intelligendum, cui melior sit alius species. Nā calamita idē est qd bona gutta, a calos qd est bonū, & mitos qd est gutta. Et hic co-pletur decima dicto quo fuit de cerotis in usu existentibus.

Incipit X l. distinctio, quae est de oleis, & continet xxx. de descriptiones. Quarum prima est.

OLEVM spicae Mesae seu nardinum, & est scda descriptio, multorum inuamentorum, & propter ad oēs ægritudines frigiditatis & ventositatis, & proprie neruorum, stomachi, hepatis, splenis, renum uesciae, & matricis, & confert dolori auris uentosis, & dolori capitis, & hemiplegia secundum omnem formam administrationis.

℞. Spicae indix. ʒ. iiii. lampucci. i. maioranae. ʒ. ii. xyloa. i. ligni aloes, genulae, fradices folii indi, calami aroliorum lauri, cyperi, quinqñati, cordumeli, lacruu agrestis an. ʒ. s. confrangantur oia grosso modo, & fundantur super ea uini & aquae ana tantum qd prædicte res cooperiantur, olei sisamini li. vi. decoquantur in duplici uase per horas sex lento igne, deinde sine calaturae, oia in uase reponantur & obturetur eo uasis.

Olei oliuarū est materia oium oleorum, & de notatione olei hētur, & intelligit de oleo oliuarū, & non de alio oleo.

Compositio huius olei est preciosissima. Sed raro fit propter penuriam folii ueri. Et propter avaritiam emptorum nolentium debitum precium soluere.

Oleum sisamini non fit quia grana sisami non reperiuntur apud nos, sed loco ipsius accipi potest oleum amygdalarum dulcium, uel illud quod inferius describitur.

Descriptio. II.

OLEVM spicae magistrale: & hoc coctus fit, & supplet uicem superius quod propter penuriam folii ueri non fit.

℞. Spicae nardi. ʒ. ii. spicae celticae. ʒ. i. storacis vnc. s. maioranae, vnc. s. nucis musc. cinnamo. an. ʒ. vi. masticis. ʒ. iii. calami aroma. croci an. ʒ. s. succi saluiae, uini optimi, aquae fontis, an. vnc. vi. olei communis lib. vi. confrangantur omnia similiter, & coquantur in duplici uase lento igne usq; ad consumptionem uini, aquae, & succi: deinde resecretur.

Oia olea debet coqui in duplici uase & lento igne, eo quia oleū facilliter est resolubile, & magno calore inflammaret, & uirtus perderetur: ideo doctores uoluit & iussit hanc decoctionē. Modus autē tritus est. Sed si artificiale uas ad hoc non haberemus, possemus accipere urceū petreū uel stanni coopti, & in eo oleū & alia ponere: deinde dictū urceū infundere i cacabo aquae pleno, & sub eo ignē facere & ex ebullitione aquae, oleū qd nō tangit decoqueretur: sic hinc modus optimus.

Dicitur oleum spicae & spica in eo intrante, eo quia spica est basis in oleo.

Descriptio. III.

OLEVM sisamini magistrale: quod fit qd haberi non potest oleum de granis sisami, tamen si haberi possent: melius esset: modus compositionis eius esset, sicut olei de amygdalis,

& eius inuamenta sunt, quia impinguit, & addit in spermate & lenit durities, & asperitates, & clarificat uocem, & lenit guttur, & est materia multorum oleorum.

℞. Mucis. ʒ. i. ligni aloes. ʒ. s. nucis muscatae, & garyophyllorum, masticis, spicae cardamomi. f. maioris & minoris, galliz musca. cubebe, calami aromatici, ana. ʒ. i. olei communis lib. i. bulliant in duplici uase, & reponantur.

Itud oleum ingreditur in multis medicinis, & quia ad nos non affertur: quanquam multi & falsē dicant quod uero apportatur, hanc compositionem loco ipsius solent medicis dispensare quia in uirtute idē ipsius. Et si hanc non uis facere, & aliud habere non potest, hipiorum loco accipies oleum amygdalarum dulcium, qd in uirtute est illius, ut omnis medicorum tenet scola, sed recens esse debet nō rācidū.

Descriptio. II II.

OLEVM cydoniorum Mesae stomachum & membra nutritionis, confortans, & neruos quibus accidit laxitas, & prohibet multitudinem sudoris.

℞. Carnium cydoniorum tritorum cū cortice suo quibus media accidit maturatio, succi cydoniorum cum cortice in complete maturatorū an. ʒ. vi. olei ex oliuis immaturis lib. iiii. tria haec ponantur in uase uitreo, & olei exponantur per dies xv. uase obturato: deinde coquantur in duplici uase per horas quatuor: deinde coletur cum pecia exprimēdo, & colatur iterum addantur cydonia: & fucus eorum quantitate supra scripta. Et soli per tantum tempus dimittantur, deinde in duplici uase, ut supra coquantur: deinde exprimantur. Et iterum tertio & cydonia & fucus colaturae addantur, et soli exponantur, & tempore dicto iterum dimittantur: postea ultime coquantur, & coletur & resecretur.

Si oleum de oliuis immaturis haberi non posset, loco ipsius accipi potest oleum completum, & ter uel quater lauari potest in aqua, & ita aliquoties ad uirtutem olei incompleti approximabitur. Modus lauandi positus est supra.

Descriptio. V.

OLEVM masticis Mesae secundum, quod in usu est confortans stomachum, neruos, hepatis, & iuncturas: & lenit apostemata dura, & sedat dolores.

℞. Olei rosa lib. i. masticis ʒ. iiii. uini boni ʒ. iiii. & in alio ʒ. viii. decoquantur omnia in duplici uase, uique ad consumptionem uini & resecretur.

Vinum idē quo fieri debet illud oleum debet esse uinum rubeum, eo quia magis hypitricum & confortatiuum est.

Descriptio. VI.

OLEVM liliorum compositum secundum Mesam in usu est: separatium dolorum quae sunt a frigiditate, & confert dolori pectoris, dolori maricuni, & frigiditati eius, & calescit renes, & uesciam, & confert colicā.

℞. Folii liliorum alborū ʒ. ix. masticis, calami aroma. costi, carpopalsami an. ʒ. i. garyophylli, cinnamomi ana. ʒ. s. croci ʒ. iiii. omnia grosso modo conterantur & proiciantur super eis lib. ii. aquae folii liliorum remotis & dimittatur per diem ac noctē: postea oia simul bulliant tribus uel quatuor ebullitionibus: deinde pone olei oliuarum uel sisamini super ea lib. ii. de tribus ebullitionibus iterum bulliant: deinde ponantur in uase uitreo cum foliis liliorum, & dimitte in sole per dies xl. deinde cola & administra. Itud oleum quod fit ex lilio celestis, aereos, & tūc illud est magis resolutiuum, calefactiuum, penetratiuum. Factum uero ex lilio albo est magis sedatiuum, & lenitiuum, & maturatiuum.

Descriptio. VII.

OLEVM costini Mesae: neruos & lacertos calefaciēs & aperiens oppilationes eorū, & cōfortiās oia mēbra neruosa, & cōfert lēti & hepatis, & confortat capillos prohibēs caniciem & faciens colorem & odorem corporis bonum.

℞. Costi amari ʒ. ii. casiae lignae ʒ. s. summitatum maioranae ʒ. viii. uinodori ferri li. ii. confrangant oia pēdicta, & infundantur in uino per noctes duas: deinde accipe olei sisamini lib. iiii. decoquantur oia in duplici uase per horas sex & resecretur.

Hic nota qd autor dicit costi amari, ex his uerbis posset qd credere qd sit illud costū rigū intelligas ex his dictis qd te nāstruit qd nō accipias de adulterato, sed de nālī qd amarū est, & quā

& cum his etiam nota quæ supra de costo tibi dixi.

Descriptio. VIII.

OLEVM vulpium Mel. & est medicamen nobile ultimum ad arthriticam & podagram & dolorē renū & dorsi. R. Vulpem integrā, cuius interiora sint euulsa, & pone in uase, & funde super ipsam aquæ fontium & aquæ maring an. kist. i. idest li. i. s. olei antiqui clari, kist. ii. s. idest lib. iii. & x. Et simul omnia decoquantur lento igne cum sale. §. iii. & coquantur usque ad aquæ consumptionem: deinde permuta in alio uase, & proice super ipsa, anethi, alhafe, i. thymum an. lib. i. & funde super ea aquæ dulcis decoctionis prædictarū herbarum lib. ii. & decoque sicut prius usque ad aquæ consumptionem, & carnis ab ossibus & neruis separationem: deinde colentur omnia fortiter exprimendo & referuetur.

De aqua niarina. Nā si illam habere non potes loco. eius apponas aquam bene salicam, & cum hoc q̄ bene salita sit iterum quantitate salis in receptis descriptam apponas. Aqua marina ante quartum diem putrefat & fæcet. Sed ad eam conseruandum per mensem ponatur fex miliceatur cū ea parum aquæ uitæ: aqua enim uitæ est bona conseruatric: eo quia resistit contra omnem putrefactionem. Et ultra hoc conseruat encausticum ne a magno frigore congeletur, ut sape ego expertus sum hoc incidenter.

Sal si simpliciter scribatur uel scriptum reperitur semper de usuali & communi intellectu.

Kist enim idem est q̄ lib. s. vel cotilz dūz. Et cotila est. §. ix. vt uolunt doctores.

Descriptio. IX.

OLEVM scorpionum fin Mel. q̄ lapidē in renibus & uescia frangit & expellit eū, & proprie in renibus, femore, & super collum uesciz inunctum & iniectum per uirgam. R. Aristolochiz rotun. gentianæ, cyperi, corticum radicis cappari, an. §. i. funde super ea grosso modo constricta, olei amygdalarum amararū Kist. i. idest lib. i. s. & pone in sole uiginti diebus stringendo orificium uasis: deinde proice super ea scorpiones x. v. & iterum stringe orificium uasis, & dimitte in sole per dies xxx. deinde coletur & reponatur.

Istud oleum quandoq̄ Mel. beneat absq̄ coctione illud facere, tamen ut uirtus istarum rerum in oleo mellis transeat laudare quod antequam soli exponerentur cum oleo ad ignem tribus uel quatuor ebullitionibus & plus bullirent, ea quia in eo sunt multa de decoctione multum sustinētia.

Descriptio. X.

OLEVM mirinum Mel. abstergium, resolutiuum, maturatiuum, & sedatiuum dolorum frigidorum, subiliatum, & maturatiuum materiem in pectore & pulmone existētiū, & confert doloribus iuncturarum, & lenit durities earū, & apostemata dura & scrophulas, & confert dolori & frigiditati matricis, & spasmō, & dolori auris, & fetori nariū. R. Radicū ireos, §. ii. floris eius, §. iii. aquæ decoctionis radicū eius lib. i. olei oliuarū li. ii. bulliat in duplici uase usque ad aquæ consumptionem: deinde cola, & permuta radices & flores, & aquæ decoctionis, & hoc bis fiat, deinde cola & referua.

Oleum illud est illud quod intrat in unguento arthaniz Mesue supra descripto.

Descriptio. XI.

OLEVM de cappariis magistrale: conueniens & appropriatum in duritiibus plenis.

R. Corticum radicū capparorum, §. i. feminis agni casti, scolopēdriz, cyperitamaricis, an. §. ii. rutæ, §. i. olei oliuarū lib. i. acetū optimi an. §. ii. misce, & confrangantur omnia grosso modo: & coquantur in duplici uase usque ad consumptionem uini & accende deinde colentur & reponere.

Multæ aliæ descriptiones huius olei reperiunt a doctoribus descriptæ, sed illa melior est, & longa experientia p̄bata.

Descriptio. XII.

OLEVM myrtillorum Ioannis de sancto Amando, isto machum, cor, & neruos confortans.

R. Myrtillorū li. i. confrangantur, uini optimi li. iii. olei cois li. ii. misce, & simul bulliant in duplici uase usque ad consumptionem uini, deinde colent. Et iterū myrtilli & uinū secundum eandem quantitatem cum dicto oleo ad coquendum po-

nantur & iterum tertio fiat: deinde coletur & referuetur.

In hoc oleo apponi debet uinū rubrum ut adiuuentur in stypticitate & melius sit. Non fit illud Mel. quia succus myrtillorū ad nos non portatur, q̄ si haberi posset modus faciendi est, sicut olei cydoniorum, ut supra ostensum est: quare &c.

Descriptio. XIII.

OLEVM Rosarū Mel. & est primum modus confortatiuum, resolutiuū cōueniēter, lenitiuū, & sedatiuū. Rude uero est extinctiuū inflammationi, & confortatiuum, & aggregatiuum, & phibitiuū carsiū. Et differt cōpletū a rudi i qm̄ materia cōpleti est oleū ex oliuis cōpletis, & solia rosarū cōpletā. Materia autē rudis est: ex oliuis quibus nondū accidit maturatio & ex foliis rosarum non completurum.

R. Olei oliuarum non cōpletæ maturitatis, uel olei oliuarū cōpletarum li. i. laetetur lautionibus pluribus cū aqua fontium, rosarū rubearum completarum recentium contusarū, §. iii. infundantur in præscripto oleo loto, & reconde in uase uitreo, & obtura os eius, & expone soli per dies. vii. dein de coq̄ in uase duplici p̄ horas tres deinde fac permutatiōnem rosarum recentū contusarū, premas fortiter manibus exprimendo, & soli exponas per dies septē: deinde coq̄ in duplici uase per horas tres: & iterū cola manibus exprimēdo, fac denuo, & tertio permutatiōnem rosarū, ut supra: & ultimo proice super eas aquæ infusionis rosarū, quā tradidimus in cap. de syrupo ex infusione rosarū li. i. & strige orificium uasis, & dimitte in sole per dies xl. deinde cola exprimendo: & abicias rosas, & iterum soli exponas, & per mitas usque quo aqua sit consumpta & referua.

Aqua infusionis q̄ intrat hoc oleo, sit quæadmodū tibi ostēdi supra tract. syruporum de infusione rosarū p̄ syrupo rosa.

Descriptio. XIIII.

OLEVM rosarum Mel. secundū habens uirtutem superioris, efficitur tamen aliquater solutiū uirtute succi. R. Succū rosarū, aquæ infusionis rosarum, an. lib. i. s. olei loti, ut supra lib. iii. foliorū rosarum contusarum lib. i. reconde in uase uitreo, & expone soli per dies septem sicut in anteriori diximus: deinde coquant in duplici uase per horas tres, postea colentur manibus exprimendo: deinde adde iterum superscriptam quantitatem rosarum, succi & infusionis, & facias ut supra ponendo in sole & decoquendo tempore dicto: deinde cola, ultimo uero oleum solum cum sicco rosarū & aqua infusionis earum in dosi præscripta recondantur in uase: & exponatur soli per dies xl. deinde referuetur.

Isto modo raro fit illud hoc modo oleum factum est solutiū & est illud de quo intelligit Auic. quando dixit. x. lib. capitulum de rossis, quod oleum rosarum solutiū uentrem.

Nota quod rosæ ex quibus fit oleum rosarum & syrupus rosatus &c. necessario colligende sunt in mense Aprilis uel Maii & in umbra exiccande, quæ exiccande sunt.

Descriptio. XV.

OLEVM camemil. Mel. benedictū, expertorum iuamentorū, sedatiuū dolorū, & resolutiuū, & est in eo phibitio cursum materię propter stypticitatem eius modicā, & p̄fortat neruos, & neruosa oīa, & confert doloribus eorum: R. Olei oliuarū cōpletæ maturitatis li. i. florum camemilæ §. iii. infundant in dicto oleo, & soli exponant per dies tres deinde in duplici uase coquant per horas tres: deinde colentur manibus cōprimendo, & hoc fiat ter semper flores p̄mutando: deinde ultimo adde dictam quantitatem florū aquæ infusionis, florum camemilæ li. i. & pone in uase uitreo, & obturetur orificiū uasis, & exponat soli p̄ dies xl. deinde cola manibus cōprimendo, & floris abicias, & colatura iterū soli exponatur, ut p̄mittat vsque quo aqua tota sit p̄sumpta.

Infusio florum camemil. fit eodem modo quo fit infusio rosarum accipiendo flores camemilæ loco rosarum, & e secundum eandem quantitatem et aquæ et florum.

Descriptio. XVI.

OLEVM uiolarum Mel. inflammationes sedans ubicunque sint, & lenit asperitates pectoris & pulmonis, & sedat apostemata calida, & pleuresim.

R. Olei oliuarum immaturarum lib. i. uiolarum, §. iii. scilicet uiridium contusarū, reponantur in uase uitreo, et soli

Lumi. apoth.

V 3

exponantur per dies.vii.deinde bulliant in duplici uase per horas tres:postea colentur manibus cōprimendo, & hoc fiat bis semper nouas uiolas mutando,foli exponēdo,& decoquēdo ut supra.Vltimo uero colaturæ adde uiolas nouas quātitatē dictā,& super his adde aq̄ infusionis oliarum lib.i.& stringe orificium uasis.&c.expone foli per dies xl.deinde cola manibus exprimendo,& iterū in dicto uase exponatur, dimittatur & permittatur usque uia aqua consumpta sic.

Infusio oliarū debet fieri ut supra olēdi in syrupo uiola to ex infusione. Accipitur igit de illa aqua & fit istud olēū.

Descriptio. XVII.

OLEVM de anethō Mef.fedatiuum dolorum, resolutiuum,prouocatiuum sudoris, confersens rigori febris, inuētū spina, prouocans somnum, & confert dolori capitis.

℞. Olei oliarum lib.ii.florum anethi.ʒ.iiii. reponantur in uase uitreo,& decoquantur ut in superiore tibi dixi ter per mutando flores,& ter decoquendo ut supra:ultimo adde aq̄ infusionis oliarū lib.i.& foli exponas per tempus tibi in superiori dictum, & omnia facias de isto, quemadmodum de alio superiori monstrauimus.

Modus infusionis florū anethi est ut infuso rosarū & oliarū nec plus nec minus, nisi quod loco oliarū uel rosarū ponitur anethum.

Descriptio. XVI II.

OLEVM liliorum simplex Mesue habens uirtutem compositi superioris,est enim fortioris uirtutis & operationis quam oleum camamillinum.

℞. Olei oliarum lib.ii.florum liliorum alborum.ʒ.iiii. reponantur in uase uitreo,& foli exponantur,& modo eo facias ac de decoctione & de permutatione florū & coctione & de aqua infusionis:quemadmodum fecisti in oleo camamillino & anethino, nec addendo, nec diminuēdo, præter quam oportet quod citrinatis eorum tota abiciatur.

Infusionis modus florū liliorū alborū est ut infuso rosarū & oliarū accipiedo duntaxat folia florū liliorum alborum.

Descriptio. XIX.

OLEVM sambucinum Mesue leniens & mundificans cutim,& confert doloribus neruorum, & confortat eos. ℞. Olei li.florum sambuci in mense Maii collecti.ʒ.iiii. facias etiam de isto, eo modo quo fit oleum camamillinum, anethinum,liliorum in omnibus tam de permutatione quā de decoctione & foli expositione & infusionis additione.

Modus infusionis florū sambuci fit ut infuso præscriptorum florū ut rosarū & oliarū &c.

Insup nota q̄ oēs p̄scripti flores debēt ēē uirides, & de ipsis uiridib⁹ ē intelligēdū. Iō semel in anno fieri pūt & nō plus.

Descriptio. XX.

OLEVM rutæ Mesrenes uesciam,& matricem calefaciens & confert doloribus eorum,& dolori laterum.

℞. Foliorū rutæ,succi earum an.ʒ.iiii.olei oliarū in cōpletarum li.iiii. tria hæc reponant in uase uitreo:stricti orificii, & obturei eo eius,& foli per dies xv.exponent:deinde per horas quatuor in duplici uase coquantur:postea colent fortiter manibus cōprimendo,& secundo & tertio hoc reitetur: demum decoquatur,per tempus ut supra feruetur.

De oleo nota q̄ aliud est nouum,aliud est uetus,illud qđ est nouū,calefacit calefactione tēpera & humēctat: uetus uero est calidum magis:magisq̄ resolubile. Igitur cū olea temperata facere uis uel parum calida: oleum nouum accipere debes. Cum uero calida, tunc uetus accipere potes.

Et hic nota quod omne oleum cum quo hæc olea fiunt debet carere omni malo sapore.

Descriptio. XXI.

OLEVM mentæ magistralē, stomacho debili frigido & nauicanti miro modo subueniens, ipsum resocillans,& omnem eius iniuriā detergens. Nauseam & uomitum sedans, digestionem confortans,& appetitum procurans, soluens scilicet osium & duritiem apostematū.

℞. Foliorum mentæ,succi eius an.ʒ.iiii.olei oliarū cōpletarum lib.iiii. Tria hæc reponantur in uase uitreo, & foli exponantur per dies xv. os uasis obturādo: deinde bulliant p̄ quatuor horas, deinde colentur manibus fortiter expri-

nendo, & hoc idem ter reiteratur semper modo prædicto faciendo deinde cola, & reserua.

Istud oleum a Mesue non describitur, sed fice communiter ab omnibus practicantibus fieri solet.

Descriptio. XX II.

OLEVM de abinthio magistrale, calefaciens & cōfortans mēbra frigida, corroborans stomachum & excitans appetitum mortuū oppilationes aperiens, & morbos oppilationum a causa frigida curans, uermes interficiens, & educens, si uunguntur & emplastris contra ipsos apponatur.

℞. Summitatum abinthii,succi eius an.ʒ.iiii. olei oliarū lib.iiii. & de his facias prout superius tibi monstrauimus, & de decoctione, permutatione, & expositione ad solem.

Oleū qđq̄ fit ex oliis cōplete maturis, & illud oleū dī cōpletū. Aliqñ fit ex oliis immaturis, & illud dicitur, rude uel omphaciū, & magis stipticū est,et frigidum cōplete.

Descriptio. XX III.

OLEVM saluæ magistrale. Alteratiuum male complexionis frigidæ, confersens membris paralyticatis, & mitigans morsum uenenosum strigoni marini.

℞. Foliorum saluæ,succi eius an.ʒ.iiii. olei oliarum li. iii. & facias prout in oleo rutæ mentæ, & abinthio tibi ostensum est de decoctione & expositione ad solem, & trina permutatione succi & herbæ &c.

Mō hoc potes facere ex oib⁹ herbis oleū, & illud oleū habebit uirtutē illius herbæ. Sed fieri debet olea ex herbis i mense Maii ut pluribus, eo q̄ tunc maior uirtute uigent.

Descriptio. XX IIII.

OLEVM de floribus papaueris, Mesue, sedans dolores calidos, & faciens, principaliter ad somnum prouocandum, quando causa uigilium est mala complexio calida: ab ascensione uaporum auctorum ad caput si ex ipso inungantur tempora. nares aures, & tota frons.

℞. Florū soliorū, & capitum papaueris uiridum contusorum.ʒ.iiii.olei oliarum incōpleti lib. i. reponantur duo hæc in uase uitreo, & obturei eo uasis, & foli exponat per dies septem, deinde bulliant in duplici uase per horas tres: postea colentur manibus fortiter exprimēdo, & hoc fiat bis p̄ noua folia, capita, & flores in nouādo, istando: ad solem & bulliādo ad ignem ut supra. Tercio uero colaturæ adde supra scriptā quantitātē soliorū florū, etc. contusorum ut supra. Et his addas aq̄ infusionis papaueris libram i. et stringe orificium uasis et expose foli per dies xl. deinde cola manibus exprimendo, & iterum in dicto uase reponatur, et foli exponant, et ibi permittatur vsq̄ ad consumptionē aq̄.

Istud oleum fieri etiam potest ex solo semine per expressionem, ut fit oleum amygdalarum et seminum.

Infusio papaueris fit ut infusio oliarum, excepto quod in illo solum flores accipimus: in isto uero flores, folia, et capita omnū.ʒ.iiii. et cōfranguntur in reliquis fit ut in illa.

Descriptio. XX V.

OLEVM cucurbitæ Mes. alteratiuum malæ cōplexionis calidæ excessiue: unde conuenit superflue caliditati renū, et quasi effe cōsiliū uirtutis et operationis cum ol. uiuo.

℞. Succī rursus tenerrimæ cucurbitæ, florū eius an.ʒ.iiii.olei oliarum incompleti lib. iii. tria hæc reponantur in uase uitreo, et facias prout ostendi tibi in oleo mentæ et abinthii tam de decoctione, quā de expositione ad solem et permutatione succi et rursus etc.

Olea omnia frigida perfectiora fiunt cum oleo incompleto, quā cum completo, et si pur cum completo fiunt, lauari debent cum aqua fontis bis. uel ter. Calida uero olea fieri debent cum oleo completo absque lotionē.

Potest etiam fieri oleo ex semine cucurbitæ per expressionem quemadmodum fiunt alia omnia ex seminibus, et erit superiori temperatior, et naturæ magis conformis.

Descriptio. XX VI.

OLEVM de nenuphare Mesue conueniens quasi cum oleo de papauere, non effe tamen tantæ stupefactionis, sæpe tamen cum quærimus somnum prouocare permiscemus ad inuicem oleum, hoc cum oleo de papauere, est etiam alteratiuum malæ complexionis calidæ ubicubi reperitur.

℞. Olei

R. Olei oliarum immaturarum lib. i. florum nenupha. uiridiū contusorū ꝑ. iiii. reponatur in vase vitreo, & facias prout de oleo uiolato tibi dixi, & de positione ad solem, & de coctione, & de permutacione, & de additione infusiois.

Infusio nenupharis fit: sicut infusio uiolarum vel rosarum nec plus nec minus.

Ex omnibus floribus fieri potest oleum & habet virtutē florum, & fit ut de floribus uiolarum tibi monstravi, sed accipere debent cum sunt completæ maturitatis, & cum non deperderunt naturalem suum colorem.

Descriptio. XXVII.

O L E V M amygdalarum dulcium Mesleniens asperitaret gutturis, & pulmonis & partium omnium exteriorum, & omnes durities & siccitates membrorum, & iuncturarū, & prodest hec tics, & impinguat & augmentat sperma, & iniectionem confert ardori unius & uiscis.

R. Amygdalarū quantitatē quā uolueris: cōtere eas bene, uel melle eas ad molā, & ipsīs bene molitis reponē ꝑ. patella sub qua fit ignis clarus, & eas in dicta patella resolue manibus, vsquequo dicta pasta fit bene calidā: deinde dicta pasta in uoluitur in tela postea in expressorio ponatur, & bene cōprimatur, & iter sub eo aliquatū, deinde iterū ad molam ponas ad remolendū, & postea in patella iterū ad bene calefaciendū ponatur demū post calefactionē peciis inuoluatur, & iterum exprimat, & tunc habebis totum oleum.

Alios modos ponit Mesue, sed ille magis vitatus est. Sunt q. sub. ille corticē ab amygdala remouēt anteq. oleū faciāt, eaq. mādāt ab impunditiā, & modus iste bonus est, & oleū magis pfectum. Sed inertia detenti pauci sunt qui hoc faciant. Modo igitur scripto de oleo amygdalarum sūt omnia olea per quæ expressioem sunt ut de nucleis persi corum, de chrysomillis, & oleo amygdalarum amararum.

Descriptio. XXVIII.

O L E V M laurini magistrale, conueniens oī male cōplexioni frigide materiali, cōferēs doloribus hepatis, mēicra niz, & neruorū, & iuncturarū factis a cā frigida, & confers dolori stomachi, colico, renum, matricis, splenis, & viscērum, & cum simili causa uel uenositate grossa factis.

R. Baccarum lauri quantitatē quā uolueris, mundenat superior cortice, & macinentur bene ad macinam oleario rum, deinde calefiat illa pasta in cacabo, semper in manibus agitādo sub quo fit ignis, deinde inuoluatur in pecia, & sub expressorio ponatur, & bene prematur, & iterato remacinetur, & calefiat, & exprimat, & habebis oleum.

Alio modo docet facere Mesue hoc oleum bulliendi in aqua dictæ baccarū, & pinguedo super natans pro ipso oleo accipitur, uide ab eo, sed modus superior est melior.

Ex multis seminibus, & ex multis nucleis fructuū olea fieri possunt, sed quia in usu nō sunt sermone nō feci. Olea nuncum amygdalarū amararum, auellana, chrysomilla, de persicis, de nucē inda, de cerasis, de granis citri, de philicis & pīneis de lino, de sem. p. pa. de sem. lactu. de sem. cucurbi. de semine feno grece, fieri possunt, & sunt per expressioem mō quo fiunt, olea amygdalarum uel dulcium uel amararum.

Descriptio. XXIX.

O L E V M amygdal. magistrale hīs virtutem olei amygdalarum superius descripsi, immo in omnibus excellentius.

R. Amygdalarum exortica. lib. iiii. uel lib. i. si uis excipere bene ab aqua in bacilone sub quo fit ignis carbonū, deinde bene pistent, post bonam contusionē ponatur in bacilone dicto & bene calefiat, manibus semp ducēdo, deinde recol ligantur in unā massā, & si teneri per se nō possent, parum aque uiolarū aspergatur vsquequo de eis fieri aliquid possit ad modū pastis nī. semper tibi manibus ducēdo, postea inclinat bacilone ad unam pōnem sub quo remoueat ignis massā dictam manibus cōprimēs, quēdammodum mulieres solent facere cum pannos suos in lūciūm, & post aliqualem frictionem cum sapone illos exprimūt, & hoc sape facias. Et sic extrahes pro omni lib. i. amygdalarum ꝑ. iiii. olei, hoc ego sate fieri feci pro illiutissima N. quōdam dñā Brixie.

Oleū amygdalarū si simpliciter scriptū reperitur & absq. de terminatione, semp de oleo amygdal. dul. est intelligēdū.

Descriptio. XXX.

O L E V M tartari magistrale, & est quo mulieres liniunt facies suas, abstergit enim faciem mirabiliter.

R. Tartari quantitatē quā uolueris ponatur super prunas, & tūc permittatur q. torū inflammetur & rubeat, postea ponatur in sacculo lino, & pone dictū sacculū in loco humido sicut penā, & sub sacculo ponat uel ampullā uel cyathus, quod n. exiet ab oleum tartari ab omnibus solet appellari.

Hoc oleū pot fieri tā de tartaro albo. f. vini albi quā vini rubei. Et sunt qui alio mō faciūt. f. puluerizādo tartarū subtiliter, deinde a sacculo telæ reponūt, & ipsum sacculū, & tartarū rōrāt aceto, deinde sub prunis ponūt, & relinquit vsq. quo nigrescit, deinde extrahunt illud a sacculo, & iterū puluerizāt: & aceto aspgūt, & sub prunis ponūt, & post ipsi nigredinē sacculū accipiūt, & ip. n. ponūt liquor erit vsq. supra.

Quing. modis habet diuersitas olea, quā ad n. olea sūt, per expressioem, ut oliarū, & amygdalarum, quēdam per impressioem, ut oleum camemille, & de abstinio, quēdam per resolutionem, ut oleum ouorū, & frumenti, quā dā per sublimationem, ut oleum philosophorum, uel de lateribus, quēdam uero per emanationem, ut oleum balsami.

Et iterum oleorum triplex est diuersitas, quēdam n. sunt frigida, ut rosarum uiolarum, quēdam temperata, ut amygdalarum dul. recens eo, quia elapso mense rancescit, & sic sua temperies deperditur, & calida fit, ideo dicti recens. Et quēdam calida, ut rutaceum, colinum, uulpinum.

Olea frigida quāto recētiōra tāto meliora, cū trāsūt tres menses virtus ipsorū perdit, & calida sunt. Temperata uero quae ad sex menses sunt in sua bonitate. Calida uero seu calefacientia quanto antiquiora tanto meliora. Et sic habes distinctionem oleorum quæ fuit undecima in ordine.

Incipit distinctio XII. quæ est de artificio ceræ. Et continet sex modos præparationis. Quarum prima est.

C E R A enim quid sit, & quō a melle separatur quō fiat a doctioribus, lōgo & clario sermone tractatū est, ita ut et mulieres, & rustici magistri effectū sint. Igitur de ipsius artificio scribere restabat. Acera igitur rubea faciā initiū.

Modus primus. Ad faciendum ceram rubeam.

R. Ceræ lib. i. terebinthine subtilis ꝑ. iiii. in q. sita, in hyeme. ꝑ. iiii. cinaprii super lapidem pictorum bene triti, olei oliarum an. ꝑ. i. liquefiat cera, & terebinthina ad ignem, demum remoueat, & post aliqualem in frigidationem addatur oleū, & cinaprium beneq. simul misceatur, & referetur.

Oleum enim cum cera ponitur, ut ceram simul tenere faciat quæ a cinaprio separatur, & frangibilis redditur, ac ut cinaprium melius conteratur.

Sut q. loco cinaprii ad faciēdū rubeā cerā ponūt miniū, & fieri potest, sed triplū ponit de minio, ut ꝑ. oī lib. ceræ, miniū bene triti cum oleo ut supra ꝑ. iiii. uel duas a dminis addas.

Modus. ii. Ad faciendum ceram uiridem.

R. Ceræ lib. i. uiridis æris triti ut supra, olei oliarum an. ꝑ. i. liquefiat cera, & post aliqualem in frigidationem addatur uiride æs, & oleum, & bene misceatur, & uiridis fiet.

Si dictā cerā tenacē facere uis addē quantitatē terebinthina supra scriptā in cera rubea. Terebinthina. n. in cera ponit ut ꝑ. ipsam tenax reddat. Ac q. aliq. de ipsa sunt imagines, ut facilius a formis in aqua madefactis separaretur. quare & c.

Modus. iii. Ad faciendum ceram nigram.

R. Ceræ lib. i. terre trite: ut supra, olei oliarum an. ꝑ. i. liquefiat cera, & post aliqualem in frigidationem addatur terra nigra, & oleum, & referat.

Si dictam ceram nigram tenacem facere uis, addas quantitatē terebinthina supra tibi notatam.

Modus. iiii. Ad faciendum seu dealbandum ceram.

R. Ceræ quantitatē quā uolueris, aque claræ partes duas. Misceatur uero hæc, & calefiat aqua ad ignem clarū vsquequo cera sit liquefacta, deinde paululū permittatur quiescere do nec tota cera nater super faciē aque, deinde accipe uis aliquod uitreatum, cuius pars exterior fit lenis, & madefac eia in aqua frigida, deinde infundat fere medietas eius in cera

quanto ab alto plus proiciatur tanto melius, nec permittent
ez sunt quæ super eas cadere: illæ enim opus destruent.

Modus.vii. Ad faciendum anisos.

Æ. Semina anisorū bene mundata li.ii. & super ea proiice zuc-
charū leuis coctionis in principio, & bene manibus ducant
p bacilonū uel quoque fere sint cooperta beneq; exiccetur
ad oēm manū zucchari, & hoc cōcūter usq; in finē, si soli
dus adifos facere vis. Si uero crispis, postquā cooperta erunt
da zuccharū cū capite forato, & ab alto proiice, & sic fortis
cocturæ, deinde duc bacilonum, ut in coriandris cū ispis tibi
dixi, & hoc facias vsq; ad debitam ipsorum magnitudinem.

Anisi quanto paruiores, tanto pulchriores: & quanto du-
riores, tanto laudabiliōres: duri. n. sunt, & non solum anisi,
sed & cæteræ alię coctiones si bene siccantur ad omnem
zucchari additionem, quare bene hoc notetur.

Modus.viii. Ad faciendum pineas.

Æ. Pinearū bene mundatarū quātitate quā uolueris, & sup
eas, pice zucch. cū capite forato bonæ cocturæ a principio
usq; ad finē, & duc bacilonū put in coriandris crispis tibi mō
strauī. Si uero solidos facere uis, facias put de amygdalis tibi
mostrauī, & de picectione zucchari, & ductione bacilone.

Nota q; hæc coctio parum durat, eo quia rancescunt
pineæ, & antequam conficiantur est aduertendum ne ranci
da fiat cognoscitur autem quia sunt nigre, & mali saporis,
purgandæ sunt cum fursure, ut supra tibi ostendi.

Nota insuper, q; sunt qui in prima exhibitione zucchari
ponunt albumen oui bene conuassatum cum zuccharo nō
multum calido, ne albumen coqueretur, hoc faciūt, eo quia
cum difficultate zuccharum eis adhæret propter oleaginei
tatem quæ in eis est, & hic modus non utitur.

Modus.ix. Ad faciendum auellanas.

Æ. Auellandarū quātitate q; uolueris, & facias put de amygd
dalis tibi monstrauī, & crispas, & solidas faciendo seruādo
modum in istis, sicut de amygdalis tibi dedi. Auellanz ante-
quam conficiantur debet bene duci in bacillono, & calefie-
ri ad hoc, q; subtilis cortex eis adhærens remouetur. Si.n.
permittetur, zucchari facilius ab eis remoueretur &c.

Modus.x. Ad faciendum muscardinos.

Æ. Cinnamomi subtilis, & ele. & bene puluerizati 3.ii. musci
optimi dissoluti cum paucissima aqua ro. 3. s. misce duo
hæc in bacilono, & super eis proiice zuccharum bene co-
ctum beneq; & incessanter manibus zuccharum, & species
ducantur, & bene exiccetur, & totiens hoc fiat, q; ad grossi-
tudinem semi. papau. ueniant, in fine dando per duas manus
zuccharum leuis coctionis ut rotundi fiant.

Muscardinī nisi cū difficultate corpus accipiūt. Sed sagax
apothecarius, & sollicitus immiscendo manibus zuccharū,
& species cito eos format. post uero duas, uel tres manus
zucchari cribellandi sunt, aquam cribellatione exeunt mus-
cardinī grossitudinis pūre acus, & puluis referetur, & alii
qui iam corpus sumplerunt expleantur. Feci ego semel fa-
cere ab uno fanulo bene docto, & præsens fleti, & illos ci-
to, & optime perfecit. Sed ante perfectionē dimisit pellem
manus ad bacilonum, & pauca quæ remansit deciccat erat.

Insuper nota, q; qui picipit oēs coctiones in bacilono
sunt, debet esse lub eo ignis carbonum accensus sine fumo,
non autem lignorū, ut iam a quibudam fatuis uidē facere.

Modus.xi. Ad faciendum pignocatam.

Æ. Zucchari clarificati, & coctionis non perfectæ lib.i. Stā-
gezetur optime cū baculo amota captia ab igne, & post lon-
gam eius ductionem addatur picea mundæ 3.iii. Er simul
misceantur, deinde zuccharum perfecte coquatur, & si du-
ra coctio, deinde in morsellis incidatur.

Pignocata si longo tempore conficiari debet apponen-
da est quantitas præscripta pinearum. Si uero paucō tempo-
re apponi potest lib.s. pinearum pro omni lib.i. zucchari.

Modus.xii. Ad faciendum morsellatam albam.

Æ. Zucchari clarificati, & coctionis nō perfectæ lib.i. Strangeze-
tur optime cū baculo, & post lōgā eius ductionē addant zin-
gib. minutim inciti 3.ii. deinde zuccharū pfecte coquat, & i
morsellis incidat. Sunt autē multī q; maiore q;ritate zingib.
lib.i. zucchari ponunt, ut fortior sitis, & ab oibus uis-

tata dosis est 3.ii. zingiberis pro omni lib.i. zucchari.

Modus.xiii. Zingiberata.

Æ. Zingib. mudi & ele. 3.s. cinnam. fini 3.ii. macis garyo
phyllo. an. 3.ii. puluerizetur hæc subtiliter, & adde zucchari
clarificati, & bene cocti lib.ii. & fiat coctio in morsellis.

Coctio hæc est multū delectabilis gustui, sed nō est al-
ba, & fit i multis bonis urbis. Sed in hac nra urbe nō ē i usu.

Modus.xiiii. Ad faciendū fructū, & aialia oia ex zuccharo.

Æ. Zucchari quātitate quā uolueris, & pulueriza, deinde post
subtile puluerizationē impastet cū albuminibus ouorū quā-
titate sufficiēt in tū q; formā pastæ habeat, deinde ungant
formæ cū oleo amygdalarū dul. & de dicta pastæ formæ im-
pleant, postea simul cōprimantur, & sic erūt aialia, uel fructū
facti, & sic oia fieri pnt dūmō formæ habeat, deinde ponant
in stupha ad siccandum, demum pingatur fm colore suum.

Sunt quidam alii qui impastant zuccharum cum güm-
ma dragacati facta in aqua ros. & qui aspergūt formas farinæ,
& hoc fieri potest. sed superior modus melior est.

Modus.xv. Ad faciendum penidos.

Æ. Zucchari lib.ii. infundatur in aqua p noctē, deinde coquā-
tur cū illa aqua absq; aliqua alia clarificatione, prius tū colē-
tur, & sit coctio dura. postquā coctionē piciantur sup mar-
mor inunctū oleo amygd. dul. deinde ducant ad ferrū ante-
quā infrigidetur, & quāto longiori tpe ducuntur, tātō albio-
res sunt, deinde forpice incidantur, & in stupha referentur.

Sunt autē qui ponūt po lib.i. zucchari 3.s. amydi pulue-
rizati post mediam zucchari coctionem uel in fine, & hoc
ut zuccharum non candeat, & modus ille non utitur.

In aqua aut zuccharum ponit, ut viscositate acquirat, quæ
mediare possit ad ferrū trahi, quæ trahit oia albi penidi facti.

Zuccharū quāto pfectius tātō longiori tpe in aqua pmit-
tatur isufum. Quāto uero grossum magis, ac rubeū, tātō mi-
nori tpe relinquitū est in aqua, & hoc not. zuccharū. n. gro-
sum, & rubeū, multū de uiscositate habet, id parū in aqua p-
mittatur. Album uero paucum hēt, humiditatem, ideo ad il-
lam acquirēda quæ necessaria est ad hoc q; trahi ad ferrum
possit, in aqua infusum stare debet, & longo tempore.

Zuccharum in omnibus supascriptis coctionibus cla-
rificari debet. In ista autem non clarificatur, sed tantummo-
do colatur, ut a superfluis, & immunditiis mundeat.

Modus.xvi. Ad faciendum manuschristi rosatum.

Æ. Zucchari clarificati, & ab aqua consumpti lib.i. aquæ ros.
lib.s. misce, & bulliant duo simul usq; ad aquæ consumptio-
nem, & zucchari totiem coctionem, deinde, proiice super
marmor aspersum aqua subtili & resera.

Sunt qui unguent marmor ex oleo amygdalarum loco fa-
rinæ. Nec hic modus mihi placet.

Sciās insup q; zuccharū qui quo fit manuschristi nō multū stā-
gezetur. longa. n. stāgezetur phibet zuccharū cādecere etc.

Modus.xvii. Ad faciendum manuschristi uiolatum.

Æ. Zucchari clarificati, & ab aqua consumpti lib.i. aquæ florū
uiolarum lib.s. misce, & fiat, ut præscripto tibi monstrauī.

Nota insup, q; apothecarii nostri tps solū 3.iii. aquæ flo-
rū uiolarū & rosarum pro li. i. zucchari ponunt ad faciendū
tam manuschristi uiolatū quā rosatū, & tunc pauca uirtus in
eo est, ideo quātitas illa apponenda est supra a me dēscripta.

Potest etiam fieri manuschristi buglossatum & boragin-
atum, & fiant ut præscripti permutando solum aqua & loco
aquæ rosarum ponatur aqua florum buglossæ, uel florum bo-
raginis cum quantitate zucchari præscripta.

Modus.xviii. Ad faciendum manuschristi perlarum.

Æ. Zucchari clarificati, & ab aqua consumpti lib.i. aquæ ro-
sarum lib.s. misce hæc duo, & simul bulliant usq; ad aquæ con-
sumptionem & zucchari duram coctionem. In fine uero ad-
datur margaritarum subtilissime puluerizarum 3.s. & pro-
iciatur super marmor aspersum ut supra & referetur.

Sunt autē quidam apothecarii, immo fere oēs qui solū 3.
i. margaritarū p oī. li. zuc. ponunt, & hoc pp ipiarum penu-
riā, ac emptores nolūt soluere & male, nulla. n. minor qua-
ritas apponenda est quam 3.s. pro omni lib. i. zucchari.

Modus.xix. Ad faciendum manuschristi cum fragmentis.
Æ. Zucchari clarificati ab aqua consumpti lib.i. aquæ rosæ lib.

s. bulliant duo hæc simul usq; ad consumptionē aq; & durā coctionem zuchari deinde in fine addant fragmentorum pscioꝝ oꝝium subtilissime contritorū. 3. iiii. margaritæ. 3. i. misce & piciatur super marmor, & referetur in stupha.

Modus. xx. Ad faciendum suoniū.

℞. Zuchari clarificati, & ab aqua cōsumpti li. i. aquæ ros. 3. iiii. amydi puluerizati. 3. iiii. bulliāt oia simul usq; ad aquæ cōsumptionē, & zuchari durā coctionē, deinde in fine addantur zingi. subtilissime incisi. 3. ii. et proiciatur sup marmor, & derur ei forma manuſcripti, sed latior, & maior sit.

Hæc pfectio fit apud curiales et dños Venetos, et his i lo eis multū i uſu ē. Multiq; delectabilis ē gultui ac nutritiua.

Modus. xxi. Ad dandum colorem rubrum zucharo.

℞. Braxili subtilissime raspati. 3. i. aluminis rochæ. 3. s. aq. 3. vi. infundant duo hæc pecia ligata in dicta aq; p dies sex. de inde caleſcit ad ignē leuiter, et cū aqua zuchari coquatur.

Modus. xxii. Ad faciendum colorem uiridem zucharo.

℞. Succum caulium, uel succum bletæ, uel succum foliorum ireos, & cum altero eorum zucharam coquatur.

Modus. xxiii. Ad faciendum colorem celeſtium, uel nigrum zucharam.

℞. Indici, gūmi, dragacathi, an. 3. s. vini nigri. 3. vi. ligent in pecia duo hæc subtiliter puluerizata, & infundant i uino per dies sex: deinde cum dicto uino zucharo coquantur, prius tamen ad ignem cum dictis rebus aliquid caleſcit.

Modus. xxiiii. Ad faciendum colorem glaucum.

℞. Croci. 3. ii. aquæ lib. i. infundant in ea p diem & noctē, deinde aliquid caleſcit ſimul, poſtea coletur, & cum dicta aqua zucharam coquatur, uel accipe ſuccum ſtorum na ſcientium in paludibus qui ſunt glauci, & eſt opinio quorūdam, quōd ſint flores, acori, & cum eo coque zucharam, eſt. n. glaucum pulcherrimum, non tamen ita boni odoris.

Modus. xxv. Ad faciendum colorem turcicum.

℞. Indici. 3. ii. ceruſæ. 3. s. calcis uiuæ. 3. i. puluerizet, & in pecia ligetur, ac infundat i li. i. aq; p diē & noctē, deinde ſit ad ignē aliquat; caleſcit, et cū dicta aq; zuchari coquat.

Modus. xxvi. Ad faciendum colorem morellum.

℞. Succi ſtorū ireos, & cum eo zuchari coquat, & ſi illo tepore non reperit, accipe M. i. incisionū corii morelli ex quo ſunt pile luſoria, & burſæ, & pone in aqua dum incipit bullire, & permittatur bullire tribus, uel quatuor ebullitionib; deinde coletur aqua ab illis incisionibus, & cum dicta aqua coquatur zucharam, & ſic potes facere de rubeis incisionibus ſi rubrum colorem facere uis abſq; braxili.

Modus. xxvii. Ad faciendum marzapannum.

℞. Amygd. dul. mundata, & subtiliter cōtriturum li. s. zuchari bene etiam puluerizati, deinde iterum cum amygdalis bene commixti lib. i. aquæ ro. aũ. q. ſ. & fiat paſta quæ extendatur ſuper ubiatas. & in forno coquatur.

Sunt autem qui non ponunt niſi. 3. iiii. amygdalarum pro omni lib. i. zuchari quidam plus, & quidam minus, & hoc fieri poteſt ad placitum ſumentis ſeu comedentis.

Fiunt aliqui ſine ubiatis marzapani hoc modo: facta paſta extendatur ſuper incifſorium zucharo aſperſum, & in tegula ſine igne ponatur, & ſupraponatur tellum cum igne, et poſt coctionem ſuperioris partis reuolatur, & ita fiat, & tunc non cognoscitur pars ſuperior ab inferiori.

Etiā ſūt marzapani, ſi proiciant ſuper marmor, ut manuſcripti, & hoc mō ſunt, coquantur zuchari ac ſi manuſcripti facere uelles, & in eo piciatur amygdalæ ultimo cōtrite, & bene cum zucharo miſceatur, deinde iterū zucharam coquantur, poſtmodū ſuper marmor farina aſperſum proiciantur, ſed primus & ſecundus modus melior eſt.

Modus. xxviii. Ad faciendum zucharam roſatum.

℞. Summitates ſtorum roſarum rubearum incompletę maturitatis. 3. iiii. permittantur poſt earum collectionem ſalcē p diem, deinde in lapideo uafe ultimate cōterantur, poſtea ad de eis zuchari lib. i. & bene piſtado miſceatur: deinde re ponantur in uafe uitreato, & cooperiatur charta, demū ſoli exponatur & per mēſe tres permittatur, oſi id ipſum miſceudo, deinde remoueat, & referetur, & hoc mō ſit zucharam, uiolatum, bugloſiatū, et boraginātū permutando ſolū

flores, & in reliquis præſcriptis modum ſeruandus eſt.

Noca, inſuper, q; de floribus pſcriptis ſolū ſummitas accipienda eſt alia uero pars abicienda, quia nimis dura. Et ſila illa quæ in floribus boraginis reperiuntur abicienda ſunt.

Modus. xix. Ad faciendam codognatam.

℞. Poma cydonia a ſuperiori cortice & ab interiori aia mū data, & pignē cū pauco uino i paſta reducta li. xii. zuchari clarificati, & ab aqua cōſumpti li. viii. miſce & coquantur oia ſimul, ſemp agitando donec cocta ſint, & in ſcatulis reſeruet. Hæc. n. eſt uera doſis zuchari q̄ in codognata apponenda eſt. alii ponūt aqualē ſitātē zuchari, & paſtæ, nec mod⁹ iſte laudat. Paſta igit dicta anteq; cū ea zuchari miſceat ſtaminaā ē cū bacili forato ad hoc q; ipſa ſubtiliſiſi.

Semperque ducenda eſt cum baculo dum ad ignem eſt ad decoquendum. Ipſius autem coctio cognoscutur p diſſa tota a bacilano ducendo ſe leuat, nec ab igne remouenda eſt niſi ipſa ſeparetur a bacilano, quia tunc eſt ſignum cocturę, et hoc idem intelligas de amarenata.

Modus. xxx. Ad faciendam amarenatam.

℞. Amarenas, non dulce, & cum pauco uino ad bulliendum pone. poſt uero crepaturam earū coletur a ſucco fuco, deinde manibus fricando tranſeant per bacilonum foratum, et exiet pulpa, & arili ſeu nuclei, & cortices remanebunt. Accipe igitur de dicta paſta li. xii. zuch. clarificati, & ab aqua cōſumpti li. viii. miſce, & bulliāt ſimul ſemper cū baculo agitando, donec a bacilano leuēt, & reſeruentur.

Nota q; hoc mō ſit coſectio delectabilis ſeu cornalina ac cipiendi cornalos, & faciēdo, nō de amarenata ſupra monſtraui, & de bullitione cum uino, & colatura, & poſitione zuchari. Eſt. n. coſectio delectabilis multum ac reſtrictiua.

Modus. xxvi. Ad faciendum zelem amarenatum.

℞. Succū pſdicti amarenarū li. viii. zuch. clarificati, & ab aq; cōſumpti li. ii. miſce & bulliāt uſq; ad cōgelationē, ſemp cū baculo ducēdo, et reſeruet. Eſt. n. uſilis ad ſtitem extingue dā. et ſi q; loco ſaporis aliqd uti uellet appetitū incitat &c.

Sunt q; hoc idē faciūt de ſuccis cydoniorū, & decoquūt illū ad zalcæ formā alii uero ad ſyrupi formā, et ueroq; mō fieti pōt, & in multis ægritudinibus ualet. Et hic ſinis poni tertiodecim diſtioni quo ſuit de artificio zuchari &c.

Incipit X I I I I. diſtinctio quæ eſt de decoctione medicinarum. Et continet partes tres.

P R I M A eſt de medicinis quæ multum ſuſtinent de decoctione. Secunda eſt de medicinis quæ parum ſuſtinent de decoctione. Tertia eſt de medicinis quæ modicam ſuſtinent coctionem.

Hæc diſtō nō minus utilis eſt quā necceſſaria. Niſi. n. me dicinæ debito modo coquantur, quæ cōpoſitū faciūt, ſane uirtus cōpoſiti a doctoribus limitata nō reſultabit. igit ut hunc errorem amoueam diſtinctionem hanc annotari, in qua & uniuerſalem & particularem doctrinam comperies.

M E D I C I N A E quæ multū ſuſtinent de decoctione ſūt iſtæ ariſtoſchia, oēs ſpēs, fœniculus, & herba, & radix apii, & radix & herba petroſilii, & herba, & radix brulei, enule ireos, gentiana, ſquinantia, colloquitioides, hermodactyli, cucumer alſinus, cetauræ, oēs lapides armenus, lapis, ſtellatorū, ſarcoſcollaſerapi, euphor. opopanax, oēs ſpēs ſerpētariz, duo ellobori, radix pœonie, milium ſolis, cicera, orobus, baccare, gramē cardones oēs plātago, ſepēruia, cauda eqna, raphanus, cortices capparorū, cortices mandragoræ, cortices granatorū, ſpēs oēs, ſalis aluminis, rhen. rubea tinctorū. diptamum, achacia, hypoquiſtidus, cornu cerui, coctareum, oēs ſucci herbarum, radices oēs nō aro. oia habentia multā humiditatem, & frigiditatem, ſtaphiſagria, lupuli, faſoli, ſemē canapis, berberi, ſtipites arabici & plantarum minus tamen quā radices, & pluſq; folia coquenda ſunt.

M E D I C I N A E quæ parum ſuſtinent decoctione, ſunt iſtæ māna, aqua lactis, roſæ, uin. ſtrocacodis, epithymū. f. pſyllii, capi. ue. ſcamo. ſolium indium, flores genſtæ, cardamomi, garyophylli, piper oē, rheubar. cinnam. maiorana ſaturegia, ancho, baſilicon, melliliorum, camemilla ſerpillum, ori ganū, ſand. oēs, muſcus, ambræ, caphora, ameos, amomi, nigel. ſalthez: quatuor, ſfrigida maiora. f. papa. albi & nigri, ozimum,

ozimū, carpobal. cū tota plāra, cortices citri, cortices cydoniorum, calamus aromaticus opū acetū, aqua rosārū, aqua uio. flores nenu. buglossa, flores boraginis, oēs ē flores, oia aromatica, omnia habentia uirtutē in superficie, lignū oēs, omnia facilis resolutionis &c.

MEDICINAE quæ mediocrē sustinent decoctionē sunt istæ calamētum, menta, saluia, betonica, folia omnia, semina omnia, uinū, granatorum, unum cydoniorum, herba papau. utriusq. fucci herbarum aromaticarum, aloes, tamarindus, succus rosarum, succus violarum, abinthium, fumus terræ, eupatorium, hyssopus, pruna, affarium, lupuli, colloquintida, turbitus, agaricus, polyop. quilibet, ieros. fen. mezereon. cyclamē. f. genestis, iuliquami, launa, fabiosa, pæonia, dauci carui, leui. petrosil. fœn. anisi, cymini, asparagi, apiū. f. semē. f. sem. rut. f. sem. lini. f. fœnugræci. f. portu. f. lactuæ. f. scario. f. endi. f. sem. acetosa, & herba, f. ertica. f. cortiādrorū, hordeum, myrtill. cubebæ. f. iuniperi, iuiubæ, balaustis, calfus barbaf. herba, menta, endi. scolopendria, cicorea, tamaricus, faxifraga, laurus, nenupha. hepatica, artemisia, pimpinella, parietaria, hypericon, coltum, zedoaria, zingiber, radix liquiritis, & succus Et sic concluditur 14. distinctio decoctione medicinarum.

Incipit. XV. & ultima distinctio quæ est de contritione medicinarum. Et continet partes tres.

PRIMA est de medicinis q̄ multum sustinent de contritione. Secunda de medicinis quæ parum sustinent de contritione. Tertia est de medicinis q̄ mediocrem sustinent contritionem.

Hæc distinctio non minus est utilis q̄ præcedens, & si intellecta fuerit, & executioni mandata, auctorum compositiones uirtutem suam a compositore limitatam in recipientem imprimet, ad laudem altissimi qui sua benigne opus nostrum dirigit.

MEDICINAE q̄ multū sustinent de contritione sunt istæ ari. floch hix oēs, quinātū, enula, cortices, scorfa ferri, uitrū, cortices, ouorum, scorpiōnes, sandali oēs, margaritæ, opū, papauer album & nigrum, f. semē, aloes, colloquintida, cortices capparorū, cortices granatorū, & rheumticitū, rubea tinctorū colū, diaprimum, sang. drac. cornu cerui, ossis sepis, ebur, aurū, argētum, plumbum uisum, cartamus, sem. iuliquami, hermodactyli, cucumer alinus, centaurea omnes, serpentarie omnes, duo ellebro, radix prœniz, milium folis, semina lini, f. sem. fenugræci, berberi, quatuor semina frigida maiora, f. aphyllagria, f. sem. coriandrorum, lupini, f. caloli. canapis, cicorea, orobos, hordeū, baccæ lauri, pinex, amygdalæ, auellana, daçylli, passiflæ, ficus myrtilli, iuniperi, balaustis, gramen, omnes cortices plan-

tatum, fauina, cardones oēs semperniua, cauda equina, raphanus, lignum aloes, cortices mādrazorū, batitura aris, marchefita, cerussa, lithargyrium, miniū, argenteum sublimatum, arsenicū, coralli utriusque, lapis lazuli, lapis iudaicus, lapis lyncis, crystallus, magnes, cinaprium, marmor, sulphur terra figi, uitrulium, flos aris, auripigmentum, species omnes salis, omnia aluminata, lapides omnes, fragmenta omnia, præciola oia numeralia, species tyriacæ, spēs mithridati, medicinz cōpositæ, de oppilatiuæ, medicinz cōpositæ hepaticæ, medicinz pro renibus: species trochiscorum, medicinz oēs lufufaceantes: species hieræ: species loch, medicinz pectorales, omnia metalla.

MEDICINAE parū sustinent de contritione sunt istæ. scamonea, nigella capil. ven. aloes, roza, uiolæ, scarocolla, ferapinū, euphorbiū, opop. mezereō, flores genestis, flores camæ. mellilotū, anchum, cardamomū, abinthiū, stœca. epithymū, femina pŷylli, calsiæ lig. p. oē, camphora, ambra, musculus, succus ros. cortices citri, cortices cydonio. fen. thymus, oia uina aromatica, oēs cummæ, ameos, amomū, ozimum, calamus arom. laudanum, oēs spēs aromatica, oia quorum uirtus facit resolutiua: oia debilia, & raræ texturæ, oia quæ habēt uirtutem in superficie, omnia intensæ caliditatis & siccitatis.

MEDICINAE q̄ mediocrē sustinent contritiōnē sunt istæ, ruta, spica oēs, oia femina, cyminum, myrobalani oēs, rheub. fumus, terræ, eupatorium, hyssopus, affarū, lupuli, turbitus, agaricus, p. lypodii squilla, femina urtica, acetosa, nastur, garyophylli, nux muf. cubebæ, f. scia, scolopendria, cicorea, tamaricus, ferpillum, faxifraga, laurus hepatica, artemisia, pimpinella, parietaria, ieros, cyclamen, f. genestis, scabiola, f. pæonia, dauci, carui, leuifitici, petrosilli, fœni, anisi, asparagi, apiū rutæ, hypericon zedoaria, zingiber, hepar, adhib. in reſectum lupis, pulmo uulpis, stomacha, galliazarum, medicinz omnes solutiua, pilulæ omnes, medicinz stomatichæ, diacimum, dianifum, diatrion pipereon: omnia folia præter ipsa aromatica: omnia fere femina præter aromatica. Et sic finem operi imponimus.

Hæc. n. suae Ioan. Franciscæ mi frater optimæ quæ paruitate ingenii, mei a uariis librorū uoluminibus elucere potui. Nō ut te his doctorem redderem, meum. n. non est Minerarum instituta: sed ut tuis uocis obtemperarem. Multaq; alia scribere proposueram: sed dubitans loquacitate dampnari finem imposui. Nostri tu homines nostri temporis, proluxitas eos tedio afficit: quamquam utilis: & necessaria. Malui igitur taciturnitate suis ambagibus dampnari quam loquacitate. Vale igitur diu felix: & Quirici fratris tui memento.

TABVLA DISTIN.

ctiōis ac descriptiōis oīum
alibus libri. Continet enim
quinq; & decem di-
stinctiōes.

PRIMA est de confectiōibus
aromaticis

2 De electuariis amaris 97
2 De medicinis solutiuis 103
4 De trochiscis 107
5 De pulueribus 109
6 De loch 109
7 De syrups 110
8 De unguentis 113
9 De emplastris 115
10 De cerotis 115
11 De oleis 116
12 De artificio ceræ 117
13 De artificio zuchchari 118
14 De decoctione medicī 119
15 De contritione medicina 120

PRIMA est de confectiōe
ub. aromaticis cōtinet. 22.
descriptions.

Prima electuariis de gēmis 97
2 Diamufci dulcis 97
3 Diamufci amari 97
4 Diagalange 97
5 Aromatici rosati descriptio 97

ne Gabrielis 97
6 Diamini 98
7 Diambre 98
8 Diacoralli 98
9 Triafandalorum 98
10 Electuarii de aromatib. 98
11 Diarhodon abbatris 98
12 Confectiōib. de stœcae 98
13 Confectiōes de cinnam. 98
14 Rosatæ nouellæ 98
15 Diadranganthi frigidi 98
16 Diarhodō descriptiōe cōi 98
17 Aromatici rosati 99
18 Armoniaci rosati mino. 99
19 Aromatici muscati 99
20 Aromatici garyophylla. 99
21 Aromatici nardini 99
22 Electuarii de citro 99
SECVNDA disto quæ est de
electuariis amaris continet
26. descriptions.

Prima ē tyriacæ andromachi 99
2 Tyriacæ Galeni 100
3 Mutridati 100
4 Aureæ Alexandrinæ 100
5 Iustini 100
6 Electuarii de baccis lau. 100
7 Diacalamenti Nico. 101
8 Diacalamenti Galeni 101
9 Dianifi Mesue 101
10 Diatrion pipereon 101

11 Diacurcumz 101
12 Diacacæ 101
13 Confectiōis anacardinz 101
14 Confectiōis de scorfa ferri 101
15 Electuarii de cineribus 101
16 Diastyrionis 102
17 Diatriis 102
18 Diapenidia 102
19 Diadranganthi calidi 102
20 Trypteræ magnæ 102
21 Diabolibani 102
22 Requies 102
23 Egere zarenæ 102
24 Athanasiz 102
25 Philoni persici 102
26 Philoni 102
TERTIA disto quæ est de
medicinis solutiuis, conti-
net descriptions 51.

Prima est hieropieræ Mes. 103
2 Hieræ simplicis Gale. 103
3 Hieræ compositæ 103
4 Benedictæ 103
5 Electuarii indi maioris 103
6 Electuarii indi minor. 103
7 Confectiōis amech. 103
8 Electuarii elefscoph. 103
9 Diacaliconis 103
10 Electuarii rosati 104
11 Electuarii de succorof. 104
12 Diastenz 104
13 Confectiōis de manna 104
14 De pŷilio 104
15 Miclezæ 104
16 Diasticonis 104
17 Diaprunis non solutiui 104
18 Diapiunis solutiui 104
19 Diastisæ 104
20 Calsiæ fistulæ 104
21 Diarob cū turbit & rhe. 105
22 Diarob sine rheubarba. 105
23 Diacharthami 105
24 Pilularū elephangina 105
25 Pilularum masticinarū 105
26 Pilularum aurearum 105
27 Pilluarū turbidatarum 105
28 Pilularū aggregatiua. 105
29 Pilularū de fumoterræ 105
30 Pilularū de mezereon 105
31 Pilul. de hiera simpli. 105
32 Pilul. de hiera cōposita 105
33 Pilula. foetidā maiorū 105
34 Pilula. foetidā minorū 105
35 Pilularū de farcocolla 105
36 Pilularum de bellio mino-
rum 105
37 Pilularum lucis 106
38 Pilularum de hermoda. ma-
iorum 106
39 Pilula. de rheubarbaro. 106
40 Pilularum de hermoda. mi-
norum 106

TABVLA LVM. APOTH.

41	Pilularum indarum.	106	2	Est loch de papauere.	109	11	Vnguenti de dragacathis.	114	DVODECIMA distinctio
42	Pilularum sine quibus esse nolo.	106	3	Loch fani & experti	109	12	Vnguenti pectoralis	114	quæ est de artificio ceræ, cōtinet. 6. modus præparationis.
43	Pilulari cochiarū Nic.	106	4	Loch de alina	109	13	Vnguenti de comitissæ	114	
44	Pilulas cochiarū Almā.	106	5	Loch de squilla	110	14	Vnguenti p uernibus	114	
45	Pilularum arabicarum.	106	6	Loch de pulmone uul.	110	15	Vnguenti p scabiz Mef.	114	Prima est de cera rubea facienda
46	Pilularum assaiaret	106	7	Mixturæ pectoralis	110	16	Vnguenti pro scabie alterius pro pulueris	114	2 De cera uiridi
47	Pilula. stomachicarum.	106	8	Mixturæ cordialis	110	17	Vnguenti de arthanæ	114	3 De cera nigra
48	Pilularum imperialium	106	9	SEPTIMA distio quæ est de syrups, cōtinet 46. descri.	110	18	Vnguenti dialthez	114	4 De albandi ceram
49	Pilularum communium	106	10	Prima est syrups acetosif.	110	19	Vnguenti marciaroni	114	5 Alius modus de albandi ceram
50	Pilularum de agarico	106	11	2 Syrups de duab. radicib.	110	20	Vnguenti aragon	115	6 Mefura ceræ eorum oīum
51	Pilularum bichicarum.	106	12	3 Syrups rosa. de infusione	110	21	Vnguenti agrippæ	115	DECIMATERTIA distio
Q V A R T A distio quæ est de trochiscis, p̄tinet 32. descri.				4 Syrups. rof. ex rofis siccis	110	22	Vnguenti marciaronis alterius	115	quæ est de artificio zucchari p̄tinet 31. modus labora.
Prima est trochiscorum diarthodon				5 Syrups de endiuia magistrallis	110	23	Vnguenti staphisagriz	115	Prim⁹ est de coriandris solidis
2	Trochiscorum de rofis minorum Mef. solutiōrū	107	6	Syrups de endi. Gentilis	110	24	NONA distio quæ est de emplastris, continet. 6. descri.	115	2 De crisps
3	Trochiscorum de rof. maiorum Mefue	107	7	Syrups de succo acetosæ	110	Prima est emplastrū melliloti			3 de cinnamomo conficiendo
4	Trochiscorum de eupatorio & rof.	107	8	9 Syrups de succo endiuie	110	1	Emplastrū Galeni emundantis uisita stomachi	115	4 De amygdalis
5	Trochif. de rheubarba.	107	9	10 Syrups de succo endiuie	110	2	Emplastrū diaphiniconis	115	5 De rancettis
6	Trochif. de camphora	107	10	11 Oxyczachare	110	3	Emplastrū de granis lau.	115	6 De garyophyllis
7	Trochif. de spodio	107	11	12 Syrups de pomis simpli.	110	4	Emplastrū montagnæ contra fluxum	115	7 De anisif
8	Trochif. de spodio cū femine acetosæ	107	12	13 Syrups de pomis cōpositi	111	5	Emph de crustapanis ciuld.	115	8 Depineis
9	Trochif. de berberis	107	13	14 Syrups de myrtis magist.	111	6	DECIMA distinctio quæ est de cerotis continet. 9. de	115	9 De auellanis
10	Trochif. de abinthio	107	14	15 Mellis uiolati	111	descriptions.			10 De muscardinis
11	Trochif. de alkengi	107	15	16 Mellis rofati	111	Prima est ceroti diachilonis magis			11 De pignocara
12	Trochif. de capparibus	107	16	17 Syrups de acetositate citri.	111	1	Diachilonis minoris	116	12 De morsellata
13	Trochif. de eupathio	107	17	18 Oxymellis simplicis	111	2	Ceroti pro renibus	116	13 De zingiberata
14	Trochif. de charabe	107	18	19 Syrups uiolati cōpositi	111	3	Ceroti de gummis	116	14 De omnibus animalibus & fructibus
15	Trochif. de myrrha	107	19	20 Syrups de iuiubis	111	4	Ceroti de laudano	116	15 De penidiss
16	Trochif. de terra figil.	107	20	21 Syrups de scabiola	111	5	Ceroti de crepatis	116	16 De manuschrifti rofati
17	Trochiscorum de aniso	108	21	22 Lulep rofati	111	6	Ceroti pro colicis	116	17 De manuschrifti uiolati
18	Trochif. de agarico	108	22	23 Lulep uiolati	111	7	Ceroti pro costis	116	18 De manuschrifti perlato
19	Trochif. alandal	108	23	24 Syr. uiolati ex infusione	111	8	Ceroti ozoyroci	116	19 De manuschrifti cū fragmen
20	Trochif. diacoralli	108	24	25 Syrups de granatis	111	9	Ceroti mucilaginum	116	20 De faunia
21	Trochif. de tyro.	108	25	26 Oxymellis squillitici	111	VNDECIMA distio quæ est de oleis, continet 30. descriptions.			21 De colorando zuccharum beo colore
22	Trochif. de squilla	108	26	27 Mixx cydoniorum bene speciebibus	111	1	Olei aliteris	116	22 De colore uiridi
23	Trochif. Andromachi	108	27	28 Syrups de bizantiis	112	2	Olei silamani	116	23 De colore celestino
24	Trochif. de uipera	108	28	29 Syrups de menta	112	3	Olei alifami	116	24 De colore glauco
25	Galliz mufcatæ	108	29	30 Syrups de fumoteræ	112	4	Olei cydoniorum	116	25 De colore turchino
26	Galliz sebeliz	108	30	31 Syrups de prassio	112	5	Olei mactis	116	26 De colore morello
27	Galliz elephanginæ	108	31	32 Syrups de abinthio	112	6	Olei liliorum compositi	116	27 De marzapanis diuerse
28	Galliz magnæ	108	32	33 Syrups de epithymio	112	7	Olei coftini	116	28 De zuc. rof. uiol. & aliis
29	Trochiscorum ramich	108	33	34 Syrups de thymo	112	8	Olei uulpini	116	29 De codognata
30	Tortellæ defeni	109	34	35 Syrups de artemisæ	112	9	Olei scorpiionum	117	30 De amarenata
31	Sigillatio trochifchorū	109	35	36 Diamoron Mefue	112	10	Olei irini	117	31 De zelea amarenarum
Q V I N T A distio quæ est de pulueribus, cōtinet. 11. descri.				37 Diacariidō seu rub. nucū	112	11	Olei de capparibus	117	DECIMA Q V A R T A distio
Prima est pulueribus pro epithymate cordis.				38 Mixx cydoniorum aromaticæ	112	12	Olei myrtillorum	117	quæ est de decoctione medicinarū & continet partes tres.
1	Pulueris cordialis	109	39	39 Syrups de stocados	112	13	Olei rofati primi	117	Prima est de medicinis q̄ multū
2	Pulueres cōtra uermes	109	40	40 Syrups de corticib. citri.	112	14	Olei rofati secundi	117	sufficiunt de coctione
3	Pulueris pro bocio	109	41	41 Syrups de radicibus	113	15	Olei camzmillæ	117	2 De medicinis quæ parum
4	Pulueris ducis	109	42	42 Syrups de hylopo	113	16	Olei uiolati	117	sufficiunt de coctione
5	Pulueris fenæ	109	43	43 Syrups de liquiritia	113	17	Olei anethi	117	3 De medicinis quæ mediocriter
6	Pulueris fenæ	109	44	44 Syrups de eupatorio	113	18	Olei liliorum simplicis	117	sufficiunt de coctione
7	Pulueris fenæ magis solutiui	109	45	45 Decoctionis pectoris	113	19	Olei sambucini	117	DECIMA Q V I N T A distio
8	Pulueris pro minguentibus in lecto	109	46	46 Decoctionis communis	113	20	Olei rutæ	117	ultima distinctio quæ est de contritione medicinarū, continet partes tres.
9	Pulueris restrictiui	109	47	OCTAVA distinctio quæ est de unguentis, continet 23. descriptions.	113	21	Olei mentæ	117	Prima est de medicinis quæ multū
10	Pulueris pro faculo capitis	109	48	Prima est unguenti stomachi	113	22	Olei de abinthio	117	sufficiunt de contritione
11	Pulueris pro faculo cordis	109	49	2 Vnguenti sandalini	113	23	Olei saluiz	117	Est medicinis quæ parū
S E X T A distinctio quæ est de loch, continet. 9. descriptio nes. Quarum.				3 Vnguenti Galeni	113	24	Olei de floribus papa.	117	sufficiunt de contritione
Prima est loch de pino				4 Vnguenti popoleonis	114	25	Olei de cucurbita	117	Est de medicinis quæ mediocriter
				5 Vnguenti citrini	114	26	Olei de nenuphare	117	sufficiunt contritionem
				6 Vnguenti ægyptiaci	114	27	Olei amygdalarum dul.	117	
				7 Vnguenti apostolorum	114	28	Olei laurini	117	
				8 Vnguenti basiliconis	114	29	Olei amygdalarum magistra lis	117	
				9 Vnguenti de cerussa cru.	114	30	Olei tartari	117	
				10 Vnguenti de cerussa cocti	114				

F I N I S.

THE S A V R V S A R O M A T A R I O -

R V M P A V L I S V A R D I .

Recens singulari diligentia recognitus: ad clarissimos dominos
Mediolanenses Collegii Phycos, Salutem.

CVM animaduertem colendissimi doctores quam plures in nonnullis aromatariorum apothecis errores ignorantia committi (quod in animarum simul, & corporum humanorum, summum damnum fore dubitandum non est) eosque corrigere non nisi honestum ac iustum esse uidere: quare tum amicorum precibus: tum pietatis motus (diuino prius inuocato auxilio, sine quo omnia uana, testante diuo auctore nostro Mesue, sanati, solus languores Deus) opusculum hoc hinc inde authentice eligendo componere decreui, in quo compositionum omnium in communi practica existentium uirtutem, modum tempus eligendi omnia, quæ eis pertinentia declarantur, serie alphabetica omnia ordinando, correctionibus, emendationibusque uestris me submittendo, quibus summe debeo & sicut charitate mouerita Deus sublimis benignitate sua in sanitatem nos conseruare dignetur, qui fit benedictus in secula seculorum.



V R A A Alexandrina Nicolai aurea dicta est ab auro. Alexandrina ab Alexandro peritissimo philosopho a quo fuit inuenta, ualet proprie ad omne uitium capitis ex frigiditate, & maxime ad omnem de curationem rheumatis quæ fit de capite ad oculos, ad gingiuas, ad aures, & ad grauedinem omnium membrorum quæ

fit de eodem humore. cuius permixtio.

R. Affari.
Carpobalsami. i. se. plantæ.
Iusquiami. an. 3. ii. s.
Gargophylorum.
Opil. Myrrhæ.
Radicum cyperi. an. 3. ii.
Balsami. i. liquor emanans ab arbore balsami.
Cinnamomi. Folii.
Zedoariz.
Zingiberis.
Coli.
Coralli albi & rubei,
Cassiz lignæ.
Euphorbii.
Dragacanthi. Thurris,
Storacis calamitzæ.
Spice celicæ.
Meu. i. radix.
Cardamomi maio. & mino.
Semen sileris montani.
Radicum saxifragiz.
Seminis lynamis.
Seminis anethi.
Seminis auisi. ana 3. i.
Ligni aloes.
Rheubarbari ana 3. s.
Seminis petrosilii.
Alipzæ muscatæ.
Caltorei.
Spice nardi.
Galangæ.
Opopanaci.
Anacardi Masticis.

Sulphuris uiui.
Radicum pæonizæ.
Radicum iringi.
Rosarum rubearum.
Thymi.
Radicum acori.
Pulegij.
Aristolochiz longæ.
Gentianæ.
Corticum mandragoræ.
Chamaerdrys.
Radicum valerianæ.
Baccarum lauri.
Seminis ameo.
Seminis dauci.
Macropiperis. i. piper longum.
Leucopiper. i. piper album.
Xyloballæ. i. lignum balsami.
Seminis carui.
Amomi, ana 3. s.
Albarum margaritarum.
Seminis rutæ.
Seminis leuistici.
Sinoni i. idest fe. macedonicum an. 3. s.
Auri purificati, i. idest in foliis collecti.
Argenti meri. an. gra. xiiii.
Bletæ bizantiæ.
Olsis de corde cerui. ana. gra. xiiii.
Rafuræ eboris.
Calami aromatici.
Pyrethri. an. gra. viii.

Puluerizanda puluerizentur, & cum mellis despumati q. su. fiat confectio in bona forma & da post sex menses cum uiuo albo calido ad modum auellanzin sero quando uauit dormitum.

Sinoni secundum Simonem Ianuensem, & fm Diosc. est semen petrosilium agreffe, & in libro pandectarum uel semen macedonici, opinio mea est semen macedonicum.

Opium qd fit in nostris partibus ex capitibus papaueris nigri, fieri debet de Mese Maii, uel de mense Aprilis, & ita opium thebaicum in illo tpe fieri debet in partibus Thebis.

De meu Sera. in ca. de meu dicit, habet radicem non subtilem, cuius alique partes diuiditur in plures, quarum quædam sunt tortuosæ, & quædam rectæ, longæ habent odorem bonum, & radix eius est quæ administratur, postea iterum ait ex auctoritate Gal. radix huius herbe est ea in quo est iuuamentum, similiter ait Circassians.

Pro balsamo ponit terebinthina subtilis, uel oleum laurinum: uel oleum balsaminum, uel gummi hederæ, uel quædam compo olei quæ describitur in recepta diacurcumæ in isto.

Radices omnes in autumno sunt colligendæ, & cyperi de mense Octobris.

Et nota, qd si radices alicuius herbe, uel arboris colliguntur, tunc debet colligi quando non habent flores. Si uero folia quando flores habent.

ATHANASIA magna Mes. conferens ad dolorem capitis, & splenis, & oppilationem in eis, & dolorem stomachi & althamæ, & tulsii antiquæ, & mundificat pectus, & fluxum ventris antiquum, dyfenteriam, & ad fluxum sanguinis, & est in sedatione dolorum scit philonium, & confert ad dolorem renium, & hæmorrhoidarum, & Gal. precepit miseri hepar adip. i. hepar lupi. ualet enim proprietate sua ad morbos hepatis, cuius permixtio.

R. Croci.
Opil.
Myrrhæ.
Caltorei.
Seminis iusquiami.
Costi. an. 3. iiii.
Cordumeni, i. idest semen 3. iiii.

Quæ sunt puluerizanda puluerizentur, cetera liquescent cum melle despumato q. s. fiat confectio, & post sex menses, dosis eius est ab auro medio usq; ad aureum unum cum uiuo suauis, & dulcis, aut cum rob. & succo endiuizæ, & apii.

Hepar adip. i. hepar lupi præparatur hoc mō, & conseruatur. primo debet optime lauari cum uiuo albo optimo, & bene mundari ab omnibus immunditiis: deinde saleter seu aspergatur sandalis citrinis bene, & subtiliter puluerizatis: deinde permittatur exiccare: demum inuoluatur absinthio, & ponatur in una scatulla in loco sicco dī dicto absinthio, omni hebdomada absinthium mutando.

Lupi. uero intestinum hoc mō præparatur, & conseruatur, lauetur cum optimo uiuo albo: deinde tumeat, & ponatur ad exiccandū, sed caueat a fumo, & puluere: deinde erit in absinthio inuoluatur, & referuet. ualet. n. i. colica mirabiliter.

ANACARDINA Mes. est confectio sapientum & eorū qd desiderant scire. acuit. n. intellectum subtilizat sensum: memoria recuperat & cōfert dolori stomachi, & uentris, a frigiditate factis, & clarificat sanguinē, & colorem bonū facit.

R. Piperis nigri.
Macropiperis. i. piper longum.
Myrobalanorum Kebu, album.
Myrobalanorum emblicorum. Burungii. nigella. an. 3. vi.

The. aroma.

X

Myrobalanorum ind.
Vini de hedust. i. castoreum ana. 3. ii.
Costi.
Anacardi. ana. 3. vi.
Baccarum lauri ana. 3. vi.
Radicum cyperi. 3. iii.

Tere anacardos per se deinde alias medicinas cōfice cū butyro vaccino, & melle despumato, an. lib. i. proiciēdo primo butyro purgatum postea mel despumatum: deinde alias medicinas subtiliter puluerizatas, & da post sex menses, & caueat sumēs a labore, ira, coitu, & ebrietate, dosis est. 3. ii.

Omnes myrobalani ponantur in hac cōflectione ad frangendum malitiam anacardorum: nisi enim illi ponerentur, ipsorum malitiā omnes alias medicinas corrumpere, quare in hac bene aduertant apothecarii.

Anacardi sunt fructus cuiusdam arboris qui habent similitudine cordis aut paruari habentes intrinsecus rubedinē quandā ad similitudinē sanguinis, & nascuntur in Sicilia in montibus igneis qui continue cōburent, & ab ipsis denominantur cōfectio anacardina, & nota q̄ isti fructus dum sunt recentes cōdiuntur cū melle hoc molliquefacto melle in eo, ponantur anacardi, & diu morentur in eo, illud tale mel vocatur mel anacardi, habetur in usu abq̄ dictis anacardis, & aliqui ingrediuntur in electuariis, ut inferius apparebit, & illud tale mel habet intensiorem gradum caloris, & siccitatis quam mel purum, quia anacardi sunt calidi, & siccī in. 4. gradu, nec sunt pediculi elephantis, vt quidam fatui dicunt.

Burungi, de eo est magna differentia. Christophorus de honestis super illū passum exponit, q̄ nigella, & q̄ nigella est semē nigrū odoriferū. Gentilis uero exponēs illā cōflectionē inquit, burungi sunt grana lili piperi quæ non habemus, sed illorū loco fm quodam ponitur cataputia. Alii uero dicunt, q̄ est quedam herba habens folia similia rutæ faciens semen in uaginis sile nalturto qui mordet linguam sed prima opinio est melior magisq̄ ad mentē auctoris, cū nigella cerebrū confortet, humiditatēq̄ ipsi deficit, quæ admodū cōflectionis uirtus est quare nigella ponenda est. ATHANASIA .i. immortalis, Nicolai ualeat prope contra fluxum sanguinis mulieris data cū succo plantaginis, qui succus debet duci super lapidem molarē, cū lapide hamathitis donec in sanguis uertatur colore, & cum tali succo medicina dispergata detur, & etiam suppositoriū de eadē medicina inunctū, & in uulua immisissim sanguinē stringit, hoc idē facit hæmoptois, uentris etiā fluxū mirabiliter sedat, fluxū sanguinis ex naribus cū pēraphylo soluta, & frōte illinita: siue naribus immissa cū eo celeritate sistit lietericis cū apozimate balaustræ non modice auxiliat, cuius pmixtio.

R. Cinnamomi .i. Macropiperis ana. 3. s.
Casix fist. an. 3. iii. gr. viii.
Storacis calamitz.
Croci.
Phu. i. radicum ualerianæ.
Betonice.
Insiquiam. i. semen.
Sisileos. i. fileris montani,
Semen apii.
Semen dau.
Semen anifi.
Opian. 3. i. s. gra. iii.
Spice.
Folii.
Castorei an. 3. s.
Meu. i. radix.

Mellis. q. dosis eius est. 3. iii. & da post sex menses, hæc cōflectio laxius libet at hominē ab extremis mortis.

ANTIDOTVM Nicolai. i. contra datum hæmagogū. i. sanguinem menstrualem ducens, ualeat ad multas pōsiones mlierum, ad matricem, quæ non usu purgantur purgat mirabiliter, mensura educit, foetum in utero occidit, & postea extirpat, & post partum quæ non sunt purgata purgat, & ad silem perducit, petrā in uescam rumpit, & purgat urinā, mouet litanguria, sanat hepatis emphyasim, curat sclyrosim in

splenē sanat, & ad oīa interiora magnū bonū facit, & ad stomachi indigestiōē, & eos sanat qui colicā patiuntur, nephreticis prodest, hoc autē qui biberit sanitatem obtinebit, uel aliqui hæmorrhoidas prouocat, uiam totius corporis aperit & foetum mortuum, & secundinam educit, & uescicam purgat, stomachum calidum facit, uentositatem cōsumit, uomi tum cōpescit, tamen in mulieribus nihil inuenitur fortius ad oīa quæ illis sunt utilia, propter quod cauendū est patier tibus hæmorrhoidas, aut fluxum uentris, aut diffentiam.

R. Radicum affari.
Radicum acori. Amomi.
Seminis triplicis.
Marachri. i. semen feniculi.
an. 3. gr. vi.
Seminis anifi 3. ii.
Aristolochiz longæ.
Artemisiz.
Casix fistulæ ana. scrop. ii. gra. xiii.
Centauræ mi. 3. i. gr. vi.
Dauci cretici. i. pastinaca.
hortensis 3. ii.
Ellebori nigri 3. ii.
Foliorum lauri scrop. i. s. gra. iii.
Liquiritiz rase. 3. i. 3. i.
Lupini. 3. ii.
Melanthii. i. gie, & nascitur in frumentis 3. ii.
Myrrhæ 3. ii. gr. xiii.

Mellis. q. l. detur ad modum auellane maioris cum aqua calida post balneum si cum febre est: si uero sine febre cum uino ueteri, aut mulsā dabis, dosis est. 3. iii.
AROMATIZVM rosatum descriptione. Gabrielis Mesua lect contra deflectionem stomachi, & omnia nutritionis mēbra confortat, & est contra stomachi humiditatem, & molli ficationem, & omnem corruptionem in eo corrigit, cor cōfortat, appetitum excitat, digestionem procurat cōuale scētibus & debilibus mire subuenit, cuius permixtio.
Rosarum rubearum 3. xv.
Liquiritiz rase. 3. vii.
Ligni aloes.
Sandali mazachari. i. citrini an. 3. iii.
Cinnamomi electi 3. v.
Macis
Garyophyllorum ana drac. ii. s.
Syrupi rosati, & de corticibus citri quantum sufficit, & fiat cōfectio, dosis est. 3. ii.

AROMATIZVM rosatum Mesuz, stomachum, & cor confortat, humiditatem uiscerum excicat, appetitum excitat, & digestionem confortat, uomitum, & nauseam sedat.
R. Rosarum rubearum 3. i. s.
Ligni aloes 3. i. s.
Trochiscorum diarhodon
Galiz mufc. an. 3. ii. s.
Liquiritiz rose. 3. viii.
Cinnamomi electi 3. iii.
Galangæ 3. i. s.
Macis
Garyophyllorum an. 3. ii. s.
Zingiberis.
Nucis mufc. an. 3. ii. s.
Heil. i. cardamomi maius.
Spice nardi an. 3. i.

Puluerizentur subtiliter, & cum syrupo rosato, & de corticibus citri, ana. 3. viii. aromatizando illas cum 3. s. optimi mufci: sed in forma solida fieri solent, ut supra.

Si rosarum in aliqua compositione scriptum reperies, si ne determinatione est de rubeis intelligendum, tanquam de melioribus, & perfectionibus.

Hic, & pro hac compositione, & pro ante scriptis & infra scribendis est notandum, quod descriptio trochiscorum in istis ingredientibus infra describuntur, in descriptionibus de trochiscis tantum erit.

AROMATIZVM Rosatum minus Mesuz stomachum, & cor confortans, & eorum inflammationes sedans.

Rosarum rubearum 3. x. **Cinnamomi electi** 3. iiii.

Ligni aloes **Malticis** 3. i. 3. i.

Sandalis malfurne i. citrini. **Ambræ** 3. i.

ana. 3. ii.

Puluerizent subtiliter, & cū syr. ros. fiat confectio & si in for. solida sit, ut supra diximus inuenitur in hac cōpōne magna diuersitas literæ aliqñ. n. dicitur in superiori annotauit & bene litera fiat. in aliquo Mef. scriptū reperitur malticis exagii unū, & hic litera corrupta est quia pul. tenēda ē.

Insuper intelligendū, q. si in aliqua compositione scriptū reperis sandali, de sandalis citrinis est intelligendum, cum meliores sint, eo quia participant de utraq; natura, & quoddam medium sunt inter albos & rubeos. Si uero reperitur sandalorum, de omnibus sandalis intelligas.

Aromati. ros. minus, d. minus, q. minus simplicia intrāt. **AROMATICVM** musca. Mef. confert syncopi, & tremori cordis, & cōfortat cerebrū, & cor, & p̄fert epilepsia, & p̄pōtationi matricis, & facit oris odorē bonū, cuius permixtio.

R. Ligni aloes 3. vii. **Ambræ** 3. iiii.

Darfeni i. cinnamo. fini. 3. x. **Mulci** boni 3. ii.

Puluerizentur subtiliter, & cum syrupo rosato fiat confectio, in forma solida, fac. ut supra ostendi.

De musco: nota q. uim suā ac odorē amittit si cum spēsbus aromaticis cōseruatur seu ponatur, & uirtus sua amissa recuperat, si in cloacha ponat, & odorē recuperat quod amiserat ex pmixtione aromaticorū, cōseruatur autē si in suo folliculo tenet, uel in ampulla uitrea, & cū eo permiscetur plumbum in parua frustra incusum, sed ab aromatibus elongetur.

Medicinæ simplices plures ponuntur in composita, eo quia ex his simplicibus fiat una uirtus communis quæ in nullo simplici inueniebatur.

AROMATICVM garyophyl. Mef. stomachum, & cor confortat, nauicā, & uomitum sedat, & ualet cōtra putrefactionē in partibus stomachi, mēbra naturæ nutritionibus calefacit, uentositatem dissoluit, & carminat, cuius permixtio.

R. Garyophyllorum 3. vii. **Heil** i. cardamomum m. i.

Macis, **Rosarum rubearum** 3. iiii.

Galangæ, **Liquiritiz rase** 3. ii.

Sandalis nazachari i. citri. **Galliz mufcate** an. 3. ii.

Trochiforum diarhodon, **Folii**,

Cinnamomi, **Cubebæ** an. partes. ii. 3.

Ligni aloes, **vnus** i. 3. ii.

Spici inde, **Mulci** 3. s.

Piperis longi an. 3. i. **Ambræ** 3. i.

Puluerizentur subtiliter oia, & cum syrupo citrino q. s. fiat confectio, & si in forma solida facere uis, fac, ut supra.

De folio inter doctores magna est differētia, & cōtrouerfia quidam dñt, q. est quæda herba nascens in aquis dulcibus abiq; radice, & super eas natat quæadmodum lentigo aquæ alii q. est arbutulum nascens in India, & folia ipsius dñt, q. est folium alii uero dicunt, q. sunt folia garyophylli.

Partes duæ unius drach. sunt duo seropuli nā diuidendo drachmam per quatuor, omnis pars erit gr. xv. & sic ter multiplicando quindecim, erunt duo seropuli & gr. v. Cum seropulus medicinarum resiliat siue sit grana uiginti.

AROMATICVM uardium Mef. ualet ad stomachum, & hepar, & uiscera confortat, & renes, & uescicam calefacit, & addit desiderium coeundi, oris, & sudoris odorem bonum facit, & confortat anhelum, & facit digestionem cibi & resoluat uentositates, cuius permixtio.

R. Spicæ inde 3. ii. **Seminis anisi**.

Rosarum rubearum 3. iiii. **Corticum citri**.

Liquiritiz rase 3. ii. s. **Trochiforum diarhodon**

Galliz mufcate i. quædam an. 3. i.

Compositio, **Pinearum purgatarum**,

Cubebæ, **Amygdalarum purgatarum**,

Ligni aloes, **Macis**, & excorticatarū ana. 3. v.

Garyophyllorum, **Dragacanthi**,

Folii indi, **Gummi arabici** an. 3. ii.

Cinnamomi an. 3. i. 3. i. **Mulci** scrop. s.

Puluerizentur subtiliter & conficiantur cū syrupo rosa.

quantum sufficit, & fiat ut supra.

Purgant pinex, & amygdalæ hoc mō. accipiat bacillum sub quo sit ignis carbonum, & in eo ponatur amygdalæ, & pinex excorticatæ seu mundæ a subtili cortice, & manibus ducatur hinc & inde usquequo sint bene calidæ, & illa caliditate confumitur illud dimidium corruptum.

Alio etiā mō fieri potest cū amygdalis, & pinis: ponatur sū. iiii. uel. iiii. sem ipsorum quantitatē fururis frumenti, & bñ super dictū ignem oia simul uolue, quouq; bene calefacta sint, & de illo fursure amouetur illa rancitas, & puræ sunt sine malo sapore reductæ, & hic modus melior est.

Sebelix est quæda cōpositio quæ describetur infra in tractatu trochiforum, quæ a Mefue gallia fabella appellatur.

Item notandum est, q. in præscriptis compositionibus in quibus Mef. scribit, & confice cum syrupo ros. uult, quod componatur cum ulepo rosato, quia perfectior est: & magis confortatiuum igitur exponas, cum syrupo ros. s. facto cum aqua infusionis rosarum vel uiolarum.

ATRAMENTVM bonum pro scribendo.

R. Galletti rupti grosso mō lib. viii. aq. pluuialis, aut uinacii lib. lx. & dimittatur galletum simul in aqua, aut uino per dies quinq; postea bulliat usq; ad cōsumptionē mediocritatis sue sit aqua, siue uinū cōsumetur quarta pars, & postea dimittatur frigeſcere, & postea addatur. Gūmi arabici li. iiii. Vitrioli romani lib. vi. & iterum bulliat parum, & sic fit.

ATRAMENTVM bonum factum ad solem in catmine scriptum **R.**

Vncia gallæ, mediæq; sit uncia gummi.

Vitreoli pars quarta, his addas octo salerni.

Hæc tribus ad solem uitreo suspende diebus.

Noctibus & totidem, sub aperto desine celo.

ACATVM squillicum Mef. confortat gingiuam laxam, & putridā, & confirmat dentes motos, & similiter collutio ex eo, & eius potus, similiter est medicina magna feotori oris, faciens ipsum odoriferum, & sanat dolorē stomachi, & adiuuat ad digestionem, & usus eius sū oēm modum administrationis ipsius cōfortat corpus cui accidit laxitas, et mollescit, & colorem bonum efficit, dosis, potio acetii ipsius est a. 3. v. usq; ad. 3. xii. & oxymellis ubi aur. vi. usque ad 3. iii. & trochiforum eius a. 3. ii. usq; ad. 3. iiii.

R. Laminas squillæ q. in medio sunt abiiciēdo primas, & ultimas, quia uenenosæ, & malæ. primæ sunt uenenosæ, quæ sunt et multum calidæ interiores uero sunt abiiciēdæ, quia mortiferæ sunt nimia frigiditate, medix uero sunt temperatæ. di uidenda est igit squilla, & tot uniūq; sunt ab exteriori parte abiiciēdæ, quot in interiori, & medix referuādæ. Accipe igitur de melioribus triatā quæ uolueris & sue eas in filo cū filo ligneo & sit distātia inter eas, & dimitte eas siccare in umbra per dies 40. postea incide eas in frustra cū incisori ligneo in frustra mediocria, & pone ad oēm librā dictarū corticū squillæ acetii albi, & boni li. viii. & ambo poue in uase ui treato stricthi orificii, & obtineatur os eius, & exponatur soli per dies 40. post illud cola, & referua administrādo ubi op̄.

Incisio, & foratio squillæ cū infuso ligneo est, ne infuscat ex ferro in ea rubigo quæ excitat sui acuitate, & ad hoc doctores dubitantes cum instrumeto de ligno ferri faciunt &c.

AQVA ad asthma secundum Rasim.

R. Ficuum siccarum 3. x.

Dactylorum,

Seminis apii,

Seminis foeniculi an. 3. v.

Coquantur oia in lib. iii. aquæ & bulliant simul usq; ad cōsumptionem duarum partium, & coletur, & de dicta colatura da bibere. 3. iiii. pro uice de summo mane loco syrupo.

AQVA constrictiua magistralis.

R. Prunorum syluestr.

Cydoniorum,

Mespillarum immaturarum,

Plantaginis an. partes æquales, & distilla ad lambicum.

AQVA ad oculos rubentes, & lachrymantes experta, & bona.

R. Zucchari albi,

Aloes hepatici an. 3. v.

The. aroma.

X 2

Thutiz preparatz 3.s. Aqua rose.
Camphore. gra.ii. Aquæ sceniculi.an.3.iiii.
Vini albi clari.
Misce in vna ampulla uitri, & desuper liga peciam unam
lini subtilis, & de dicta aqua asperge in oculis:
A. Q. V. ad inflammationem membri bona & experta.
R. Aquæ plantaginis. Ceruffe.
Aquæ portulacæ. Lichargyri subtiliter pulueriza
tana 3.iiii.
Aquæ vermicularis. Camphoræ, gra.ii.
ana 3.ii.

Misce omnia simul, & balnea pluries in die cum pecia li
ni subtilis ubi est inflammatio.

BENEDICTA simplex Nicolai, & dr benedicta: quia
ab oibus a quibus sumitur benedicitur, maxime fide-
tur habentibus infirmitates contra quas inuenta fuit.
valet ad vesticam arcticam, & podagram ex frigida-
te, renes & guttam purgat, peripleum monicos, stomatichos,
hepaticos curat, cuius permixtio.

R. Efulæ 3.ii. Salis gemmæ, 3.ii.
Turbith albi & gummosi, Galangæ,
Zuchari albi.an.3. x. Macis,
Diagrydii, Seminis carui,
Hermodyctylo, Seminis sparagi,
Rofarum rubearum.an.3. v. Lithospermato. f. miliu folis
Garyophyllorum, Amomi,
Spice nardi, Piperis longi,
Zingiberis, Polypodii,
Croci, Cardamomi,
Seminis petrosilij, Msllicis,
Seminis apii, Seminis ameos,

Radicum faxifragiæ, an.3.ii. Lapidis lycnis. an.3.ii.
Puluerizentur subtiliter, & cum melle collato & despu-
mato q. fiat electuarium, dosis est 3.iiii. vsq; ad 3. viii.

Benedicta dr ab effectu, & ab eo denotatur, quia bonum
effectum inducit, unde ab oibus sumentibus benedicitur.

Foeniculi si simpliciter inuenitur de semine ipsius intelli-
gendum est, non autem de radice neque de herba.

Sextaria multiplicia sunt, & diuersificatur fm diuersita-
tem rerum. f. n. dicitur aquæ v. x. vnum, tunc idem est quod
lib.ii. s. Si aut nini sexta. vnum, idem est quod lib.ii. vn. viii.
Si vero sexta. unum olei, & idem est quod lib.ii. vltimo sepe
inuenitur sexta. unum mellis, & idem est quod lib.iii. quare
nota has differentias: quia sepe uidi errores contingere in
componē medicinarum, & non à vulgaribus aromataris.

CONDITION de fecalul Mesue renes calefacit, &
coitum excitat, ventositatem stomachi dissoluit. Et
modus operationis eius est.

R. Radices earum albas grossas, & teneras, & radā
tur cortices eius cineritii, & elixentur, & mundenur a uen-
is interiorib; & incendant in frusta, sicut est mensura polli-
cis, & ponat in eis uacuitatis arundinosi frustū zingibe-
r, humectati sicut dicemus in ca. de zingib. cōditio, & gra.ii. hu-
mectatū, & accipiant ad oē pondus eorum mellis pondera
tria. Et alii ponunt mellis pōdera duo, & zuchari pōdu. i.
post coctū fuerit cū facilitate, & epiciant sup illud spēm
alephangine partes conuenientes & dosis eius est 3. i. vel. ii.

CONDITION de acoris Mesue, ualeat ad aggritudines ce-
rebrī, et neuorū, et modus eius est, sicut fecacul cōditum
adducit ad omnem partem eius fecacul boni partes. ii.

CONDITION de bāucia Mesue ualeat sicut fecacul, & e-
ius modus est sicut fecacul.

CONDITION de cydoniis Mesue fluxum uentris, et uomi-
tum sistunt, stomachum uero confortant, & digestionem.

R. Cydonia magna mūda a putrefactione, & mundenur
a cortice suo, & granis interiorib; et incendantur in frusta cō-
uenientia, & decoquant cū iulep multæ aquositas, & post
diē unū decoquant cum alio iulep, quod est uicinum pfe-
ctæ coctioni vsq; dē periciantur in eis decoctio: deinde aco-
matizentur cū mūco, & ponant in uase uitreo, & sepeliantur
cū iulep in quo decocta fuerunt. Et quidā decoquant cū
melle. Et quidā cū uino coctō decoquant, & quidā super cō-
dunt cum speciebus aromaticis & alia. Et alii faciunt alia,

CONDITION de citro Mesue stomachum, & cor cōfo-
tat, & digestionem facit, & bonum oris odorem.

R. Cortici citri mundatorum a corticib; suis et propriis
magnorū corticū sunt uel manus quantitatē quā uolueris, et
fundatur super eos liscini clari quantitas in qua submergāt
et mutetur super eos usq; ad nouem dies semel in die aqua
deinde post illud mittatur super eos aqua clara tñ usq; do-
nec dulces fiant, & abscondat amarocto eorū, tunc uero eli-
xentur in aqua fontū plurima in uase mundo usquēdū tēp-
rescant, deinde exprimentur donec fluat aquositas eorū,
post illud infundatur super eos in uase lapideo iulep quanti-
tas aliqua qua submergantur, & sic dimittantur per diē & no-
ctem, et sit iulep ex zucharo albo, & aqua q̄ sit triplū ipsius:
deinde coquantur cū facilitate vsq; ad modū penidii, tūc uo-
ro separentur cortices citri a zucharo, & recōdantur in ua-
se uitreato, & condiantur cum iulep rosato, cuius decoctio
sit sicut nabit, ita q̄ una superficies sit laminarum citri, & a-
lia iulep, & recondē, & da post mensem. Et sunt qui aroma-
tizant cum ambra, & musco &c.

CONDITION de zingibere Mesue confert ad frigida-
tem, & stomachi mollificationem, & malitiā digestionis, &
corruptionem ipsius, & acetofam eructuationē, & lenitatē
uiscerum, et multitudinem uentositatum, faciens cibum cito
penetrare ad hepar, et totum corpus, et modus eius est.

R. Zingiberis recentis si haberi pōt, uel salē humectat partē
tem unā, mellis boni partes tres zuchari partem unam, co-
quantur sicut fecacul. Et quidam accipiunt fecacul, et zingī-
beris humectati an. partem unā, et sit delicatus. Et quidā su-
per conditiunt cum spēsbus alephanginæ. Et quidā faciūt alia,
modos autem humectationis eius est sicut diximus de Ka-
bulis, & proprie ut infundantur in aqua: deinde sepeliantur
in harena. Et sit zingiber album, mundum, et recondē.

CONDITION de zingibere Mes. ualens sicut superius dixi-
mus. Accipe zuch. albi partes octo, mellis tabazer partes
quatuor, zingib. boni puluerizati pulverizatione ultima si-
cut alcohol partes tres, aquæ infusionis zingib. q. d. distempe-
retur zucharam cum aqua, et melle, & coquantur usquēdū
sufficiat: deinde proiciatur super illud pulvis zingiberis et
agitetur, et incorporetur cum eo & administretur.

CONDITION de piris Mesue, stomachum, et cor cōfo-
tans, & modus condiendi ca est sicut cydoniorum.

CONDITION de pomis Mesue cor confortans, synco-
pim, et cordis pulsū sedans. Et modus condiendi est sicut
cydoniorum.

CONDITION de persicis Mesue stomachum calidum
& cor confortans, sitim reprimens, oris fetore abscindēs,
Et modus condiendi est sicut cydoniorum.

CONDITION de Kēbulis Mesue stomachū confortans,
& appetitum prouocans, digestionem procurans, sensus &
rōnem uigorans, uisum clarificans, uentes eis in iuuēntute
conseruans. Et modus cōdiendi est, ut accipias ex eis humi-
dis si haberi pōt uel saltem humectatis fm artem qua hume-
ctari pōt quantitatē quam uolueris, et cū stylo punge eos
undiq; & decoq; eos in aqua cū facilitate ulquēdū tēp-
scāt, post hoc dimitte ipsos super tabulam, et exprime aquā
illorū, et submerge illos in aquā mellis: et dimitte eos per
duos dies: tunc uero decoque eos igne lēto cum facilitate,
& postq; decocti fuerint recondē eos in uase uitreo, & sub-
merge eos in melle decoctionis eorū. Et da post sex mēses.

Ats alia auxiliatur ipsos in humectādo hoc modo. Infun-
dantur in aqua plurima, & exponantur radis solaribus per
dies octo, deinde accipe uas magnum sicut dolium, uel sal-
tē fiat fouea magna sup terra in loco humido, ubi intūs mul-
tam harenam humidam ponas in qua disfundim sepeliatur
sepe ac' eque aquam superfundendo, et inuouando harenam
de quinque in quinque, aut de quatuor in quatuor diebus
usquēdū tūmescant, et humescant.

CONDITION de myrobala. emblicis Mes. stomachum
cōfortans, et humidatē ipsius abscindēs, et pparans ipsū
pparatione, qua partes, et uirtutes eius aggregantur in ip-
sum. Et modus condiendi eorū est. Accipe ex eis quantitatē
quam uolueris, & infunde super eos aquam, et expone soli
quousque

quousq; tumeſcant, et humeſcent, poſt exprime in aqua mel liſ, et dimitte per duos dies, deinde coq; cū facilitate: poſtq; cocti fuerint dimitte eos ſtigidare, et adde cū melle tabar zet, ſicut cū quarta parte totius, et recode. Quidā uero ſup condunt cū ſpēbus aromaticis, ſicut eſt cinnamomum, et gallia, et cardamomū crocum muſcum et ſimilia etc.

CONDITVM de citro alio mō Aui. in .ſ. can. conueniēs ad debilitatē ſtomachi, et digerit cibū. Sumat citrū recens, et incidat ſm longitudinem in quatuor partes totū citrū, et mundeſterius totū acetofum, & proiciat in liurello teſteo: et ſfundat ex aqua dolci clara cū ſale groſſo albo ſeptē diebus donec ſtringatur: deinde ſeptē diebus aliis ſine ſale: imo cū aqua donec alteretur color eius, et ſit albi illud qđ eſt exterius, ſicut quod eſt interius, et guſte aqua tā diu donec nō ſit in ea falſedo: et ſumant mellis boni pars. i. aq̃ partes duz ſm quāritatem quę cooperiat citrū, et proiciat in uafe, et decoquant leni igitur duabus horis, deinde tollatur ab aqua, et melle: et in mane ſumatur mel, et ſerueat, et tollatur ſpoma eius, et proiciatur in eo citrum, et ſerueat bullitione una: & tollatur, et reducat citrum in liurello et puluerizetur ſuper ipſum iſtę medicinz ad oēs duas eminas citri, croci, & heil, & cardamomi, omnium an. aur. i. garyophyllorum & cinnamo. amborum an. aur. ſ. Muſci ſexta & medietas ſextę. 3. i. Tere has medicinas, & pulueriza ſuper citrum ex utroque latere eius, & proiciatur in uafe, & proiciatur ſuper ipſum mel, & adminiſtretur.

CONDITVM de citro. Deſcriptione alia Aui. in .ſ. can. Sumat de citris media matura æqualis ſupficie longa, et ſcinditur in longū: & ſiant de unoquoq; citro quatuor fruſta: & in fundant in liurello teſteo nouo: & illud ſit in Kenini. primo qđ ſol ingredit ſ Capricornū. Et melius quod fit de eis eſt in anno uehementis frigoris: citrū quantum poſſet cōgelat ſuper ea æqua eſt magis indurans ea, & ſunt magis remanentiadeinde de ablutur in oī die bis: poſtquā fricata ſunt cū ſale groſſo: & mundeſcentur, & reducant ad aquā frigidā uſquequē trā ſeant ſuper ea tres hebdomades: deinde extrahatur ex aqua, & fundant ſuper planū aliquod, ut tabula, & mundeſce cū cultello, ſi ſi aliquid cōpuitrit ex eis, & reducat ad aquā dulcē, & abluantur in extremitatibus diei cū facilitate donec prætereant ſuper ea xl. dies deinde extrahantur ab aqua & ablutur ab oibus quę adueniūt eis ex putrefactione, et corroſione, & dimittant die & nocte donec auferant ab eis humoroſitas: deinde ponantur quaſi in mane in uafe habētē la tū caput: aut patella munda, & effundatur ſuper ea tantum aquę quod ipſa cooperiat, & puluerize ſuper ea de zucharo contrito quatuor et tertii pondus citrorū, & decoquant igne leni & miſceantur cū ſpacula: deinde extrahant, & abſtergantur, & mundeſcentur & ponant ſuper planū, ut eſt tabula, & dimittantur duobus diebus continuis, deinde reducantur ad patellā, & proiciantur ſuper ea de zucharo quātū eſt medietas ponderis citrorū, & aquę quę cooperiat ea: et ſi ſuperfluat quatuor digitis cōiunctis, decoquantur lento igne ſicut coxiſti ea prius: & caue in hoc ne corrūpantur in igne: qm ſunt debiliora eorū quę condierunt. Et ſit mens tuis: & intellectus tuus totus ad ea: quia ignem accendiſ ſuper eis, ut ſit ignis lenis et quietus. Deinde extrahantur & expā dantur ſuper tabulę deimitantur tribus diebus continuis, & noctibus ſuis: & a die quarto mundeſcent, & mundeſcent cū capite cultelli: & reducat ad uas, & fundatur ſuper ea mellis collati quāritas quę cooperiat ea: et ſuperfluat quatuor digitis, et decoquantur lento igne quinq; horis, aut ſex donec uideatur mel egredi ſup illud qđ apparet de citro, ſicut ſimilitudo margaritarū, & ingroſſeſcit mel in groſſationē aliqua deinde auferant ab igne & ſtigidant, & ſumantur ſpice, & garyophylli, & cinamomi, & zingiberis, & cardamomi, & macroperis, & giriboe: oium ana pars. i. & ſit pō dus oium quāritas medietatis decimę ponderis citrorū. Et eſt uſus duo ſextaria, p. unaquę; emina citrorū: & cerantur groſſe: & ponantur in uafe uiridi uitriato: & puluerizentur in eores parua de medicina: & fundatur de ſuper citra quāritas tunicę uniꝝ, deinde puluerizentur ſuper ea medietatē: & ſit cū eis ita donec cōpleant ambo ſimul: deinde

fundant ſup ea ſi patella de religis mellis donec cooperiat ea & ſupfluat quatuor digitis, & ſtingat caput uas, & ponat illoco: quo nō adueniat ei frig: neq; humorofiſtas. Et ſcias qđignū maturatiſſi citri ē ei ſubmerſio liurello ſub aquā &c. **CYDONIA** condita. 5. can. Aui. quę conueniunt ad cōfor tandū ſtomachū & ſtringunt naturam, & ad malitiam digeſtionis, & uomitum propter cauſam oriſis ſtomachi. Sumant cydonia bona magna, & mundeſcent interius & exortici centur & incidantur in fruſtra, & decoquantur cum aqua, & mellā: & ſint aquę partes ii. & mellis pars i. Quidam uero decoquūt ea cū uino & melle, & eſt melior operatio: & infrigidentur. & in die ſecundo decoquantur cū melle ſolo: deinde expandantur in liurello, & puluerizentur ſuper ea medicinz prædictę in citris, et fundatur ſup ea mel & ſeruet. **CYDONIA** condita. Deſcriptione alia. 5. can. Aui. quę cōferunt ad debilitatē ſtomachi & ſolutionē uentris. Sumant de cydoniis matura & incidantur in quatuor fruſtra et mundeſcent qđ eſt in interiore parte eorū ex granis & abſtergant interiora eorū cū mantili de lino, & fundantur ſuper ea mel liſ pars. i. et aquę partes quatuor cū quāritate qđ cooperiat cydonia, & ſerueant duabus ebullitionibus aut tribus: dein de colentur, et reducantur ad uas, et fundatur ſup ea mellis deſpumati pars. i. et aquę pars. i. et bulliant ebullitionibus duabus aut tribus: deinde colentur et expandantur ſup planū aliqđ ut eſt tabula, et dimittantur donec exiceſſ qđ in eis ē de humorofiſtate: deinde abſtergant & reducant ad uas, et fundat ſup ea mellis quāritas quę ſubmergat ea, et emineat quatuor digitis cōiunctis, et ebulliant ebullitione una, et puluerizentur ſuper ea ipſes quas diximus in operatione citrorū, & ponantur in uafe uitreato uiridi, et oppiletur ſtriſtē caput eius quidam uero medici non proiciunt ſuper ea de ſpeciebus nifi de cardamomo et garyophyllis et crocū.

CONDITVM de cucurbitis magiſtrale quę conueniunt ſto machis calidis, et ſitit extingunt. Accipe cucurbitas longas natas uerſus ortum ſolis nō nimis teneras nec nimis duras et rade corticem earum deſuper, et incide in fruſtra magna ſicut palmā manus, et munda molliculam interius, et poſtea infunde eas in aqua ſeruentiſſima per nouem dies et noctes ſemper mutando quotidie aquam ſeruentiſſimam ſemel in die, poſtea accipe dictas cucurbitas, et pone in melle colato et deſpumato, aut zucharam album clarificatum non nimis calidum, et ibi dimitte per octo dies, et poſtea permuta in alio melle colato et deſpumato, aut zuch. clari ficato, et ſit bene coctum ſicut iulep, et caue quod mel aut zucharam non remaneat aquoſum, et ponantur in uafe uitreato et cooperiatur os eius. Et ſunt aliqui qui aromatizat cum ſpeciebus aromaticis, aut muſco, etc.

CORNELINA conſectio delectabilis et multum conſtricti ua, et ſit ſicut marenum nec poſſe minus tam in forma ſolida quam in forma zele.

CONTRACTIO hamech primę deſcriptionis Meſ. quę in uſu eſt, ualet omni paſſioni quę fit ex cholera et phlegmate ſalto quę eſt ſicut impetigo, ſcabies, lepra, cancer, corroſions et ſimilia, et eſt conſectio medicaminis, et medicina ſublimis iuuamenti: cuius permixtio.

Myrobalanorum citri-	Agarici albi. an. 3. xviii.
norum. 3. iiii.	Abſinthii.
Myroba. chebulorum.	Aſtix. i. thymus.
Myroba. indorum.	Follicu. ſe. an. 3. viii. in alia. 3. vi.
Rheubar. electi. an. 3. ii.	Succi ſumiteri 3. lib. i.
Colloquidie interioris albę.	Prinorum numero lx.
Polypodii uiridis.	Paſſularum 3. vi.

Intundantur hec omnia in aqua caſei quāritate ſufficiēti et ponantur in uafe uitreo ſtriſti oriſici et obturetur os eius et dimittantur per dies quatuor: deinde bulliant ebullitione una, poſtmodum coletur et in tali colatura addatur. Tamarindorum 3. v. Terenabin. li. uanna 3. ii.

Fricentur manibus et diſſoluantur cum decoctione prædictā: deinde colentur et proiciantur ſuper iſtis. Zuchari lib. i. s. Scamoneę 3. i. s.

Ethęc omnia ſimul coquantur donec habeat ſpiſſitudinem mellis: deinde puluerizentur ſuper illud.

Myrobalanorum citrinorū,
Myrobala.chebulorum,
Myrobal.indorum an.3.iiii.
Myrobala.embulicorum,
Myrobala.bellericorum,

Rheubarbari,
Sem.sumiterræ.an.3.iiii.
Seminis anifi,
Spicæ indæ an.3.ii.
Dosis ei' ē.3.ii.vij. ad au.ii.

Tereniabin est species mannæ quæ apud nos non reperitur, sed loco ipsius accipimus mannæ: est. n. tereniabin ros quæ de nocte cadit in quibuldam partibus Aegypti super fides aliquarum arborum, & sic colligitur, ut habetur in sacra scriptura. Exodi in capitulo 16.

In ista confectione intelligendum est q. autor coquit scamoneam ut amoveat malitiam eius, quia non est præparata, q. si præparata esset non deberet decoqui, sed reservari secundum canonem medicæ: deinde pulverizare eam grossi modo, & cum aliis rebus pulverizatis apponi, q. si decoqueretur virtus solutiva ipsius deperderetur.

Incidenter de aqua lactis hic intelligendum quod ponitur aqua lactis capræ, quod melior est &c.

CONJECTIO de manna Mesuz de mente Galeni est medicina nobilis operationis & bonæ solutionem enim efficit facilem & educit cholera citrinam sine molestia, & valet ad ægritudines factas ex ea & est medicina delectabilis boni saporis, cuius permixtio.

R. Mannæ puræ & recentis lib.i. scamoneæ antiochiæ. 3.i. Dissolvatur manna cum succo rosarum rubearum, & sit succi quantitas conveniens ciferarum l.i. & coquatur cum facilitate donec habuerit sufficientem coctionem: deinde ponere super illud masticis. 3.iiii. & da. 3.iiii.

Inquit Galeni ostendit compositio huius medicinæ nobilitatem eius, est enim composita ex partibus convenientibus complexione & proprietate.

Tereniabin synacost & manna inter se differunt: nec est manna ut quidam dunt: in uno differunt & fm patris, & fm loci in quæ cadunt, & fm virtutē & complexionē: synacost. n. & tereniabin calidiores & humidiores sunt manna, sed quia ad nos non portantur, ideo ipsorum loco ponimus mannā.

Quidam doctores volunt quod diagrydium & non scamonea hoc in loco ponatur. Sed sua semper pace salva si poneretur & decoqueretur virtus solutiva fere in totum deperderetur: coctio enim est præparatio dicitur scamoneæ, quia illa non diagrydium est ponendum.

CONJECTIO de storace magistralis, illa Mesuz & Nicol. non est in usu propter opium: valet. n. & confert ad superabundantem fluxum cholerici ventris & phlegmaticis & ad tenationem factam a frigidityte: cuius permixtio. R. Passularum electarum & Cinnamomi electi. 3.i.s. vltimæ contritarum. 3.i. Storacis calamitæ. scrop.v. Liquiritiæ rasæ. 3.vi. Boli armeni loti & præparati. 3.iiii. Ligni aloes, Nucis muscatæ an. 3.i.s.

Pulverizentur subtiliter oia & cū zucchar. 3.xv. dissoluti in aqua betonica & foliorū violarū fiat coctio in morsellis.

Confectio. n. nihil aliud est quam compositio diuersorum. Modus lauandi & pparandi boli armenū talis est. Accipe de eo quantitatē quā volueris, & tere subtiliter, postea in fundatur super eū quantitas aquæ rosæ irroretur: deinde in umbra permittatur exiccare, & iterum post exicationē conteratur, & aqua ros. irroretur, & ter ut primo hoc fiat postea reserua: illud enim dicitur lotum & præparatum.

Storacis simpliciter si scriptum reperietur, de storace calamita intelligendum est.

CONJECTIO de cinnamomo Mes. quæ est medicina sana & experta ad humorositatem stomachi & putrefactionem in eo phlegma digerit, & digestionem attrahit.

R. Cinnamomi subrilis electi. Cardamomi an. 3.iiii. Zingiberis, Heil. i. cardamomum minus & est melegeta, Macis, Nucis muscatæ, Ligni aloes an. 3.iiii. Croci. 3.i. 3.xv. Darfeni. i. cinnamomi grossi Cimini, Radicum enulæ an. 3.iiii. Galangæ. 3.iiii. Garyophyllorum Piperis longi,

Zucchari tabarzet idest albi. Musci. 3.i. partes duas idest scrop. ii.

Pulverizentur subtiliter oia. Mellis despumati & colati q. s. & fiat coctio in forma solida, ut supra tibi ostensum est.

Coctio hæc licet in usu nō sit tñ quia in ea aromatari folent dubitare: igitur nota q. cum in una compositione scripte reperies daturæ p se, semper debes apponere cinnamomū electū: si uero & darfeni & cinnamomū ut in superiori uidiisti utrunq. s. subtile & grossum est ponendum, nec auscultes illos dicentes, q. per darfeni intelligitur macis. hæc. n. opinio reprobat a est Christophoro de honestis super Mesuz.

Scdō est intelligendum q. cū reperies in una recepta heil per se: de cardamomo maiori semper est intelligendū: si uero ambo reperiat, ut in superiori, & maiorem debes apponere: non autem garyophyllos ut quidam dicunt.

CASSIA fistulata pro clysteris magistrali, valet ad mundificandum sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & mundificat stomachum, & educit cholera & phlegma, & operatur sine nocumento, & resoluit apostemata & confert calefactionis permixtio.

R. Florum uolarum, Bletarum, Parietariz an. M.i. Absinthii romani. M.s. Maluarum, Mercurialis an. M.i.

Oium uiridū: fiat ex his decoctio in sufficienti quantitate aqua: postea coeatur manibus exprimendo, de qua colatura dissolvatur casiz extraxta lib. i. mellis electi lib. s. & coquatur usque ad consummationem decoctionis & referuetur.

Herbæ omnes præscriptæ ex quibus decoctio hæc fieri debet uirides esse debent, eo quia sunt magis lenitiuæ: si uero haberi non possint, sicca ponantur.

De absinthio nota q. ipsum diuersificatur fm diuersitatem loci & patriæ, in quibus orit: ideo q. dicitur & reperitur in receptis absinthii romani, hoc est quia illud est melius aliis: una tñ & eadem est species, sed quia illud haberi non potest, eligatur illud quod in montibus & locis saxosis oritur, quia melius est quā qui nascitur in locis humidis & umbrosis, & colligi debet in Mese Iulii, & in umbra exicari. Inter enema & clystere differentia est: nam clystere est instrumentum quo decoctio in intestinis impellitur: enema autem est ipsa decoctio, & medicina quæ iniicitur.

CASSIA fistulatum de melle & de zuccharo sic fit.

R. Prunorum nu. xxx. Seminis anifi an. 3.ii. Violarum, Medullæ casiz lib. ii. s. Tamarindorum, Mellis lib. iiii. s.

Et fiat electuarium, & ad faciendum de zuccharo loco mellis accipe zucchari candi. 3.iiii. Mannæ electæ. 3.ii.

Et nota quod decoctio debet fieri de prunis uiolis & anifi supra scriptis.

CASSIA fistulatum alia magistralis, valet cuius pmixtio.

R. Pulpæ casiz, Tamarindorum. 3.vi. Pulpæ prunorum damascenorum Mellis lib. iiii.

Cassia & tamarindi dissolvuntur cum decoctione maluarum matrum uolarum & mercurialis in quo sint coctæ prunorum damascenorum quantum sufficit.

CODOGNATA de zucchi. fine spēsbus sic fit: valet sumen tibus ante cibum ad confortandum & fortificandum stomachū, et sumendo post cibū ad restringendū fluxum succentibus per horam ante cibū: & similiter post cibū immediate. R. Poma cydonia a cortice ipsiū & ab aia interiori mundata, & cū pauco uino uermilio antiquo coctæ & in magdalena reducta lib. viii. zucchi. boni & clarificati lib. vi.

Et q. sint ab aqua consumati misce & coquantur oia simul semper agitando cū spatula donec cocta sint & serua hæc est. n. uera codiz zucchi. quæ in codognata apponenda est, alii ponunt æquale, sed prima melior est, & debet stangezari cū baculo super ignem hinc & inde vsquequo cocta sit.

CONDITUM de cydoniis cū perlis magistrale stomachū & cor confortat, & fortificat & uentrem stringit mirabiliter:

ter: cuius permixtio.

R. Seminis coriandrorum Margaritarum non perfora-
preparatorum, Zucchari lib.ii.
Radicum cyperi,
Cinnamomi fini ana.3.i.

Et fiat coſectio in forma manuſcripti cū uino cydoniorū.

CEROTVM Galeni emendans uitia ſtomachi Meſue ſtomachum confortat quæ ex frigidityte ſunt preparans & confortans appetitum & digeſtionem cibi & cōfortans hep-
par & ſedans dolorem eorum.

R. Roſarum rubearum, Tere ſubtiliter & accipe ce-
ra nouæ.3.iiii.
Foliorum abſinthii ſicci, Olei roſati lib.i.3.vi.
Maſticis.ana.3.xx.

Spicæ indæ.3.xx.
Diſſoluantur oleum & cera ad ignem, & lauetur lauatio-
nibus pluribus cum aqua roſata: deinde iterum lauetur cū
uino uermilio ueteri & fucco cydoniorum & pauco aceti
deinde miſce cum ſpeciebus ſupraſcriptis.

CEROTVM hyſſopi deſcriptione Philagrii. Meſue ex-
pertum ad dolorem ſplenis ſtomachi & hepatis & duri-
tiam in eis & dolorem matricum, & apoſtemata in eis ſinitū ex-
terius,uel etiam ſuppoſitum in lana. & ualet ad durities &
nuſſitates quæ ſunt in iſſis:cuius permixtio.

R. Croci.3.v. Cera citrinæ.lib.i.
Bdellii, Terebinthinæ.3.i.s.
Maſticis, Medullæ cruris vaccæ,
Armoniaci, Adipis anferis ana.3.v.
Storacis liquidæ, Hyſſopi humidæ lib.i.3.vi.
Aloes.ana.3.viii.

Bdellium aromaticum & aloes diſſoluantur in aqua inſu-
ſionis ſcœnugræci & ſorum camæmillæ, & cum cæteris fiat
cerotum, & poſt Philagrium addiderit expreſſionis ſquili-
læ.3.iiii.olibani.3.i. ſepi utili.3.xv. in alio cera nouæ lib.i.
minus quarta, & eſt conuenientius.

CEROTVM oxyrocii ſecundum Nicolaum maiorem
in antidotario, ualet ad fracturas coſtarum, fracturas oſſiū
& mirabiliter confortat & ratificat.

Croci, Galbani.ana.3.i.s.
Picis naualis, Armoniaci,
Colophoniz, ideſt picis Myrrhæ,
græcæ, Olibani,
Cera citrinæ.ana.vnc.iiii. Aloes,
Terebinthinæ, Maſticis.ana.vnc.i.s.

Conſiciantur ſic: galbanum armoniacum aliquantulum
contuſum ponatur in aceto per diem & noctem:mane uero
ponatur ad ignē uſq; ad liquefactionem diuidendo: poſt li-
quefactionē colet, & iterū coquatur uſquequo aceti conſu-
metur:& tunc addantur pix naualis liquefacta & colata, ce-
ra,colophonia,& terebinthina:& interuallo facto ponantur
maſtis,olibanum,myrrha,& aloes ſemper cum ſpatula agi-
tando,ad ultimum cum coſum fuerit in aqua frigida pona-
tur:& extracto ad aqua manibus exprimatut ut tota aqua
exeat,& ſuper marmōr unctum oleo laurino puluerem cro-
ci ſuperpoſitū malaxet, & factis magdaleonibus referuetur.

De croco hoc in ceroto a uariis diuerſimode ponitur,q-
dam poſt perfectam coctionem, & poſtea amotum eſt ab
igne crocum intus ponunt, & cum aliis rebus bene incorpo-
rant:& modus iſte magis a doctoribus laudatur:alii uero ſu-
pra dicto modo faciunt nec inuiliſ eſt.

CEROTVM pro colli magiſtrale, cuius permixtio.

R. Maſticis, Cera nouæ,
Galbani, Abſinthii,
Opoponaci, Seminis ſcœnugræci,
Serapini, Florum camæmillæ.ana.vnc.i.
Armoniaci, Croci.3.iiii.
Picis naualis, Muſcullaginis ſcœnugræci,
Hyſſopi humidæ, Muſcullaginis feminis lini,
Thuris ana.vnc.ii. Muſcullaginis althææ.ana.vnc.
Terebinthinæ.vnc. ii.& 3.iiii.

Miſce & ex his fiat cerotū diſſoluendo prius gummas in
aqua decoctionis althææ ſcœnugræci & femin. lini,pulueri-
zando etiam puluerizanda reducantur ad formam ceroti.

Camæmillæ ſi ſimpliciter ſcribitur uel ſcriptum reperia-
tur, ſemper de flore eſt intelligendum.

Mucillago althææ ſi ſimpliciter ſcribitur uel ſcriptum re-
peritur,de radice facienda eſt, ut doctores uolunt.

CEROTVM hyſſopi deſcriptione Pauli Meſ. ualet ut
diximus in deſcriptione Philagrii cerotū, cuius permixtio.

R. Armoniaci.3.x. Aloes,
Bdellii.3.v. Olibani.ana.3.iiii.
Sigæ,ideſt ſtoracis liquidæ. Cera nouæ.3.iiii.
3.iiii. Sepi utili,
Croci.3.i.s. Medullæ utili ana.vnc.ii.
Maſticis.3.i.s. Hyſſopi humidæ.3.xl.
Ireleoni.olei nardini quantum ſufficit,& fiat cerotum.

CEROTVM pro renibus magiſtrale repertum utile atq;
mirabile ad prohibendum abortum in muliere prægnante
uidi de eo utilia experimēta & maxime in illuſtriſſima nūc
quondam comitiſſa Brixie in partibus ultramontanis uxore
illuſtriſſimi Philippi dñi de Sabaudia q̄ habuit duos abor-
tus,et approximato ceroto aliquo ſuo tpe portauit,et illo
ſemel relicto iterū ad abortum uenit in multiſq; aliis ma-
tronis & mulieribus illud; ualde opauit:cuius permixtio.

R. Maſticis eleſti vnc.i. Corallorum rubeorum,
Laudani.3.vi. Sandalorum,
Cera citrinæ.3.iiii. Mente ſiccæ,
Radicum biſſortæ, Seminis coriandrorum
Nucum cupreſſi, preparatorum,
Succi hypoquiſtidis, Gallix muſcatæ,
Sanguinis draconis, Terræ ſigillatæ.ana.3.ii.
Roſarum rubearum, Olei oliuarum completarum
Acaciz.ana.3.ii. lib.iii.

Puluerizentur puluerizanda, & factæ cerotū in bona forma
& q̄ ſit tenax, & ſi nō eſt tenax abdatut parū terebinthinæ.

Cerotum dicitur a cera quia oē cerorum recipit cerā uel
aliquod loco ceræ:& eſt quoddam medium inter unguentū
& emplaſtrum,ſpiſſius unguento & liquabilius emplaſtro.

CEROTVM pro crepatis Gentilis in ſuis conſiliis con-
ſilio primo præcioſiſſimum & expertum:& eſt in uſu in di-
uerſis partibus: cuius permixtio.

R. Picis liquidæ, Serapini,
Conſolidæ maioris, Conſolidæ mino.ana.vnc.i.
græcæ, Gallarum,
Cera citrinæ, Nucum cupreſſi,
Ariſtolochiæ longæ, Boli armeni,
Ariſtolochiæ rotundæ, Vermium terreſtrium,
Aloes.ana.vnc.iiii. Mummiz ana.vnc.vi.
Lithargyri aurei, Thuris,
Armoniaci, Viſci quercini,
Opoponaci, Lapidis hematitis,
Galbani, Olibani,
Maſticis, Gypſi,
Bdellii, Myrrhæ.ana.3.iiii.
Sumach, Sanguinis draco. vnc.vii.
Terebinthinæ ana.vnc.i. Sanguinis humani lib.i.

Conſice ſic. Accipe pellem arietinam cum pilis inde re-
moſta coquatur in aqua tam diu donec tota liqueſcat: & po-
ſtea permittit aquam inſrigidari & reſidere, deinde accipe
ſpēs bene tritas & cribellatas,et gummx prius trā diſſoluā-
tur in aceto forſitimo quæ diſſolutæ ſanguine commiſcean-
tur:& hæc omnia permisce in colatura aquæ pellis arietis
in cacabo fac ut ſimul bulliant donec ad nigredinem & for-
mam ceroti ueniant & utere.

Sanguinis humanus debet extrahi ab homine ſano, ſanæ
complexionis, & poſt extractionem debet in ceroto illico
poni, eo quia longa ipſus extractio corruptionem inducit.

CEROTVM de muſcullaginibus magiſtrale, ualet ad mol-
liſcandum, reſoluendum, maturandum omnem duri-
tiam & inſtationem, & eſt expertum.

R. Muſcullaginis althææ, Muſcullaginis feminis lini,
Muſcullaginis ſcœnugræci, ana.vnc.vi.
Fœcis olei linotæ.vnc.iii. Bdellii,
Lithargyrii, Armoniaci,

Opopanax ana. ʒ. ii.
Olei de lilio. ʒ. iii.
Terebinthina. ʒ. iii.
Storacis liquida. ʒ. ii.
Puluerizetur puluerizanda, & ex his fiat cerotum in bo na forma.

Nota q̄ quando storax simpliciter reperitur, de calamita est intelligendum, cum melior sit aliis speciebus, nam calamita idem est quod bona gutta, a calos quod est bonum, & mitos quod est gutta, ex his completur.

CEROTUM aliud ad crepatos de pelle arietina secundum Rainaldum de Villanova in libro. 3. in cap. de crepatura cap. trigesimo, & est multum in usu: cuius permixtio.

R. Lithargyri aurei. Ceræ albæ.
Opil. Ceræ rubræ. ana. ʒ. i.
Sedene. i. lapis hematitis Radicum consolide maioris.
ʒ. ʒ. i. Radicum consolide medianæ.
Sanguinis draconis, Radicum consolide minoris.
Boli armeni. ana. ʒ. iii.
Masticis, Rosarum rubearum.
Armoniaci, Myrrhæ.
Mummæ, Aloes. ana. gra. xv.
Galbani, Pallæ marinæ. i. balz marinæ.
Thuris, combustæ.
Colli. Balustiarum.
Lumbricorū terrestrium, Aristolochiæ rotundæ.
ana. ʒ. s. Gallæ. ana. ʒ. vi.
Picis naualis usualis, Viscæ quercini. ʒ. ii.
Picis græcæ. i. colophoniz. Sanguinis hominis.
ana. ʒ. i. rub. ʒ. ix.

Conficiatur hoc modo. Accipe pellem unam hædinam uel arietinam cum omnibus pilis suis, & decoquat quasi bulliendo per totum diem: quousq̄ tota liquefacta sit: & fiat sicut colla, & parū uel nihil de aqua ibi remaneat. deinde ex illa aqua accipe lib. i. optime cum staminea uel panno colatam: & adde cum eo uisum quercinum, & in olla noua lento igne fac liquefieri & bullire, & cō baculo semp̄ & contrineucas, aut per alium duces facias: deinde lumbricos terrestres, post cerā & picē addas: deinde adde terebinthinā. i. gummi albotin. ʒ. ii. postea colophoniam, masticem, myrrham, armoniacū, & galbanū adde, & liquefac in simul, & cō baculo semper deuantur: & signū q̄ erit coctū est q̄ ponat una gutta ex eo super lapidē marmoreū, seu super cultellū oleo unctum quod cō infrigidatum fuerit, si malaxetur & optime coaguletur, tūc signū est perfectæ coctionis: sin autē lento igne bulliat, & fiat, & usui reserua in pelle pecorina uel arietina. Et istud cerotū est illud quod generaliter utunt doctores sub noīe ceroti ad crepatos, uel sub noīe ceroti cō pelle arietina. ibi Rainaldus dicit, q̄ crepatura accidit sepe in mulieribus & robustis uirīs, qui uolunt nimis saltare uel currere, uel maxima pondera portare, uel petras grossissimas iactare, uel eas uiriliter eleuare, uel ex nimo & alto clamore. Et Bartho. Montagna in suo antidotario hēt unum emplastrum usuale pro crepatis, sed idem non est uerum id ferunt parum de quo infra. Gentilis in suis consiliis in consilio primo habet unam descriptionem de super istud, scriptā prout patet, sed non est eadem, sed ista est plus in usu.

CEROTUM de laudano magistrale, ualet ad stomachū & omnia membra mī abilitat.

R. Mentæ siccæ. Zedoariz.
Rosarum rubearum. Myrrillorum ana. ʒ. iii.
Absinthii sicci. Garryophyllorum.
Ligni aloes. Galangæ.
Masticis, Nucis muscatæ.
Cinnamomi. Macis.
Spicæ nardi. Zingiberis.
Cyperi. Gallæ muscatæ.
Calami aromatici. Colli. ana. ʒ. i. s.
Olubani. Terræ sigillatæ.
Aloes. Centonici.
Corallorum rubeorum. Centauræ maioris.
Myrrhæ. ana. ʒ. i. s. Abrotani. ana. ʒ. i. s.

Laudani boni. ʒ. viii.

Ceræ citrinæ lib. ii.

Liquefiant terebinthina, & ceræ, & laudanum simul: deinde de suprascriptis species simul apponantur.

Aliquando reperies scriptum mentæ siccæ, & absinthii sicci, & aliquando mentæ & absinthii simpliciter. Quereret aliquis quid in diuersitate dicta est faciendum. In hoc dico q̄ authores semper intelligunt de ipsis siccis, quamuis aliquando non exprimant, & aliq̄ sic: & pp expositionem uolunt postmodū intelligere de siccis: & ideo expresserunt in aliquibus mētē uel absinthii sicci id quod uolunt: q̄ tu in ceteris intelligas: nā q̄ uolunt dictarum humiditate inter herbarum, dicunt succi mentæ uel succi absinthii, quare bene &c.

D IACHYLON magnum Mef. sue cerotum, quoddam bo appellatur emplastrum, uerum quia communiter fit ad formam ceroti: ideo in eorum summa ponam, ualet ad resoluendum et ad maturandum oēm duritiem & inflationem, & est expertum, cuius permixtio.

R. Lithargyri subtiliter triti. lib. i. Mucilaginis seminis fœnugræci.
Olei irini. Mucilaginis ficuum pinguium.
Olei camæmillæ. Mucilaginis passularum.
Olei anethi. an. ʒ. viii. Succi ieros. ana. ʒ. xii. s.
Mucilaginis seminis lini Terebinthina. ʒ. iii.
ʒ. xii. s. Raxæ pini.
Hyssopi humidæ. Ceræ citrinæ ana. unc. ii.
Glutinis alchanach.

Succi squillæ. an. ʒ. xii. s.
Confectio hoc modo. Accipe lithargyrium & suprascripta olea & diu in mortario lapideo cum pistello ferreo coquantur, & elaboretur in eorum conuassatione per mediam horam saltem, deinde bulliant super ignem cū facilitate semper, & incussant agitando cum spatula donec coaguletur lithargyrium tunc deponatur ab igne & permittatur infrigidari: deinde accipe mucilagines, gluten succum, & hyssopū humidum, terebinthinam: inter eos aliqui ebullitione bulliant, deinde in mortario cum lithargio & oleis prædicta ponantur, & cum pistello tantum conuassentur, donec concedens fiat eorum permixtio. Tunc iterum oia reponantur super ignem, & cerā addita tantum coquantur, quod ad debitam formam ueniant. q̄ quod habeant folioidem coctionē, qualiter habere debet ungēt, est nihil ultra ne adurat.

Istud emplastrum est in usu, maxime fm istam descriptionē nemipie aut Mef. In titular hoc emplastrum diachylon, sed fm modum opionem debet dicere diachylon. i. compositio facta ex mucilagibus & succis pp hoc a multis dicitur cerotum de mucilagibus sine gūmis, aut diachylon sine gummis: sic sic bene legis expositores nostrorum doctorum, uidebis quod emplastrum diachylon magnū, et cerotū de mucilagibus, et unguentum diachylon sine gummis idem sunt: qui non credit, uideat in antidotario. lo. Serra. qd̄ dicit unguentū de mucilagibus, et est diachylon, idē dicit Gécilis super. ʒ. Aui. Magister Pet. de argilla. in ca. de scrophulis, ponit unguentū diachylon, qd̄ id est ibi doct̄ cetipsum conficere cum gūmis, de quo infra. Supra est pos. tum unguentum de mucilagibus ex autoritate Bar. Mōtagnæ, qd̄ pōt fieri pro diachylon sine gummis: Scias autē quod generaliter aromatarum maxime apud nos faciunt emplatra in forma mollis: cerota in forma solida, de quo aromatarum Neapolitani admittuntur, quia ipsi faciunt cōtrariū: nā emplatra faciūt in forma dura, et cerota in forma molli. Leonar. de preda palea in ca. de ulceribus profundis ponit emplastrum diaphenicon descriptione Alexandri, sed dicitur emplastrum. i. dura confectio, eadem est opinio Nicolī.

Gluten alchanach uel alchamach uel alzanach quid sit generaliter ignoratur: nequaquā uidi nec audiui ab aliquo uidisse autore autenticū de eo mentionē facere: uerū fm cōsuetudinē aromatariorū ē colla pisciū qd̄ nō nego nec affirmo certe i partibus Roms dictū fuit, qd̄ in rei ueritate glū re alchanach est quidam uiscus qui reperitur in Arabia super arborem asæ foetida, tamen Deus scit. Magister Petrus de Argil. qui sæpe et sæpius utitur isto unguento, quod ipse de

scribit in cap. allegato. & ibi loco glutinis alchanach ponit uiscum cum quo capiuntur aues: sed non intelligimus uiscū quercinum, quod conuenit in isto casu: tamen non affirmo quid sit generaliter, loco eius ponitur colla piscium, sed intentione nostrorum chirurgorum uiscus quercinus etiā ualeat. Si aut facere uolueris unguentum diachylon, seu emplastrum de mucilaginisbus cum gummis, oportet facere ut docet magister Petrus de Argilla in cap. allegato. ubi sic ait in fine descriptionis, dicens, conficiatur sicut ipse Mes. docet in antidotario, & si cum istis addatur bdellium, armonia cum, & serapinum, an. 3. i. erit diachylon gummatum siue cū gummis: tu uero scias si ponas supra unguentum diachylon sine gumis, aut cerotū de mucilaginisbus sine gummis illas tres gummas quas nominat, tunc erit diachylon cū gumis.

DIACHYLON minus Mes. siue cerotum dissoluens & maturans tumores a caliditate factos & apostemata calida: cuius permixtio est hæc.

R. Mucilaginis foenigraci. Mucilaginis althææ. 3. i.
Mucilaginis feminis lini. Fiat dicti mucilagines in aqua ana. 3. i. qua decoctionis meliloti.

R. Lithargyri subtilissimæ puluerizati 3. i. s.

Olei camæmillæ.

Olei iirini. ana. 3. i. s.

Pulueris radices ireos. 5. i.

Accipe ergo olea, & lithargyrium, & pulueriza ireos, & diu in mortario agitentur, & ut tibi ostendi in alio facias, commemorando, q̄ coctio sit inter unguentum & cerotum.

In omni compositione in qua intrant lithargyri & mucilagines, post coctionem lithargyri cum oleo, antequam mucilagines ponantur, semper debemus expectare refrigerationem uel saltem tepescationem olei in quo est lithargyrium: si enim ipsis feruentibus apponerentur, mucilagines adeo exrescerent super captiam, quod maior pars in ignem perderetur, & hoc sæpe uidi contingere famulis aromatariorum non expertis, & etiam a multis qui se magistros esse dicebant.

DIACHYLON paruum Mes. maturans & dissoluens tumores a caliditate factos, & apostemata calida.

R. Lithargyri 5. vi. Mucilaginis semi lini.

Olei ueteris clari lib. i. Mucilaginis radicū maluz.

Mucilaginis psyllii. 3. iiii. ana. 3. ii.

Mucilaginis iulquiami 3. i. s.

Eius operatio est sicut operatio alterius.

DECOCTIO communis sic fit.

R. Prunorum. Liquiritiæ rase.

Tamarindorum. Hordei mundi. ana partes

Passularum. æquales.

Violarum.

Bulliant hæc omnia in aqua infusionis quantitaris sufficientis secundum artem: deinde coletur, & reseruetur.

DECOCTIO pectoralis magistralis sic fit: cui permixtio,

R. Histopi sicce. Passularum.

Capillorum ueneris. Hordei mundi.

Ficum. Liquiritiæ rase. ana partes

Dactylorum. æquales.

Sebesten.

Bulliant hæc in aqua quantitaris sufficientis secundum artem, & coletur, & seruetur.

In hac decoctione sunt aliqui qui addunt ireos, sed quāquā pectoralis sit ego non laudo illum apponendum esse propter eius horribilitatem & malum saporem.

Decoctiones istæ & omnes aliz per tres uel quatuor dies conservantur & non plus & maxime in æstate: & inter oēs hic incidenter dicam de infusione facta in aqua lactis seu caisei, quia minus conservatur, quia uix per unum uel duos dies conservari potest.

Syrapi uero conservantur si sunt de melle per duos annos si uero de zucharo & bene cocti & in uase bene obturato per annum durante, aliter uix possunt durare.

De conseruatione iulep scias quod iulep aquosum & male decoctū pauco tpe conseruetur: & maxime tpe æstatis: iulep uero bñ coctū p annū seruat & non plus sub forma iulep.

DECOCTIO carminatiua magistralis, quæ ualeat contra omnes uentrositates.

R. Seminis anisi.

Seminis foeniculi.

Dauci,

Carui.

Bulliant in aqua secundum artem ut dictum est in aliis decoctionibus.

DECOCTIO constrictiua sic est, & sic fit.

R. Corticum granatorum Azimorum uarum, idest gran-

Balaustiarum.

Myrtillorum.

Nucum cupressi,

Gallarum.

Cupularum glandium

Samach.

Achaciz.

Bulliant in aqua plantaginis fm artem, & de dicta deco-

ctione da ubi oportet: & malum ualeat ad restringendum.

DIAPHYGLOSSATVM Mesue ualeat ad confortandum cor, maniacis & melancholicis confert, syncopim & tremorem cordis aufert, & modus eius est. Accipe florū buglosæ bene mundatorum. 3. iiii. zuchari albi lib. i. Et expone soli, & fac sicut in cap. de zucharo rosato.

DIABORAGINATVM Mesue, ualeat ad confortandum cor, maniacis & melancholicis confert, syncopim, & tremorem cordis aufert.

R. Florum boraginis. 3. iiii. Zuchari albi lib. i.

Contundantur in mortario lapideo & exponentur soli ut dictum est in zucharo rosato, in isto sic fit.

DIAMYSVS dulcis Mes faciens aulsum cordis, & ægritudines melancholicas, & ad eum qui tristatur sine causa, & confert ad ægritudines cerebri, sicut est uertigo, & epilepsia, & paralytis, & ad ægritudines pulmonis & difficultati anhelitus: cuius permixtio hæc est.

R. Croci.

Doronici.

Zedoaria.

Ligni aloës.

Macis an. 3. ii.

Albarum margaritarum.

Seræ crudæ parum adultæ.

Karabæ.

Corali rubei. an. 3. ii. s.

Calliæ muscatæ. 3. ii. s.

Ozimi citrati. 3. ii. s.

Been albi.

Been rubei.

Folii.

Macis an. 3. ii.

Garyophyllorum.

Spicæ. ana 3. i.

Zingiberis.

Cubæ.

Piperis longi. ana. 3. i. s.

Musci boni. 3. ii.

Conferat cum melle crudo q̄ sit quadruplum ponderis omnium: & pone in uase uitreo. Et sit dosis eius. 3. i. usq; ad 3. iiii.

Si autem hanc confectionem amaram facere uolueris ualentior efficietur ad ea quæ diximus, & ad exiccandum humiditates stomachi & putrefactiones in eis, & propriæ si ad datur in permixtione eius.

Rosarum rubearum, Keisim, idest semen leuisti.

Abstinii. ana. 3. iiii. ci. 3. i.

Aloës optime abluti. 3. iiii. Cinnamomi electi. 3. ii. s.

Castorei. 3. i.

Puluerizanda puluerizentur subtiliter, & fiat electuarium in bona forma.

Circa hanc descriptionem nota q̄ de seta cruda parū adusta additur. Accipe de folliculis serici noui qui nondū transierunt annum unū, & aperi, & extrahe vermes quos intrus reperies mortuos, & misce per optime: deinde pone in olla noua dictos folliculos, quæ cooperito lapide bene tegatur: deinde in furno ponatur, & tantū permittantur q̄ possint puluerizari: deinde extrahatur & ului referuentur: hæc n. cōbustio fit ut desiccet ac ut conteri possint. In una alia cōfectione infra reperies subtiliter incidantur, & et ut bene terant, igitur per hoc intelligas q̄ uterq; modus laudatur. Tamen ego non soleo hoc in electuario nec in aliis cōfectionibus cordialibus setam comburere, sed subtiliter incidere, sed si comburere uis ut uerba Mes. sonat, caueas q̄ illa adusta nō sit incinerans: immo prudētē fieri dēt, & taliter q̄ sericū solum fit puluerizabile, & remaneat seta secundum

formam suam, dicit etiam crudæ, quia per coctionem virtus eius extrahitur.

De ozimo qñ enim in compõnibus reperies scriptum ozimi garyophyllati: tunc idem est quod semen basiliconis citrinum, si uero ozimi simpliciter idem est quod semen basiliconis nigrum, & hoc colligitur a planta basiliconis habens folia lata. Citrinum uero a planta faciens parua folia. & hæc est ipsorum differentia. Citrinum .n. magis aromaticum est, & cordiale, magisque calidum. igitur in hac compositione ubi dicit ozimi citrati: tunc ponere debes de ozimo citrino, quia odorem habet de citro: prout per experientiam videri potest, fricando eum manibus dico de femine, & sic non stri aromatarii communiter utuntur.

Hic bene aduertendum est de been scriptum per deplex ee, been sunt duæ radices, alba, & rubea, & debet scribi per duplex ee, & non per unum e, neq; per h, prout patet in secundo lib. Auic. cap. 86.

Spica, aliquando enim reperitur scriptum spicæ nardi uel spicæ indæ, & ambæ idem sunt, aliquando spicæ romanæ uel spicæ celestis, & hæc duæ idem sunt.

Mel crudum est quod non est coctum: igitur si modo descripto a Mesue facere uis, accipe mellis puri li. i. supra scriptum sferum 3. iiii. & permisce, & sic habes mentem autoris, fm mel crudum quod est quadruplū pōderis oīum, si uero non hēs mel purum, potes hoc modo facere. Accipias unam quantitatem mellis quantum uolueris, & pone ad ignem ad bulliendum, et semper illum despumabis quousq; coctū sit, deinde ab igne remoueat, & post infrigidationem supra scripta sferum quantitas apponatur: & hoc modo habebis mel crudum, & a superfluitatibus depuratum: alii uero dñt qd mel crudum est illud quod manibus absq; igne exprimitur: fauo mellis, & hæc opinio non omnino sine ratione est fundata, uel illum uel scriptum accipias, quia conueniunt, & si in forma solida facere uis, fac ut supra.

Aloes succotrinum dicitur aloes optimum, quia inter oēs alias spēs aloes est melius, & lauetur hoc modo. Terať quantitas aloes tibi necessaria, & roborabis aqua pluuiali uel aqua endiuiz. Hæc .n. loto sit ut ipsius acuitas amoueatur & confortatio augeatur, donec totum ab aqua sit madefactum, deinde soli exponatur ad desiccandum, & permittatur usquequo possit denuo puluerizari. deinde iterum contere & quantitate de prædicta aqua iterum irrota, & soli exponas, & illud idem secūdo & tertio facias: demum post exiccationem referua & utere illo.

De aloes iterum est notandum, q aliqui sunt qui illum cōburunt qñ ponere uolunt in hac confectioe, & non lauant dicentes, quod per combustionem amouet sua gummositas per quā laxabat, & stomachum debilitabat: pp hoc magis appropriat alia uirtus, & alia operatio quæ est confortare: immo melius confortat. Et ad hoc notandum est q si aloes datur ad laxandum, non cōburitur nec lauatur, sed si ad confortandum, uel abluatur uel comburitur, quanquā combustio ipsius de raro fiat. Modus comburendi est, ponatur in olla munda, & super prunas permittatur donec aduratur.

Semen leuistici in compositionibus apponendum est, nō planta, neque radix, neque folia.

DIAGALANGA Mesue, ualeat contra morbos uentositatum grossarum, & acetosam eructationem medicina experta, & ad malitiam digestionis, & bonificat operationes stomachi, & hepatis frigidi, imo emēdat defectiōē ipsorū.

Rg. Galangæ,	Piperis albi. ana. 3. i. s.
Ligni aloes. ana. 3. vi.	Calamenti,
Garyophyllorum,	Mentæ siccæ domesticæ,
Macis,	Heil. i. cardamomum maius.
Keisim, idest semen leuistici ana. 3. ii.	Spicæ,
Zingiberis,	Seminis apii,
Macropiperis. i. piper longum,	Seminis fœniculi,
Cinnamomi,	Seminis anisi,
	Seminis carui. ana. 3. i.
	Calami aromatici. 3. i. s.

Puluerizentur omnia supra scripta debito modo, zucch. tabazet. i. albi uel illius provincie. 3. x. Et fiat confectio de

coquendo quantum sufficit, & fiat dosis eius est. 3. ii. usque ad aur. ii. si autem in forma solida fac ut dixi.

Intelligendum est q in omnibus confectionibus & compositionibus cordialibus stomachicis, hepaticis, & breuiter in quibuscunque, & exceptis in medicinis uomitiuis, semper apponendum est cinnamomi subtile. In uomitiuis uero grossum apponendū ē eo q illud uomitū puocat, parq; sustinet de decoctione & coctione, & minus subtile iterū sustinet.

Quando simpliciter piper descriptum in compositionibus reperitur, de pipere usuali est.

Calamentū & menta sicca in hac compōne ponuntur, q a ficiōris sunt complexionis. Et de menta domestica & calamento montano est intelligendum, non de aquatico.

Nonnunquam continget aromatariū reperire in quibusdam compōne mel tabazet: ideo declarabo quid illud sit, & dico q est mel album, de cœlo cadens ad modum rosis, & est albus, & aliquoties densius quā sit apun; q quā tēdit ad naturam zucchari. sed quia illo caremus loco eius ponimus mel album uel zuccharam secundū decoctionis. Et hoc mel tabazet ponitur a Mesue in confectioe de zingibere. distinctione quarta circa finem.

DIACYMNUM bonum Mesue primæ descriptionis, ualeat contra stomachum & uiscerum uentositatem digestiōnem procurat, stomachum & uiscera calefacit.

Rg. Zingiberis,	Macis. s. ii.
Cinnamomi. ana. 3. iiii.	Galangæ,
Garyophyllorum,	Piperis longi,
Ligni aloes. ana. 3. ii.	Cardamomi maioris, & minoris. ana. 3. ii.
Cimini infusi in aceto per tres dies & noctes. 3. x.	Muscicæ scrop. s.

Puluerizentur puluerizanda, & cum melle quantum sufficit fiat confectio: et si in forma solida facere uis, fac ut supra dixi in aliis receptis.

Varie reperiuntur receptæ de hac confectioe, sed ista est melior et in usu. Reperitur qñ; magnus error in hac compōne apud aromatarios & medicos. Aliqui. n. hñt in suis receptis cymini carmeni, & aromatarii dicunt q carmeni nihil aliud est quā prociua in qua dictū cyminū nascitur ut v. gr. opii thebaci &c. Sed multum errant ut uideri potest a Math. Sylua. cap. de cymino ubi dicit, q cyminum carmenum idem est fiseleos. i. filer montanum. Causa autem quare infunditur cyminum in aceto per diem est, quia acetum addit sibi in uirtute profundationis, & incisionis, & temperat eius calorem aliquoties.

Nota insuper q contritio medicinarum huius confectio nis non debet esse subtilis sed grossa, cū intentio ipsius medicinz non sit nisi q sit fortis in resoluendo & euacuando uentositatem. Quod si ultimatē contratur, uentositatem non resoluere, sed per urinam educere: hoc declarat Auic. 5. canone cap. de diacymino.

DIAMBRA Mes. est medicina sublimis, cerebrum confortans, & stomachum & oia membra, & digestionem procurat, & membra nutritionis calefacit, senibus quoq; cōuenit & frigidis natura, & mulierib; & agritudinib; matricis.

Rg. Cinnamomi,	Folii,
Doronici,	Galangæ. ana. 3. iiii.
Garyophyllorum,	Spicæ 3. i.
Cardamomi maioris & minoris. ana. 3. i.	Sandali citrini,
Zingiberis. 3. i. s.	Ligni aloes,
Macis,	Piperis longi. ana. 3. ii.
Nucis muscatæ,	Ambræ auri.
	Muscicæ 3. s.

Puluerizentur puluerizanda, & confice cum syrupo rosæ facto cum aqua infusio nis rosarum, idest cum uisale rosato, & si facere uis in forma solida, fac ut supra tibi ostēdi in aliis confectionibus, dosis est 3. iiii.

Diambra dicit ab ambra ingrediente in bona quantitate hoc apud medicos ē multū in usu, & maxime ista descriptio.

Circa scripta & sequentia unum generale est notandū, q spēs huius confectio nis, & oēs species medicinarum coartantur membra, & aperientur oppilationes, debent subtiliter puluerizari, & eo maxime si ad longinquā mēbra

confortanda debent transire, non autem utilitate. vltima enim contritio perdit uirtutē medicinz aromaticę, sed media fit inter ultimā & subtile. Et si nostro tpe hæc confectio nes fiant in morsellis, maior operatio tñ & efficacior ut plurimum fit ab electuario q̃ a confectioe pparata ut superior, & hoc multis rationibus. Prima p̃ meliorem fermentationē q̃ fit aromatum in electuariis quę fieri non pōt in confectioibus. Secunda quia de aromaticis plus ponitur in electuario construendo quā in confectioe. Tertia quia melius & facilius euaporat, & transire uirtus electuarii ad membra remota, quā uirtus confectiois assumptę in passionibus pectoris & cerebri, & hoc uerificari potest in omnibus confectioibus et electuariis.

DIACORALLI magistralis ualet &c.

Specierum diarhodon ab- Fragmentorum præciosiorū.
bais. 3. iiii. Margaritarum non perforatarum. ana. 3. s.

Corallorum alborum,
Corallorum rub. ana. 3. s.

Puluerizentur subtiliter & addantur zucchini dissoluti in aqua ros. vnc. vii. s. Et fiat confectio in morsellis.

Intelligendum q̃ qñ scribitur fragmentorum præciosiorum absolute, de quinque descriptis in electuario de gemis est intelligendum, & non de aliquibus aliis.

Secundo ē est intelligendum q̃ qñ dicitur specierū diarhodon abbas, uel spēm triasandalorum uel aliarum specierum, de ipsis complete intelligendum est. i. de ipsis secundum integram descriptionem positam a doctoribus, non ut quidam fatui dicebant, qui cum scriptum inuenerunt specie rum diarhodon abbas, illas sine musco ponebant, dicentes quod illa erat doctorum intentio & fatue.

DIARHODON abbas Nicolai & dicitur a rossis q̃ ibi intrant plus quā de aliis spēsbus. Abbas, ab abbate de curia factum, dicitur propter ictericis, hepaticis, & phthisicis, hæticis, & cardiacis q̃ patiuntur ex calore, conualecentibus ex longis & acutis ægritudinibus calidis.

R. Dragacanthi, Seminis scariolę,
Gummi arabici, Sem portulacę dome.
Spodii. ana. 3. ii. Seminis maluz,
Sandalorum alborum, Seminis lactucę,
Sandal. rub. ana. 3. ii. s. Seminis papaueris albi,
Affari, Seminis cydoniorum,
Spice, Seminis citrulli,
Masticis, Seminis melonis,
Cardamomi maioris & minoris, Sem. cucumeris,
Seminis cucurbitę. ana. 3. i.
Crocī, Osis de corde cerui,
Xyloaloes. i. lignum aloes, Margaritarum. ana. 3. s.
Garyophyllum, Zucchini candi
Galliz muscatę, Rosarum rubearum, ana. vnc.
Seminis anisi, i. 3. iiii.
Maratri. i. semen fœniculi, Succī liquiritię,
Cinnamomi, Rheubarbari. ana. scrop. i.
Seminis basiliconis, Camphorę. gra. vii.
Berberorum, Musci, gra. iii. s.

Puluerizentur puluerizanda subtiliter, & cum syrupo rosato quantū sufficit fiat, & in forma solida facere uis, modum supra descriptum habes.

Nicolaus dicit q̃ hæc confectio debet dari cū rhodostomate uel cum frigida. ut igitur omnis pars clara fit, scias q̃ rhodostomate. i. cū decoctione rosarum, uel cum frigida. i. cum decoctione facta cū frigidis. Sed decoctio hæc hoc tpe non est in usu: sed loco ipsius datur cum syrupo rosato.

DIARHODON descriptione cōi Mel. confert ad dolorem stomachi & hepatis, & puncturam in eis, & caliditate & acuitatem cholere citrinę, faciens digerere cibum & est ex confectioibus stomachi & hepatis debilibus.

R. Trochiscorum diarhodon. 3. iiii.
Crocī,
Masticis,
Ligni aloes. ana. 3. ii.
Sandalorum alborum,
Sandalorum rubeorum,
Sandalorum citrinorum,
Rosarum rub. 3. xxx.
Garyophyllum,
Galliz muscatę. ana. 3. iiii.
Spodii,

ana. 3. iiii.

Affari. id est radicem.

Spice,

Macis,

Cardamomi maioris & minoris. ana. 3. i.

Trochiscorum de spodio

Liquiritię rase. ana. 3. iiii.

Semini portulacę,

Semini lactucę,

Semini scariolę,

Puluerizentur subtiliter puluerizanda, & cum syrupo rosato quantū sufficit fiat confectio. Si in forma solida facere uis, fac ut supra ostendi.

Syrupus factus ex rossis rubeis, & aqua rosata cū quo debet confici hæc confectio: si in forma liquida facere uolueris hoc modo fiat. Accipe rosarum rub. uiridium lib. ii. pōnas in uase uitreo stricti orificiū, & super eas infundas feruētis aquę rosatę lib. v. & confringatur orificium uasis & per mittatur infragiri deinde dicitur rose bene manibus exprimantur: & duæ aliz librę rosarum uiridium accipiantur, & p̃dicta aqua rosata calefacta bene: & iterum supra eas ponat deinde coletur, post infragiri deinde manibus exprimēdo rosas & in dicta colatura addantur zuc. lib. iiii. & clarificetur cum suprascripta aqua rosata, & fiat syrupus de quo fit supra scriptum confectum & fiendo infusio ter esset melius.

De musco & opio in medicinis parum ponitur, muscus .n. in modica quantitate est magnę qualitatē & operationis opium sifr. Et immo sufficit parum apponere, ne in magna quantitate noceat, aut operationes aliarum medicinarum corrumpat, aut occultet. Et sicut de opio & musco exemplifico, ita & de aliis medicinis fortibus est intelligēdum. Notat hic de contritione spēm electuariorum & confectio num. Nam spēs quę ponuntur in electuariis confortantib. aperientibus uel alterantibus & confortantibus, subtiliter debent conterī. Causa est, quia non alterant nec confortant nisi attrahantur, & immo ad hoc ut alterent membrum uel confortent indigent ut attrahā a membris possint penetrare. Facilius aut penetratio fit per contritionem multam: secus autem est de medicina solutia. Nam ipsa manens quicquid in stomacho secundum cōem opinionem euaporat ad mēbra, q̃ si attraheretur a membris esset nialum: & ideo grossi nodi debet conterī, & hoc respectu subtilis, ne citius de bito transeat a stomacho, & hoc notato, habes perfectā doctrinam conterendorum.

DIADRAGACANTHYM frigidum Nicolai a dragacātho nomen accipit: ualet ad omne uitium pulmonis & pectoris quod fit ex calore, maxime phthisicis, hæticis, pleuriticis, peripneumoniacis ad omnem cūsum quę fit ex caliditate, & siccitate, & ad omnem linguę asperitatem & gutturis, cum uero sumuntur tandiu in ore teneantur donec parum per ibi dissoluatur.

R. Amydi. 3. iiii. Seminis melonis,
Dragacanthi. 3. ii. Seminis cucumeris,
Gummi arab. 3. i. 3. ii. Seminis cucurbitę,
Liquiritię rase. 3. ii. Seminis citrulli. ana. 3. ii.
Penidi. 3. iiii. Camphorę. 3. s.

Syrupi albi Gal. in lep uiolati lib. ii. contendantur subtiliter oia. deinde permisceantur bene in mortario paulatim niscendo illam confectioem cum iulep & referuetur. Sed hæc communiter fit in forma solida hoc modo.

De compōne ista est intelligendum, q̃ cum sit in forma solida non debet fieri de superioribus ut tibi dixi accipiendo spēm. vnc. i. zuchli. i. eo quia pauca spēs cribellat in ea intrant. Sed de supra descriptis debes accipere. vnc. iii. spēm, zuchli. lib. i. & facere in morsellis: tñ. n. zuchcharum q̃ prædicta spēs possint simul teneri debet apponi & non plus: igitur præscripta regula ab aromataris tenenda est. Et opoplium uidi semper facere ab eis: quanquam sæpe ac sepius a magistris moniti essent.

Omnes doctores conueniunt quod gummi debet dissolui in confectioib. in quibus intrant & non cōteri: eo quia

puluerizari non possunt, & pistando virtus illarum deperditur: quare cum in aliqua confectioe intrant, dissolui debent in aqua appropriata, in ista enim dissoluantur cum parum aquae violarum: in aliis vero cum aliis aquis secundum digerfas intentiones.

DIADRAGACANTY calidum Nicolai: valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus eicere, astmaticis, emphthicis, anhelosis, suspiriosis, peripneumoniacis, pleuriticis, & ad omnem coarctationem pectoris, stomachum confortat, digestionem procurat.

R. Dragacanthi triduo in Seminis foenugraeci.
Cinnamomi. ana. 3.ii.
Aqua temperati lib.i. Seminis lini ass. 3.iii.
Hyssopi. Zingiberis.
Amygdalarum amararum. & excoctatarum.
Liquiritiz rase.
Pinearum, ana. 3.iii. Succu liquoritiz, ana. 3.i.

Puluerizetur subtiliter puluerizanda, & coterantur coterenda, coctae sic. Dragacanthum infusum in aqua per lineo dum extorque, & cu li.ii.iii. mellis cocti vsque ad spissitudinem lento igne semper cum spatula agitando misceatur: deinde addantur pineae amygdalae, semen lini & foenugraeci ab igne deponatur, & puluis supralcriptarum specierum addatur, & vsui referetur.

Modus assandi femina lini in eo intrantia talis est. Accipe patellam vel bernaciu & super ignem multu calefacias, postq bene calefactu fuerit remoue ab igne, & intus ponas femina lini semper mouendo vsuequo sint assata. Et si tunc bene assata non sunt, iterum vas calefactu a notis seminibus: deinde ab igne remoto iterum femina supraposita semper remouendo vsuequo sint bene assata: deinde referua: & secundum hanc doctrinam omnia alia femina debent assari.

Semē lini assatur ut amoueatur humiditas superflua & viscositas, & plus assari det quā alia femina. Ideo nota q oia femina per se assanda sunt: eo quia aliqd semen multu assandu est pp eius viscositate multam, ut semen lini & psyllii: quae dam minus pp eius paucam humiditatem, ut semen anisi & ozimi & huiusmodi, quare bene notent aromataria.

Confectiones hae amarae p duos annos seruantur oēs: tyriaca vero magna longiore tpe seruat ut in ipsa scripsi.

DIACALAMENTY Nicolai dictum est a calamentho precipue ad omne vitium pectoris & capitis, ex frigide, maximae his qui sunt in sculis aetate, valet etiam tussientibus ex frigida causa & quartanariis, si ex eo vitium accepto post prandium & post coenam, in sero cum uino, frigiditatem & dolorem stomachi amputat: ventositatem immaturam excludit, calculos frangit, menstrua imperat, quartanariis & quotidianariis cum duobus scrupulis diagyridi & euphorbii idem in modum nucis ponticae an. duas horas accessiones cum apozimate pigami uel roris marini sumptum mirabiliter liberat.

R. Pulgii. 3.iii. 3.ii.
Calamenti syluestris. Seminis leuistici. 3.i. 3.i.
Hyssopi sicci. Seminis apii. 3.i.
Melanopiperis. i. piper nigrum. Seminis ameos.
Thymi. Seminis anethi,
Cinnamomi.
Zingiberis. an. 3.ii.

Semina petrosilii. ana. Puluerizetur omnia debito modo, & cum melle quantum sufficit fiat confectio.

Calamentum quod in hac compositione ingreditur debet esse syluestre, eo quia magis confortatiuum & abstersiuium est quam domesticum.

In mense Iulii & Augusti ista femina colligenda sunt. scilicet petrosilii, lauroleae, cataputiae, ruta, scaenicali, caulis milium folis, lactucae, portulacae, pastinacae, rapae, & similium.

Anethi si simpliciter scripti reperitur, semper de femine est intelligendum non de herba, ut est communis corruptela.

DIACALAMENTY Melue descriptione Gale. confersens ad agnitudines frigidas membrorum, nutritionis, & ad malitiam digestionis, & facit penetrare cibum qui non pot penetrare ad hepar & corpus reliquum: & est haec eius

proprietas, & confert rigori febriu, & emplastrat & inunctu in spina, & est ex maxime subtiliariibus humores grossos & viscosos, & ex resolutentibus ventositates: & confert singul tui uehementi frigido & uentoso uel acetoso, quorum diffcilis est resolutio, & prouocat urinam & menstrua.

R. Calamenti montani & Seminis apii.

flumialis. Exrematium alase, idest thymus. ana. 3.ii.

Semina sifeleos, idest silex. Keissim. i. leuisticus. 3.vi.

Sem. petrosilii. an. 3.vi. Piperis nigri 3.xii.

Zingiberis. 3.iii.

Puluerizetur omnia & cum melle quantum sufficit fiat electuarium, dosis est. 3.i.

Calamentum tam montanum quam fluuiiale colligendum est in mense Iulii, & exciccadu est in umbra, excicatio. n. facta in sole operatione eius debilitat, & eo tpe colligitur pulegiu.

Quinq; de causis medicinae miscentur simul. Primo ut uirtus earu fortificetur, & hac de causa scamonea misceatur cu medicinis aloeticis, & zingiber cu turbith. Secundo ut cito faciat alias medicinas transire ad locu debitu: & sic crocus ad misceatur auro & argento: aurum. n. & argentum sua ponderositate ad intestina descendunt nec ad uenas possunt penetrare: & crocus facit eas ad cor penetrare. Tertio misceamus ut cito medicina non transeat ad uenas ut cu uolumus hepar deopillare per diuretica: quia illa sunt cito penetrantia ad uenas permiscemus aliam medicinu in raphanum. Raphanus. n. hnt proprietate atrahedi humores ad stomachu.

Quarto ut uasa per alia debilitetur, & sic misceamus cu uigilis uel cu casia fistula myrobalanos. Quinto ut malicia alterius remoueat uel impediatur ut zingiber cum scamonea, scamonea. n. multu debilitat stomachum, & zing. confortat.

DIACODION Mel. est confectio de iecur: & modus confectionis de iecur fm intentio. Gale. & diacodion puru confersens eis quibus ex capite ad pectus & ad pulmonē subtilis catarrhi defluunt, & sunt causa tussis & in fonnietatis.

R. Decem capita papaueris albi in quibus sit mediocritas inter paritatem & magnitudinem & humiditatem & exiccationem & proiciatur super ea sextarium unu aquae, & sit aqua pluuialis. Et si tunc humida plus quam sicca, dimittantur die ac nocte, si tunc ficciora dimittantur plus. Tunc coque: ea usq; du discosta sint, & aquae duae partes sint consumptae, tunc quonia si catharus subtilis fuerit & timetur fluxus eius ad pectus & pulmonē & cannam, & timetur uigilia, oportet tunc ut misceatur ex rob quantitas quae fit medicatae aquae, & coquatur super ignem in quo non fit flamma, neq; fumus, sed super prunas tautum. Et non conuenit in hac intentione mel quantum mel est ex habentibus acumen, quare est subtilitatum, & est propter hoc quod intendimus: & quantum est materia subtilis ualeat, & mel est ex subtiliariibus. Cum autem plenitudo continetur in thorace & pulmone, & uelis medicamen fieri abstersiu: tunc mel conuenientius est quonia dormire facit, & materias quae sunt in pectore ad expellendum habilitat. Et qng; fit medicamen ex vtriq; qn cadunt in occupatione duplicis intentionis: & est dosis. 3.i. & pl^a & minus fm q exigit dispositio. Et oportet, ut teneat eam patiens in ore suo, & traiciatur inde modicu quod dissoluatur ex ea in salua. Si autem uelis ut sit retentiuum naturae eruptionis sanguinis a locis qui sunt sup diaphragma, & ab aliis locis maniosis, & a partibus uiscerum: tunc ad unamquamq lib. apianon sit, & a partibus achae rubrae, heuistici dos, croci, myrrhae, balaustiae. an. 3.i. & ramich. 3.iii. & admi nitretur. Et tunc qui ponunt in idem iecur pro loco mellis penidas. Et sunt qui ponunt zucharam. Et quandoq; exigit dispositio agritudinis quae est multae caliditatis & acuitatis ut fiat medicamen ex papauere nigro & sint eius capita vsq; 50. Et quandoque ex albo & nigro. Et loco mellis ponitur zucharam penidia.

DIASPLITICON de speciebus grossis. Auice. in 5. lib. & uocatur diacyminum grossum, facit ad uentositates frigidas, & facietatem nauisium, & resoluat uentositates, & coferet ei qui non digerit cibum: cuius haec est permixtio.

Reci.

R. Baurach. i. salnitrum partem mediam. Cymini carmen i infusi in aceto & torrefacti. Piperis albi. Piperis longi. Foliorum ruta oium ana partem unam. Et hoc quidē fit (scdm duas descriptiones) quandoq. n. sic ex partibus equalibus in oibus suis compōnibz. f. cymini, piperis, rutæ, & baurach: & iste modus soluit naturam valde: & qñq; permiscetur de spēsbus reliquis quantitas æqualis, & de baurach medietas huius quantitatē, & eligitur de cymino carmenum & infunditur in aceto fortis, deinde torrefit. & fit piper album: & illud ideo qm̄ ipsum confortat stomachum plūquam duæ aliz spēs. piper longum, & piper nigrū: & hoc est illud qd non est parum, uidelicet contractum, & n. eius cortex est grossus: immo est ex illo quod dicitur grauis ponderis, & eligatur de eo magnum & sanum & baurach. Fiat ergo medicina ad illius cuius natura retinetur cum baurach dicto nitrum aurum & est rubeum, & quando feceris ipsam ad illum: cuius natura est soluta, administrais baurach aliud, & fit illud qd de eo prociēs medietas quantitatē inuisuolūq; medicinarum quas diximus: & folia ruta iterum. Sint ergo sicca cum mensura, & illud ideo qm̄ si excicetur uehementer, sunt calidæ complexionis, & est calefactio eorū ultra mensuram, & si non excicentur uehementer, remanet in eis humiditas superflua q̄ non consequitur ultimatiōē digestionis: quapropter nō destruitur eius inflatio in aliquo. Et hæc quatuor spēs qñq; permiscunt cum melle despumato, & qñq; non permiscuntur cum aliquo, & referuntur per se absq; melle. Cū ergo ipse sunt necessariz proiciantur in aqua hordei, aut in cibo alio conueniente, & hæc medicina sumit sola ante cibū & post cibum: et illa q̄ pmiscetur cum melle despumato est magis conueniens in hac dispōne: & illud ideo qm̄ ipsa destruit inflatiōē oīno, & oportet iterum ut sit mel, bonum qm̄ non est necessarium ut sit hæc medicina nisi fortis in resoluendo uentositatem & euacuet cū fortitudine. Et oportet ut scias quod qñ uis ut eius euacuatio plus sit, contritio medicinarum non sit subtilis sed grossa: et illud ideo qm̄ scio hominem qui contriuit hanc medicinam contritiōe ultima: qm̄ non seruauit illud quod ego dixi, quare non soluit naturam oīno: immo prouocauit fortiter, & ueniat ad nos mirās & qrens de causa in hoc: et illud ideo qm̄ ipse existimabat quod in corpore illius uiri esset proprietas q̄ esset in causa: in hoc quod accidit, postquā ego se cicēre eum quod causa in illo esset dispositio cōpositiōis eius: tunc composuit eam sero sicut præcepi ei, & completa est eius operatio, & oportet ut seruetur hic determinatio in compositione reliquarum medicinarum.

DIANISI Mefue, ualet ad uentositatem grossam & frigiditatem q̄ est in stomacho & tussi diuturne: cuius permixtio.

♂. Seminis anisi. 3. xx.	Garyophyllorum. 3. i. s.
Liquiritiz rafe,	Zingiberis,
Malticis ana. j. viii.	Seminis feniculi,
Carui idest semen,	Cinnamomi ana. 3. v.
Macis,	Piperis albi,
Galangæ ana. 3. v.	Piperis nigri,
Calamenti montani,	Piperis longi. ana. 3. iii.
Pyrethri,	Cubebaurum,
Cassiz lignez. ana. 3. j.	Croci,
Heil, idest cardamomum	Spice. ana. 3. i. s.
maius 3. i. s.	Zuchari. 3. xvi.

Puluerizentur ista satis subtiliter & cum melle despumato quantum sufficit fiat confectio: dosi est 3. ii.

Notandum quod in electuariis de melle & de zucharo semper in eis species aromaticas ponendæ sunt post earum aliqualem infrigulationem, quāsi ponentur, melle uel zucharo existente adhuc ad ignem, ut quidam faciunt, uirtus aromatum perderetur.

Feniculi et anisi cum simpliciter scriptum reperiuntur in confectioibz. uel electua. iis, de ipsorum seminibz. est intelligendum: cum ea magis ad usum medicinz conueniant.

DIATRION pipercon Mefue descriptione cōi quod calefact stomachum et uētem, et remouet dolorem eius ex humiditate phlegmatica multa & cruda, et mundificat eum ab ipsis, et ualet pra acerbos ructus, et digestionē pcurat.

R. Piperis albi,
Piperis nigri,
Piperis longi. ana. 3. ii.
Zingiberis,
Assiz. i. thymus,
Anisi. i. semen. ana. 3. ii.
Spice,
Seminis ameos. ana. 3. i.

Amomi,
Cinnamomi ana. 3. i.
Cassiz lignez,
Seminis apii,
Siseleos. i. siler montanum.
Affari, idest radicium,
Radicum enulæ siccz,
ana. 3. s.

Mellis quantum sufficit & fiat confectio: dosi eius est 3. i. usque ad 3. ii.

Piper album non est illud quod est paruum, contractum & quod habet corticem grossum, sed est illud quod est magnum grauis ponderis, sine contractione subtilissimi corticis. Et illud plus confortat stomacho quā duæ aliz species.

Enula debet esse sicca, eo quia maioris, est desiccationis quam quando est recens.

Cassia qm̄ in libris autorū reperitur absolutæ scripta consideranda est, si compō illa in qua intrat est solutior uel lenitior, & tunc debemus ponere cassiam fistulam. Si autē non est solutior nec lenitior. a. calefactior, confortatior, uel opēratior opatiōnē: tūc debemus ponere cassiam ligneā, & hoc fit de generali regula & documento.

DIACURCYMA magna Mefue conferens ad ægitudines antiquas hydropis iuuamentum manifestum, & eradica ægitudines hepatis, et chronicas quæ iā induratz sunt, & confortat ad febricitatem caloris & corruptionis stomachi, et humiditatem frigidam, et uentositates grossas in eis, & dolori renum et uesciz, et urinam prouocat.

♂. Croci,	Carbalsami,
Radicum affari,	Rubez tinctorum,
Seminis petrosilij,	Succi absinthij,
Seminis dauci,	Succi eupatorii,
Seminis anisi,	Olei balsami. ana. 3. ii.
Seminis apii. ana. 3. iiii.	Calami aromatici,
Rauedensi. i. rheubarba.	Cinnamomi. ana. 3. i. s.
Meu,	Scordeon, idest allium.
Spicz nardi. ana. 3. vi.	lyllestre,
Costi,	Scopolendrix,
Myrrhæ,	Succi liquiritiz. ana. 3. iiii. s.
Cassiz lignez,	Dragacanthi. 3. i.
Squinanti. ana. 3. ii:	

Puluerizentur omnia subtiliter & cum melle quantum sufficit & fiat electuarium: dosi est 3. i. vel. ii.

DIACURCUMA dicitur, quia color asinusularum curcumæ, uel dicitur a croco, quia crocus apud Græcos di. i. u. crocon, qui in ea ingreditur in bona quātitate. Et quia uocabulum est corruptū dñt diacurcuma, sed dēt dicere diacroccon.

Insuper nota qd oēs medicinz confortantes hepar & ualentes hepati debent bene teri & subtiliter cribellari.

Balsamum est liquor emanans a stipite illius arbusculæ, & dicitur opobalsamum.

Oleum qd ponitur loco balsami, & est nobiliss secundum Gulielmum Placentinum.

R. Myrrhæ,	Nucis indz. 3. iiii.
Carbalsami. i. semen balsamij. ana. 3. iiii.	Hypericon, idest perforata.

Terantur grosso modo, & misceantur cum 3. v. olei uel 3. j. iii. terebinthinæ siue largati, & in fine addatur musci gra. v. ambre. gra. iiii. olei de lateribus. vnc. i. Hoc enim loco balsami potest poni in omni loco, facit enim operationes ut balsamum. Istud oleum maxime secundū istam descriptionem non potest poni in omni loco ubi balsamum ingreditur, & secundum intentionem Gulielmi facit operationes, ut balsamum: uerū ipse Gulielmus decribit duas alias descriptiones olei quod ponitur loco balsami, sed secundum intentionem suam ac modernorum doctorum ex illis tribus hæc est nobilior, sed ipse Gulielmus non ponit qualiter ipsum oleū debeat componi: uerum est qd in secunda descriptione melius docet, & est qd omnia bene terantur & malaxentur deinde in mortario, & ponantur in uase alembici & distillentur ut aqua rol. Secunda recepta est posita in diacurcuma magna Mefue: prout uidere poteris.

DIALACCA magna Mesue conferens ad debilitatem stomachi & hepatis, & aggritudines frigidas factas in eis. Oppilationes hepatis aperit, & omnem duritiem resouit, lapidem renum, & uescicæ frangit, vrinam prouocat: & est ad hydropisum & cachexiam medicina sublimis.

R. Gummi lacæ ablutæ, Rubæ tinctorum,
Rauedensi, i. rheubarbari, Seminis feniculi
ana. 3. iiii. Seminis anisi;
Spicæ nardi, Radicum affari,
Masticis, Aristolochiz rotundæ,
Seminis apii, Gentianæ,
Cimmarum squinanti, Croci,
Abinthii, Cinnamomi,
Succi eupatorii, Calsiz lignæ,
Seminis ameos, Cimmarum squinanti,
Sauinæ, Bdellii, ana. 3. i. s.
Amygdalarum amararum, Piperis nigri,
Costi amari, Zingiberis, ana. 3. i.
Myrrhæ, ana. 3. i. s.

Infunde bdellium & myrrham in uino, cetera teræ subtiliter & confice cum melle despumato, & colato, quantum sufficit fiat, dosis est aur. i. vsque aur. ii.

Modus lauandi laccam ponitur a Pandectis in capitulo proprio de lacca in hunc modum. Tere gumma lacæ & laua illa in mortario postq̃ bene pistata fuerit & lauationib. pluribus ex aqua fontis in qua bulliant aristolochiz longæ & squinanti ana. partes æquales, & tandiu lanetur cum hac aqua quod clarescat semper cum pistello agitando: deinde dimittat residere: postea colesq̃ aqua & in umbra: pmittatur deficcari, quæ deficcata reseruetur, & hic est modus. Et ex ista lotione lacca acquirit subtilitatem & apertionem maiorem.

Medicinarum ablucio fit quinq; de causis. Primo ut acuitas q̃ in medicina est auferatur, & hoc modo ablucitur calx. Secundo ut sordes remoueat, & abiciantur, & hoc modo ablucitur oleum. Tercio ut possint melius cõteri, & hoc modo ablucitur gutta. Quarto ut eius malitia auferatur, & hoc modo lauati lapis lazuli ut remoueat q̃dam uirtus nascentia, & compressiua sola remaneat. Quinto ut acquirat maiorem subtilitatem, & hoc modo lauatur lacca quæ efficitur subtilior ad apertendum.

DIASATYRION Mesue secundæ descriptionis ista est in usum, & uocatur confectio testiculorum vulpis, & est melior quam prima, faciens erectionem uirgæ & multiplicat spermata & desiderium coeundi.

R. Secacul albi & mundi elixati in aqua cicerum, quorū eiecta fuerit prima aqua: lib. i. satyrion. i. testiculū vulpis. 3. viii. radices raphani. 3. iiii. lupulani. i. serpentaria uel dragonæ. 3. ii. terantur & fundatur sup ea lactis uaccini, aut ouini quantitas q̃ superaret duobus digitis, et olei sissamini, & butyri vaccini recentis ana. 3. iiii. & coq; cum facilitate usque ad spissitudinem, et si adhuc radices non bene decoctæ sunt fundantur sup eas ex lacte & oleo et butyro usq; dum persectæ decoctæ sint: et prius hæc infunde sup hoc totum mellis boni & despumati li. vi. succi cepæ humidæ lib. i. s. decoque oia simul usq; ad perfectâ coctionem: r. n. de pone ab igne & proice & super ea puluerem: cuius permixtio hæc est.

R. Seminis crucæ, Seminis nasturtii,
Zingiberis, Cinnamomi,
Been albi, Piperis longi,
Been rubei, Bauciz. i. semen pastinacæ
Lingux auis, idest semen domesticæ,
fraxini. ana. 3. iiii. Seminis napi,
Candarum finci cum renibus & sumine. 3. viii. Seminis sparagi,
Se. synapis. ana. 3. iiii. Se. fynapis. ana. 3. iiii.

Et conficiatur cum eis: vltimo uero ponatur in medicamine pinearum mundatarum lib. i. s. phislicorum mundatorum 3. x. cerebellorum passerum vac. ii. Conficiantur oia bene et aromatizentur cum 3. i. boni musci & usui referua. Hæc confectio est illa quæ nos utimur, & maxime secundum istam descriptionem. Nicol. in suo antidotario habet unam aliam descriptionem, sed non sit apud nos.

Secacul secundum Modernos est sigillum sanctæ Mariz

& non iringus, ut quidam herbolarii uolunt: quare Serapio aliud capitulum facit de fecacul, aliud de iringo. Præterea uide Serapionem in 7. ca. de conditis qui inquit, q̃ fecacul est radix sicut zingiber, & asportatur ex India, & sit ex eo ingiba dum est recens, & sic est scdm ueritatem q̃ fecacul scdm modernos habet radicem similem zingiberi, & hæc est quæ nostro idiomate uulgariter zonozello uocatur in partibus nostris, & in multa quantitate reperitur.

Cicer fin Serapio. ex autoritate Galeni, cicerum tria sunt gna, sunt. n. alba, & nigra, & est alia species quæ dicitur Kerseue, & cicer minuta quæ dñr Kerseue sunt alba, & asimilatur orobis, & nigra nominatur chubus. & Plinius inquit, arietinum ciceris genus quod capit arietis asimilatur, quod ceteris magis diureticum creditur esse & agreste est, & erraticum, et columbinū, quod aliqui uenerū dixerunt, candidum rotundū, leue, arietino minus. Cicer erraticum apud Diosco. uocatur a quibusdam serpillum. Gal. in 6. de simplicibus inquit: Ciceria sunt species leguminum.

Testiculi vulpis sunt satyrion. Dioscorides de satyrione tria capitula facit sub litera satyrion. & alibi capitulum de orchis, & ibi ponit duas spēs: quod etiam inter species satyrionis sunt in numero, et hoc apud Auicennam uocatur testiculus canis, alibi cinosofchin, idest canis testiculi.

Quare prima aqua ciceris abiciatur, et in secunda lauatur satyriones & fecacul, quia prima est abstusiva prohibens inflationem & uentositatem generari secunda uero est multum uentosa & inflatoria & comportatoria aliarum medicina rum ad genitalia membra.

Stincus est quoddam animal simile lacertæ degens in ripis aquarū iuxta flumen Nili. In hac confectioe pro omni lib. i. mellis colesq̃ despumati ponendæ sunt vac. iiii. spērū cribellatarum, si habere debet uirtutem a Mesue scriptam.

Iringus, et tassus barbaless colligendæ sunt in mense Octobris.

Incidenter hic notandum est, hoc electuarium duplici ratione solet dari hominibus. Primo exhibetur corporib. exiccatis ad humectandum: & tunc debemus exhibere de eo. 3. s. in mane per horas quatuor uel duas ad minus ante prandium. Datur & secundo ad augmentum coitus et uirilīs mēbri erectionem, & tunc ipsum exhibere debemus uespere ante coenam per duas horas cum modico uini subtilis et odoriferi. Complexio dicti electuarii est temperata inter calidum & frigidum: humida tamen ad secundum gradum.

DIATRIS de melle Nicolai dicitur a radice illa q̃ ireos appellatur, prodest dispnoicis arteriacis, tussientibus, uocē perditā restituit si fuerit ex frigidityte: cuius pmixtio.

R. Ireos. 3. i. Cinnamomi,
Pulegii, Zingiberis,
Hyssopi, Piperis ana. 3. iiii.
Liquiritiz rase. ana. 3. vi. Caricarum. i. ficum.
Dragacanthi, Carnium dactylorem,
Amygdalarum, Passularum. ana. 3. iiii. s.
Pinearum. ana. 3. iiii. Storacis rubæ. 3. ii. 3. i.

Puluerizentur puluerizanda subtiliter omnia, & cum melle despumato et cocto fiat confectio: dosis est 3. ii. usque ad 3. iiii.

Hyssopi si simpliciter scriptum reperiat, de herba sicca est intelligendum, & in umbra exiccandum est, & non solum ipsum, sed omnes herbas aromaticas. Sol enim aromaticitatem illam. resoluere facit & uirtutem destruit.

Pineæ, & amygdalæ nisi sint recentes antequam in confectioibus & electuariis pectoralibus ponantur semper debent purgari, ut supra ostensum est, aliter rancitas sua non cet pectori, & tussim prouocat: quare bene notent aromatarii, & in hoc aduertant.

DIAPENDION dicitur a penidis quæ ibi intrant plus quam de aliis speciebus, fm Nicolau ualeat cõtra omne uitium pulmonis, & tussis, & ad rauedinem uocis factam ex siccitate, & tussientibus peripleumoniciis & pleureticis.

R. Pendiorum. 3. xvi. s. Seminis papaueris albi ana. 3. iiii. 3. i. Cinnamomi,
mundatarum, Garyophyllorum, Cinnamomi.

Cinnamomi.
Succi liquiritiz.
Zingibe.ana.3.i.s.
gra.viii.
Dragacanthi.
Gummi arabici.
Amydi.
Seminis citrulli.
Seminis melonis.
Seminis cucurbitz mundato-
rum.
Seminis cucumeris.
an.3.i.s. gra.viii.

Camphoræ tertiam partem unius scrupuli. Syrupi uiola-
ti. q. puluerizetur subtiliter puluerizanda; & conterantur
conterenda: deinde confice sic. In lib. i. iii. aquæ uiolarum
bulliant donec aqua aliquantulum inficiatur: postea coles,
& colaturz addatur libr. i. zucchini, & bulliant donec inci-
piant inspissari. Tunc addantur pineæ & quatuor supra scrip-
ta, semina, unumquodq; per se bene cōtūsum cum spatula
semper mouendo, deinde addantur penidii subtiliter pulue-
rizati, & cum liquesfacti fuerint, illud grossum quod superna
est cum capia despumetur, & iterum in mortario proiciatur,
& bene terendo & commiscendo, ad ultimum pulvis su-
pra scripturum cum supra dicto syrupo in mortario semper
agitando moueatur, donec incoiporetur, demum referuetur
in uase uitreato.

DIACOLIBANVM Nicolai & dicitur ab olibano quod
ibi ponitur, lachrymas oculorum potenter constringit, do-
lorem hemeraneum & cilijs sanat, fauces rheumaticis & ar-
terias lenit, emopthoicis & tussentibus medetur, vomitu-
m compescit, dolorem stomachi & nauicam auferit, peri-
pneumoniacis, pleureticis subuenit, gonorrhœam & satyriam
sim emendat, et menstrua sanguinis sistit.

Castorei.
Opit thebaici.
Iusquiami.ana.3.iiii.
Cassiz fistulz.3.ii.℥ii.
Folij.
Crocij.
Thuris.ana.3.i.s.
Reupontici.
Amomi.ana.3.i.
℥ii.
Radicum pœoniz.
Macropiperis. i. piper
long.
Storacis calamitz.
Myrrhæ.ana.3.i.
Spicz.
Pyrethri.
Euphorbii.
Leucopiperis, idest piper al-
bum.ana.℥ii.s.

Puluerizetur subtiliter omnia, & cum melle quantum
sufficit fiat confectio in bona forma.

De iusquiamo cum scriptum reperitur, semper de semine,
& non de herba est intelligendum, herba enim maioris
est uenenositas quam sit semen.

Pœoniz si simpliciter scribitur, de radice est intelligen-
dum cum illa magis vñi medicinz conueniat quam folia
vel semina.

DIACORI Mef. in cap. ægritudinis neruorum. Et est
cōfectio conditi ad ægritudines neruorū frigidas mirabilis.
℞. Secacul. Pinearum mundatarum. Radiciū acori, an. lib. i.
s. Et sint secacul. & acori elixata, et expressa, & misce cū eis.
præter pineas mellis despumati, lib. x. & decoq; lento igne
usque dum spissitudinem acquirat: deinde deponatur ab
igne, & proiciantur super ipsum pineæ, & misceantur ad
inuicem, post hoc pulueriza super ea piperis 3. i.
Piperis longi.
Garyophyllorum,
Zingiberis.
Macis ana 3.iiii.
Nucis muscatz.
Galangæ.
Cardamomi ana 3.iiii.

Dosi eius 3. i. mane & sero.
DIAMORVISION Mef. est medicina multarum utilita-
tum, sicut diacurcuma magna, & experta, et efficax nimis &
proprie ad dolorem stomachi propter frigiditatem factū,
& humorem crudum & ad ægritudines splenis, et hepatis,
& chronicas factas in ipsis propter hydropisum.
℞. Croci.
Radicum acori.ana.3.ii.
Myrrhæ.3.iii.
Baccarum lauri.
3.ii.s.
Dauci.
Cinnamomi.
Cassiz lignæ.
Cimini carmeni.
Carbopalsami.
Florum squinantii.
Seminis apii.ana.3. i.
Seminis anisi.
Cordumeni. i. carui agre,
Spicz.
Mentz siccz.

Marmacur. i. marubium in
pandectis.
Ameos.
Costi.
Piperis longi,
Piperis albi.
Piperis nigri.ana.3. i.

Mellis despumati, & colati quantum sufficit, & fiat confectio,
dosis eius est 3. i. usq; ad. ii.

DIACOSTVM Mef. ualet ad dolorem viscerum & op-
pilationum in eis ad principium hydropisis.
℞. Costi amari.
Cassiz lignæ.
Cinnamomi ana.3. v.
Seminis apii.
Seminis anisi.
Cimarum squinantii.
ana.3. iii.
Rauedfeni, idest rheubar-
barum.3.iiii.
Radicum affari.3.iiii.
Crocij.
Aristolochiz.
Myrrhæ.ana.3.ii.

Mellis quantum sufficit, & fiat confectio.

DIACVLPHER Mef. confert febribus antiquis, et me-
lancholicis, et phlegmaticis, et cōstrictioni anhelitus, et an-
tiquæ tussis, et eis, qui habent pectus saniosum, et confert iu-
uamentum masticum ad duritiem splenis, et hydropisum,
et prouocat urinam, et frangit lapidem, et confert morsum
uenenoso, et eis qui timent porasse venenum.

Piperis albi.
Piperis longi.ana.3. vi.
Sulphuris citrini.
Thuris.
Meu.
Iusquiami albi.
Myrrhæ.
Storacis cala.ana.3. viii.
Cordumeni. i. carui.
Agrestz.3. viii.
Rurz.
Costi, ana.3. vi.
Opit.
Corticum mandragorę.
ana.3. iii.
Crocij.3. ii. s.
Cassiz lignæ.3. v.

Confice cum melle despumato, et utere post sex menses,
dosis eius est 3. ii. usq; ad. 3. iii.

DIACVBBES confectio. in thesauro pauperum in cap.
de oppilatione hepatis, et in usu a paucis diebus citra.
℞. Cubebarum.
Ozimi, idest semen, ana.
3.iiii. s.
Sandalorum alborum.
Sandalorum rubeorum.
Sandalorum citri.ana.3. ii. s.
Pistitum omnia subtiliter, et cum zucharo q. d. fiat electuario
secundum artem tibi ostensam.
Rasurz eboris.ana.3. i. s.
Seminis endiuiz.
Seminis portulacæ.ana.3. i.
Addendo in hoc electuario i magistralis rheubarbari electuarii
infusi.3. iiiii. & misceatur in supra scripto electuario arte,
et ingenio, ne uirtus infusionis rheubarbari huius depdat.

DIAREHYBARBARVM Nico. ualet ad defectionem
hepatis, et oppillationem eius, et uentositati uiscerum, di-
gestibilitati.
℞. Costi.
Crocij.
Cinnamomi.
Spicz indæ.ana.3. i.
Cassiz lignæ.3. iiiii.
Radicum affari.
Myrrhæ.
Aristolochiz longæ & ro.
Squinantii.ana.3. iiiii.
Rheubarbari electz.3. iiiii.

Mellis quantum sufficit et fiat confectio.
DIAPAPAYER Nico. dicitur a papauere albo, quod
intrat, ualet contra uitium pectoris, & pulmonis, cuius
permixtio.
Succi liquiritiz
Dragacanthi.
Gummi arabici.
Seminis papaueris albi.
Penidii.ana.3. vi. ℥ii.
Amygdalarum.3. ii. ℥ii.
Seminis melonis.
Seminis citrulli.ana.3. i.
Seminis cucumeris.
Seminis cucurbitz.
Seminis lactuce.
Seminis maluz.ana.3. i.
Amydi.
Seminis cydoniorum.
Seminis portulacæ.ana
3. i. ℥ii.

Syrupi uiolati quantum sufficit, et fiat confectio.
DIACORI magistralis ualet ad paralyisim, epilepsiam,
& tororem oris, et ad frigiditatem stomachi, ad omnem pas-
sionem corporis ex causa frigida. Cuius permixtio.
℞. Acori sicci, et mund.
3.iiii.
Zingiberis.
Piperis longi.

Piperis nigri ana.
3.i.s.
Seminis pæoniz.
Radicum pæoniz.
Carui, idest semen.
Seminis ameos
Stoechados citrini,
Saluiz.
Petrofilii.i.femen.
Rutæ ana.3.iiii.
Aristolochiz longæ.

Nucis muscatæ.
Garyophylorum.
Cinnamomi.
Galangæ.
Zedoariz.
Castorei ana.3.iiii.
Seminis ozi, idest semen
Basilicopis.
Hyssophi siccz.
Pyræthri ana.3.ii.

benet, et lauri.

De serico uero quod scriptum est, quod apponatur in medicinis cordialibus pro confortatio cordis nullo modo debet comburi, sed minutissime incidit, et teri.

Quod uero ponitur in medicinis ad materiz cõsumptionem, ut in hoc electuario ponitur, tunc comburendum est. Modus combustionis positus est supra in diamusco dulci.

DIAPHONETICON Mesue, confectio de dactylis, uocatur, confers ad febres compositas, & chronicas, & est medicina securitatis, confert ad colicam, & dolorem ventris & humorem crudum & frigora, et solutium facile et conueniens.

R. Dactylorum liyeron infusorum in aceto tribus diebus, & noctibus 3. c. siue drachmas centum.

Penidiorum sichiari, idest facti de zucchero albo infuso in aqua decoctionis hordei. 3. 50.

Amygdalarum mundataru 3. xxx.	Cinnamomi, Macis, Ligni aloes, Seminis anisi, Seminis fœniculi, Seminis dauci, Galangæ ana. 3. ii. s.
----------------------------------	---

Conterantur subtiliter dactyli penidii, & amygdalæ, cætera uero puluerizentur non multum subtiliter. Melis despumari, et colati quantum sufficit, & fiat electuarium.

Dactyli heyron, dicuntur heyron ab illa regione in qua dactyli multum abundant, & qui in ea nascuntur sunt meliores omnibus aliis aliarum regionum. Alii uero dicunt, qd est una maneries dactylorum quæ melior est, quæ madmodum sunt pruna damascena quæ meliora sunt aliis prunis, et una & altera opinio bona est.

Penidii, et dactyli in hac compositione ponuntur ut inuiscentur, et ingrossent medicinas solutiuas, ne ad longinquam penetrent, & hac de causa ponuntur in hac compositione Mesue, & in omnibus aliis medicinis solutiuis in quibus ponuntur.

De hac compositione uaria reperitur litera, & paucissimi sunt aromatarum qui uique adeo compositionem hanc recte composuerint ob literæ uarietatem. reperio. n. in aliquibus Mesue scriptum fieri, in aliis san, in alio fieri, in quibusdam sachiari, in aliis sichiari, & in aliis sichiari, & syari, quæ omnes corruptæ sunt præter illam quæ penidiarum sichiari dicit, & multipliciter exponitur.

Quidam enim dicunt, quod penidii sichiari sunt penidii facti ex zucchero illius provincie, & quod sichiari est provincia, & hæc falsæ est. Alii dicunt quod sunt penidii, qui sunt ex zucchero prius infuso in aqua hordei, cum fieri id sit quoddam hordeum, & tunc illo modo facti sic appellandi sunt, magisque lenitui sunt, et absteruiui, minusque uiscosi, & oppilatiui.

Alia expositio est, qd sichiari id est quod solidi alibi, et leues & hi sunt ex bono zucchero, & dux hæ opinionones bonæ sunt sed secunda magis ad mentem doctoris, & fuit, & est mea opinio. Igitur cum compositionem hanc facere uis, accipe zuccharam album, & infunde in aqua decoctionis hordei per horas sex: deinde zuccharam coque illa in aqua, & penidios fac, & habebis perfectam, & ueram descriptionem diapheniconis secundum authoris mentem.

Penidii sichiari ex zucchero solido ultimate decocto, & ex longa, & continua ductione, & manibus pertractione de albanur, & de bono zucchero facienti sunt non de puluere zucchari, ut quidam faciunt aromatarum.

Diaphenicon dicitur a phenihiis, idest dactylis de qui bus plus intrant quam de aliis medicinis, tamen non sunt in hac medicina. Sed turbidi, & scamonea sunt basis.

DIAPRUNIS non solutui Nico. & dicitur diaprunis, siue diamusculum, quia pruna damascena ibi intrant, ualeat proprie acutas patientibus, & per acutas maxime causon & synchoe in principio, augmento, & statu ægritudinis.

R. Prunorum damascenorum quantitate quam uolueris nõ per

Puluerizentur oia subtiliter, & cû lib. v. 3. iiiii. mellis cocti, & despumati fiat confectio in bona forma, dosis est 3. ii.

DIACATOLICON lassatiuum in Nicolao maiori uniuersaliter potest dari in oibus ægritudinibus: in quibus est fenda quasi uniuersaliter solutio ventris, datur, & sanis constipatis ad conseruationem sanitatis, datur indifferenter ante cibum, & post sine nutritione alicuius, purgat melancholiam, choleram, & phlegma, mundificat sanguine, et expellit uentositates ventris, & pectoris, & lenit intestina.

R. Folliculorum fenæ. Cassiz nouiter extractæ & mundæ. Tamarindorum. ana. 3. ii. Rheubarbari. Violarum ana. 3. i. alibi. 3. i. s.	Penidii. Zuchari candi. ana. 3. vi. Seminis anisi. Seminum communium. ana. 3. iiiii. Polypodii. 3. i. Zuchari. lib. ii.
--	--

Liquiritizæ rasæ. 3. vi.

Hæc hoc modo, cassia & tamarindi extrahantur, cum modico altero polypodio, & fiat decoctio, & extrahatur cassia, & tamarindi, cætera puluerizentur, & cum lib. ii. zucchari fiat electuarium in bona forma.

Species electuariorum solutiuorum sunt grosso modo conterendæ, & per sedatium rarum transiri debent, & non solum electuaria solutiu, sed & confectioes solutiuæ, ut diarobæ, diacartamum. Et grossa hæc puluerizatio duplici causa fit. Primo ut diuin stomacho maneant, & ibidem diu operentur. Secundo ut uirtus eius cito non euanescat, & ne sua subtilitate ad membra transirent, quia maximum nocuumt inducerent, ut supra declarauimus.

Medicinz solutiuz dicuntur, eo quia habent corruptos humores soluere, idest educere, & euacuare.

DIABENAL Nic. dicitur a fenæ quæ ibi recipitur plusquam de aliis speciebus, ualent proprie melancholicis, maniacis, cardiacis, tritibus. Cuius permixtio.

R. Folliculorum fenæ. 3. iii.	Spicz.
Auellanarum affata. n. u.	Ozimi. i. semen basilici.
mero. 50.	Zingiberis.
Serici combustii. 3. ii.	Folii.
Lapidis armeni. 3. i.	Cardamomi scilicet maioris & minoris.
Lapidis lazuli amborum lorum. 3. ii.	Croci.
Zuchari. 3. vi.	Zedoariz.
Cinnamomi. 3. i.	Florum roris marini.
Garyophyllorum.	Macropiperis. i. piper longum ana. 3. iii.
Galangæ.	
Piperis ana. 3. ii.	

Puluerizentur oia subtiliter, & cû lib. ii. mellis colati, & despumati fiat electuarium in bona forma hoc modo. Auellana subtiliter cõterantur. deinde ad bulliendũ cum melle ponantur, semper spumã a melle amouendo, post uero aliqualem cõtionem uel remoueat ab igne, & spēs ponantur.

Lapis lazuli, & lapis armenus hoc modo lauant. Terantur ambo per se subtilissime: deinde accipe mortariũ lapideũ & proice ipsorum alterum, & aquam claram in eo, & cum pistello agitando simul miscetur, & hoc facto per aliquod tps permittit residencia facere, & primã aquam abicias, & sic ter facias semper aquã innouando, postea loco aquæ clare accipias aquam rosatã, & sic facias vt de eorum aqua dixi. Et tũ cum dicta aqua lauentur, quod aqua remaneat clara, & tuac ipsorum perfectã erit lotio, sed per se conterere

perfecte maturatorum, sed propinquorum maturacioni, a-
que claræ, q̄ possint bullire, coque donec mollescant: dein
de pone ad cribrū, ut trāsant, & supius remaneant ossa, &
cortices. In aqua uero decoctionis dictorum prunorū adde
uiolæ. ʒ.i. & bulliat iterū: deinde cola dictā decoctionē, &
symplicia cū li.ii. zuc. in quo suppone de pulpa prunorū li.i.
Castiæ nouiter extractæ. Tamarindorum. an. ʒ.i.

Coque et totum usq; ad mediocrem spissitudinem semper
cum spatula agitando postea adde hos pulueres.

R̄. Sandalorum alborum	Berberorum.
Sandalorum rubeorum	Succi liquiritiæ.
Spodii.	Dragachanthi ana ʒ.ii.
Rheubarbari.	Seminis citrulli.
Cinnamomi ana ʒ.iii.	Seminis melonis.
Violarum.	Sem. cucurbitæ, mundatorum,
Rosarum.	ana. ʒ.i.
Seminis scariolæ. ana. ʒ.ii.	

Puluerizentur omnia satis subtiliter, & permisceantur,
& habebis diaphanum non solutū.

Et si lassitium facere uolueris, adde pro qualibet libra
istius electuarii diagridii. ʒ.iii.

Pruna & omnes fructus colligendi sunt quando iam ma-
turitatem acceperunt, & antequam cadant ab arbore, & sic
debent conseruari.

Pruna ex quibus supra scripta compositio fit, debent esse
mediocriter maturitatis, non multum matura, uel muza.

Muzum autem propriè dicitur, cuius sapor est compo-
situs ex dulci, & acetofo.

DIACASSIÆ magistralis.

R̄. Castiæ mundæ & elec.	Capil ue. an. M.s.
lib.ii.	Tamarindorum ʒ.i.
Prunorum nuxii.	Thimi.
Violarum.	Epithymi. an. M.s.
Hordei.	Passularum ʒ.s.
Seminis anisi.	Seminis foeniculi. ʒ.iii.
Polypodii.	Seminis portulacæ.
Cartami.	Seminis maluarum ana. ʒ.iii.
Liquiritiæ.	Cinnamomi. ʒ.iii.

Misceantur & confrangantur omnia grosso modo, & bul-
liant in lib. xii. aquæ fm̄ artem: deinde colesnt manibus ex-
primendo, de qua colatura castiæ, & tamaridi extrahant,
& dissoluantur. Et addatur zuchari lib. i. deinde coquantur
usq; ad formam electuarii, reducantur lento igne cum spa-
tula semper agitando.

Drachma nomē est pōderis, & ponderat nonam partem
uncie, & sic accipiebatur antiquitus, & illa est uera drach-
ma, moderni uero octauam partem uncie pro drachma ac-
cipiunt quæ est scropulus tres, & drachma græce idem est q̄
manipulus uel fasciculus modernorum.

Grana ex quibus medicinz ponderatur debent esse gra-
na hordei, uel frumenti, si. n. sunt frumenti, debet illud gra-
num esse à superiori cortice mundatum, si uero hordei, il-
lud granum esse debet cum cortice, & sic habebis debitum
ordinem ponderum.

DIACARTMI magistrale.

R̄. Medullæ cartami. ʒ. i.	Turbith electi. ʒ. i.
Specierum diadragacanthi	Diagrydii. ʒ. i.
frigidi. ʒ. ii.	Maniæ granatæ.
Carnium cydoniorum	Mellis rosati. ana. ʒ. viii.
ʒ. ii. ʒ. i. s.	Zuchari albi. ʒ. vi.
Zingiberis albi. ʒ. i.	

Et fiat confectio in morsellis, uel in forma manus christi
de. ʒ. iii. pro singulo cuius est dosi.

Dosis enim est limitata mensura, & quantitas simplicis,
uel compositæ medicinz solutiæ, uel non solutiæ, de se a-
pra nata est facere sufficientem operationem, non diminu-
tam, nec superfluum.

Carnes cydoniorum i. pulpa cydoniorum debent subti-
liter cōterui cum cartamo à quo amouet sic cortex exterior
& hoc modo dicitur medullas deinde ambo debent dissolui
cum melle rosæ, & manna, & zuchra. fere cocto bene misce-
ri, siq; uero addantur species præscriptæ, quæ misceri de-

bent, & confectio fieri.

Medicinz omnes solutiæ conseruantur per duos annos
in sua bonitate, & solutione, elapso uero dicto tempore a-
mittunt uirtutem suam solutiæ.

DIAROB. cum turbith magistrali, & cū rheubar. ualeat
& est confortatiuū solutione educit humores phlegmaticos
grossos, & uiscosos, & à remotis, & iuncturis propriæ. & ip-
sum quidem mundificat stomachū, & expellit ab eo super-
fluitates adherētes in uis eius, & mūdificat pectus à phas-
te grosso, & putrido, & educit à iuncturis & locis neruosis
& anchis humorem grossum, & uiscosum, & est medicīna
ad dolores iuncturarū, & usus eius præseruata lepra, ab in-
fectionib. phlegmatis, sicut est morphea, & baras, est enim
medicīna bona febrium phlegmaticarum, is autem qui su-
mit ipsum, timeat, austrum, & abhorreat pisces.

Cuius permixtio hæc est.

R̄. Turbith albi, & gum	Macis. ʒ. s.
mo. ʒ. x.	Rheubarbari boni & electi.
Zingiberis albi. ʒ. v.	ʒ. iiiii.
Galangæ.	Diagridii infusi in aqua ro.
Piperis longi.	per diem. ʒ. s.
Cardamomi maioris &	Zuchari boni.
minoris.	ʒ. xvi.
Croci ana. ʒ. i.	

Et fiat confectio in morsellis, dosi eius est. ʒ. vi.

Pondera communia ex quibus medicinz cōmēsurant,
& ponderantur sunt sex, primo libra, cuius, talis est figura
lib. secundo uncie, & talis est figura. ʒ. tertio. ʒ. & talis ē. ʒ.
quarto scropulus, & talis est. ʒ. quinto granū & talis ē gra-
sexto Manipulus & talis est. M. & his sex ponderibus cōi-
ter omnes mensuræ mensurantur medicinarum.

DIAROB. cum turbith sine rheubarbaro magistralis ua-
let &c.

R̄. Turbith albi & gūmo.	Galangæ.
ʒ. viii.	Piperis longi.
Zingiberis. ʒ. iiiii.	Macis ana. ʒ. i.
Cinnamomi.	Diagrydii. ʒ. iiiii.
Garyophyllorum.	Zuchari lib. i.
ana. ʒ. ii.	

Et fiat confectio in morsellis de. ʒ. iiiii. pro quolibet mor-
sello dissoluendo zuchra. in uino cydoniorum, & aqua sim-
plici puluerizato solutiū hoc more &c.

Inter antiquos & modernos de pōderibus est differētia,
iō indigedi, q̄ libra modernorū cōstat, & resultat ex. ʒ. xii.
uncia constat ex. ʒ. viii. drachma ex. ʒ. iii. scropulus ex gra.
xx. & sic medicinz a medicis cōmēsurantur hoc tpe.

DIAMARGARITON Nic. & dicitur a duobus generi-
bus margaritarum perforatarum, & non perforatarum quæ
ibi intrant. ualeat cardiacis tristibus, & ad oēm cordis debi-
litate stomachi, patientibus fastidium auferet, digestionē
procurat, asthmaticis, dispnoicis opitular, & priscos &
eos qui ex longa ægritudine sunt extenuati refant.

R̄. Garyophyllorum	Margaritarum non perforata- rum.
Cinnamomi.	Sparicæ.
Spicæ.	Margaritarum perforata- rum.
Galangæ.	Zingiberis.
Ligni aloes.	Osis de corde cerui.
Liquiritiæ.	Rasuræ eboris.
Trochiscorum diarhodō.	Blatæ bizantiæ ana. ʒ. s.
Trochiscorum diani.	Musci.
ana. ʒ. i. s.	Ambræ.
Nucis muscatæ.	Cardamomi.
Macis.	Seminis leuistici.
Alipræ muscatæ.	Seminis basilici. ana. ʒ. i.
Rheubarbari.	minus gra. ii.
Zedoariæ.	
Storacis calamitæ. an. ʒ. i.	Camphoræ. gra. vi.

Mellis rosati quātum sufficit, de i. in zlatæ cū rodostoma
tæ, uel cum frigida, in hieme cum uino mane, & meridiz.

DIAMARGARITON Auicennæ ualeat mulieribus ip-
sum. n. rectificat dispositionem matricis earum & dispositio-
nem stomachorū earū, & oportet, ut uehementis sit studium

in stomachis earum, quare confortentur cum eis quæ sunt geleniabin cum xyloaloe, & matrice, & similibus, & electuaria facta cum zucchero plurimo cum speciebus aromaticis, in quibus enim est multa caliditas cū emplastris Ilypti eis calefacientibus aromaticis, cuius permixtio.

R. Margaritarum non per Zedoaria.
foratarum. Doronici.
Pyrethri ana. 3. i. Seminis apii.
Zingiberis. Taphæ.
Matricis. ana. 3. iiii. Cinnamomi.
Been albi. Nucis mulfatæ.
Been rubei. Macis ana. 3. ii.
Piperis. Cinnamomi. 3. v.
Macropiperis. ana. 3. iiii.

Zucchini sublimis quantum omnia, & plus fiat cōfectio in morfellis, & etiam in forma electuarii potest fieri.

DIACARDION seu rob nucum Melux cōferens eis quibus a capite ad pectus catarhus acutus, & subtilis defluit, & ad cannam pulmonis, & est causæ apostematum, & præfocionum mortis, & est ad hoc medicamen sublime. Et eius modus est:

R. Succo corticum exteriorum nucum in diebus canicularibus li. iiii. decoq. ipsū ebullitione una, deinde adde mellis purificati li. ii. & coq. usq. ad spissitudinem mel. & referua.

Nota q. rob durat per duos annos in sua bonitate, & per sectione ut uoluerunt antiqui, moderni uero dicunt per annum solum, sed durat plus & minus secundum ipsorum fucorum purificationem.

Nux simpliciter prolata uel scripta semper de nucē com muni intelligatur.

Dies caniculares sunt dies in quibus apparet quædā stella meridionalis, canis appellata ab astrologis, in matutinis apparet & solis ortū ascendit, & hoc ē i medio æstatis. Incipit aut canicularē tēpus decima die Iulii uel circa, & durat usq. ad dies xx. Augu. ita q. in summa dicti dies nu. xl. illis igitur quibus nuces colligendæ sunt per hac cōpositione.

Dies quibus dicuntur naturales, quidā artificiales, naturales dies sunt a prima hora usq. ad. xiiii. artificiales uero ab ortu solis usq. ad occasum.

Et post illud nobis occurrēt intentiones quatuor. nā pro pueris & mulieribus, & humidis natura sufficit medicamen sic factum; & quando est in principio aliquid de stypticitate habentibus misceri oportet, sicut fur rosæ & balaustia, & quando in statu est ægrotudo crocis, & myrrha miscenda sunt, in declinatione uero baurach, & sal armoniacus, & similia. Est enim medicamen sublime, & expertum.

LECTARIUM de gemmis Melux iuuantem est magnum ad ægrotudines cerebri, cordis, stomachi, & hepatis, & matricis mulieris frigida, & nos fecimus experimentum bonum, & ualeat ad tremorem cordis, & sincopim, & debilitatem stomachi: & quando quis tristatur, & nescit radicem, & ei qui diligit solitudinem, & facit corporis colorem, & odorem bonum.

R. Albarum margaritarum. Garryophylorum. ana. 3. i.
3. ii. Zingiberis.
Fragmentorum zaphiri. Piperis longi.
Hyacinti. Croci.
Sardinis quod est quidam lapis præciosus. Spicæ.
Granatorum. Folii.
Feruggi idest smeraldi. Heil. i. cardamomum maius.
ana. 3. i. Trochiscorum diarhodon.
Zedoaria. Ligni aloes. ana. 3. v.
Doronici. Cinnamomi.
Corticum citri. Galangæ.
Seminis falphelengemisc. i. Zurumbet ex radice aromatici.
ozymi garryophyllati. ana. 3. i. s.
Macis. ana. 3. ii. Foliorum auri & argenti.
Corallorum rubeorum. ana. 3. ii. gra. v.
Carabæ. Mufci boni. 3. s.
Limaturæ ebo. ana. 3. ii. Ambra. 3. ii.
Been albi & rubei.

Puluerizentur & referuentur in uase uitreo, & obturentur os uasis.

In hac compositione multa sunt uidenda pro clariori ipsius doctrina. Primo quid sit sardonis. est. n. lapis rubeus spissus cum substantia per uia seu transparente, & dicitur q. eius uirtus est quæ accendit animi ad gaudium, & acuit ingenium, ideò merito in hoc electuario positi sunt. Sed quia cognitio huius lapidis non est apud aromatarios: ideò loco ipsius ponunt rubini. Et hoc consonum est cumdam receptæ inuenta in uno antiquissimo Melux, quæ dicebat quinque generum fragmentorum cōmunium præciosorum, & sic erit litera bona. Quia si scriptum reperies quinq. generum fragmentorum cōm præciosorum de quinq. supradictis deberes intelligere. f. de zaphyri, hycinti, rubini, smeraldi, gradatæ fragmentis, & non de aliquibus aliis.

De alciis q. de per se nihil significat nisi articulum scilicet hoc. Nam ubi nos dicimus hoc: arabes dicunt al. Et est quando almiscetur cum aliqua dictione significat articulum in illa dictione ut alhale, idest thymus &c.

Felengemisch differentia est de eo inter doctores, quidā dicunt q. est ozimum garyophyllatum & illud est, femen cū trinum odoriferum quod colligitur a basilicone habet folia minuta, & hæc opinio uera est. Alii uero dicunt, q. est femen melissæ. Alii q. est cinnamomū, quæ duæ opinionēs a doctoribus reprobantur, & prima tenetur.

Prætiolæ fragmenta, & mineralia sunt cum in aliqua cōpositione intrant ultimate conterenda, usquequo possunt per satis spissam telam transire, ac etiam oēs lapides, ut coralli, lapis iudaicus, & ita ea administrare ut docet, nosque monet Aui. cū lapide iudaicū in carulo aliarum calculo iubet dari illum super cotē, uel lapidē molarē ducere iuber ut magis subtilior sit. Igitur nunquā in triturando eos fessus sis, quia quanto subtiliores, tanto perfectiores existunt.

Zurūbet nō est zedoaria, ut Matt. Syl. exponit. cū Aui. 2. cano. diuerfa de eis faciat capitula. Sed zurūbet est quedam radix similis cypero, grossior zedoarias, intus subcitrina, odore aromatica, & sapore, acuto: minus tamen zedoaria, sed si caremus ea loco ipsius zedoariam ponimus.

De aureo pōdere dicendum est, inter doctores de eo est magna differentia, unde dicunt, ut Gentilis, q. est pōdus de 3. i. s. & hoc affirmat Simon Ianuensis. Alii dicunt, q. est septima pars uncie. Sed communis & uera decisio est, q. si inueniatur aurum, i. ut in hoc loco. & in oibus aliis medicinis non solutiuis idem est q. 3. i. s. in medicinis uero solutiuis, si reperitur idem est q. septima pars uncie, & nō plus.

Insuper quia cōfectio hæc, & sequentes propter laxiūciū hominum fieri solent in morfellis, quantitas spemur ad zucchero declaranda est. Ideo ad oēm li. i. zucchini apponi debet. 3. i. spemur cribellatarum. Cribellatarū dico propter simplicitate quæ cribellari non possunt, ut amygdalæ, dactyli, semina oia. Ad oēm uero lib. i. mellis specierum cribellatarum, ut supra. 3. iii. Et hoc modo faciendū habent domini medici, & ægri uirtutem medicinarum a doctoribus limitata tam. Secus autem faciunt aromatarii nostri temporis auriatā ducti, quod ignoscant illis Deus.

Nota insuper q. Mel. dicit, cōfice cū melle emblicorum & colatura geleniabin. Ido si in forma illa facere uis: scias q. mel emblicorum hoc modo fit.

R. Myrobalarum emblicorū 3. ii. aque cōmunis li. ii. Tenantur subtiliter dicti myrobalaui, & infundantur per dies viii. in dicta aqua, postea bulliant usq. ad consumptionē medietatis deinde coletur cū panno lineo bene manibus exprimēdo: & in dicta colatura addatur mellis boni li. i. bulliant simul usq. ad cōsumptionem aque & cōstionē mellis, & referuentur. hoc. n. dicunt mel emblicorum. Accipe ergo mellis emblicorum geleniabin. i. mel rosatū ana. lib. s. supra scriptarum spemur. 3. iii. & simul misce. & habebis electuarium de gemmis in forma liquida ut scribit Mel.

De geleniabin inter doctores est discordia. nā Aui. 5. cano. c. de conditis dicit, q. geleniabin idē est quod rosa cōdi ta, siue cū melle. siue cū zucchero, & sic cū zucchero rosatū quam mel rosatum scēdum eum appellari potest geleniabin:

bin: & hoc idē tenet Halyabas Rasis uero tertio Almanfo. dicit gēleniabin eſt mel roſatū. Quas opiniones reprobant Matth. Syl. dicens gēleniabin idē eſt q̄ mel roſatum. Sed ſeleniabin. i. zucchari roſatū. gēleniabin. i. ſupruſ roſatus, & hæc opinio ab aliis oibus doctōribus tenetur. Igitur gēleniabin. i. mel roſatū &c. Et hæc de electuario de gemmis.

ELECTVARIUM Conciliatoris in cap. differentiārū. xvi. cor. leſtificat, & confortat, mirabiliter ualet. ut patet in libro Conciliatoris.

℞. Succī pomorum dul. Spicæ nardi ana. 3. ii.
Deſpumati, & ſint poma Florum boraginis.
redolentia. Roſrum: rubeorum.
Succi bugloſſæ deſpuma- Been albi & rubei.

ti ana. 3. v. Corallorum rubeorum.
Doronic. Limaturæ eboris. ana. 3. iiij.
Corticum citri. ana. 3. iiij. Spodiū. 3. iiij.
Galliz muſcatæ. Setæ crudæ minutim incifæ.
Macis. Croci ana. 3. ii.

Charabæ. Myrobalanorum omnium
Oliſis de corde cerui. ana. 3. iiij.

Sandalorum rubeorum. Berillorum.
ana. 3. iiij. Smeraldorum.

Seminis baſiliconis. Hyacinthorum.
Folij. Sydani.

Myſtilorum. Zaphiurum.

Meliſſæ. Granatarum ana. 3. i.

Seminis coriandrorum præ Albarū margaritarum. 3. iiij.
pararotum. Limaturæ auri.

Cinnamomi. Limaturæ argenti. ana. 3. ii.

Gelange. Ambre.

Zedoaræ. Camphoræ. an. 3. v.

Ligni aloes crudi. Muſci. 3. i.

Miſce, & fiat electuarium arte, & ingenio ori laudabile

eum zuccharo albo quantum ſufficiat.

ELECTVARIUM de aromaticis Meſuz quod ſcripſit Galenus expertorum iuuentorum ad cauſas ſtomachi, & hepatis, & ægri tudines in eis factas ex phlegmate groſſo, & uentofitate. Digeltionem cōfortat Inflammationem remouet, & morbos ex ea factos curat: Retardat canos: Colorem efficit bonum, & oris, & ſudoris odorem reddit bonum. Renes quoq; calefacit, & coitum excitat. Acidus rudis curat, & ſaltidum, & abominationem remouet.

℞. Ligni aloes crudi non cocti. Roſarum rubeorum ana. aur. xii.

Galliz muſcatæ. Croci.

Doronic. Cardamomum. ſ. maius.

Piperis longi. Cardamomum minus i. æle-
legeta.

Nucis muſcatæ. Trium ſandalorum.

Menæ ſiccæ. Rheubarbari.

Spicæ. Cubebæ. Coſti.

Caiſie lignæ. Zingiberis.

Macis. Seminis ſceniculi.

Muſci. Seminis aniſi.

Cinnamomi. Keiſim. i. ſemen leiſiſici.

Rodicum aſſari ana. aur. iiij. ana aur. ii.

Colami arom. aur. iiij. Zucchari. 3. vi.

Muſæ aromaticæ. i. miuæ cydoniorum cum ſpeciebus li. i. Mellis deſpumati. q. ſ. & fiat electuarium, puluerizatis prius puluerizandis. Sed ſi in morſellis facere uis, facies ut ſuprat doſis eius eſt ab 3. ii. uſque ad aureos. iiij.

Lignum aloes crudi eſt illud quod non eſt coctū. Arabes enim ſolēt ipſum decoquere antequam illud ad nos uenire permittant, decoquēdo illū in aqua, per quā decoctio nem quæ dā humiditas quæ in illo errat ſeu gūmoſitas amouetur, quæ natans ſuper aquam, illam reſeruat: deinde mittunt ad nos illud coctum quod eſt ſine anima, & nullā habet uirtutem, uel bene pauci, & ob hoc auctor dicit crudi Cognofcit q̄ ſit crudi hoc modo nam ſi in igne poſit emit tit quandam humiditatem aromaticam quæ illū a combustionē prohibet. Secundo ſi in aqua proiciatur, ſubito fundum petit propter ipſius grauicatem, & talis eſt eiſus cognitio.

ELECTVARIUM de baccis lauri. Rasis. 9. Almanforis c. de colica. ualet ad colicam, & iliacam paſſionem, & dolori bus inteſtinalium ex cauſa frigida uel uentofa.

℞. Foliorum rutæ ſiccæ. Acori. ana. 3. ii.

rum 3. x. Keiſim. i. ſemen leiſiſici.

Seminis ameos. Origani.

Cimini. Amygdalarum ama.

Nigellæ. ana. 3. ii. Carui. ana. 3. ii.

Piperis nigri. Baccarum lauri.

Macropiperis. i. piperis Calſorei. ana. 3. ii.

longi. Serapini. 3. iiij.

Mentaltri. Opopanacis. 3. iiij.

Dauci.

Puluerizentur puluerizanda non multum ſubtiliter, ut dictum eſt de cicimino. Mellis cocti, & deſpumati ad pondus omnium, & eſt 3. v. 3. v. gumme uerō diſſoluatur in aqua rutæ, & facies in bona forma.

Et nota, quod Rasis dicit, quod non habet partem in reſoluendo uentofitatem.

Ruta q̄ in hac cōpōne intrat ac in oibus aliis debet exie cari cū meſura, & hoc ideo q̄n ſi exiccatur uehementer, eſt calidiſſimæ cōplexionis, & eius calefactio eſt ultra meſurā. Et ſi non exiccatur debito modo, remanet in ea humiditas ſuperflua quæ prohibet eā digeri, & uentofitatē facit: quare in ipſius exiccatione diligentia habenda eſt. Et debet in umbra exiccari, non autē in ſole, ut quidā imperiti faciūt.

De nigella multi ſunt qui errant ponentes in receptis ſe men quoddā cinerulentum odoriferum fatiſ triangulare pro ipſa nigella & errant. Sed nigella eſt quoddā ſemen in grum clarum aromaticū multum faciens folia ſere ſimilia fumoteræ, & id in medicinis appendendum eſt.

Origanum colligendum eſt in menſe Iulij poſtquam ſol tendit ad occalum. ſ. in ueſperis. Non autem in mane ante ſolis ortum, ut quidam fatui faciunt.

Mel & oēs medic inæ triplici cauſa coquuntur. primo uel mūdificēt mel quia coqui, ut ſua impuritas remoueāt. ſecundo ut expellamus aliquam ſubſtam noſtro propoſito repugnante, ut multa decoctio caulium q̄ illos ſtipſicos facit. tertio, ut uirtus ipſus in oleo uel aqua tranſeat &c.

ELECTVARIUM de citrō Meſuz inuentione noſtra contra ſortans ſtomachum, & procurans digeltionē, & odorē oris facit bonum, groſſas uentofitates expellit, & cor cōfortat Cuius permixtio hæc eſt.

℞. Corticum citri aur. xx. Gelange. 3. ii.

ideſt. 3. xxx. Muſci. 3. s.

Garyophyllorum. Cardamomi maioris, &

Ligni aloes. minoris.

Cinnamomi. Zingiberis. ana. 3. i.

Macis ana. 3. ii.

Puluerizentur hæc non multum ſubtiliter mellis cocti, & deſpumati 3. viij. & fiat confectio, ut fieri ſolet in forma ſolida, ut ſupra.

Vellem tandē poſtquā prouinciā hanc accepi Ioannes Francieſe mi partē oēm aromataris neceſſarium declarare, ne illi ſua ignorantia ad tenebras exteriores duceretur. Cōtingit nōnuquam ad eos accedere uiros, & hoies afflictoſ ſtomachi dolore, petentes ab eis ſuffragiū. Ipſi pietate moti exhibent, uel aromaticū, uel diaciminū uel dianthum, non ultra cōſiderantes de hora exhibitionis, quæ res aliquē ducit egrum ad non parua pericula. Ea propter in doctiſ ne audiant, notent quæ diſtinctionem hanc.

Conſediones quæ dant aut ad digerendum materiā facientem ægri tudinem, & deoppilandū, ac ad confortandū mēbrū, ut triſandali, tunc dari debent ante cibū ſtantim per horas quatuor, ut poſſint a natura præparari, & ad loca neceſſaria tranſmitti. Si uero propter ſtomachū, aut propter proſtrationem appetentis dātur, tunc parū ante cibū dādæ ſunt. Si uero propter uirtutem digeltiuā exhibētur: immediate poſt prandium exhibendæ ſunt. Si uero dant ad cōfortationem cerebri, & uirtutis aialis, poſt prandium, & poſt cœnā per lōgum tēpus ſaltim per duas horas dandæ ſunt. Si uero ad cordis confortationem, debent dari circa mediā

noctem, & tenenda sunt multum in ore, ut paulatine, resoluantur. Si uero ad resolutionem uentositatis, stomacho uacuo, & a cibo, & superfluitatibus mundato exhibeantur. Et in hoc aduertendum est, quod nullo modo exhibeantur, neque tyriacae, neque confectioes aperituae seu diureticae, ci bo existente in stomacho uel in ipso repleto malis humoribus. Igitur cōsuetudo. Vercellensis, quae est accipere tyriacā cum aqua ardenti propter nauicam, uituperatur. Ad corru ptela italicorum, qui eam cum maluitico alsumunt. Et ratio est, quia cibus indigestus ac superfluitates malorum humorum ducuntur subtilitate maluitici, uel aquae ardentis ad hepar, & oppilationem faciunt, & ad prauas aegritudines homines precipitant, quare.

Cuius electuarii species sunt satis grossae terendae, cum sua uirtus sit in confortando stomachum, & non transit ipsum, sed uentositates resoluunt & hoc propter causas assignatas in recepta diacymini.

Modus accipiendi cortices citri, & aliorum pomorum sua ueni, & aromatici habentiu odore hoc modo facies igitur qui uult uti corticibus pomorum citri in componibus eligat poma quae habeant acetositate maiorem intrinsecus eo quia cortices eorum sunt magis odoriferi, & oportet, quod ex corticibus illa die qua collecta sunt ab arbore, tergatur ergo primo bene cum mantili aspero, & mundo, & exorientur cum cutello acute acutiei paulatim, & leuiter, ne accipiatur ex carne cum cortice, & simili modo oportet fieri de cydoniis, & aliis pomis: deinde in umbra exsiccentur.

Nota quod ista oia electuaria dulcia seruantur per annum in tegris, & ultra, & oia alia praeter electuariū quo utuntur reges, & plati, quod non potest diu seruari, eo quia rancefiscit, sed solum per dies quindecim, uel per mensem ad plus serua. ur.

Electuariū de cineri. Aui. sen. de cinere octaua terti c. 19.

℞. Cineris uitri	ana. 3. i.
Cineris scorpionum	Lapidis iudaici,
Cineris radicem caulium	Gummi nucis,
nabati, sunt caules trans-	Radicum acori. ana. 3. i.
plantati.	Seminis Petrosilii.
Cineris leporis,	Daucis. semen pastinacae
Lapidis spongiae,	sylicestris.
Sanguinis hirci exsiccati, &	Pulegii,
preparati.	Gummi arabici.
Cineris corticum ouī a quo	Seminis altheae,
pullus egressus fuit	Piperis. ana. 3. i. s.
Puluerizentur omnia subtilissime, mellis cocti, & despu-	
mati. 3. x. & fiat electuarius, quod bene obturetur, ac saepe	
cū spatula commisceatur.	

Vitru cōburitur hoc mō: terat bene: deinde reponatur i crucibulo uel capcia ferri, & pone sup prunas semper insut flado donec rubetū fiat: deinde ab igne remoueat. si erit i cineratu bene ē, aliter iterū ponatur sup prunas, & insuffletur, & nō definas sic facere donec incineret, & de eo utere.

Scorpiones hoc modo comburentur. Accipe scorpiones uiuos quantitate quam uolueris, & pone in olla noua, & clauda eam, lutado illam cum pasta, uel cum terra, & pone illam in furno calido, & dimitte per diem, & noctem: dein de extrahe, & cinerem ipsum habebis.

Caules nabati. i. caules nō transplantati hoc mō cōburuntur. Extrahe radices a terra, mundentur ab omni immunditate: deinde in frusta incidantur, & ponantur in olla, & cooperiatur olla coopertorio perforato: ita ut fumus possit exire & ponatur i furno, & dimittatur per totū diē, in sero remoueat, & reperies in dicta olla tāquam carbones, postea dīctos carbones tere bene, & in alia olla parua reponē, & cooperi lutando eā, & reponē eā in furno, & dimitte per diem, & noctem, & tantum ac tam saepe hoc facias, quod carbones in cinerem album esse conuersos reperies, & de illo utere.

Modus incinerandi leporē Accipe leporē uiuum, & decolla illū, & reponē in olla noua cū toto sanguine, & pelle bene obturad olla Deinde ponat in furno, & trādimittat quod inclinet, & dicto cinere utere i electuario supra scripto.

Cortices ouorum hoc mō incinerentur. Accipe cortices ouorū a quibus pullus egressus fuit, bene pistentur: deinde

ponantur in olla noua quae bene obturata sit, & ponatur in furno, & dimittatur per noctē, in mane si sint incinerate bene est, sin autem in furno dimittatur usque quo sint incineratae: & nota, quod quanto magis cōquuntur tāto magis albiore redduntur, & incinerantur, & de eis utere.

Gummi uero nucis secundum quosdam est fungus qui reperitur super arbores diuersas, cuius color est ad similitudinē spongiae, sed non recte sentiunt. quia illa res uocatur narcotica nucis gummi uero nucis fm ueritate est gummi quod re perit super arbores ferentes nuces, sed in partibus nostris non reperitur, ego autē uidi prēdictū gummi quod in colore est similis colorī myrrhae grossae, sed odorem non habet, defertur de Apulia ad nos, & in illis partibus inuenitur.

Auicenna dicit, quod dosis istius electuarii sit usque ad aur. ii. idest. 3. iii. & supra cum aqua tribulorū decoctorum. s. tribu lorū marinorum quos ipse in secundo uocat hasek, & sunt qui nominant ipsos uulgo castaneolos lacus.

Serapio, & author Pādecitarum uolunt, quod differentia sit inter dauci, & bauciae, & dicunt, quod dauci est pastinaca sylue stris, bauciae uero pastinaca domestica Auic. uero, & Mes. inter eas nullam differentiam faciunt. Tamen in usu est, & tenetur opinio pādecitarum, & Serapionis.

Sanguis hirci in hoc electuario ingrediens hoc modo pre parandus est. Accipe hircū. iiii. annorū in diebus cannicula ribus. Qui sint diēs canniculares infra describentur in diaca ridion, nutriatur faxifragia, foeni, apio, petrosilii, pulegio, hedera, squinanto, gentiano, capil. ue. polytricho, uel lupulis, & potetur optimo uino, & si ad aliqualem acetositatem tēderet, melius esset, semperque in sole teneat, & hoc mō nutriatur saltem per dies xl. deinde quod incipit urina eius deni grari, sumatur olla noua, & fundatur in ea, aqua, & feruatur donec auferat ab ea terretas quae in ea est. Deinde decolle tur hircus, & accipiat ex medio sanguine quod currit ex eo in ollā, & non accipiatur primus sanguis, neque postremus, & non amoueatur coagulatus: deinde incidatur in parte. ii. eo exstite cōcūitate ollae, & cooperiat cū rute stricte, aut cū panno subtili raro. & dimittatur sub diuo donec recipiat radios solis, & luna, & dimittatur ipsum donec exsiccat bene, & caue ne adueniat ei humectatio ex rore. Nec decollā dū ē nisi san' sit hirc', & ex dicto sanguine utere in oī medi cina, & in oī loco, in quo scriptum reperit sanguinis hirci.

In collectione mineraliū tres condiciones considerandae sunt. Primo eligantur a mineris notis, & famosis. Secundo quod non sit admixtum quod impediāt eius cognitionem. Tercio quod non habeat substantiam transmutatam.

Electaria Mesue experta ad dolorē stomachi a frigiditytate factum, & oēs dolores factos ex simili causa, & a uentositate grossa, & ad dolorē colicæ, & difficultatē urinae, & dolorem dentium, & ad uentositates matricum, & coisere, iuu mentum maximum ad sterilitatē bibitum, & supposita cum lana, & oleo de lilio. Cuius permixtio hāc est.

℞. Castorei,	Costi,
Myrrhae,	Cinnamomi,
Opi,	Phu. i. ualerianz,
Piperis,	Meu.
Macropiperis, idest piper	Danci,
longum.	Alfari,
Galbani,	Croci. ana. 3. i.

Puluerizentur omnia subtiliter, & cum lib. a. mellis cocti, & despumati fiat electuarius in bona forma.

Mel ponitur in ista medicina, & non solum in ista: sed in omnibus aliis triplici ratione.

Primo ut placet horribilitatē medicinarum Sed o ut mū disceret, & resoluat. Tercio ut conferret spēs sua uiscositatē.

Stupefactio est dispositio inducta in membro a frigiditytate per quam membrum non sentiat, aut obtuse sentiat.

Electuarium Indum maius Mes. solutione educens humorum superfluitates, & proprie plematicorum, & putridorū a stomacho a membris nutritionis uentositatē grossam in eis resoluunt, & morbos factos ab eorum exuberantia curat, sicut est dolor stomachi, & uiscerū, & colicæ, & dolorē rem, & educit materias quae sunt in iustis, & coisere

inuamentum manifestū doloribus earū. Cuius est p̄mixtio:
 R. Cinnamomi,
 Garyophyllorum,
 Spicæ,
 Rosarum rubearum,
 Casia,
 Macis,
 Cypri. an. 3. iiii.
 Sandalorum citrinorū. 3. ii. s.
 Ligni aloes,
 Nucis muscatæ. an. 3. ii.

Turbith albi, & gummosi. 3. i.
 Zuechari albi,
 Penidiarum. an. 3. xx.
 Galangæ,
 Heil. i. cardamomum maius.
 Cardamomum. minoris id-
 est melegeta.

Affari,
 Masticæ. an. 3. i. s.
 Diagydi. 3. xii.

Oia hæc fricentur manibus cū oleo amygdalarum dulciū:
 deinde accipe. Succū cydonio. Succū granatorū. Succū apii.
 Succū fœniculi. an. l. s. Puluerizentur puluerizanda satis gros-
 so modo mellis despumati lib. iiii. s. misce, & decoquatur cū
 faccis, & fiat electuarium in bona forma: dosis est aur. iiii.

De casia hic est notandum, q̄ secundum doctrinam su-
 pra tibi datam in forma. Casia filula ponenda est cum sit e-
 lectuarium solutium. Nec casia lignea in electuario est
 ponenda q̄ tamen secus esse quidam tenent. Ego etenim ap-
 poni facio casiam filulam, cum nullum solutium sine leni-
 tino esse debeat, ut uolunt doctores.

Nota q̄ doctores non ponunt in electuariis a remotis at-
 trahentibus penidiosis in suis receptis, sed duntaxat in illis
 quorum intentio est a stomacho, & intestinis, & uenis ma-
 gnis trahere ut in diaphenicone, & hoc electuario.

Affarum cum simpliciter scriptum reperitur, radix ipsius
 ponenda est, quia radix melior pars est plantæ.

Licet Mesue in litera ponat, q̄ dosis huius electuarii est,
 usque ad aur. iiii. hic intelligendum est quando ad lib. i. mel-
 lis ponitur. 3. iiii. specierum, sicut ego hic annotaui. Sed si
 ponitur. 3. ii. ut aromatarii nostri temporis faciunt, & ma-
 le, maior quantitas dari potest.

ELECTUARIUM indum minus Mesue habens inten-
 tionem maioris. Cuius permixtio.

R. Turbith al. & gummo-
 si. 3. c.
 Zuechari. 3. c.
 Macis,
 Garyophyllorum,
 Piperis an. 3. viii.

Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Heil. i. cardam. maius,
 Nucis muscæ. an. 3. vii.
 Scamoneæ. 3. xii.

Puluerizentur omnia satis grosso modo: mellis colati, &
 despumati lib. ii. 3. iiii. misce, & fiat electuarium liquefacien-
 do zuecharum cum melle.

Nota hic unū gēale intelligendū in oī cōpōitione quod
 scamonea acuitur. Medicina. n. quandoq̄ fit in principio ue-
 ris, & acuitur, ut per totum annum possit seruari, & dari q̄
 volumus. Et tunc cum scamonea non cocta acueda est, ne
 sua uirtus lōga mora debilitetur. Nec timet eius malitia, eo
 quia per tps diuturnitatem satis auferitur. Aliquantū autē
 acuitur medicina non quæ debet diu conseruari, sed quæ in
 fra. iiii. vel. iiii. dies debet exhiberi. Et tunc cū scamonea co-
 cta debet acui, ut sua malitia coctura moueatur. Et idem in-
 telligat in electuariis quā in pilulis, & confectionibus.
 Insuper nota, q̄ Mesue acuit hoc electuarium cū scamonea
 & non cū diagydio, eo quia intentio est, q̄ lōgo tpe seruetur,
 si uero dare illud intendimus, omni die acuat cū diagy-
 dio, & non cū scamonea propter causam supra assignatam.

ELECTUARIUM elefcom Mes. quod educit superflui-
 tates a toto corpore, & expellit uentositatem, & ualet ad di-
 sturbarum dolorē, & laterū, & colicam. Et m̄ indicat renes
 & uescam, & addit in coitu. Cuius permixtio hæc est.

R. Scamoneæ antiochiæ,
 Turbith albi, & gummosi,
 an. 3. vi.
 Garyophyllorum,
 Cinnamomi an. 3. iiii. s.

Zingiberis,
 Mirobalanorum emblico.
 Nucis muscatæ,
 Polypodii an. 3. iiii. s.
 Zuechari albi. 3. vi.

Puluerizentur omnia grosso satis modo, mellis despuma-
 ti lib. i. misce, & fiat electuarium in bona forma.

Scamonea dicitur antiochia. i. illius p̄uincie, eo quia me-
 lior & perfectior est quæ reperitur in aliis p̄uinciis.

Insuper nota, q̄ & si in quacūq̄ solutius reperis scri-

ptum scamoneæ, q̄ intelligendum est de præparata, nisi in
 duobus sequentibus casibus. Primo nisi in dicto electuario
 coquatur, ut in confectione amech, & electuario rosato, &
 tunc scamonea ponatur non cocta, quia coquendo præpara-
 tur. Secundo, nisi illud compositum longo tempore referua-
 ri debeat, & hoc modo præparata ponatur propter causam
 supra allegatam. In aliis uero si reperitur litera Mes. sup-
 pleatur & dicatur scamoneæ scilicet coctæ.

ELECTUARIUM rosatū Mes. solutium solutione edu-
 cens cholera sine molestia, & ualet adiuncturam ægritudi-
 nes calidas, & ad sodam calidā, & uertiginē oculorum dolo-
 res, & icteritiam citrinā, & est expertū. Cuius permixtio.

R. Succū rosarū rubearū cōpletarū. sin maturitate li. iiii.

Tereniabin puri, & recentis loco ipsius ponuntur man-
 næ. vnc. vi. Scamoneæ antiochiæ. 3. i. s.

Zuechari tabarzet. i. illius regionis. lib. i. s.

Conteratur grosso satis modo. Coquantur omnia super
 prunas usq̄ dum mellis habet spissitudinem: deinde proice
 super illud. Trochiscorum de spod. vnc. i. Croci. 3. ii.

Galliz muscatæ. 3. ii.

Trochiscorū de berbe. 3. iiii.

Et repone in uase uitreato, & reserua.

Succū rosarū cōpletarū, eo quia rosæ seu succus earum ma-
 gis est solutius q̄ succus incōpletarū, & ideo explicuit de
 completis, & nulli sunt aromatarii qui ad hoc aduertant.

Nota in super, q̄ cum hoc electuario reformari debent pi-
 lulæ aggregatæ Mesue ex inuentione nostra, & pilulæ de
 hermodactylis minores, & pilulæ de hermodactylis inuen-
 tione nostra ipsius Mesue, non enim electuario de succo ro-
 sarum, ut quidam bestiales faciunt.

ELECTUARIUM de succo rosarum Nic. solutiū edu-
 cens cholera sine molestia, & ualet ad ægritudines calidas,
 & est expertum contra guttam calidam, cholera rubeam
 purgat consualescentes ab ægritudinibus quartanariis, ter-
 tianariis, & quotidianariis, de salso phlegmate purgat, & re-
 liquias malorum humorum potenter educit q̄ remanserunt
 post ægritudinē, uel ut quidam uolunt si admisceatur medie-
 tas bēdictæ purgat reliquias q̄ remanserunt post medicinā.

R. Succū rosarum rubearum. Spodii de canna. 3. iiii.

Zuechari al. an. lib. i. 3. iiii.

Diagydi. 3. i. iiii.

Trium sandalorum. an. 3. vi.

Camphoræ. 3. i.

Misce & fiat electuarium: dosis est. 3. i. 3. vi. pulueri-
 zando prius puluerizanda.

Succū rosarū hoc modo fiat. Accipiantur rosæ cōpletæ,
 & post earū collectionē permittantur per diē: deinde in mor-
 tario marmoreo pistentur cū pistello ligneo, & bene terantur:
 inde in pecia inuoluantur, & in torculo exprimant, & co-
 lentur, & in uase uitreo reponantur, per aliquos dies p̄mit-
 tantur: deinde residentia seu fex facta amoueatur ponendo
 in alio uase, & super eum ponatur parum olei oliuarum, &
 reserua, conseruetur enim bonitate sua per duos annos.

Electuarium enim idem est quod electum ex uariis, quia
 ex multis, & uariis, rebus electuaria consuntur, & ele-
 ctuarium dicitur omnis compositio non reducta ad solidita-
 tem, siue cum zuecharo, siue cum melle fiat. Confectio uero
 dicitur quando durefit, & in dura forma fit.

ELECTUARIUM de scoria ferri. Rafis. 9. Almanforis
 in capitulo de hemorrhoidibus, & ualet ad sanguinem per
 partem inferiorem.

R. Myrobalanorum indorū,
 Myrobalanorum emblicorū,
 Myrobalanorum bellerico-
 rum. an. 3. s.

Spicæ indæ,

Squinanti an. 3. ii.

Puluerizentur omnia subtilissime, & consuntur cum

melle despumato quod sufficit, & sit coctum cum apozima-
 te emblicorum. vnc. x. & fiat.

Præparatur scoria ferri hoc modo. Accipe scoriam ferri
 quantitate quam uolueris, & eam infunde in aceto fortissi-
 mo per hebdomadam omni die acetum mutando, postea
 prociuitur super laminam ignitam, & torrefiat: deinde sub-
 tilissime puluerizetur, & reserua.

Radicum cypri,

Zingiberis,

Piperis nigri,

Seminis ameos,

Olibani an. 3. ii.

Scoriz ferri præpa. 3. i. s.

Mel cum apozimate emblicorum hoc modo fit.

R. Myrobalanorum, Kebulorum, & emblicorū. an. 3. xx. terantur, et in tribus libris aquæ coquantur donec ad unam libram remaneat, et postea coletur, et in colatura ponatur mellis boni lib. i. deinde bulliant donec aqua a melle confumata sit, et hoc factio habes mel cum apozimate emblicorū quod in hac confectioe ingreditur.

E L E C T V A R I V M de feminibus Mef. sedans dolorē uiscerum, ex vicositate factos, opilationes aperit lubricitatem a malicia digestionis curat.

R. Seminibus feniculi,	Amomi infusorum in aceto
Cymini,	per diē, et noctem, et exicatorum. an. 3. vi.
Seminis carui, an. 3. vi.	Cardamomi,
Keisim. i. semen leuistici,	Spice indæ. an. 3. iiii.
Cinnamomi fini 3. iiii.	Siseleos,
Garyophylorum 3. iiii.	Zingiberis,
Anisi,	Macropiperis, idest piper
Dauci,	longum,
Ameos,	Galangæ. an. 3. v.
Apii,	

Mellis. q. f. et quandoque ponitur in eo zuchari duplum ponderis omnium, et fac ficut suffus, et est sanum etc.

E L E C T V A R I V M de passulis Auicennæ. Et existimauit Galenus quod esset medicamen compositum ex medicinis conuenientibus cum suis proprietatibus hepatis.

R. Passulorum enucleatarum. 3. xxv.	Spice indæ. 3. iiii.
Croci. 3. s.	Squinant. 3. ii. s.
Calami aromatici. 3. ii.	Myrrhæ,
Bdelli iudaici. 3. ii. s.	Terebenthinæ. an. 3. iiii.
Cinnamomi. 3. ii.	Darshahan. an. 3. iiii.
Cassie lignæ. 3. s.	Mellis despumati. 3. xvi.

Vini quantum sufficit, et fiat electuarium.

Darshahan, tm Serapi, est arbor granati sylue, quæ apud Dioscoridem uocatur aspalinū. uidet Galenum, q. loco darshahan habet limaturam aspalici quod idem est.

E L E C T V A R I V M pliris arcoticon. i. principium interpretatur, ualeat tribus melancholicis, ualeat etiam ad magnam stomachi debilitatem, & cordis. i. syncopi, memoriam reparat, sensum acuit, epilepticos analiticos prodest, & omnem cerebri debilitatem reparat.

R. Garyophylorum,	Sampfuchi. i. maioranæ,
Cinnamomi,	Balsamitæ. i. menta aquatica,
Ligni aloes,	Semiuis bassiliconis,
Galangæ,	Cardamomi,
Spice indæ,	Piperis albi,
Nucis muscatæ,	Myrrylorum,
Zingiberis,	Corticum citri. an. 3. ii.
Spodii,	Lapidum preciosorum,
Squinant,	Been albi,
Cyper,	Been rubri,
Rosarum rubearum,	Corallorum rubeorum,
Violarum siccarum. an. 3. i.	Corallorum alborum,
Folli. gra. xv.	Setæ parum combustæ. an. 3. i.
Liquiritiz,	gra. xii. s.
Storacis calamitæ.	Mulci. gra. vii. s.
Masticis,	Camphoræ. gra. v.

Syrupi rosati quantum sufficit, et fiat.

Item nota, q. in aliis inueni piper longum pro pipere albo. 3. ii. gra. xv. & alibi inueni gemmarum, & margaritarum loco lapidū preciosorum cum aliis dosib, & sic de singulis & c.

E L E C T V A R I V M de psyllio Mef. solutione educens choleram citrinam, & confortat ad febres difficiles, et uehementes, & ad sodā, & uertiginem que sunt a fumis cholericis, et cōfert ad calefactionē hepatis etc. itinece. Cuius permixtio,

Succi buglosæ syl. & domæ.	Cuscute. 3. iiii.
Succi endiuiz,	Seminis anisi.
Succi apii coctorum, & de-Folliculorum fenæ. ana	
spumatorum, & colato	3. iiii.
rum an. lib. ii. & proice fu Capilli ueneris. man. i.	
per ipso.	Succi tumiteræ. 3. iiii.

Radicum affari. 3. iiii.

Spice indæ. 3. ii.

Infundantur oia in superscriptis succis die ac nocte: deinde de bulliant ebullitione una, & proiciantur super ea violæ viridium uel siccarum 3. iiii. Epithymi. 3. ii. Et bulliant adhuc ebullitione una alia parua: deinde coletur, et exprimitur, & in colatura ponantur psyllii. i. semen 5. iiii. Et dimittatur die ac nocte oia hora agitando cum spatula: deinde exprima uiscositas facta: deinde accipiatur huius uiscositatis lib. iiii. & proiciantur super ea zuchari albi lib. i. s. Scamoneæ coctæ in pomo 5. iiii. s. coquantur cum facilitate, & postquam coctum fuerit proiciantur super ipsum hi pulueres.

Trochiscorum diarhodon	rum. an. 3. i.
Trochiscorum de spodio.	Trochiscorum de berberis.
Rauedensi, idest rheubarbarum.	drach. iiii.

Puluerizentur hæc satis subtiliter, et misceantur simul, & referuentur in uase uitreato, et qui poneret diagrydium in pulueribus melius esset quam bulliendo in succis dosis eius est 3. iiii. usq. ad aur. iiii. Et uocatur hamech confectio: hæc electuarium trochiscorum, sunt alij qui addunt aceti lib. i. s. Succu uiolarum lib. i. Et est medicamentum nobile.

Violæ si simpliciter scriptæ in compone reperiuntur, de ipsis succis intelligendum est, quæ colligende sunt in mense Martii, excario fit in umbra, & reseruandæ sunt in loco sicco in humido enim in eis putrefactionem inducit.

Sunt aliqui textus qui dicunt, scamoneæ non coctæ, et hæc litera magis consona est, quia ponendo scamoneam coctam, et illam iterum decoquendo uirtus solutiuæ perditur, sed nota, q. quando parata coquitur intentio est, ut illud electuarium sit lenitium, et non solutiuum: quando igitur in his electuariis reperis hanc literam. s. scamoneam ponere, et coque uel diagrydium, puluerizare grosso modo, et cum aliis speciebus in fine in electuario ponere sine coctione, et altero duorum modorum facias.

E L E C T V A R I V M quo utuntur reges, et prælati Mesue, & est bonum, et expertum, et confortat stomachum, cor, pectus, et cerebrum. Cuius permixtio.

R. Pinearum mundatarum.	recentis. an. 3. iiii.
vnc. v.	Cinnamomi electi. 3. iiii. s.
Amygdalarum munda. 3. v.	Garyophylorum. 3. iiii.
Zuchari albi lib. iiii.	Ligni aloes. 3. iiii.
Aquæ rosæ. lib. i. s.	Sandali citrini. 3. iiii.
Olei rosati,	Ambræ bonæ. 3. i.
Olei amygdalarum dulcium	Mulci boni 3. vnius sextam.

Misce omnia, puluerizentur quæ sunt puluerizanda, & fiat electuarium in bona forma.

E L E C T V A R I V M de pomis Mef. bonum ad debilitatem cordis, & stomachi, & confortat digestionem.

Carnium pomorum dul-	Sandali citrini.
cium, & redolentium mun	Garyophylorum. 3. iiii.
datorum, & incisorum per	Ligni aloes. 3. v.
frustra. lib. vi.	Cinnamomi electi. 3. iiii. s.
Zuchari albi lib. v.	Ambræ. 3. ii.
Aquæ rosæ. lib. ii.	Mulci boni. 3. i.

Hoc etiam modo fit electuarium de pomis acetosis, & electuarium de pomis paruis & aromaticis dulcibus.

E L E C T V A R I V M de forbis Mef. confortans stomachum, & sedans solutionem fortem.

R. Carnium forbarum immaturarum, & vicinarum maturarum, & elixatarum in aqua rosæ rubæ quæ prius decoctæ fuerint, et corticum granatorum, an. lib. iiii. Mellis aut zuchari albi lib. ii. s. coquantur usq. ad spissitudinem, & reconde in uase uitreato: dosis est 3. i. pro uice.

E L E C T V A R I V M ad scabiem, & pruritus carnis in tractu.

5. Alm. in ca. de pruritis, scabiez, & magnis pustulis.

R. Myrobalanorum citrinorum 5. ii.

Succi abstinethi quantum ad eorū sufficit conspersio nem, aliquoties aëre additur huic medicinz abstinethi quantum quartam partem myrobalanorum, & conscantur oia cum melle, & sumatur ex ea quotidie quantum est auellanz magnitudo.

Istud electuarium nō est in usu, sed gñaliter loco huius electuarii utitur unguento quodam pro scabie, cuius compo-

scio nota est aromatijs.

Auellana aliqui sumitur pro fructu, aliquando pro pondere, ut apud Auic. in distinctione de ponderibus, & est pondus auri unius, ergo est. 3. i. & semis unius drachmæ, ut dicit Simon Iamensis. Auellana uero pro fructu secundum Isid. dicitur ab Auellano campaniæ oppido ubi abundat, hæc a grecis ponticæ appellatur, eo quod circa ponticum mare abundat. Rasis dicit quod de prædicto electuario datur quantum est auellana magnitudo, auellana apud Auic. est sicut granum lauri, ut dicitur in suo capitulo.

ELECTVARIVM ad restitutionem humiditatis secundum Nico. Cuius permixtio.

R. Liquiritiæ rase, an. 3. iiii.
Rosarum rubearum, Cinnamomi. 3. i.
Zucchari an. 3. ii. Storacis calamitæ 3. i.
Dragacanthi, Zingiberis an. 3. ii.
Gummi arabici an. 3. i. Croci drachm.
Sandal albi, Penidii. 3. ii.
Sandal citrini an. 3. vi. Quatuor seminū. M. frigidorum an. 3. iiii.
Papaueris albi 3. i. s. Seminis cydoniorum. 3. iiii.
Succi liquoritiæ, Amygdalorum.
Amydi, Pincarum.
Seminis portulacæ, Berberis.
Seminis lactucæ, Scabellæ.
Seminis scariolæ, an. 3. s. Seminis malux.
Spodii, Violarum an. 3. i.
Garyophyllorum,
Florum uuarum syluestrium,

Syrupi rosati quantum sufficit.

ELECTVARIVM almezeræ Mefuz ex inuentione nostra quod est medicamen benedictum ad hypodispim, solutione enim educit aquam citrinam cum fortitudine.

R. Foliorum almezeræ præz. Carnium cydoniorum elixir paratorum. 3. x.
Zucchari tabarzet. 3. lxxx. Tereniabin. i. manna. 3. lx.
Aque casei infusionis agarici. Olei almezeron. 3. xii.

3. xxx.
Dissoluitur zuccharum, & tereniabin in aqua casei prædicta, & misceatur cum carne cydoniorum, & coquantur cum facilitate usque dum mellis habeat spissitudinem, & inuoluitur pulvis foliorum almezeron cum oleo iam dicto, & conficiatur cum eis. Et sit dosi eius 3. iiii.

ELECTVARIVM de persicis Mefuz, confortans stomachum, situm extinguens, & ardorem stomachi mitigans, & oris fœtorem amputans. Cuius permixtio.

R. Cãmium persicorum mediocrium inter maturitatem & acerbitatē, & mûdatorum a corticibus suis. Succi persicorum, an. lib. iiii. Zucchari tabarzet lib. ii. Terantur persica, ut sint ficut medulla, & exerceas in eis decoctio nem cum syru pro sicut diximus in confessione de cydoniis, & cum coctum fuerit puluerizentur super ipsum ualet.

R. Ligni aloes. 3. ii. Macis drach. iiii.
Cinnamomi, Sandali citrini. 3. ii.
Cubebæ, an. 3. iiii. Musci. 3. s.

Et aliquando sine speciebus, & est sanum & expertum.

De emplastris.

EMPLASTRUM de melliloto Mefuz, mollificans omnem duritiem quæ est in hepate, splene, stomacho & in uisceribus.

R. Florum melliloti 3. vi. Casis lignæ. 3. i. s.
Florum camemille, Samplicis, idest maioranæ. 3. iiii.
Seminis foenugræci, Armoniaci. 3. x.
Baccarum lauri, Storacis.
Radicum altheæ, Bdellii an. 3. v.
Abstinii an. 3. iiii. Terrebinihæ. 3. i. s.
Seminis api, Ficuum pinguium numeroxi.
Cordumeni, idest carui agrestis, Sepi caprini.
Radicum iroos, Resinæ an. 3. ii. s.
Cyperi, Cærz. 3. vi.
Ameos, Olei limpluci, idest maioranæ.

ranæ,

Olei spicæ ana lib. ii.

Conficiatur sic ex semi. foenugræci, radice altheæ, & ficubus sicut mucillagines in aqua decoctionis alterius foenugræci camemille, & melliloti an. q. s. & de dicta decoctione etiam gumme præscripte dissoluantur. Cætera uero puluerizentur, & additis, oleis, cera, & adipibus fiat emplastrum.

Potes etiam alio modo facere decoquere, radice altheæ, & ficus in præscripta decoctione, & post ipsarū perfectam coctionem bene illas pillare, & gūmas in decoctione dissolvere. Cætera uero puluerizare: deinde cum oleis prædictis quod remansit, de decoctione miscere, & his addere, & radices, & ficus, & gummas dissolutas, & iterū simul tantū bullire, q. decoctio consumpta sit, postea adde flores, & leui bullitione bulliant: deinde terebenthina, resina, colata, sepi, & cera ponantur, & bulliant usque ad liquefactionem ceræ: deinde ab igne depōnantur, & pulvis suprascriptarum rerum addatur, & bene omnia misceantur, & referetur. Et hic melior erit modus: quamquam etiam superior sit bonus.

Ea quæ in emplastris ponuntur non multum sunt contenda, eo quia uirtus ipsius solum agit in membrum quod tangit, & diu uirtus eius durat. Et debet esse emplastrum, grossum, quando super locum ægrum ponitur.

Aliqui imperiti aromatiari puluerizant semen lauri exteriori cortice non amoto, & male, quia quæ in loco ponuntur, semper a superiori cortice mundenur.

Cordumeni. i. carui agrestis. Sed si haberi non potes, eius loco apponi possunt carui domestici.

EMPLASTRUM diaphœnicum Mef. confortans stomachum, & hepar mirabiliter, in quibus accidit uehemens debilitas, & uiscera in quibus accidit lubricitas, & mollificatio, & confort ad fluxum uentris, & ad fluxum hepaticum. In primis fiat cerotum. Cuius permixtio.

R. Cærz. 3. ii. Dactylorum siccorum numero xl.

Olei rosati, Torcellarum de seni. 3. x.

Olei nardinian. 3. iiii. Deinde infunde biduo in uino odorifero, & accipe carnes cydoniorū decoctas in uino. 3. viii. & tere cum dactylis cum contritione ultima, & misceantur cum ceroto, & cōtundantur in mortario donec aggregentur: deinde proice super eam.

R. Mastice, Aloes loti.
Olibani, Spicæ.
Abstinii romani sicci ana Acaciz,
3. iiii. Galliz muscatæ,
Ligni aloes, Calami aromatici,
Macis, Ramich. an. 3. i.
Myrrhæ an. 3. i. Laudani. 3. ii.

Et iterum conterantur donec permisceantur: deinde lini super lamina ex eo: deinde summum cum ligno aloes, & pone super stomachum, & hepar, & uiscera. Et de meliori operatione est ut mastix, & olibanum cum cera, & oleis misceantur, & sic cum cæteris fiat emplastrum.

Calamus uel calami si simpliciter scriptum reperitur, de calamo aromatico semper est intelligendum.

Aloes quod ingreditur in emplastris, unguentis, & cerotis, semper debet esse lotum, cum magis confortarium sit magisq. defecatum, & minus mordicatum, &c.

EMPLASTRUM de granis lauri Mef. conferens ad dolores a frigidityte, & uentositate factos, & proprie ad dolorem uentris, & stomachi, & renum, & matricum, & uisceræ, & aliorum uiscerum. Cuius permixtio hæc est.

R. Olibani, Granorum lauri vnc. ii.
Mastice, Cyperi.
Myrrhæ ana vnc. i. Colliana vnc. s.

Mellis colati. q. s. ad aggregandum, & extendatur in pannum, & calidū supponatur ubi oportet. Si autē triplicatur in eo cyperum, & ponatur de stercore caprarum, aut uaccarū sicco ad pondus unum, inuenitur mirabile ad hypodispim.

Ad faciendum emplastrū cum melle pro oili. i. mellis dare debes. 3. iiii. Specierū cribellarū si debijā formā habere debet. Mel in emplastris nullo modo coquendum est, eo quia coctura multū tenax ipsum facit, ideo ponatur in eis crudum.

EMPLASTRUM Montagana contra fluxum quod

in usu est. Cuius permixtio hæc est.

R. Eupatorii. M. i.
Squinai. M. ii.
Spice indæ quartam partem
manip. vnus;
Malticis,
Macis an. 3. iiii.
Ligni aloes. 3. iiii.
Mirobal. emblico.
Myrobal. K. bulborum
Aftatorum an. 3. i.
Boli armeni,
Lapidis hæmæthitis an. 3. vi.

Teræ sigillatæ. 3. vi.
Seminum coriadorum præ
paratorum. 3. i. s.
Spodii. 3. ii.
Rofarum. 3. i.
Farinæ hordei. 3. ii.
Specierû triafandalorum fi
ne Camphora. 3. iiii.
Scoriz ferri præparatæ. 3. i.
Olei myrrillorum,
Olei malticis analib. i. s.

Conteratur subtiliter eupatorium . Cætera uero pulue
rizenur, & fiat emplaftrum in bona forma. Mirabiliter in
ualer in fluxu uentris.

Camphoram. n. non iufsit apponi in speciebus triafanda
lorum hoc in emplaflo intrantibus propter intenfam ipsius
frigida in teftina enim debilis calor, nec multum frigi
da funt apponenda circa regulariter operando.

E M P L A S T R V M de crufta panis Montagnanæ, ualeat in
uomit uerorum, & fic non potentibus cibum retinere
multum in usu est. Cuius permixtio.

R. Malticis,
Mentæ,
Spodij,
Corallorum rubeorum,
Sandalorum alborum,
Sandalorum rub. an. 3. i.
R. Cruftæ panis afsi, & infusi in
aceto per mediam horam
vnc. ii.
Olei malticis,
Olei cydoniorum an. 3. i.
Farinæ hordei. 3. i. s.

Conterantur subtiliffime cruftæ panis, cætera puluerizen
eunde in mifceantur, & fiat emplaftrum fine igne.

Veliter hic eft notandû, q. membris principalibus, & ma
xime cordi, & ftomacho nullo modo apponenda funt frigi
da actû: quâuis potentialiter, & virtualiter frigida funt, fed
aliquiliter funt tepesciendi proprie pueris, quare bene no
retur hoc, ut queant inftituere medicamenta accipienda, quia
qñ domini medici in aduertentia non expediunt de forma
approximationis, & doctus aromatiarius fupplere potest.

E M P L A S T R V M filij Zachariæ Mefue, quod lenit duri
tiæ, & nodofitatem iuncturarum, & lenit pectus & habilitat
materias in eo, & pulmonē, difficilis expulſionis. Cuius per
mixtio hæc est.

Ceræ citrinæ,
Medullæ cruris uaccæ,
Adipis anatis an. 3. ii.
Adipis gallinæ,
Mucilaginis feminis lini
an. 3. iiii.

Olei de lilio. q. f. Si aut fortius facere uolueris adde mu
cillaginis althææ, & mutillaginis fœnugræci partes conue
nientes, & pro oleo de lilio ponatur oleum de keiri citrino,
vel utrunq. Et fi adhuc fortius facere uolueris adde hyſſopi
humidæ, & glutinis zanaba inquantum de una mucillagi
num, & miraberis effectum eius ad ea quæ diximus &c.

E M P L A S T R V M contra morbum magiftrale.

Axungie porci. 3. iiii.
Caput allei numero. i.
Pulvis ſynapis ru. M. i.
Crecetis frumenti,
Farinæ frumenti an. M. i.

Mifce cû aqua putei. 3. iiii. olei camæmillæ, & fiat emplaftrû.

E M P L A S T R V M ad extrahendû codexellas magiftrale.

R. Radicum althææ. 3. iiii.
Farinæ frumenti,
Farinæ linofæ an. 3. iiii.
Farinæ hordei,
Farinæ ſynapis rub. ana. 3. ii.

Terebenthinæ. 3. ii.
Albaminum oui numero. ii.
Picum ſiccorum nume. vi.
Cepæ lili numero. iiii.

Et emplaftrum fecundum artem.

E M P L A S T R V M ad pleureſim Mefue.

R. Radicum althææ. M. i.
Farinæ hordei. 3. iiii.
Florum camæmillæ. 3. i.

Bulliant primo radices althææ, & bene pifentur, & po
ſtea bulliant ſimul, & coquantur, & in fine addatur. Olei car
mæmillæ. Olei violati Olei amygdalarum dulceum an. 3. ii.

Mifce, & fiat emplaftrum fecundum artem in bona forma,
& funt qui addunt in fine butyri recentis. 3. iiii.

E M P L A S T R V M ad crepatos magiftrale.

R. Sanguinis dracois,
Thuris an. 3. ii.
Boli armeni. 3. iiii.
Malticis. 3. iiii.

Pulueris balauſtium.
3. viii.
Farinæ cicergiarû. 3. xvi.

Et fiat emplaftrum cum decoctione camæmillæ, abſinthii
& balauſtium quantum ſufficit.

E M P L A S T R V M ad morſum ſcorpionum magiftrale.

R. Caſtorei,
Serapini,
Fimi columbini,
Mentaſtri,
Pulegii an. 3. iiii.

Aſſæ,
Sulphuris,
Cymini,
Picis naualis,
Olei ſcorpionum an. 3. iiii.

Mifce, & fiat emplaftrum in bona forma ſecundum ar
tem &c.

E P I T H E M A pro corde magiftrale.

R. Aquæ endiuiz,
Aquæ bugloſſæ,
Aquæ roſæ,
Aquæ meliſſæ an. 3. ii.
Aceti fortis. 3. iiii.
Sandalorum rubeorum,
Rofarum rubeorum,
Sandalorum alborum,
Been albi an. 3. i.

Been rubei,
Doronici an. 3. i.
Spodii,
Camphoræ an. 3. s.
Croci an. 3. i.
Oſis de corde cerui,
Setæ combulte gra. vi.
Mifce & fiat epithema.

E P I T H E M A pro hepate magiftrale.

Aqua ſolatri,
Aquæ endiuiz,
Aquæ roſæ, an. 3. ii.
Sandalorum alborum,
Sandalorum rub. an. 3. i.

Rofarum rubeorum. 3. i.
Spodii,
Camphoræ ana. 3. s.
Aceti fortis. 3. iiii.

Mifce & fiat epithema pro hepate.

H I L O N I V M ex inuentione prima Meſue, mani
feſtorum iuuamentorum, & exportorū in ſedatione do
lorum, & ſeparatione a caſibus mortis, & proprie do
lori ſtomachi a frigida te factio, aut humore crudo
aut a uenofitate groſſa extendente. Et ſedat dolorem colicæ,
& uicerum, & dolorem renum, & maricium, & dolo
rem laterem, & præfocationem anhelitus, & difficultatem
urinæ, & ſingultum uehementem, & eſt in uſu primæ de
ſcriptionis in antidotario.

R. Piperis albi,
Seminis iſſiquami ana. 3. xx.
Opii. 3. x.
Croci. 3. v.

Spice,
Pvethri,
Caſtorei an. 3. i.

Puluerizentur omnia ſubtiliffime, & cum lib. ii. 3. xi. mel
lis cocti, & deſpumati fiat conſectio in bona forma, doſis
eius eſt ſicut cicer, aut faba parua cum eo quod conuenit ex
potibus. Et ſunt qui ponunt muſci 3. i. Medicinæ autē om
nes quō ſtupeſciant nota. Omne. n. membrum ſentiens ha
bet quandam meſuram frigoris terminati cum ſuo calido:
in quo frigore fi fiat additio in certa meſura membrum ſtu
peſt, & hoc modo medicinæ omnes opiate ſtupeſciant.

Contritio enim medicinarum omnium ſtupeſciantium
debet eſſe ſubtiliffima ad hoc, q. poſit perſuadere uenas pen
etrare, & ardua loca, aliter enim membrum ab eis non poſ
ſet ſtupeſcere, negi ſenſus obundi.

In actû præctico notent iuuenes medici, & non ſolum de
hac compoſitione, ſed de omnibus narcoticis & ſtupeſcanti
bus, tam ſimplicibus quam compoſitis. Quod ſi intentio mei
ci eſt ſomnum prouocare, illa dauda ſunt poſt coenam in
ſero tranſacta hora. Cum autem intendimus ſedare dolores
ſeu fluxum ſanguinis prohibere, non niſi uacuo ſtomacho a
cibo & ſuperfluitatibus ſeu exhibenda. Neque poſt per
quinque horas eſt cibus aſſumendus, & ſic de tyriaca noua
inelligatur.

P H I L O N I V M perſicum & eſt in ca. de ſputo ſanguinis
Meſue eſt uehementis uirtutis ad manationem ſanguinis un
decunq. & ſcreatum eius cum tuſi & ſine tuſi, & ualeat ad
ſuperfluitatē menſtruorum doloroſam, & hemorrhoidarum
& egelionem ſanguinæ, & ad mulieres prægnantes quibus
erumpunt menſtrua, & conſeruat fœtus in matricibus ea
rum

rum. Cuius permixtio hæc est.

℞. Terræ sigillatæ. Euphorbij.
Opil.an. 3. x. Pyrethri.
Seminis papaueris albi. Margaritarum non perfo.
Semi iustquiami.an. 3. xx. Karabe.
Scededenegi, idest semen Zedoariz,
canapis. Doronici.
Crocii. an. 3. v. Ramich. i. quædam cōpositio
Castorei. infra descripta. an. 3. i.
Spicz.an. 3. i. Camphoræ. 3. i.

Puluerizentur subtiliter omnia cum mellis rosati colati lib.ii. & fiat electuarius in bona forma.

Differentia enim est inter scedenegi & scchedenegi: scedenegi idem est quod lapis hemathitis: scchedenegi. i. semē canapis: quare bene considerandæ sunt literæ in omni compositione & uocabulo.

Castoreum enim in hac compositione ponitur ut probeat congelationem ab opio.

Margaritæ uero ad confortationem membrorum principalium propter laxationem opii.

Margaritæ a natura perforatæ meliore sunt quam non perforatæ. Et ratio est quia per illud foramen superfluitates ipsarum sunt consumptæ & purgatæ.

Philonium enim dicitur a compositore, quia Philon medicus illum composuit.

GALLIA Muscatæ Melle: quæ cerebrum, & cor confortat, & ingreditur in permixtionibus medicinarum, & facit corporis & oris odorem bonum.

℞. Xyloalos crudii. lignum Ambræ. 3. iiii.
Aloes. 3. v. Musci. 3. i. i.

Glutinis dragacanthi facti in aqua rosata quantum sufficit, & sunt trochisci contereudo contereunda & sigillentur. Muscus enim & ambra terenda non sunt, nec puluerizanda, sed dissoluenda sunt cum aqua eo quia puluerizanda euaporat uirtus sua ut de gummiis dixi in recepta dragacanthi.

GALLIA sebeliz Melle stomachum & cor confortat, & hepar debile, & ingreditur in medicinis magnis. Cuius permixtio hæc est.

℞. Foliorū rosarū recentium & humidarū quæ iam incipiunt referre nodos. i. quæ quasi sunt cōplete dilatatæ. 3. i. s. terant cōtritione ultima in mortario lapideo: deinde accipe. Ligni aloes boni & electi. Spicz indx. an. 3. i. s. i.
Garryophyllorum. Sandalorum citrinorum.
Gummi arabici. drach. ii.

Ramich, idest quædam compositio. 3. iiii.

Terantur omnia hæc subtilissime & misceantur cū suprascriptis rosis, & simul pistando bene misceant, humectando oia cū parū aquæ rosæ infusionis gummi arabici: et iterū terant deinde iterū humectent & terant, & hoc facias per totū unū diē: postea aromatizent cū 3. ii. musci, ambre, & caphoræ an. auro medio. i. 3. ii. gra. v. et sunt trochisci & sigillentur.

Galliz omnes species sunt subtilissime terendæ & per spissum cribrum transeundæ ut ipsarum confortatio ad longinquā membra penetrare possit.

Ista compositio est illa quæ intrat in aromatico hardino. Mef. Et quæ intelligitur, cū scriptū reperit gallia sebelia.

GALLIA alephangina Melle: et est eius interpretatio aromatizatum. Et ideo illa de qua antiqui considerant, & de qua plurimum loquuntur: cerebrum, cor, stomachum, & hepar confortat, & omnia membra nutrigit. Et liniunt super neruos debiles, & confortat eos, & ingreditur in medicinis magnis, et hoc est, quod intelleximus.

℞. Myroba. emblic. bonæ. abiectis ossibus. 3. iiii. contereantur contritione grossa, & ponantur in uase uitreo, et fundantur super eos aquæ rosæ bonæ & electæ infusionis rosarū siccatæ & corticum citrorū lib. s. & stringat os uas & dimittatur per tres dies: deinde fundantur in eis aquæ prædictæ infusionis. 3. iiii. et in crastinum fiat similiter usquequo emblicorum uirtus in aqua impressa sit. Tūc uero.

℞. Rosarum. Ligni aloes boni. 3. viii.
Garryophyllorum. an. 3. x. Ramich, idest quædam

compositio. 3. i. s.

Spicz indx. 3. iiii.

Terantur omnia sicut alcohol sicut dixi & fundatur super ea parum succi infusionis prædictæ emblicorum, & contereantur cum eo usque dum totū in eo paulatim fundatur, ultimo uero aromatizetur cum 3. i. camphoræ & ambre. 3. ii. musci boni. 3. ii. sicut inde trochisci: & sigillentur sicut diximus & ponantur in uase uitreo & admixtrentur & c.

Si tūc dicitur tibi supra datā nō uelles cāphorā puluerizate dissoluere, sed tūc ne tota circū mortariū de pda, hoc mō facias. Primo in dicto mortario pilabis duas uel tres amygdalas, & gbus exit quādam unctuositas, quæ circūuoluta mortario nō pmitit cāphorā mortario adhærere, pilatæ amygdalæ abiiciuntur, et cāphorā intro ponat & pistet, & sic nihil de ea de peditur, hoc annotare uolui, pp iuuenes, quāq̃ ego antiquos quq; in hoc errare uideri, et nō sūt sine risu.

GALLIA magna siue regalis, seu zachalerus Mef. vj. ℞. Succu albelach li. i. bulliat ebullitione una: deinde coles & piiciatur super ipsum gallarum cōtritarum contritione ultima. 3. iiii. et simul bulliant, donec fiat sicut melle deinde. ℞. Rosarum rubearum. 3. i. Masticis. an. 3. vii. s. Cardamomi. f. ma. et mi. Darfeni, idest cinnamomi, Lingue auis. i. semen fraxini, electi. 3. v. Garryophyllorum, Sādali mazarachi. i. citr. 3. v. Nucis muscatæ. Croci. 3. s. Ligni aloes, Gummi arabici. 3. i.

Terantur cōtritione subtilissima & cribe llentur: deinde misce cum prædicto succo, postea expādent oia hæc mixta super marmor inunctū oleo amygdalarū et dimittat donec siccet: deinde puluerizet subtilissime & aromatizet cū 3. s. musci dissoluti in aqua rosata, et cū dicta aqua fiat trochisci qui exiccantur in umbra, & sigillentur & referuentur.

Inter doctores magna est diuersitas de albelach: quidam enim dicūt q̃ est flos palmæ ut Auicēna: quidā q̃ est species dactylorū. Alii q̃ sunt dactyli imaturi, et hoc opinio uera ē. Sed quia nō portantur in nostrā patria ita uirides q̃ succus ab eis extrahi possit: igitur hoc modo faciendū est. Accipias dactylorū immaturos quāticatē q̃ uolueris ut li. i. bene pistentur, uel minutissime incidantur, & post incisionē apponatur ad ignē cū lib. ii. aquæ cōis, et permittatur simul bullire donec aqua remaneat in lib. s. deinde dicti dactyli exprimantur bene in pecia uel staminia, et succositas ab eis extens referuet, et utat in hac cōfectione, & hoc facias si succu dactylorū hīc nō potes, q̃ si haberi pōt succus magis cōueniens est: quāquam ab ipsa decoctione uirtus ipsorū extrahatur, tūc per dictā decoctionē de uirtute eius indubie resoluitur & c.

HOMONYA in. s. can. Aui. quæ confert ad belilitatem hepatis & splenis, et duritiem eorum, et uerapit oppilationē et prouocat urinam, & frāgit lapidē in renibus, & iuuamentum eius in iniectione hydropis est magnum.

℞. Seminis dauci. Piperis longi.
Cimini carmeni. Costi,
Xylobalfami. Piperis albi. an. 3. s.
Cassiz lignæ. Myrrhæ. 3. iiii.
Cordumēti. Baccarum lauri numero. x.
Floris squinanti, Acori.
Seminis apii. an. 3. i. Croci. an. 3. ii.

Mellis despumati quantum sufficit, et fiat confectio et data ad quantitatem euellanz cum aqua tepida.

HIERAPICRA Galeni Melle: siue de mente Galeni. Et uirtus quidē huius medicinæ affert inuamētā multa expectata ad ægritudines capitis & stomachi et hepatis et iuncturarū et renū et matricū et mēbro: u. frigidas, et educit humida res generatas i eis et putredines. Cuius pmixtio hæc ē.

℞. Cinnamomi, Croci,
Asari, Masticis, Xylobalfami. i. lignū balsami,
Carpobalfami. Cassiz lignæ. an. 3. i. s.
Spicz. an. 3. i. Aloes succorini. 3. ii.

Mellis colati & despumati. 3. iiii. & fiat electuarius in bona forma. Dosis est. a. 3. iiii. usque ad 3. i.

Quantitas mellis in hac compositione debet ēē pauca. f. The. a. om. Z

specierum et mellis an. partes æquales. Eo quia mel frangit uirtutem aloes, et non solum de hac compositione est intelligendum, sed et de omnibus aliis in quibus aloes est basis.

Basis in medicina dicitur illa medicina simplex cuius operatio principaliter queritur in medicina cõposita: et per cõsequens operationem: cuius alie medicinae intendunt sicut finem, et ipsa est efficiens principale. Et sic ratio essendi basis est ratio finis intenti. Vel illud dicitur basis in medicina per quod laudes medicinae ei conueniunt: quare bene nota.

Hiera. n. exhibenda est illico quod est facta, et hoc cõtra indolentes medicos et ignaros aromatiarios. Albusmasar enim uult q. postq. est facta sepiatur per sex menses in hordeo uerfermentetur, et debet confici in mense Iulii uel Iunii, et uõ in frumento, quia calore æstatis et frumenti corruptione: cuius contrarium faciunt aromatiarii nostri temporis.

De alo succotrino et hepatico differentia est inter doctores. Auic. Mesue, et quidam alii laudant succotrinũ. Halyabbas hepaticum. Igitur uero q. aloes hepaticum magis est solutiuum, et hoc est quod Halyabbas dicere uult. Sed in aliis succotrinum hepaticum in bonitate superat. Et ideo cum aloes simpliciter scriptum, reperitur, de succotrino est intelligendum tanquam de perfectiori.

Hiera simplex Gal. 7. therapeutica, quæ est illa quæ in usu est, et de qua intelligunt doctores cõ tantas laudes tribuunt et dicunt q. dos est 3. i. q. non intelligant de pisciaria satis patet, eo quia de ea exhibui et exhibere uidi a famosis doctoribus. 5. i. et q. n. 3. x. et parum operabatur. Et uirtus quidæ huius medicinae affert inuamentum multa experia ad eggritudines capitis et stomachi et hepatis et iuncturaru et renu et matrici et membroru frigidas, et educit humiditates generatas in eis et putredines. Cuius pmixtio hæc ẽ.

R. Cinnamomi,	Xylobalsami, idest lignum
Masticis,	balsami. 3. i.
Assari,	Aloes succotrini. 3. c. seu
Spice nardi,	centum,
Croci an. 3. i.	

Mellis colati et despumati. 3. centum et sex. Ita quod est æqualis quantitas cum speciebus, et hæc est descriptio hieræ quæ fieri debet non alia: dos 3. iiii. usque ad 3. viii.

Si reperitur scriptum hiera simplex, uel hierapicra Gal. uel hiera ex octo rebus, uel hierapicra, semper de nunc præscripta est intelligendum non de alia.

Hieræ omnes seruari possunt a sex mensibus usq. ad quatuor annos in sua bonitate. Cum uero demum tempus transeat, a bonitate et perfectione declinant etc.

Hiera cõposita Gal. quæ in clysteris apponitur, et est descriptio Nicolai, ualet et facit ad diuersas capitis passionēs, et aurium et oculorum distemperantiam, stomachũ optime purgat, causas hepatis emendat, splenis duritiem et diuersitatem remouet et extenuat, renibus et uesicæ proficit, et matricis distemperantiam emendat.

R. Cinnamomi,	Spice
Croci,	Abinthii,
Squinanti,	Epithymi,
Assari,	Agarici,
Cassie lignæ,	Rosarum rubearum,
Xylobalsami, idest lignum	Turbith albi et gummosi,
balsami,	Coloquintidæ,
Carpobalsami, idest semen	Masticis, an. 3. ii.
balsami,	Aloes electi. 3. iiii.

Violarum an. 3. ii.

Puluerizentur subtiliter omnia, mellis colati et despumati. 3. viii. quod est ad pondus specierum, et confice etc.

Squinantum per se terendum est et puluerizandum, eo quia multum sustinet de contritione, et si permisceretur cõ aliis medicinis ad puluerizandum, ante ipsius puluerizationem euanesceat uirtus aliarum medicinarum, et bonitatem deperderet, per se ergo conterendum est.

Hieræ spēs sunt oēs subtilissime terendæ ut sua subtilitate uirtus aloes transeat per angustas uias: et hoc uoluit Albucasis particula. 5. ca. de hiera atrica, q. dicit. Et unaquæque pars teratur, et cõ panico serico triconizet, et puluis in

aliquo uase uitreo reponatur dos ẽ 3. iiii. usq. ad 3. viii.

Mel in electuariis solutius parũ uel nihil decoquendum est: mel enim quanto minus coctum tanto magis laxatiuum, & quanto magis coctum tanto magis restrictiuum: ac etiam quia per coctionem magis uiscosum redditur. Mel enim coctum magis nutrit & minus laxat.

HIERALOGODION fm Auic. Et est confectio benedicta plurimi inuamenti mundificans corpus ab ultimis extremitatibus suis cum solutione in qua non est labor omnium humorum & superfluitatũ, & cõfert ad ægritudines capitis & dolorẽ, & hemicrania, & cephalicam, & ouum & galeam & uertiginẽ & alguesq. & maniam, & epilepsiã & timorem, & paralyfim & mollificationẽ, immo ad apoplexiam, & totum illud accepta in puluere, sicut dictum est de sceliche, & est melior illo plurimũ, & cõfert ad dolores auris & oculi, & confort stomachum, & aperit oppilationes hepatis, & puocat menstrua, & remouet difficultatem anhelitus, & cõfert ad quartanã, & oēs passiones phlegmaticas crudas & febres antiquas & ualet ad dolores iucturarum, & podagram, & uenam sciaticam. Et est utilis ad tyriã & alopiciam & ulcera antiqua in capite & alia, & ad baras & morpheã, & impetiginẽ, & exoriationẽ, & lepram, et ad scrophulas, & apostematã frigida, & et caneros. Cuius permixtio.

R. Pulp. coloquintidæ 3. v.	Croci,
Squillæ assatæ,	Cinnamomi,
Agarici,	Opopanaci,
Scamoneæ,	Polypodii,
Ellebori nigri,	Serapini,
Armoniaci,	Castorei,
Scordeon an. 3. iiii. s. et in de	Seminis petrosillii,
scriptiõne alia an. 3. iis.	Myrrhæ,
Hæcæ,	Aristolochiæ longæ,
Hypericon,	Succi abinthii,
Folii indi,	Euphorbii,
Prasii,	Spicæ,
Cassie lignæ,	Amomi,
Polii montani,	Zingiberis an. 3. ii.
Melanopiperis, idest piper	Gentianæ,
nigrum,	Stœcados an. 3. i. s.
Macropiperis, idest piper	Epithymi,
longum,	Camædryos,
Leucopiperis, idest piper	Bdellii,
albu an. 3. ii.	Aloes an. 3. iiii.

Mellis despumati q. d. fusi integra aur. iiii. cum aqua tepida et melle, aut cum decoctione epithymi et passularum cõnucleatarum, dos 3. ii. usq. ad 3. iiii.

Hiera hermetis Mesue: est hiera luf super qua expectatur fiducia inuamentorum multorum expertorum, et proprie ad dolorem capitis, et hemicraniam, et uertiginem, et paralyfim, et epilepsiam, et tremorem, et torturam. Et educit superfluitates, et proprie humorum grossorum, et uiscosorum, et subtilium a capite et neruis et iuncturis, et stomacho et toto corpore. Et cõfert inuamentum manifestum doloribus iuncturarum, et renum, et colicæ difficilis et dolori matricum. Cuius permixtio hæc est.

R. Aloes 3. i.	Masticis,
Trochilorum alandal. aureos numero viii. idest	Bdellii,
3. xii.	Ellebori nigri,
Turbith albi et gummosi,	Euphorbii,
Agarici albi,	Assari. i. radix,
Viriuq. luf. i. dragontæ et	Cassie lignæ,
serpentariæ,	Salis indi,
Radicum ireos albi,	Castorei,
Serapini,	Croci,
Myrobal. citrinorum,	Seminis apii,
Myrobal. chebulorum,	Keism. i. semen leuistici,
Myrobal. indorum an. 3. i. s.	Seminis mezeoreon,
Zingiberis,	Stœcados an. 3. j.
Cinnamomi an. 3. i.	Squillæ assatæ. 3. iis.
	Scamoneæ bonæ. 3. iiii.

Et fiat oium contritio bona Gummi autẽ ponatur in uino odorifero, et inuoluatur puluis in succo cucumeris asinini quan-

quantitate qua bene inuoluatur, & exsiccat, & iterum denovo inuoluatur in prædicto succo & paucio oleo nucum, & iterum siccetur & conficiatur totum cum melle despumato quantitate qua fiat totum sicut pasta, & detur post sex menses. Dosis eius est 3. i. usq; ad 3. ii. &c.

VTRIUSQ; Imperatoris Nicolai, dicitur a Iustino Imperatore, quia illud composuit, ualeat proprie calculosis & ad illi dolorem, contra stranguariam & dysuriam & ad muchos mingentes. Cuius permixtio hæc est.

R. Cinnamomi,
Costi,
Folii,
Spicæ nardi,
Cassia lignæ,
Aristolochia longæ & rotundæ,
Enulæ sradix,
Hyssopi,
Pulegii,
Artemisæ,
Pentaphylon,
Leucopiperis, idest piper album,
Leuistici,
Macedonici,
Seminis vrticæ,
Milioli folii, i. milioli syluestre,
Baccarum lauri, an. 3. i. s.

Puluerizentur omnia subtilissime, mellis costi & despumati lib. ii. & fiat electuarium. Et nota qd hoc electuarium solum per annum secluratur.

De costo, si in receptis scriptum reperitur absolute, de costo amarum intelligendum est. Nec aufcultes dicentes dulce costum reperiri. Nam illos omnino utuperat Simon Iacuen. hoc modo dicens. Inuenitur aut in multis locis costu dulce scriptu in sectionibus, sed nec uidi nec audiui ab aliquo dici, sed qd imperiti dnt costu dulce esse, radix è enule artificiosè pparata: igitur & si in receptis inueniatur scriptu costum dulce amarum, ponatur, cum illud dulce in re natura non sit. Dux tñ reperiuntur diuersitates costi: unum .n. est indicum & est rufum violètum est, & arabicum quod album est & temperatius & illo utimur: quare nota, & hoc omnes clamant doctores. A nullo .n. reperies dulce costum scribi de doctoribus medicis: quare quiescant tñtis auctoritatibus uiri hi ignari dicentes costum dulce reperiri.

De saxifragia est cõtrouersia inter aromatarios. multi. n. ignorantes pro ea ponunt quãdam herbam habentem folia similia fere chelidoniæ sue pimpinellæ: minus tñ lata & habent radicè grossam & errat. nã illa est paltinacæ syluestris. Sed uera saxifragia est quãdã herba nascens in montibus Aro nia adhuc saxibus: quæ herba facit plantã cū multis foliis subtilissimis, subtilitatis fere capillorū longitudinis digiti, & hæc uera saxifragia est: & illa in medicinis debet apponi & nõ alia, & ex hoc apparet corruptella aromatario, quia non habetur uirtus medicinæ a doctoribus limitata &c.

IULEP rosatū Mef. ualens & conferens ad iustionem febriū & uehementis sitis & inflammationi stomachi & pectoris. Cuius permixtio hæc est.

R. Aquæ rosæ lib. iii. zuchra. albi clarificati. lib. ii. & fiat iulep lento igne debito modo decoquendo, & leuiter clarificato cum aqua rosa.

Aromatarii nostri tps non faciunt hoc modo, sed clarificato zucharo cum aqua communi, cum propinqua est coctio, addunt pro omni lib. i. zuchari, aquæ rosæ 3. ii. & iste non est modus, & ideo nõ habetur uilitas a doctoribus posita, & hoc propter auaritiã aromatario.

Quotiens enim scriptum reperitur iulep de rosato semper est intelligendum tanquam de perfectiori & meliori.

IULEP uiolatum Mef. confert ad febrem, & inflammationem, & asperitatem pectoris, & tussim, & pleuresim, & eius operatio est sicut iulep rosatum.

R. Aquæ storum uiolatum li. iii. zuchari albi & clarificati cum aqua uiolatum lib. ii. & fiat iulep.

Iulep omnes sunt parum decoquendi, eo quia si multum decoquantur candescunt, nec propter leuem eius coctionem timetur eorū corruptio, eo quia aqua est aromatica, et eos a corruptione conseruat. Et nota qd dico, qd nõ sunt multum decoquendi, coquendi tamen sunt.

Differt syrupus a iulep dupliciter. Primo, quia syrupus longe melius decoquitur quam iulep. Secundo, quia iulep absq; alicuius rei commixtione decoquitur: secus autẽ syrupus. Et sic fiunt iulep &c.

IULEP de iuiubis Mesue ualeat ad asperitatem pectoris ac tussim, & ingrossat sputum subtile, & facit facilem eius expulsiõnem, & confert raucedini & pleuresi. Cuius permixtio hæc est.

R. Iuiubarum magnarum & pinguium numero. c. Et de coqui in lib. iii. aquæ usq; dum remaneant lib. ii. & cum lib. i. zuchari fiat iulep in bona forma &c.

CATHARTICVM imperiale Nicolai. i. laxatiuum, pro imperatoribus uel aliis delicatis hominibus inuentum: ducit enim sine læsione: præcipue ualeat pinguibus hominibus qui semper sunt constipati: ualeat etiam illos, uentositatem stomachi & intestinorum habentibus optime caput purgat, & de toto corpore uranq; cho leram, quietam educit. Cuius permixtio hæc est.

R. Diagydi.
Cinnamomi,
Myrobal. citrinorum,
Spicæ nardi,
Hermodytylorum,
Saxifragia,
Zuchari an. 3. iii. s.
Polypodii. an. 3. ii.
Garyophyllorum,
Macropiperis, idest piper longum.
Zingiberis,
Spicæ celticæ. an. 3. i. s.
Cardamomi.

Melanopiperis. i. piper nigru. Amomi. an. 3. i. s.

Mellis quantum sufficit, iumatur cum uino uel cum aqua calida mane & sero dosis est 3. iii.

LITONTROPON Nicolai, pertundens lapidem inter pretatur: hoc lapidem fragit & expellit si in renibus uel uescia sunt: hæc utens medicina nec dolorem illi nec lapidis uitium incurrit. Cuius permixtio.

R. Spicæ nardi,
Zingiberis,
Xlobalsami,
Acori,
Cinnamomi,
Peucedani,
Meu,
Melanopiperis. i. pip nigru
Leucopiperis. i. piper albũ,
Saxifragiæ. an. 3. ii.
Carpobalsami,
Garyophyllorum,
Costi,
Rheupontici,
Liquiritiæ rasæ,
Cyperi,
Dragacanthi,
Alexandri. i. macedonici,
Chamædryos,
Seminis apii,
Seminis sparagi,
Seminis basliconis, an. 3. i. gra. xv.
Seminis urticæ,
Seminis citri an. 3. i. & gr. xv.
Folii,
Crocii,
Squinzanti,
Cassia lignæ,
Bdellii,
Malticis,
Radicum ireos,
Amomi,
Seminis leuistici,
Seminis grana solis,
Seminis petrosillini,
Sileris montani,
Sinoni. i. petrosillii agrestis.
Cardamomi,
Anethi. i. fimen,
Euphorbii,
Lapidis lycnis,
Olei nardini,
Olei muscellini, an. 3. i. minus gana. iiii.

Mellis despumati quantum sufficit: detur quando opus fuerit cum uino calido.

LAXTIFICANS Rasis. 9. Alman. in ca. de melancholicis: in diebus uero quibus quiescit æger debet fumere ex electuario quod uocatur laxificans, laxificat cor & animum, & oris & sudoris odorem bonum facit. Cuius permixtio.

R. Seminis melissæ,
Cinnamomi,
Corticum citri,
Nucis muscatæ,
Garyophyllorum,
Cardamomi maioris,
Galliz muscatæ,
Neremisch.
Malticis,
Been albi,
Croci orientalis,
Been rubei.

Zedoariz. phyllati, ana partes
Doronici. aequales.
Seminis ozymi maioris. Mulci quantum est decima
Seminis ozymi garyo- pars unus.

Deinde fumantur chebuli. xx. emblici. xxx. Et terantur in tribus libris aquæ & coquantur ad consumptionem duarum partium, & coletur in colatura uero addatur mellis despumati lib. i. deinde bulliant usque ad consumptionem aquæ. Postea ex hoc melle coñficiantur prædictæ species, quod tamen in pondere fit ad triplum ad species, de quo cum necessesse fuerit ad magnitudinem anuellanz sumendum est: hoc enim medicamentum lætitiæ & coloris pulchritudinem, & digestionis bonitatem operatur, & retardat canos.

Neremisch apud Aui. in. i. can. ca. 5. & flos & cortex & capita simulant maci, sed est minus rubeus ad citrinitatem declinans & est aromaticus &c. neque per id cognoui quod sit.

Permutatio neremisch in eodem cap. & loco eius ponitur quarta ponderis ipsius de zingibere, & medietas ponderis eius de phisticis, & sexta ponderis ipsius de spica.

Simon Ianuæ inquit neremisch, sed in arabico neremisch est ut Aui. describit, sed nec Simon vñ cognouisse quod esset.

Matthæus Sylu. dicit, quod neremisch est semine rosæ asini uel flos ipsius. Aui. in suis simplicibus in fine antidotarii ait Neremisch. i. mufaha & est flos peoniæ uel peonia, & sic credo esse bene expostum: nam sicut dictum est, Matth. Sylu. dicit, quod neremisch est flos rosæ asini. Auer. uero in 5. coll. i. dicit, Peonia. i. rosa asinorum. Præterea uide apud Io. Arculanum in cap. de melancholia, qui describit prædictum electuarium est auctoritate Rasis, & ibi inquit: Neremisch. i. semen peoniæ. Barth. Montagn. habet loch neremisch peoniam quæ idem est. Gentilis uero super 5. can. Aui. ignorauit quid esset neremisch. Dicit enim ibi quod Conciliator dicit falsum in cap. de colica, dum dicit, quod neremisch est semen peoniæ, & sic ego reperi apud Conciliatorem differentiationem ducentimanonæ, quæ est penultima omnium suarum differentiationum, dicit enim ibi: Neremisch. i. peonia, & sic ex meo iudicio Conciliator & alii bene dixerunt, sed Gentilis non bene dicit flos ostendi supra per supradictos autores, quod uerum neremisch est flos peoniæ uel semen ipsius. Præterea uide etiam quod Rasis in electuario de nucleis fructuum habet feminis peoniæ. & Auicenna in eadem confectione habet neremisch, quod idem est.

Loch de pino Mesue conferens ad tulsim antiquam, & asthma, & spui uiscoso, & constrictionem anhelitus. Cuius permixtio.

Re Granorum pini munda- torum & recetium. 3. xxx.	Radicum lilii celestis, idest ireos. 3. iiii.
Amygdalarum dulcium ex corticatarum,	Carnium dactylorum heyron, idest dactylis illius prouin- ciz. 3. xxxv.
Auellanarum assatarum,	Amygdalarum amararum et excorticatarum. 3. iiii.
Dragacanthi,	Mellis psullarum,
Gummi arabici,	Zuechari tabarzet,
Liquiritiz rase,	Butyri recentis. an. 3. iiii.
Succi liquiritiz,	
Amyli, idest amydi,	
Capillorum uene. an. 3. iiii.	

Mel tabarzet quid sit supra declaratum est lib. i. & 5. v. s. fiat loch, mel coquendo & depurando.

Auellanz assantur quemadmodum femina. Igitur facias ut supra tibi ostendi de feminibus, & hoc modo habes doctrinam assationis earum, assantur autem quoniam assatz maturant catarrhum. Sed cortex interior abicitur, & hoc modo assando remouetur quædam superflua humiditas.

Dragacantum quod ponitur in omni loch præparatur hoc modo. Accipiatu mellis & aquæ ana. q. s. & infundatur dragacanthum & permittatur per totam noctem usque in mane, & si deest aqua addatur, deinde per sedatium fricando transietur, & hoc modo utitur, & si facias de omnibus gummis in loch intrantibus.

Nucleus si simpliciter scribitur, de nucleo pini intelligitur quidam uero alii de nucleo oliuæ intelligitur. Aui. uero. i. ca. de nucleis dactyli intellexit. Sed prima opinio uerior & melior est,

Mel passulatum fit hoc modo. Exprimantur passulæ donec ex eis exeat succus, & accipe de dicto succo partem unam, mellis partes duas, uidelicet succi passularum. 3. i. mellis. 3. ii. misce, & bulliat simul usque ad consumptionem succi, & tunc erit mel passulatum. Et hoc modo ostendi facere Gal. mel myrtinum quod sit ex duabus partibus mellis & una myrtillorum. s. succi. In suo antidotario minori in confectione quæ incipit. Confectio mellis myrtini, Quod si succus earum haberi non potest hoc modo facias. Passularum. 3. ii. aquæ. 3. vi. bulliant simul usque fere ad consumptionem aquæ, deinde exprime passulas & adde duplum mellis & coque, & erit mel passulatum.

Varia reperitur litera in hac cõpõne, quædam. n. dicit ut supra annotatum est, & ista litera bona est. Alia uero dicit, mel canæ. q. s. & idem est quod puluis zuechari, eo quia puluis ille extrahitur ex canis & condensari non potest, & antiqui mel canaz appellabant. Alia uero dicit zuechari tabarzet. & idem significat quod zuecharum illius regionis quod est albisimum, purum, & bene coctum, uerum quia non cognofcitur ipsorum diuersitas accipitur zuecharum medietas &c.

Loch de papauere Mes. & est diapapauer, conferens ad tulsim calidam, & pectoris asperitatem, & cuius spiritus est tenne, & indiget maturatioe, & igrofatioe. Et cõfert ad febrem calidam, & dolorē pectoris & pleurem. Cuius permixtio hæc est.

Re. Seminis papaueris albi.	Amydi,
3. xxxv.	Seminis portulacæ.
Amygdalarum dulcium ex corticatarum.	Seminis lactucæ,
Granorum pini,	Seminis cydoniorum,
Gummi arabici,	ana. 3. iiii.
Dragacanthi,	Croc. 3. i.
Succi liquiritiz. an. 3. x.	Penidiarum albarum 3. iiii.

Syrupi de papauere hoc modo facti lib. i. & fiat loch in bona forma.

Syrupus iste hoc modo fieri debet.

Re. Capita papaueris albi & nigri, an. M. s. feminis lactuce florum uiolarum, ana. 3. i. bulliant hæc in li. iiii. aquæ secundum artem deinde coletur & addatur lib. ii. zuechari: fiat syrupus de quo fiat loch præscriptum.

Loch de squilla Mes. Est medicamentum iuuamentum magnum eius quibus materia grossa & uiscosa & difficilis murationis exuberat in membris anhelitus reddens eam facilem ad expellendum, & confert difficultati anhelitus, & dolori pectoris, & laterum. Cuius permixtio hæc est.

Re. Succi squillæ, mellis colati & bene despumati. an. 3. vi. Misce, & simul coque usque ad formam loch & referetur.

Modus extrahendi succum a squilla talis est. Munde squillam a superioribus & interioribus corticibus: quia uenenosæ et mediz sumantur: & bene inuoluatur in pasta facta cum farina hordei uel siliginis uel frumenti: non autem ex luto ut quidam fatui faciunt. Et notatur dictum est in pasta hordei, siliginis uel frumenti, non autem in luto. Luto. n. i. sorditiei eius adire. sed farinæ dictæ non habet sorditiei: immo adliat in uirtute earum & subleuiat & muficant ipsas: & post inuolutionem de dicta pasta ponatur in furno tepere calido, et permittatur usque ad cocturam paste in qua laminæ squillæ sunt: deinde extrahatur, et abiecta pasta accipiatu laminæ squillæ ita calidæ et picciatur in mortario lapideo prius calefacto et pistello ligneo bene pistetur non autem cum pistello ferris, ferrum. n. facit eis rubiginem, quæ rubigo uenenosa est, et post perfectam pistationem cõstetum ante infrigidationem ipsarum in subtili pecia inuoluatur et exprimatut fortiter, et sic succum habebis. Nec infrigidari permittantur: eo quia infrigidat succus haberi non posset propter maximam uiscositatem quam faceret &c. Quod si squilla carenus apponi per loco eius rasatur etc.

Loch sanum et expertum Mes. est ex inuentione postea: conferens ad tulsim: et ad rauedinem moris quæ est propter frigiditatem: et phlegma grossum quod continetur in pectore pulmone. Cuius permixtio hæc est.

Re. Cinnamomi,	Scabellæ. an. 3. xxx.
Hyssopi sicæ,	Passularum enucleatarum,
Liquiritiz rase. an. 3. iiii.	Ficum siccarum,
Iuiubarum.	Dactylorum pinguium. an. 3. ii.

Fœnu.

Fœnugræci. 3. v. Radicum ireos.
Capillorum ueneris. M. i. Calamench. smontani.
Anisi. Seminis lini ana. 3. iiii.
Seminis fœniculi.

Hæc omnia coquantur secundum artem in lib. iiii. aque vsque ad consumptionem medietatis: deinde colentur, & in colatura addantur Penidiarum lib. ii. Et coquantur usque ad spissitudinem mellis deinde proiciantur super eis. Pinearum mundatarum. 3. v. Gummi arabici præparati ut Liquiritiz. supra.

Amygdalarum mundata. Amydi. an. 3. iiii.
Dragacanthi an. 3. iiii. Radicum ireos. 3. ii.

Misce omnia simul: prius tamen bene contulsis conterendis et puluerizatis puluerizandis, & reductantur ad formam lochi, bene omnia commiscendo. Dosis eius a 3. v. vsque ad 3. x. Et sumatur lambendo &c.

Quoi secundum artem est plus & minus res bullire secundum quod sui natura & plus & minus sustinent de decoctione. Quæ uero sint illa quæ sustineant multum de decoctione: quæ uero minus, in ultima distinctione declarabitur, prout nunc his sis contentus.

Lochi de althæa Mæse bonum ad constrictionem anhelitus: & ad tussim antiquam, & subtiliat humorem grossum. Cuius permixtio est hæc.

R. Squillæ affatæ 3. iiii. Prasii 3. i.
Radicum ireos. 3. ii. Myrrhæ,
Hyssopi, Croci. ana. 3. s.

Mellis costi & bene despumati. 3. ii. s. & fiat loch prius conterendo subtiliter præscripta.

Modus assandi squillâ talis est. Accipe expe. squillæ mediocris magnitudinis & amoue cortices exteriores & interiores abiciendo ambas. Quæ uero in medio sunt inuoluas in pasta hordei, & sit pasta grossa grossitudinis digiti. deinde ponatur in furno & tandiu dimittatur quod pasta effecta si rubeat: deinde extrahere & dimitte in frigidare: post in frigidationem aperitur, si bene affata est contere subtiliter & utere. Alteriter iterum inuoluas in alia pasta & in furno ponas: & tantum hoc facias quod bene affata sit. Nam nisi bene assentur remanet in eis acutius mala quæ nocent stomacho & uentri ualde uomitumque & nausæam faciunt.

Mel nota quod bene despumari debet in quacunque compositione ponatur: & maxime in loch & confectionibus pectoralibus: eo quia quando spuma ab eo non est ablata facit tussim & laxat ventrem, quare notent aromatarii: quia aliquando sunt causa magni detrimenti &c.

Lochi de pulmonis uulpis magistralis: ualet asthmaticis empyici, dyspnæ, orthomæ, & tussientibus ex causa frigida. Cuius permixtio hæc est.

R. Radicum ireos. ana. 3. ii.
Liquiritiz rase. Zingiberis.
Hyssopi siccat. Ficum siccorum.
Dragacanthi. an. 3. i. Dastylorum.
Pulegii. Cubebarum.
Cinnamomi. Seminis urticæ.
Amygdalarum dulcium. Seminis anisi. an. 3. ii.

Pulmonis uulpis. 3. vi. præparati. Zuchari dissoluti in decoctione capillorum ueneris. Liquiritiz. Hyssopi. & Pulegii. vnc. vi. & fiat loch.

Pulmo uulpis hoc modo præparatur & conseruatur, mûdetur peroptime ab omnibus suis immunditiis: deinde illum bene laues cum aqua uetuli: & postea illum aspergas zucchero optimo bene puluerizato: deinde exiccari in stupha uel furno leniter calido. Et post ipsius exiccationem in uoluerum in absinthio & reuertere in loco sicco. Absinthium in conseruatur illum a corrosione uermium.

Alio modo conseruari & præparari potest hoc modo. Accipe pulmones uulpis numero. vi. scindantur per uenas & cannas, postea abluantur cum uino albo dulci & calido & odorifero quater uel quinque uicibus per horam pro quali bet uice: postea exiccantur in furno leuiter calido & uui referuntur in absinthio: & modus iste melior est.

Lochi de aliis Mæse, quod confert tussi phlegmaticæ

& maturat materiam eius bonum & expertum.

R. Alliorum mundatarum lib. s. Et elixa eis in aqua decoctionis cicurum & hyssopi siccat usque dum sint bene decoctæ: deinde colentur & terantur alia sicut medulla, & proice super ea mellis & butyri ana. 3. vi. Et decoquantur lento igne usque ad terminum lochi: & utere, bonum est.

Lochi de caulibus Mæse: ualet ut supra dictum est in loch de aliis.

R. Succu caulium nō trāspantarorū. lib. v. lento igne coq; auferedō spumā eius usq; dū redeat ad li. ii. Deinde coquat cum rob. & mellis an. li. usq; dum ingrossetur & bonū est.

Lochi de farfara magistralis: multum ualet in passione pectoris. Cuius permixtio hæc est.

R. Radicū farfaræ. i. ungulæ caballinæ elixatarum in aqua cōi. 3. vi. Pistentur subtiliter in mortario lapideo cum pitheolo ligneo, & postea addat. Pinearum purgatarum. 3. s. Passularum chucleatarū. 3. ii. Pistentur oia subtiliter, & cum li. i. Zuchari, & alibi lib. s. dissoluit in decoctione ubi coctæ sunt radices farfara, et aliqui sūt q. addūt infra scriptas spēs.

R. Croci, Macis. 3. i.
Garyophyllorum. Succu liquiritiz. 3. iiii.
Cinnamomi. ana. 3. i. Misce & fiat loch fm artem.

Lochi bonum Mæse: confertens hæctis, & consumptionis, & phthisicis maxime, & expellit saniem de pectore, mundificat pectus, & pulmonem, & tussim lenit.

R. Papaueris albi, Gummi arabici, ana. 3. vi.
Spodii, Seminis cydoniorum.
Seminis lini torrefacti. Seminis citrulli, ana. 3. vi.
Croci, Granorum nasturtii.
Amygdalarum dulcium, Seminis corti.
ana. 3. iiii. Amygdalarum amararum,
Amydi, Fabarum ana. 3. s.
Dragacanthi, Penidiarum. 3. lxx.

Dissoluantur penidia in aqua fontium, & coquantur, & conficiantur cum eis cætera dosis. 3. ii. cum aqua mellis.

Lochi de amygdalis Mæse. confertens ad tussim, ad uehemetiam siccitatis pectoris, & pulmonis. Cuius permixtio.

R. Amygdalarum dulcium, Gummi arabici,
Amygdalarum amararum, Liquiritiz.
Seminis lini torrefacti, Succu liquiritiz. ana. 3. s.
Granorum pini, Zuchari,
Anisi, Penidiarum, ana. 3. iiii.

Dragacanthi. ana. 3. i. s.

Confer cum mellis, & succu fœniculi bullitorum quantitate sufficienti, & fiat &c.

Lochi de althæa magistralis.

R. Radicum althææ quantum placet, lauentur optime, & a ligno interiori mundentur, postea incendant per transfusum minutissime, & coquantur in aqua cōpleta decoctionis: postea optime pistent. deinde itamignetur cū sua decoctione, & si per se non possent transire manibus fortiter cōprimantur, & de hac colatura accipe lib. iiii. iusti ponderis.

R. Mellis despumati lib. ii. rum 3. iiii.

Liquiritiz rase subtiliter pul Pulmonis uulpis præparati, uerizatz. 3. vi. Seminis corti. ana. 3. iiii.

Passularum bene contusa.

Conterantur omnia subtilissime, & misceantur, & bulliant, quousque habeant formam lochi, & in fine post aliqualem in frigidationem apponantur præscriptæ species.

Species omnes in loch intrantes debent subtilissime conterri, & per spissum sedacium transiri, & non tantum species, loch sed omnes medicina pectorales.

Loch oēs in sua bonitate p. duos annos seruant, & p. priore delectabiles, horribiles uero vsq; ad tres annos seruari pnt.

MYTRIDATVM magnum Nico. hoc est mater antidotorum, ualet ad omnem capitis passionē urri, & mulieris, & timidis, lachrymantibus oculis, & uitio aurium, subuenit dentium doloribus, & palato, oiaq; uitia oris, & maxillarū medetur, si super locum dolentem ponatur, iterum ad modum emplatri ponatur in temporibus ubi sit diffusio, si entericis datur cum decoctione balaufturum, præcipue datur cōtra uenenum, si di-

temperatum potetur cum succo mentę, uel superponatur Quartanariis etiam ante horam accessionis datum mirifice prodest cum uino tepido.

Mitridatum istud, discussum, & uentilatum fuit in Ticensi academia, a collegio medicorum, & secundum modum sequentem fuit approbatum esse de mente Nicolai, nihil ultra addendo uel minuendo.

Garyophyllorum,
Storacis calamitę,
Spicę nardi,
Xylobalsami, idest lignum balsami,
Orobi,
Leuistici,
Dragacanthi,
Masticis,
Galbani,
Gummi cedri, & quia nō habemus loco eius ponimus gummi iuniperi.

Seminis foeniculi,
Siseleos. i. filer (nontantum semen accipitur.

Seminis apii,
Ameos,
Petrosillini. herba,
Rutę. herba,
Seminis papaueris nigri,
Dauci,
Naseos. i. fementi. i. lapa,
Seminis rapę,

Synapsis albę,
Macropiperis, idest piper longum,
Ozimi,
Amomi. ana. 3. ii.
Acori. radix,
Ulaeos, idest bardena,
Panis porcini. i. cyclamen.
Phyllis, idest caperis,
Zacharię, idest flos agnicalli,
Cornu cerui,
Balsami. i. liquor emanans ab arbore balsami.
Cinnamomi,
Croci,
Zingiberis,
Costi,
Squinanti,
Terebenthinę,
Myrrhę,
Olibani,
Castę lignę,
Agarici albi,
Spicę celticę,
Radicum ireos,
Rheupontici,
Asfari,
Prafi,
Diptami,
Colloquintidę,
Silfei, idest consolid. mino. an. 3. iiii.

Schorcados,
Artemisę,
Calamenti. i. montani,
Leucopiperis. i. piper album,
Chamępithos,
Melanopiperis, idest piper nigrum.

Pentaphyllon. an. 3. iiii.
Petrosillini, idest seminis petrosilli.

Seminis anagogę. i. fumach.
Malabatri. i. folii indi.
Cardamomum. i. minus. i. meligeta. an. 3. iiii.
Baccarum lauri. 3. i. gra. vii.
Vini uetustissimi. 3. ii.

Puluerizentur subtiliter omnia, sed gumme dissoluantur in optimo uino albo, quęadmodum dictū est in tyriacę, mel lis cocti, & despumati. lib. viii. & 3. ii. & fiat in bona forma.

Laudandum nō est terribile: immo si laboretur in eius trituratione prius corruptet quā fiat malaxabile: ideo debet

dissolui, & liquefieri in uino quemadmodum gūma. Laudandum res est calida, & secca in primo gradu.

Insuper scias, qđ omnes gumme parum sũsint de cōtione, & oēs medicinę subtilis substantię, & acutę, & rarę sicut scamoneę, aloes, & oēs medicinę inflammabiles, sicut gumme, ut bdelliū, & serapinū. Et ratio est, quia per triturationem acquiritur inflammatio, quę. n. flāmatio fit per motū qui motus calefacit. Et hoc quia istę medicinę sunt aptę inflammatione rōne subtilitatis, & hac inflammatione, & motu duo fiunt. Vnum quia partes subtiles euolūt. Aliud quia ipsa intensa cōtōrio corripit substantiam earū.

Aristolochię omnes species de trituratione, & decoctio ne rem plenam sũsint.

Ana enim dictio arabica, & tantum importat in lingua latina, quantum xqualiter.

Radix ireos debet in umbra exiccare, & incidi in paruę frusta, & in filo infilari: & partes seu frusta separata esse debent, ita qđ una pars non tangat aliam, & reueretur.

Peucedani colligi debent de mense Nouembris, Spica uero celtica colligi debet de mense Iulii.

Vnum uniuersale in omnibus cōpositis est intelligendū de etimologia vocabuli. Medicinis. n. cōpositis imponuntur nomina varia. Qñqđ enim a medicina quę est basis denominatur, sicut diacydonitem a carnibus cydoniorum: Aliquā a quantitate licet non sit basis, sicut diaphœnicon a phœnichiis. i. dactylis: Aliquā a cōponente, sicut Phylonium a Phylone medico, & Mitridatum a Mitridate rege. Aliquā ab effectu cōi sicut benedicta, quia ab omnibus sumentibus benedicitur. Aliquā a propriis effectibus, sicut blanca, quia blancos. i. albos purgat humores. Aliquā a similitudine, ut diacurcuma: quia similitur radici curcumę. Aliquā a loco, ut syruspus de bizantiis, bizantium quidam est locus in confinis Macedonię: Aliquā a quantitate medicinę, & autore componētē, sicut dicitur diarhodon abbat. diarhodon dicitur a rosas abbatibus: quia abbas quidam composuit. Aliquā ex effectu, & autore, ut ygia gręca. i. ygia saluatric gręca, quia gręci eam inuenerunt. Aliquā est medicina, & similitudine, sicut opopyra. i. succus similis igni. Aliquā a numero medicinarum, ut tyriaca diateseron. i. de quatuor rebus. Aliquā a loco in quo aliqua suarum medicinarum fuerit collecta, sicut medicina asuledatio scripta in capitulo de lepra. asuledatio est mons quidam: super cuius lapides mingunt hirci montani, & ibi colligitur. Et quia tantum duodecim modi sunt hic positi, tantum plurimi sunt alii modi impositionis qđ apud nos sunt noti, & qui ignoti, & qui pcedunt a uoluntate hominis: immo omnes describi non possunt.

Istę species sunt subtiliter etiam puluerizandę, & cribellandę. Nam cribellatio, & puluerizatio subtilis duo facit. Primo quia transeunt ad loca remotissima. Secundo cito calore nostro alterantur, & præparantur.

Mitridatum si canonicę, & secundum artem factum est, durat eius uirtus usqđ ad annos quadraginta in sua uirtute, & bonitate &c.

MITRIDATUM Auic. & est cōfectio quam fecit Mitridates Rex, & nominauit sui nomine, & cōposuit ipsam & est ex medicinis expertis super uena proprie, & super ægritudines alias, ut esset aggregatiuum iuuenti uenenorum diuersorum, & ægritudinum diuersarum: fuit ergo ipsum tyriaca in illo tpe. Deinde postquā accidit Andromacha illud quod expertus fuit ipsum super iuuentum carniū serpentum, & aliorum addidit in eo trochiscos de uiperis, & alteratum, est parum per additionem, & diminutionem. Fuit ergo tyriaca magna in multitudine iuuenti. Veruntamen tyriaca magna est magis iuuenti ipso in re nra, & est iuuentum serpentum. In reliquis uero rebus nō diminuitur mitridatum a tyriaca diminutione de qua sit curādum: immo est magis additi in pluribus earum iuuenti, & confiditoris utilitatis, & non prelongemus sermonem in numero illorum iuuentorum: qñ ipsa sunt illa perdidit quę sunt tyriacę, & sit dosis copiosior parumper.

Cōfectio mitridati de descriptione cōmuni omnium. Cuius permixtio.

Scordeon, idest allium

sylyestre,

Myrrhiz,

Croc,

Agarici albi.

Zingiberis,

Cinnamomi,

Dragacanthi. ana. 3. x.

Spicz nardi,

Olibani,

Nasturcii,

Squinanti,

Xylobalsami,

Sthecados,

Siseleos,

Costi,

Campephyos,

Galbani,

Terebenthinæ,

Macropiperis. i. piper

longum,

Hypoquistidos.

Caltorei,

Folii,

Storacis calamitz,

Opoponacis. ana

3. viii.

Casiz lignæ,

Leucopiperis, idest piper

album,

Melanopiperis, idest piper

nigrum,

Hermodytylorum,

Vini odoriferi. antiqui in quo infundantur ea quæ oportet

infundi Mellis despumati. q. s. misceantur, & referuetur,

& administretur post sex menses: summa istarum præ-

ter mel, & vinum sunt nu. lvi.

MICISTA Nico. i. experta, detur proprie hæmorrhoi-

das habitibus, & contra ventris tortionem, & rugicum,

lienteriz, & dysenteriz oī solutioni optima est: detur cum

aqua pluviali mane, meridie, nēl sero. Cuius permixtio.

R. Myrobalanorum citri-

norum.

Myrobalanorum indorum.

Myrobalanorum Kebulo-

rum.

Omnium mundatorum &

assatorum an. 3. iis.

Myrobalanorum bellerico-

rum.

Myrobalanorum emblico-

Infundantur hæc omnia in fortissimo aceto per diem, &

noctem. Deinde extrahantur, & exsiccati permittantur: deinde

de pulverizentur, & postea addatur.

Spodii,

Sumach,

Balaustiarum,

Fridentur hæc alia manibus cum oleo rosato, & postea

pulverizentur subtiliter, & cum lib. i. & 3. iiii. syrupi myr-

tiniz electuarium in bona forma.

Myrobalani oēs assantur hoc modo, infundantur myro-

balani qui assari debent in succo cydoniorum, uel granato-

rū: deinde linteo exicca eos, postea mediant in oleo rosā.

uel masticino: deinde eos assa super patellam ferream bene

calefactā: super ducendo, & movendo. Et antequā incipiant

nigrescere ab igne siue a patella calida, amoveantur nē com-

buantur, & sic sunt assati, & hoc mo in usu administrantur:

Sex sunt modi præparationis medicinarū, primus est co-

ctio, secundus cōctio, tertius adullio, quartus ablutio, quin-

tus congelatio, sextus commixtio, & cauam omnium istorū

hoc in libello reperies descriptam.

M & l. rosalum Mesue stomachum confortat, & detur

Polii scilicet montani,

Scordeon. an. 3. vii.

Dauci,

Melliloti,

Gentianæ,

Olei balsami,

Carpopalsami,

Trochiscorum chochion

ana. 3. vii.

Rdelli,

Rutz. ana. 3. ii.

Armoniæ,

Spicz romanæ,

Masticis,

Gummi arabici,

Petrofilli,

Cordumeni, idest carui

agrestis,

Seminis fœniculi. ana. 3. v.

Anisi,

Acori,

Meu,

Serapini,

Assari an. 3. iiii.

Opii,

Rosarum rubearum.

Pulegii ceruini. ana. 3. v.

Phu,

Achaciz,

Vmblici stinchorum.

Seminis iuniperi. ana.

3. iiii. s.

rum, omnium assatorum.

ana. 3. ii.

Nasturcii. 3. ii. s.

Anisi,

Cimini,

Marathi, idest semen fœni-

culi. ana. 3. ii.

Anieos,

Carui. an. 3. i. s.

Masticis. an. 3. i. gra. v.

Gummi arabici. an. 3. i.

gra. v.

mane, & meridie.

R. Infusiois rosarum viridum lib. x. Mellis despu. li. v.

coquatur ad modum syrupi rosati ex infusione.

M & l. rosati Nicolai qd græci rhodumel uocant sic fit.

M & l. Mellis albisissimi, & purissimi. lib. x.

Succi rosarum recentium. lib. i.

Ponatur in caldario ad ignē posito, cum bullire ceperit

utridum rosarum cum forficibus, uel cultello incisarum. li.

iiii. addantur, & tam diu bulliant quousq; ad succi consum-

ptionē redeat, & dum bullierit semper agitur, & in fistili

uase reposito, quanto magis tenebitur, tanto melius erit.

Stomachum confortat, & mundificat, cū frigida confortat

mundificat, & consipat, cum calida mundificat. Datur in

mane, & meridie: de hoc conficitur diamargariton garyo-

phyllatum, & rubea trochiscata.

M & l. violatum fit eodem modo.

Et ualet typice febrientibus cum tepida: corpus hume-

dat, & relaxat, & ualet ad siccitatem pectoris cum aqua

tepidā datum.

M & l. violatum Nico. alio modo.

Mellis electi, & purificati lib. x. Violarum lib. v. Bulliant

duo hæc simul leui ebullitione, deinde coletur, coquatur po-

stea ad debitā coctionem, & referuetur. Mel de quo fit mel

rosatum & uiolatum antequam violæ, uel rosæ in eo ponat

tur debet bñ purgari, deinde ponendo in eo aq, & bullien-

do cum ea debet cōtinue despumari, demum cum aqua per

decoctionem fere est consumpta, uiolæ, uel rosæ tunc intus

ponendæ, & post pusillū colari debent: deinde in integrum

decoqui, & hoc modo mel purificatur.

M & l. rosarum Nico. alio modo. Cuius permixtio.

R. Mellis purificati. lib. x. Rosarum libr. v. bulliant simul

ebullitione leui: deinde coletur, & perfecte decoquantur

& referuetur.

Quidam sunt qui ad purificandum mel non faciunt, ut su-

pra ostensum est. Sed illud clarificant cum ouis quemadmo-

dum dixi de zucharo, hic modus non est inutilis, facias mo-

do ut tibi placeat.

M & l. cydoniorum cum speciebus Mes. stomachum &

hepar, & omnia uiscera confortans, appetitum excitans, di-

gestionem prouocans, uomitum, & ventris solutionem se-

dens, & est medicina experta, & famosa.

R. Succi cydoniorū acetosorum lib. xx. vini antiqui boni

li. x. Coquatur cū facilitate usque dū cōsumpta sit eius tertia

semper auferendo spumā eius. Deinde coletur, & dimittat

ur residere, ut clarescat, & proice super illud mellis boni,

& despumati lib. vi. Et iterū bulliantur, & auferatur spuma

eius, & proiciantur super illud spēs alephanginæ ligatæ in

panno suspensio super illud medicamen, & sunt proprie istæ.

R. Cinnamomi,

Heil, idest cardamomi ma-

lius an. 3. iiii.

Masticis. an. 3. i. s.

Croci. 3. ii.

Omnia præter crocum terantur contritione grossa, & su-

spendantur in pāno, sicut diximus omni hora fricando illud

super medicamen donec fiat ei spissitudo. Deinde aromati-

zetur cum musci. 3. i. galliz 3. ii. Et sunt ex hominibus qui

faciunt ipsum sine speciebus, & sunt qui loco mellis ponunt

zucharam, & proprie quando oportet faciunt cum specie-

bus, & sine speciebus. Miua hæc aromatica durat per annos

tres in sua uirtute & bonitate.

Species præscriptæ ad bulliendū non sunt ponendæ vsq;

fere facta sit decoctio, vel sit bene propinquit coctio nō,

quia ista parum substantie de decoctione, & hoc bene nota.

M & l. v. cydoniorum sine speciebus Mes. similiter ualens

sicut diximus superius.

R. Succi cydoniorū lib. c. & ponatur in uase lapideo mun-

do, & bulliat cum facilitate auferēdo oī hora spumam eius

vsq; ad consumptionē medicatis: deinde coletur, & dimittat

ur residere, sicut per horas tres, & proiciatur su-

per ipsum vini antiqui lib. lx. Deinde coquat super prunas

vsquedum spissitudinem habeat. Et sunt qui loco mellis po-

nunt zuccharum. Et sunt qui faciunt cum speciebus, & quidam sine eis, & aromatizant, sicut diximus.

Succus seu uinum cydoniorum hoc modo fit. Cydonia cum gratulata raspanitur usque ad interiorum animam. Deinde in pecia inuoluuntur, & cum torculari exprimuntur & colaturæ preparatur, ut uinum granatorum durat enim in eius uirtute per annos tres.

Nota his in condendo radices, & faciendos sypos cum succis apponenda est magna quantitas mellis, quia eos coferuat. Et sic in condendo radices ponitur quadruplum mellis.

M 2 L myrtinum sic fit. Accipe succi myrtillorum libr. i. mellis desumati li. ii. & bulliat simul usque ad consumptionem succi, & coletur, & tunc erit mel myrtinum.

M 2 L 2 L 5 Anacardi fit prout patet in isto in capitulo de anacardina.

M V S A magna Nic. quæ a multis probata melancholicis antiquæ, & moderne tussientibus, asthmaticis, peculiarienssem, peripneumonici, hepatici, cardiaci est probata dysenteriz obstitit: quotidianariis & quartanariis typos sine dubio tollit. Cuius permixtio hæc est.

R. Croci,	Aristolochizæ rotundæ,
Opii, an. 3. vi.	Gentianæ,
Cinnamomi,	Ireos,
Cassie,	Pucedani,
Euphorbii,	Piperis albi,
Castorei,	Piperis nigri,
Myrrhæ,	Iusquiami,
Olibani,	Dauci,
Masticis,	Petrofillini,
Cozumbri,	Sinomi, idest petrosillii a-
Pyrethri,	grestæ,
Celticæ,	Mandagoræ an. 3. i.

Aristolochizæ longæ, an. 3. i.

Mellis q. sufficit, datur ad modum castaneæ ante horam accessionis cum aqua calida tussientibus in sero &c.

M A R E N A T Y M sic fit. R. Marenarum lib. x. vel circa & bulliant in lib. i. aquæ lento igne: ebullitionis tantum q. exeat uinum. & de dicto uino claro accipe lib. vi. zucchari boni, & solidi lib. iiii. & fac bullire tantum quod sit in forma zeladiz, & non plus. Et ad faciendum marenatæ de scatolis, accipe pulpæ marenarum lib. ii. zucchari lib. i. & coque, sicut codognatæ de zuccharo.

M 1 X T Y R A cordialis magistralis sic fit.	
Diabroarginati,	Zucchari candi.
Diabuglossati,	Manufchrisiti rosati, ana
Zucchari uiolati an. 3. iiii.	vnc. ii.
Zucchari rosati 3. ii.	Pulueris cordialis. 3. iiii.

Misce, & fiat mixtura cum syrupo uiolato. Conterantur subtiliter manufchrisiti, & zuccharum candidum facto subtili cum syrupo de acetositate citri, & fiat mixtura. Candi fit simpliciter scriptum reperitur uel candi uiolati, uel rosati. Illud est zuccharum rosatum, uel uiolatum induratum quod reperitur in fundo uasis ubi reconditur uleup rosatum, uel uiolatum, & de eo est intelligendum.

Ista componentia hanc mixturam debent multum bene commisceri in mortario semper, & paulatim syrupum addendo donec ipsorum debita fuerit facta permixtio &c.

M 1 X T Y R A pectoralis magistralis sic fit.	
R. Zucchari uiolati,	Penidiarum,
Zucchari buglossati.	Diadragacanthi ana.
Zucchari boraginati,	vnc. vi.
Manufchrisiti uiolati an. 3. iiii.	Diacalamentum,
Diariis de zuccharo 3. vi.	Loch de althea ana 3. ii.

Misce cum syrupo uiolato facta mixtura, & referuetur. In ista compositione est notandū q. si debita formam habere debet necesse est, q. manufchrisiti, penidii, diadragacanthi & diariis subtilissime prius per se terant: deinde cum aliis rebus misceantur, & cum syrupo predicto humectetur &c.

X Y Z A C C H A R A Nic. ab oxy. quod est acetum, & zuccharo dicitur, sit autē hoc modo, & ualeat tertianariis, quotidianariis, & acutis, & peracutis, & quartanæ nō uere cholera purgat. Dat cū calida in mane.

2. Zucchari lib. i. Succu malorum granatorum acerosorum. 3. viii. Aceti vnc. iiii. Ponantur omnia ad ignem, & tandiu bulliant cum spatula semper agitando, & spumam remouendo donec ad formam syrapi reddatur.

Hoc in loco zuccharum non clarificatur, & si pur illud clarificare uis saltim tantum bulliant, quod aqua consumetur antequam aceto permisceatur quæ postquam consumpta erit acetum, & succum granatorum ponatur, & hoc fit, ut aceti uirtus deperdat &c.

O X Y M E L simplex Mesue. Iuuamentorum multorum propriorum qui sunt in corpore toto, & ad materias quæ sunt in iuncturis propriæ: quoniam resoluit eas, & diuidit, & subtilizat humorem grossum, qui est in stomacho, & hepate, & est efficax in materiis febrium longi temporis. Diuidit enim, & maturat eas. Cuius permixtio hæc est.

R. Mellis boni lib. ii.

Aquæ fontium lib. iiii.

Misceantur duo hæc, & bulliant lento, & claro igne usque fere ad consumptionem aquæ deinde his addatur.

Aceti boni lib. i. Decoquantur usque ad perfectam decoctionem, & referuetur in uitreato uase.

Secaniabin idest syrupus factus ex melle, aceto, & aqua. Squingibin idest syrupus factus ex aqua, aceto, & zuccharo. Ie leniabin idem est quod mel rosatum. Hydromel uero idem est quod aqua mellis &c.

O X Y M E L compositi Mesue conferens ad febres antiquas, & diuidit, & abstergit cholera grossam, & phlegma, & aperit oppilationes omnes, & propriæ stomachi, & hepatis, & splenis, & prouocat urinam.

R. Corticum radices apii, Seminis sceniculi ana.

ana 3. ii. vnc. i.

Seminis anisi, Munderent cortices, & conterantur, & proiciantur super eas in uase lapideo aceti boni antiqui, & albi li. x. aquæ lib. xii. dimittatur per diem & noctem. Deinde coquatur donec eius tertia consumatur: postea coletur, & proiciatur super ipsum mellis quod sit medietas eius, & coquantur cum facilitate, sicut superius diximus.

O X Y M E L squillicum uirtuosum Mesue ualeat contra materias difficiles, & submersas in locis difficilibus eradicationis earum, & confert ad ægritudines stomachi, & hepatis, & uiscerū, & eruentione acetosam: & mollificatione uiscerū.

R. Mellis despu. & purificati lib. iiii. Aceti squillitici li. ii. coquantur usque ad perfectam coctionem, & referuetur.

Ad purificandum mel debet esse dupla quantitas aquæ ad mellis, ut mellis lib. ii. aquæ communis lib. vi. simul debent bullire usque ad consumptionem medietatis, semper spumam abiciendo. hoc modo purificatur.

O L E Y M muscellinum.	
Olei communis lib. vi.	Myrrhæ,
Aquæ fontium lib. iiii.	Cassie lignæ ana.
	3. vi.

Folii, Spicæ, Xylobalsami. 3. vi.

Masticis an. vnc. i. s. Garyophyllorum,

Storacis calamitz, Carpopalsami,

Croci an. 3. vi. Bdellii an. 3. iiii.

Costi.

Musci vnc. i. alii dicunt, quod debet dici musci. 3. i. Neregil. i. nuce indica 3. iiii.

Hæc omnia terantur grosso modo excepto musco, & bulliant simul ad consumptionem aquæ, deinde coletur, & reponantur in uase uitreo bene obturato, & intus posito musco resolutum cum oleo, & serua.

Istud oleū est in usu in diuersis locis. dicitur autē muscellinum pp muscum quod recipit: quidā præ putauerunt hoc esse oleum balsaminum. i. de grans becnas non recte: ille uero qui dedit istam descriptionem istius olei dixit, q. ipsum inuenit in antido. Gal. & dixit, q. Gal. composuit ipsum.

Neregil. i. nux indica secundum Serapionem in cap. de nuce indica, ut dictum est supra.

Oleum rosatum Mef. & est confortatiuum: & resolutiuum, conuenienter lenitiuum, & sedatiuum. Rude uero est extinguitiu inflammationum, confortatiuum, aggregatiuum inspissatiuum, & prohibitiuum cursum, propter quod potentissimum est potatum ad disinteriam, & ad fluxum menstruorum per corpus. Et differt completum a rudis quoniam completi materia ex oliis completis: & foliis rosarum completarum. Rudis autem materia est olius, quibus nondum accidit completio, & maturatio, & ex foliis quæ non referunt nodos suos.

Modus compositionis eius est, ut accipiatur oleum de oliis, aut oleum sissimum recens, lauetur cū aqua fontiu lauacionibus pluribus. Deinde accipe folia rosarum rubeorum recentium confusarum quantitate sufficientē, & sepe lias in oleo quod modo lauiti, & reconde in uase uitreo, & obtura orificium eius, & exponas soli per dies vii. Deinde coque in uase duplici per horas. iiii. Deinde fac permutationem foliorum rosarum, & utere aliis recentibus, & dimitte per alios dies. vii. Deinde exerce coctionem in eo sicut fecisti prius, & fac denuo permutationem foliorum rosarum: & proice super illud aquæ infusionis rosarum quam tradidimus in ea de syrups sicut quantitas olei, & stringe orificium uasis, & dimitte soli per dies xl. Deinde excola, & iterum expone soli, & dimitte tempore extenso & utere ubi oportet &c.

Oleum rosatum Mefue alio modo, & est magis resolutiuum.

Re. Succo rosarum. Aquæ infusionis rosarum prædictæ an partem. i. Olei loci, & præparati, sicut diximus partes. iiii. Florum rosarum confusarum quantum sufficit reconde in uase uitreo, & expone soli sicut diximus. Deinde operare de decoctione eius, & permutatione foliorum rosarum, & expositione in sole, secundum quæ diximus de permutatione succi, & aquæ infusionis: & hoc fiat bis.

Ultimo uero oleum cū succo rosarum, & aqua infusionis earum recondatur in uase, & exponatur per dies xl. soli.

Isto modo raro fit, sed hoc modo oleum factum est solutiuum, & est illud de quo intelligit Aui. quando dicit a. li. cap. de rosis, quod oleum rosatum solui uentrem.

Nota quæ rose ex quibus fit oleum rosatum, & syrups rosatus, & cætera necessaria colligenda sunt in mente Aprilis uel Maii, & in umbra exiccandæ sunt &c.

Oleum uiolatum Mefue, inflammationes sedat ubicumque sint, & lenit asperitates, et etiam peccoris, et pulmonis & sedat apostemata calida, & pleuresim. Et modus operationis est sicut olei rosati, excepto quod debet fieri cum oleo rudi, aut amygdalino, aut sissimino cum illis modis operationum quos diximus. Cuius permixtio.

Re. Olei oliuarum immaturatarum lib. i. Violarum uiridium confusarum. j. iiii. Reponantur in uase uitreo & soli exponantur per dies vii. deinde bulliant in duplici uase per horas iii. postea colentur manibus comprimendo, et hoc fiat bis semper nouas uiolas mutando, soli exponendo, & decoquendo, ut supra. Ultimo uero colatur addde uiolas nouas quantitate dictam, et super his addde aquæ infusionis uiolarum lib. i. Et stringe orificium uasis: et expone soli per dies xl. deinde cola manibus, exprimendo, et iterum in dicto uase exponatur dimittatur, et permittatur usquequo aqua consumpra sit.

Infusio uiolarum debet fieri, ut supra ostendi, ut in syrups uiolato ex infusione. Accipiatur igitur de illa aqua, et fit istud oleum.

Oleum de lilio sine speciebus Mefue est sedatiuum, lenitiuum, et mollificatiuum. Cuius permixtio.

Re. Olei oliuarum li. i. Florum liliorum alborum. j. iiii. Reponantur in uase uitreo, et soli exponantur, et modo eo facias de decoctione, et de permutatione florum, et coctione et de aqua infusionis quemadmodum fecisti in oleo camemillino, et anethino, nec addendo, nec diminuendo.

Infusionis modus florum liliorum alborum est, ut infusio rosarum, et uiolarum: accipiendo duntaxat folia florum liliorum alborum.

Oleum de lilio cum speciebus Mef. confert dolori peccoris, et est sedatiuum dolorum qui sunt a frigidityte, et

confert dolori matricum, et frigidityte eius, et calefacit renes, et uescicam, et confert colicæ. Et modus compositionis eius est, sicut olei camemillini præterquam oportet ut citrinis eorum tota abiciatur. Cuius permixtio.

Re. Foliorum florum liliorum, Carpopallami. j. i. alborum. j. ix. Caryophyllorum, Malticis, Cinnamomi an. j. iiii. Costi, Croci. j. iiii.

Calami aromatici an. j. i.

Omnia grosso modo conterantur, et proiciantur super eis lib. ii. aquæ foliis liliorum prius remotis et dinutitur per diem, et noctem, postea omnia simul bulliant tribus uel quatuor ebullitionibus: deinde pone olei oliuarum, uel sissimini super ea lib. ii. Et tribus ebullitionibus iterum bulliat: deinde ponatur in uase uitreo cum foliis liliorum, et dimittite in sole per dies xl. deinde cola et administra.

Istud oleum quoniam fit ex lilio cælesti, liro, et tunc illud est magis resolutiuum, calefactiuum, penetratiuum, factum uero ex lilio albo est magis sedatiuum, lenitiuum, et maturatiuum.

Oleum camemillæ Mef. est oleum bene dictum expeditorum iuuamentorum est. n. resolutiuum conueniens, sedatiuum dolorum, et est in eo prohibitio cursus materierum propter spicciuitatem eius modicæ, et confortat neruos, et confert doloribus eorum, et confortat neruosa omnia. Et modus operationis eius est sicut olei rosati. ut oleum uiolarum præterquam oportet, ut fiat cum oleo de oliis copleto, aut oleo sissimino cum illis modis præparationum, quos diximus.

Infusio florum camemillæ fit eodem modo, quo fit infusio rosarum, et oliuarum, accipiendo flores camemillæ loco rosarum et secundum eandem quantitate, et aquæ, et florum.

Oleum de absinthio magistrale, stomachum confortat, et calefacit: et fortificat, et uermes a pueris custodie. Cuius permixtio.

Re. Summatu absinthii. Succi absinthii an. j. iiii. Olei oliuarum li. iiii. Et de his facias prout in superiori tibi monstraui de decoctione, et permutatione, et expositione ad solem.

Oleum quandoque fit ex oliis complete maturis, et illud oleum dicitur completum. Aliquando fit ex oliis immaturis, et illud dicitur rude, uel onfacinum, et magis spicciuum est frigidum complete.

Oleum de anetho Mef. est sedatiuum dolorum resolutiuum, prouocatiuum sudoris, quare confert rigori febris inunctum in spina, & membris neruosis prouocat somnum, & confert dolori capitis & resoluat apostemata, & durities, & modus operationis est. Cuius permixtio.

Re. Olei oliuarum lib. i. Florum anethi. j. iiii. Reponantur in uase uitreo: & decoquantur ut in superiore tibi dixi: ter per mutando flores, & ter decoquendo ut supra ultimo addde.

Infusio anethi li. i. Et soli exponas per tempus tibi in superiori dicto, & omnia facias de isto quemadmodum de alio superiori monstraui.

Modus infusionis florum anethi est, ut infusio rosarum, et uiolarum, nec plus, nec minus, nisi, quod loco uiolarum, uel rosarum ponatur anethum.

Oleum de ruta Mef. Renes, & uescicam, & matricem calefacit, & confert doloribus eorum, et dolori laterum. Et modus operationis est.

Foliorum ruta, Succo rutæ an. j. iiii. Olei oliuarum incompletarum lib. iiii.

Tria hæc reponantur in uase uitreo stricti orificii, & obturatur os eius, & soli per dies xv. exponantur: deinde per horas quatuor in duplici uase coquantur, postea colentur fortiter manibus comprimendo, & de fecido, & tertio hoc reite retur: deinde decoquantur per tempus ut supra, & reseruentur.

De oleo nota, quod aliud est nouum, et aliud est uetus: illud quod est nouum calefacit calefactione temperata, et humectat uetus uero est calidum magis quam resolubile.

Igitur cum olea temperata facere uis, uel parum calida oleum nouum accipere debes. Cum uero calida, tunc uetus accipere potes. Et hic nota, quod omne oleum cum quo hæc olea fiunt, debet carere omni malo sapore.

Oleum de menta magistrale. ualet contra oppilationem

ſtomachi, & hepatis ex frigido humore, & confortat ſtomachum & necat uermes in ſtomacho puerorum, & incitat appetitum, & ſoluit durities in ſtomacho, & tuſim frigidam calefacit: ſtomachum bonum facit. Cuius permixtio .
 ʒ. Foliorum mentæ uiridis. Succu mentæ an. ʒ. iiii.
 Olei oliuarum completarum lib. iiii.

Triâ hæc reponantur in uafe uitreo, & ſoli exponantur per dies xv. oſi obturad: deinde bulliant per quatuor horas deinde colentur manibus fortiter exprimendo, & hoc idem ter reiteretur ſemper modo prædicto faciendo: deinde cola, & referua.

Iſtud oleum a Meſue non deſcribitur: ſed ſic communiter ab omnibus præſcantiſſimis fieri ſolet.

O L E V M ſambucinum Meſ. lenit, & mundificat cutim & confert doloribus neruorum, & confortat eos. Cuius permixtio hæc eſt.

R. Olei oliuarum li. i. Florum ſambuci in menſe Maii collectori. ʒ. iiii. Facias & de iſto modo quo oleum camemil linum, anethinum, liliorum in omnibus tam de permutacione quâ decoctione, quâ ſoli expoſitione, & infuſionis additione.

Modus infuſionis ſorum ſampliſſi, ſit, ut infuſio præſcriporum ſorum, & roſarum, & uiolarum &c.

Inſuper nota, q̃ omnes præſcripti flores debent eſſe uirides, & de iſſis uiridibus eſt intelligendum. Ideo ſemel in anno fieri poſſunt, & non plus &c.

O L E V M de nenuphare Meſ. inflammationes ſedat ubicunq; ſint, & lenit aſperitates & peſtoris, & pulmonis, & le dat apoſtemata calida, & pleureſim. Cuius pmixtio hæc eſt.

R. Olei oliuarum immaturarum lib. i.

Florum nenupharis uiridum contuſarum ʒ. iiii. Reponatur in uafe uitreo, & facias prout de oleo uiolaro tibi dixi, & de poſitione ad ſolem, & de decoctione, & de permutacione ſorum, & de additione infuſionis.

Infuſio nenupharis ſi ſit ut infuſio uiolarum, uel roſarum, nec plus, nec minus.

Ex omnibus floribus fieri poteſt oleum & habet uirtutem ſorum, & ſit ut de floribus uiolarum tibi monſtrauiſſed accipi debent cum ſint complete maturitatis, & non depêdunt naturale eius colorem &c.

O L E V M coſtinum Meſ. ueruos, & lacertos calefacit. Et aperit oppilationes eorū, & confortat omnia membra neruoſa, & confert ſtomacho, & hepati, & confortat capillos, & prohibet caniciem, & facit colorem, & odorem corporis bonum & ſit ita. Cuius permixtio .
 R. Coſti amari ʒ. ii. vnc. viii.
 Caſſia lignea ʒ. i. Vini odoriferi lib. ii.

Summitatum maioranz.

Confrangantur omnia prædicta & infundantur in uino per noctes duas: deinde accipe Olei ſiſamini lib. iiii. Decoquantur omnia in duplici uafe per horas ſex & referua.

Hic nota q̃ auctor dicit coſti amari: ex his uerbis poſſet quis credere q̃ ſit aliud coſtū. igitur intelligas ex ſuis dictis, q̃ te inſtruit q̃ non accipias de adulterato, ſed de naturali q̃ amarum eſt: hic etiâ nota quæ ſupra de coſto tibi dixi.

O L E V M de formicis uolantibus Nicolai ualet ad confortandum coitum.

R. Formicarum uolantium, & pone in oleo, & pone ſoli per dies xl. in uafe uitreo.

O L E V M de capparibus magiſtrale ualet duntitici, oppilationi, & dolori ſplenis, nec non omni eius ægitudine.

R. Corticum radicum cap Tamarici ʒ. ii.
 parorum ʒ. i. Rutæ ʒ. i.
 Olei oliuarum lib. i.
 Scolopendriæ, Aceti,
 Cyperi an. ʒ. ii. Vini optimi an. ʒ. iiii.

Miſce & confrangantur omnia groſſo modo & coquantur in duplici uafe uſque ad conſumptionem uini & aceti: deinde colentur & reponet.

Multa aliz deſcriptiones huius olei reperiunt a doctore buſ deſcripta: ſed iſta melior eſt: & longa experientia pbata eſt.

O L E V M myrrinum Ioan. de ſancto Amando ſtomachū & cor confortat & neruos. Cuius permixtio hæc eſt.

R. Myrrillorum, lib. i. confrangantur.

Vini optimi lib. iiii. Olei communis lib. ii.

Miſce & ſimul bulliât in duplici uafe uſq; ad conſumptionem uini: deinde colentur. Et iterum myrrilli & uinum eandem quantitatem quâ dicto oleo ad coquendū ponantur, & iterum & tertio hoc illud ſi deinde colentur & referuetur. In hoc oleo apponi debet uinū rubet ut adiuuetur in ſtipſitate & melior ſit. Noſtiſt illud Meſ. quia ſuccus myrrillorum ad nos non portatur: q̃ ſi haberi poſſit: modus faciendi eſt ſicut olei cydoniorum ut in iſto oſtenſum eſt &c.

O L E V M masticum Meſ. confortat ſtomachum, neruos: hepar: & iuncturas: & lenit apoſtemata dura: & ſedat dolores. Cuius permixtio.

R. Olei roſati lib. i. Maſtici ʒ. iiii. Vini boni ʒ. iiii. Decoquantur omnia in duplici uafe uſq; ad conſumptionem uini & referuetur.

Vinum cum quo fieri debet iſtud oleum eſſe debet uinū vermigilum: eo quia magis ſtypticum & confortatiuum eſt.

O L E V M de caſtoreo magiſtrale ualet ad oēm frigiditatem neruorum: & ad ſpaſmum, & tremorē, & confert tremori: & tetano: & doloribus neruorum, & iuncturarum.

R. Caſtorei vnc. i. Carpoſaſami,
 Storacis calamitæ, Coſti,
 Galbani, Bellii,
 Euphorbii, Spicæ ʒ. iiii.
 Opopanaxi, Olei oliuarum lib. ii.
 Been albi, Vini boni rubei ʒ. vi.
 Been rubei an. ʒ. iiii.

Bulliant omnia ſimul in duplici uafe uſq; ad conſumptionem uini: & conſequantur: & colentur & referuetur.

O L E V M ſcorpionum Meſ. ſecundum ualet ad lapidem in renibus & uefica, frangit, & expellit eum. & proprie in renibus & ſemore, & ſupra collum uefice inuendū: & iniectum per uirgam, expellit enim eum. Cuius permixtio.

R. Ariſtolochie rotundæ. Gentianæ. Cyperi Corticum radicis capparitis an. ʒ. i. Conterantur omnia groſſo modo, & ſunde ſuper ea. Olei amygdalarum amararum Kith. i. deſt lib. i. s. & pone in ſole per xx. dies fringendo oriſcium uafis, deinde proice ſuper ea ſcorpiones numero xv. Et iterum ſtringe oriſcium uafis: & dimitte in ſole per dies xxx. deinde colentur & reponantur.

Iſtud oleum quanquam Meſue iubeat abſq; coctione illud facere, tamen ut uirtus iſtarum rerum in oleo melius tranſeat, laudarem, q̃ antequam ſoli exponerentur cū oleo ad ignem tribus uel quatuor ebullitionibus & plus bullirent, eo quia in eo ſit de decoctione multa ſuſtentia.

O L E V M cydoniorum Meſ. ſtomachum & membra nutritionis confortat, & neruos, quibus accidit laxitas, & prohibet multitudinem ſudoris.

R. Carnium cydoniorum trititum cum cortice ſuo, quibus media accidit maturatio. Succu cydoniorum cum cortice in complete maturatorum an. ʒ. vi. Olei ex ſoliis immaturis lib. iiii.

Triâ hæc ponantur in uafe uitreo & ſoli reponantur per dies xv. uafe obturato, deinde coquantur in duplici uafe per horas. iiii. deinde colentur cum pecia exprimendo, & colatur iterum addantur cydonia, & ſuccus eorum quantitate ſuperſcripta. Et ſoli per tantum tempus dimittantur: deinde in duplici uafe ut ſupra coquantur deinde exprimantur: & iterum & tertio cydonia & ſuccus colatur addantur: & ſoli exponantur, & tempore dicto iterum dimittantur: poſtea ultimate coquantur & colentur & ſeruetur.

Si oleum de oliuis immaturis haberi non poſſet loco ipſius accipi poteſt oleum completum, & ter uel quater lauare poteſt in aqua, & ita aliquoties uirtuti olei incompleti approximabit. Et modus lauandi oleum eſt in unguento dialthe magiſtralis &c.

O L E V M ſpicæ ſue nardi Meſ. & eſt ſecunda deſcriptio, & eſt oleum benedictū multorum iuamētorū: & proprie ad oēs ægitudines frigiditatis: & uerſoſitatis, & proprie neruorum ſtomachi, & hepatis, & ſplenis, renum, ueficæ, & matricis, & confert dolori auris uentoſo, & dolori capitis: & emi-

emirancæ secundum omnem modum administrationis eius: etiam factio ex eo caput purgatur: & colorem efficit bonum & corporis odorem.

Spice indæ. 3. iiii. Foliorum lauri.
Simpluchi. i. maioranæ. 3. ii. Cyperi.
Xyloalos. i. lignum aloes. Squinanti.
Radicum enulæ. Cordumenci. i. carni agrestæ.
Folii indi. ana. 3. iis.
Calami aromatici. an. 3. i. s.

Confrangantur omnia grosso modo: & fundantur super ea uini boni & aquæ an. tantum quod prædictæ res cooperiantur. Olei sisamini lib. vi. Decoquantur in duplici uase per horas. vi. lento igne, deinde sine colatura omnia in uase reponantur, & obturetur eo uasis.

Oleum oliuarum est materia omnium, oleorum: & denominationem olei habet, & intelligitur de oleo oliuarum: & non de alio oleo. Compositio huius olei est preciosissima: sed raro fit propter penuriam folii ueri, & propter auaritiam emptorum nolentium debiti precium soluere.

Oleum sisamini non fit: quia grana sisami non reperiuntur apud nos, sed loco ipsius accipi potest oleum amygdalarum dulcium uel illud quod inferius describitur.

Oleum spice magistrale, & hoc cõter fit & ualet.

Spice nardi. 3. ii. Calami aromatici,
Spice celticæ. 3. i. Croci ana. 3. s.
Stœcados. 3. iiii. Succii saluiz,
Maioranæ. 3. iiii. Vini optimi ana. 3. vi.
Nucis muscatæ. Olei communis lib. vi.
Cinnamon. an. 3. vi. Aquæ fontis. 3. vi.
Masticis. 3. ii.

Confrangantur omnia simul: & coquantur in duplici uase lento igne usque ad consumptionem uini & aquæ & succi, deinde referuetur.

Oia olea debent coqui in duplici uase et lento igne: eo quia oleum facilius est resoluibile, & magno calore inflammaretur & uirtus deperderetur, imo doctores uolunt & iussunt hanc decoctionem, modus autem tritus est. Sed si artificiale uas ad hoc non habuerimus, possemus accipere urceû petræ uel stagni cooperatum, & in eo oleum & alia ponere: deinde dictum urceum infundere in cacabo aquæ plenæ, et sub eo ignem facere ex ebullitione aquæ, olei quod aquam non tangit decoquatur, & hic est nodus optimus.

Dicitur oleum spice a spica in eo intrante, eo quia spica est basis in hoc oleo &c.

Oleum uulpinum Mesue, & est medicamen nobile utilissimum ad arthriticam, & podagram, & dolorem, renum, & dorsi. Cuius permixtio,

Vulpem unam integram, cuius interiora sint euulsa, & pone in uase & funde super ipsam aquæ fontium, & aquæ marinæ ana. Kist. i. idest lib. i. s.

Olei antiqui clari Kist. ii. idest lib. iiii. 3. ix. Et simul omnia decoquantur lento igne cum salis 3. iiii. Et coquantur usque ad aquæ consumptionem, deinde permixta in alio uase, & proice super ipsa, Anethi.

Alasei. thimus ana. lib. i. Et funde super ea aquæ dulcis decoctionis prædictarum herbarum lib. ii. & decoque sicut prius usque ad aquæ consumptionem, & carnis ab ossibus, & neruis separationem, deinde coletur omnia fortiter exprimendo, & referuetur eis enim mirabile.

Et quando præter oleum coquitur uulpes in aqua fontium & aqua salis, & fit aquæ quantitas multa cum eisdem herbis, & administretur lauando in tina ex efficac. Hoc quoque non permittimus, quia uulpes tandiu debet coqui, siue in faciendo oleum siue, aquam ad abluendum donec discotta fit, ut eius artus omnes laxentur & dissoluantur.

De aqua marina. Nā si illam habere non pot loco eius apponas aquam bene salitam, & cum hoc quod bene salita sit iterum quantitatem salis in receptam descriptam appones.

Aqua marina ante quartū diem putrefici & fetet. Sed ad eā cõseruandam per mensem ponā seu misceatur cum ea parum aquæ uitæ. Aqua enim uitæ est bona cõseruatrici, eo quia resistit contra omnes putrefactionem. Et ultra hoc con-

seruat encaustum ne a magno frigore congeletur: ut sapie ego expertus sum hoc incidenter.

Salis si simpliciter scribatur uel scriptum reperitur semper de usuali & communi intelligatur.

Kist enim idem est quod lib. i. s. uel cotile duz. Et cotila est. 3. ix. ut uolunt doctores &c.

Oleum de hypericon magistrale mirabile.

Summitatum hypericon. 3. iiii. Infundatur in uino odorifero per. iiii. dies & noctes, deinde bulliat in duplici uase bene obturato uase: & fortis fiat expressio: postea.

Tantum hypericon bene cõtū, & infundatur in su præscripto uino tribus diebus & noctibus: deinde addatur terebētinæ. 3. iiii. Olei antiqui. 3. vi. Croci. 3. i. Et misceatur & coquatur in boccia in duplici uase uitreo usque ad consumptionem uini: deinde referuetur in uase uitreo, istud oleum non est multū in usu. Hypericon est satis notæ, eo quod Diofcoride uocatur hypericon. Aui. inquit hypericon nominatur arabice alcarib: & nominatur syriace uas de demonis. Diofcorides facit de hyperico tria capitula, et distinguit ipsas species. vnum facit sub nomine alquiron, aliud sub nomine corium quod est rapa rustica, aliud de hypericon. sed Sera. in uno cap. de omnibus loquitur, sed illud hypericon, quo utimur habet folia parua, et in eis foramina minuta, et propterea uocatur perforata siue herba sancti Ioannis, siue fuga demonum, quæ inuenitur in partibus nostris.

Oleum pro doloribus puerorum bonum et expertū.

Olei anethi, olei camomil. an. 3. vi. olei rutæ, thoracis li quidē an. 3. iiii. pulueris cymini. 3. ii. bulliant omnia una ebullitione, deinde coletur et usui referuetur quando oportet.

Oleum de amygdalis dulcibus Mesue, asperitatem lenit gutturis et pulmonis et partium omnium exteriorum, et omnes durities et siccitates membrorum et iuncturarū lenit. Et confert hæctici, et impinguit et augmentat spermata. Et iniectionum confert dolori uuluz et uesicæ, et modus faciendi dictum oleum talis est.

Re. Amygdalarū q̄ritatē quam uolueris. Cõtere eas bene uel macina eas ad molā, et ipsis bene macinatis repone in patella sua quæ sit ignis clarus et eas in dicta patella reuolue manibus quousque dicta pasta sit bene calida, deinde dicta pasta in uoluat in tela, postea in expressorio ponatur, et bene cõprimatur, et stet sub eo aliquoties, deinde iterū ad molam ponas ad remolendū, et postea in patella iterū ad bene calefaciendum ponatur, demum post calefactionē petiis inuoluatur, et iterum exprimatur, et tunc habebis totum oleū. Alios modos ponit Mesue, sed iste magis uisatus est.

Sunt qui subtilem corticem ab amygdala remouent ante quā oleum faciant, easque mundant ab omni immunditia: et modus iste bonus est, et oleum magis perfectum. Sed inertia detenti, pauci sunt qui hoc faciant. modo igitur præscripto de oleo amygdalarum sunt omnia olea quæ per expressionem sunt, ut de nucleis persicorum, de chrysomilis, et oleum amygdalarum amararum.

Oleum de amygdalis amaris Mesue est aperitiuū oppilatiū, carminatiuū uentositatum, et resolutiū, et cõfert dolori aurium et surditati et sybilo, lenit asperitates et delet p̄num faciei, et confert doloribus neruorum et duritiem eorum lenit: et modus compositionis eius est sicut diximus de oleo de amygdalis dulcibus.

Oleum amygdalarum magistrale pro bitendo sic fit.

Re. Amygdalarū excoctarū lib. i. iiii. uel lib. ii. si uis exicē te bene ab aqua in bacilono sub quo sit ignis carbonū: deinde bene pissent, post bonam cõtusionem ponatur in bacilono dicto, et bñ caleant manibus semper ducendo, deinde recolligatur in unā massam, et si teneri per se non possent parum aqua uiolarū aspergantur usquequo de eis fieri possit ad modū pastosi semper tamē manibus ducendo. Postea inclinato bacilono ad unā pōnem sub quo remoueat ignis massam dictam manibus comprimens, quemadmodum mulieres solent facere cum pannos suos inficiunt: et post aliqualem frictionem cum sapone illos exprimiunt, et hoc sepe facias. Et sic extrahes pro omni lib. i. amygdalarum. 3. iiii. olei hoc ego sæpe feci, et fieri feci pro multis personis.

Olei amygdalarum simpli ceter si scriptum reperiat & absque determinatione semper de oleo amygdalarum dulcium est intelligendum.

OLEVM de nucleis persicorum Mef. ex nucleis persicorum opilationes aperit, & confert dolori auris, & occidit vermes in eis, & linitur super umbilicum calidum, & necat vermes vulnerum, & confert dolori ani, & hæmorrhoidarum, & tumoribus eorum. Et modus faciendi distillat oleum est sic diximus de oleo de amygdalis dulcibus.

OLEVM laurinum Mef. confert dolori capitis, & hemi craniz, frigidis & dolori nervos, & iuncturaru: & confert nervis laxis & frigiditate: & confert dolori stomachi, & dolori colico, & renu, & dolori matricis, hepatis, & splenis, & dolori viscerum. Et modus faciendi dictum oleum talis est. R. Granorum lauri maturorum quantum volueris, & dum adhuc sunt recentia tere in pila, & fac bullire cum aqua in caldario. Deinde exprime in zamari plano non habente coctum, & collige ex aqua quod supernat oleum. Deinde iterum exprime grana contrita in zamari habente uacuum & infunde aquam calidam & collige oleum: & reponc & administra ubi oportet.

OLEVM laurinum Magistrale ualet ut supra: & modus faciendi talis est.

R. Baccarum lauri quantitate quam volueris: mundentur a superiori cortice, & macinentur bene ad macinam oleario: deinde calefacta illa pasta in cacabo: semper manibus agitant do, sub quo fit ignis, deinde inuolutur in pecia, & sub expressorio ponatur, & bene exprimatur, & iterato remacinetur, calefacta & exprimatur & habebis oleum.

Alio modo docet facere Mef. hoc oleum bulliendo in aqua distillat baccarum & pinguedo supernatans per ipsum oleo accipitur uide ab eo: sed modus superior melior est.

Ex multis seminibus & ex multis nucleis fructum olea fieri possunt, sed quia in usu non sunt sermone non licet fieri. Olei nucum amygdalarum amarum, auellana, chrysolilla, de persicis, de nucis inda, de cerasis, de granis citri, de philicis & pineis, de linis, de semine papaueris, de semine lactuce, de semine cucurbitæ, de semine fenugraeci fieri possunt & sunt per expressionem, modo quo sunt olea amygdalarum dulcium uel amarum.

OLEVM irinum Mef. est astheriolum, resolutum, & maturatum, & sedatiuum dolorum frigidorum: & subleuatiuum & maturatiuum materiem que sunt in pectore & pulmone, & confert doloribus hepatis & splenis, & calefacit ea. Et confert doloribus iuncturarum, & lenit durities earum, & apata dura, & cerosola. Et confert dolori & frigiditati matricis iuuamentum manifestum. Et confert spalmo. Et distillatur in aurem, & confert dolori ipsius & forori narium.

R. Radicum ireos 3. ii. Florum eius 3. iiii. Aquæ decoctionis radicem eius lib. i. Oleum sisaminum, aut de oliuis maturis lib. ii. Bulliant in duplici uase usque ad aquæ consumptionem. deinde cola & permuta radices & flores, & aquam de decoctione, & iterum hoc bis fiat sicut diximus de oleo rosato deinde cola & reserua.

Oleum istud est illud quod intrat in unguento arthanitz Mefus &c.

OLEVM de granis sisami Mef. impinguat, & addit in spmate, & lenit durities, & asperitates, & clarificat uocem, & lenit guttur, & est materia aliorum oleorum multorum. Et modus componendi eius est sicut olei de amygdalis, præter quod oportet ut grana sisami prius excorticentur, & modus operatio nis eius est. Mundetur sisamus ab oibus imunditiis, deinde roretur super ipsum aqua cum sale pauco, & confricetur manibus, iterum: roretur donec madescat, postea expidatur ut excicetur, deinde affuse affusione modica, & ponatur in sacculo panni asperi, & fricetur multum donec excorticet, deinde mundetur a corticibus, & molatur cum molis: & fiat alrachine, & de cetero trahatur oleum sicut de amygdalis, & quadoq: trahitur oleum præterquam excorticetur. Et eius operatio est ut affusetur primo sisamus, deinde mola, & fiat alrachine: & trahatur oleum sicut diximus.

OLEVM sisaminum Magistrale, quod fit quando haberi non

potest oleum de granis sisami. Cuius permixtio.

R. Musci. 3. i.

Ligni aloes. 3. s.

Nucis muscatæ.

Garyophylorum.

Macis. an. 3. i.

Calami aromatici. 3. i.

Spice.

Cardamomi. s. maioris & minoris,

Galliz muscatæ.

Cubebe. an. 3. i.

Olei communis. lib. i.

Bulliant in duplici uase & reponantur.

Istud oleum ingreditur in multis medicinis, & quia ad nos non defertur, quia multi & falsæ dicant quod uerus importatur, hanc componendi loco ipsius solent medici dispensare quæ in uirtute est ipsius. Et si hæc non uis facere, & aliud habere non potes, ipsorum loco accipias oleum amygdalarum dulcium, qui in uirtute est illius, ut omni medicorum tenet scola. sed recens esse debet non rancidum.

OLEVM de chrysolillis Mef. sedat dolorem ani, & hæmorrhoidarum, & resolut tumores in eis, & tumores narium, & impedienda lingue, & dolores auris, et modus est sicut diximus in ca. de oleo de amygdalis dulcibus.

OLEVM de tartaro magistrale. ualet ad maculas faciei purgandum.

R. Tartari quantitate quam volueris, ponatur super prunas, & tantum permittatur, quod totus inflammetur et rubeat, postea ponatur in sacculo lineo, & pone dictum sacculum in loco humido sicut in penu: & sub sacculo ponatur uel ampulla uel cyatrum, quod enim exiet ab eo oleum tartari ab omnibus folijs appellari.

Hoc oleum potest fieri tam de tartaro albo, scilicet vini albi quam uini rubei.

Et sunt qui alio modo faciunt. s. puluerizando tartarum subtiliter, deinde in sacculo tere reponunt, & ipsum sacculum, et tartarum irroraunt aceto, deinde sub prunis, ponunt, et relinquunt usquequo nigrescat, deinde extrahunt illud a sacculo iterum, et puluerizant, et aceto aspergiunt, & sub prunis ponunt, et post ipsius nigredinem sacculum accipiunt & iam penu ponunt, et liquor exiit.

Quing: modis habetur diuersitas oleorum. Quædam, n. olea sunt per expressionem ut oliuarum & amygdalarum: Quædam per impressionem ut oleum camomillæ & de absinthio. Quædam per resolutionem ut oleum ouorum, & frumenti. Quædam per sublimationem ut oleum philosophorum: uel de lateribus. Quædam uero per emanationem ut oleum balsami.

Et iterum oleorum triplex est diuersitas. Quædam, n. sunt frigida ut rosata, uiolata. Quædam temperata, ut amygdalarum dulcium recēs, eo quia elapso mense rancescit, et sic sua temperies perditur, & calidum fit, ideo dixi recens. Et quædam calida ut rutacea, colinum, et uulpinum. Olea frigida quanto recentiora tanto meliora, et cum transeunt tres menses uirtus ipsorum perditur et calida sunt. Temperata uero usque ad sex menses sunt in sua bonitate. Calida uero seu calefacientia quanto antiquiora, tanto meliora etc.

OLEVM saluiz magistrale. Cuius permixtio hæc est. R. Foliorum saluiz. Succis eius 3. iiii. olei oliuarum li. iiii. Et facias prout in oleo rutæ, menthæ, et absinthii tibi ostensum est, de decoctione, expositione ad solem, et trina permutatione succi et herbarum.

Modo hoc potes facere ex omnibus herbis oleum, et illud oleum habet uirtutem illius herbarum. Sed fieri debent olea ex herbis in mense Maii, ut in pluribus, eo quia tunc maiori uirtute nigent.

OLEVM de euphorbio Mef. et est medicina solenis ad ægritudines nervorum frigidas, et dolori coru, et dolori iuncturarum, et dolori hepatis, et splenis. Et fit caput purgum ex eo ad sodam, hemigraniam, et lythargiam, quod ita fit.

R. Euphorbii 3. s. Olei de Keiri 3. v. Vini odoriferi tantumdem, decoque usque ad uini consumptionem et utere.

Alius modus est faciendi dictum oleum.

R. Staphilagris. Condian. 3. iiii. pyrethri 3. vi. Calameti montani sicci 3. xii. Costi 3. x. Caliborei 3. v. Tere et decoque in uale uirtute uini odoriferi. lib. iiii. s.

Postquam infuse fuerint in eo diebus duobus usque ad medium vini.

uini. Deinde manibus fricatione uehementi cola: & funde super ipsum olei de keir: aut olei scissimini. lib. i. s. Et decoq; uique ad consumptionem uini. Deinde proice super ipsum Euphorbii recentis & albi 3. iiii. triti contritione ultima: & coquatur cum eo.

De conditi est species ellebori albi.

O L E V M de femine lini Mef. confert ad spasmi & lenit duritiam ueruorum, & iuncturatum, & est medicina magna ægritudinibus anisicis sunt apostemata, & hæmorrhoidæ, & rhagadiæ, & dolori pulsatiui. Et modus operatiouis eius est sicut olei scissimini præterquam non oportet ut exoriantur femina lini.

O L E V M de cucurbita Mefue ualet ad inflammationes, sedat ubicunque sint, & lenit asperitates etiam pectoris & pulmonis, & sedat apostemata calida & pleuresim. Cuius permixtio.

R. Succus rasuræ tenerrimæ cucurbitæ. Florii eius. an. 3. iiii.

Olei oliuorum incompletarum. lib. iiii. Tria hæc reponantur in uase uitreo, & facias prout ostendi tibi in oleo menthæ, abinthii, tam de decoctione quam expositione ad solē, permutatione succi, & rasuræ.

Olea omnia frigida perfectiora sunt cum oleo incopleto quam cum completo, si aut cum completo sunt lauari debent cum aqua fontis bis, uel ter, calida uero olea fieri debent cum oleo completo absq; lotionē.

Potest etiam fieri oleū ex femine cucurbitæ per exprefsiōem, quemadmodum fieri alia olea ex feminibus, & erit superiori temperati, & naturæ magis conformis.

O L E V M de floribus papaueris Mef. sedat dolores calidos, & facit somnum. Cuius permixtio.

R. Flores folia & capita papaueris uiridia confusa. 3. iiii. Oleum oliuorum incompletarum. lib. i.

Reponantur duo hæc in uase uitreo, & obterretur uas fissis, & soli exponantur per dies. vii. deinde bulliant in duplici uase per horas tres, postea coletur manibus fortiter exprimendo, & hoc fiat bis semper noua folia, capita, & flores innouando, stando; ad solem, & bulliendū ad ignem ut supra. Tertio uero colaturæ adde suprascriptam quantitatem foliorum florum &c. confusus ut supra. Et his addas aquæ in fusos papaueris lib. i. Et stringe orificium uasis, & expone soli per dies. xl. deinde cola manibus exprimendo: & iterū in dicto uase reponatur: & soli exponatur: & ibi permittantur usq; ad consumptionem aquæ.

Istud oleū fieri etiam potest ex solo semine per exprefsiōem, ut fit oleum amygdalarum & seminum.

Infusio papaueris fit ut infusio uiolarum: excepto q̄ in illosolū flores accipimus: in isto uero flores, folia, & capita omnium 3. iiii. & cōfrangantur in reliquis fit ut illa &c.

O L E V M de iunipero Mef. confert infectionibus cutis: & malo mortuo tibiariū: & serpigini: & cancro: & uulneri bus malis. Et modus faciendi talis est.

R. Lignorū eius quantitatē sufficientē: & scinde in frusta: & imple ex eis doliū magnū uitreatū interius cuius orificiū sit arcum, & fac foueam in terra, & præpara parietes eius cum terra figuli. Deinde pone ollam uitreatam ex directo in fundo foueæ habentē orificium amplū: & cooperiatur lamina ferrea subtili perforata foraminibus multis sicut cribratorium tritici: ita lamina undiq; ollæ orificiū cooperiat. Deinde super lamina præparatur orificiū doli, ex inuerso: & præparetur cum terra figuli, ut nihil ex utriq; orificiis respiret. Post illud accende ignem super totum corpus doli & dimitte ardere sic per horas. ii. manabit enim ex arte hæc oleum quo redeo: & administra ubi oportet.

V L V I S cordialis dulcis Magistralis. Inuamentum magnum ad ægritudines cerebri, cordis, stomachi, & hepatis: & lætificat cor: & nos fuimus experti: & ualet ad tremorem cordis: & syncope: & quando quis tristet: & nescit radicem: & facit oris odorem bonum. Cuius permixtio.

R. Fragmentorū cordialiu Smeraldorum,
Communium scilicet. Rubinorum. an. 3. ii.
Zaphirotorum. Rasuræ cornu cer.

Seminis acetosæ. an. 3. ii.
Margaritarum. 3. i.
Et sunt aliqui qui ponunt Granatarum,
Hyacinthorum. an. 3. ii.
Corallorum rubeorum,
Corallorum alborum,
Rasuræ eboris. an. 3. iii.

In hac compositione zuchcharum apponitur duplici causa. Primo ut fit magis gustui delectabilis. Secundo ut citius a natura attrahatur.

Præscripta autem quæ cor confortent uel ratione nutrimenti uel qualitate uel occulta proprietate: in quæ meam de remouentibus uenenositatem & malitiam narcoticorum a membris principalibus subtiliter excusis quantum uero ad locum istum pertineat. dico quod agunt, & ratione qualitatibus, & ratione proprietatibus occultis: & hoc magis.

P V L V I S contra uermem magistralis amarus est.
R. Cornu cerui uisti. Seminis portulacæ. an. 3. iiii.
Granelle præparatæ. i. Herbz ianuz.
Diptami,
Myrrhæ,
Tomentillæ,
Seminis caulium,
Seminis acetosæ,
Seminis coriandrorum præparatorum.

Granelle hoc modo præparatur mundetur ab omni immunditia, & super eam proficiatur acetum quo cooperiatur: & omni die acetum permuetur: & hoc fiat per dies nouem: deinde extrahatur ab aceto, & super asidem dilatetur & permittatur in umbra exiccari.

P V L V I S pro bocio Montagnanæ exiccans multum.

R. Auellanaum, Nucis muscatæ,
Spongiz combustæ, Gallarum.
Ballæ marinæ combustæ, Aristolochiæ longæ,
Chartæ combustæ, Cinnamomi,
Osisi sepiz, Ellebori albi,
Seminis plantaginis, Ellebori nigri,
ana. 3. iiii. ana. 3. ii.
Trium piperum, Limaturæ acis præparatæ,
Zinziberis, Cineris corticum ouorum,
Salis gemmæ, ana. 3. s.

Lapidis pumicis. an. 3. ii.

Conterantur subtilissime, & detur omni die 3. i. cū aqua saluæ per duas horas ante cibos, optimum effectum.

Spongia hoc modo comburitur. primo bene lauetur & purget a lapidibus interioribus: deinde in furno temperato exiccetur: deinde comburatur. Et cognoscitur eius combustio quando omnis eius pars puluerizari potest: & hoc modo comburitur etiam charta. causa quare duo hæc comburuntur est, ut sint magis corrosiua & penetratiua.

Modus incinerandi cortices ouorum positus est supra in electuario de cineribus.

Limatura uero acis præparatur eo modo quo scoriam ferri ut in electuario de scoriam fieri ostenditur.

P V L V I S Ducis: siue puluis pro stomacho magistralis, ualet ad confortandum stomachum, & ad calefaciendum.

R. Cinnamomi subtilis Cardamomi. i. maioris & minoris,
& electi. 3. ii. Cubezæ,
Galangæ, Piperis longi,
ana. 3. i. ana. 3. i.
Gatyophyllorum, Zuchchari albi. 3. vi.
Nucis muscatæ. an. 3. i.

Misce & fiat puluis pistando prius species: deinde zuchcharum.

Ad faciendam compositionem hanc bonam pro omni drach. i. specierum apponi debet 3. i. zuchchari si perfecta et bona esse debet.

P V L V I S senæ montagnanæ in suo antidotario.

The. arom.

AA

R. Folliculorum sanz. 3. i. s. Cinnamomi,
Zingiberis, Tartari. an. 3. i. i.
Macis. an. 3. i. i.
Terantur omnia satis grosso modo. & dosi eius est. 3. i.
Folliculi ponendi sunt in hac compositi one : quia sunt
melioris totius plantæ magisquam solutiui in foliis uero
uirtus est debilis ualde. &c.

P V L V I S senæ magis solutiui magistralis.
R. Folliculorum senæ. 3. ix. Cinnamomi. 3. i. s.
Tartari. 3. i. i. Salis indi. 3. i. i. i.
Macis. 3. i. i. Diagrydii 3. s.
Terantur oia satis grosso mō & fiat puluis & dos. est. 3. s.
Tartarum quod apponi debet in hac cōpositione est tar-
tarum uini albi: eo quia magis solutiui est et penetratiuum
quam tartarum uini nigri.

P V L V I S pro epichemate cordiali magistralis : & ego
eum fieri facio.

R. Florum buglossæ. Seminis acetosæ,
Florum boraginis. Ligni aloes,
Florum melissæ. an. m. s. Garyophyllorum. an. 3. i. s.
Sandalorum omnium. Croci. 3. s.
Rosarum rubearū. an. 3. ii. Margaritarum. 3. s.
Doronici. Musci. gra. i. i. i.
Been albi & rubei. Camphoræ. gra. vi.
Karabæ. Fragmētorum preciosorum
Osis de corde cerui. omnium. 3. i.
an. 3. i. i. i. Corali utriusq.
Corticum citri. 3. i. s. Spodii. an. 3. s.

Conteratur oia p se deinde miscantur & vsui referuntur.
Flores omnes in umbra exsiccati debent : Nam si in sole
exsiccentur pars ipsorum deperderetur. sol enim resoluūt
partes subtilis & uaporosas.

Apparet quibusdam extraneum q in hac compōne frigi-
da: & quæ ad infrigidandum facta est crocus apponatur: sed
hoc factū est ut dirigat uirtute aliarū medicinarum ad cor.
& sic instruit Auic. fen. quarta prim. cap. 2.

P V L V I S pro sacculo cordis magistralis sic fit.
R. Florum boraginis. 3. s. Boli armeni. an. 3. i.
Florum buglossæ. 3. s. Corallorum rubearum,
Osis de corde cerui. 3. i. Seminis acetosæ,
Florum melissæ. ana. 3. s. Corticum citri. an. 3. s.
Rosarum rubearum. 3. ii. Ligni aloes.
Florum camemillæ. Spodii. ana. 3. ii.
Florum anthos. i. florum ros. Croci,
marini. an. 3. i. s. Sæz crudæ. an. gra. x.
Sandalorum omnium, Camphoræ. 3. s.
Been albi & rubei,

Misce & oia grosso mō puluerizētur & vsui referuntur.

Duz præscriptæ compositiones specierum sunt terendæ
grosso modo: & per cribrum medicinarum transeundæ, ut
commodius possint in sacculis stare: ac ut uirtus ipsarum lo-
gion tempore duret. & sic finis imponitur.

De pulueribus fuit opinio quorundam q uirtus earū du-
raret usque ad sex menses. Sed huic opinioni ego non adhæ-
reo: eo quia in spatio sex mensū uirtutes puluerum resoluūt
tur & efficiuntur debiles. Igitur dicas q per duos menses
conseruantur in bonitate suæ: non plus.

P V L V I S pro sacculo capitis magistralis.

R. Florum canemillæ. M. s.

Stoechados, Cubebarum,
Maioranz. aua. M. s. Nucis muscatæ,
Macis, Corticum citri.
Malticis. ana. 3. i. Rosarum. an. 3. i.
Corallorum rubearū. 3. i. Salis usti. 3. i. i. i.

Conteratur hæc & in pecia ponantur : & capiti approxi-
mentur.

Quantitas superscriptarum & infrascriptarum specierū
in sacculis apponenda est. 3. i. pro singulo uel 3. i. s. ad plus.
Forma sacculi capitis debet esse quadrata ad latitudinem
palmarum manus. Sacculus uero pro corde debet habere for-
mam cordis &c.

P V L V I S restrictiui magistralis.

R. Boli armeni lib. i. Thuris 3. i.
Myrryllorum. 3. vi. Rosarum rubearum,
Sanguinis draconis. 3. i. i. Balaustriarum. ana. 3. ii.
Malticis 3. i.

Conterantur subtiliter & vsui referuntur.

Omnes species puluerum in hac summa supra descripta
subtiliter sunt conterendæ : & per spissum sedacium sunt
transeundæ. &c.

P V L V I S pro mingentibus in lecto Montagnanz effi-
cax multum.

R. Stomachorum gallinarum Agrimonæ 3. i.
preparatorum. 3. i. i. i. Cineris ericii cōbusti. 3. i. i. i.

Conterantur omnia & detur patienti 3. i. cum paucio ui-
no uel brodii quando uadit dormitum.

Stomachi gallinarū hoc modo præparatur. Accipe aquā
capituli calidā in lisciiui quantitate cōuenientem, & in-
fundas stomachos gallinarum uel caponū pro horam po-
stea ablue duabus uel tribus uicibus: deinde abiecto lisciiui
infunde in uino uermiglio: & sicut fecisti de lisciiui, simili-
ter fac abluitionem in uino. Et etiam in aqua de nouo infun-
de aquam ut supra. Et postea in uino mutando ut de alben-
tur: portentur in furno a quo nouiter panis fuerit extractus
& permittantur exsiccare & referuntur vsui &c.

Eriicus comburitur eo mō quo lepus comburitur: & mo-
dus combustionis positus est in electuario de cineribus.

P V L V I S pro bombardis & schiopetris.

R. Salis nitri. 3. i. i. i. Carbones salicis. 3. i.
Sulphuris. 3. i. i.

Pitentur omnia subtiliter: & fiat puluis.

P V L V I S pro implendo dactylo s pro mulieribus gra-
uidis pro comedendo.

R. Malticis electi, Myrryllorum,
Thuris albi. an. 3. i. s. Boli armeni,
Sanguinis draconis fini. 3. s. Granæ electæ. ana. 3. s.

Pitentur omnia & ponantur. 3. i. i. superscriptarum specie-
rum pro singulo dactylo abiecto osse interiori : & inuoluat-
ur in papyro: & simphecur cum uino uermiglio : & ponat-
ur ad calefaciendum subter bernices calidas: & detur mul-
ieribus dubitantibus dispendere & bonum est.

P A S T O R V M pro philomenis sic fit.

R. Farinz cicerum fractorū grosso modo 3. i. Amygdalarū
mundatarum. 3. vi. & simul bene incorporentur & pitetur :
deinde accipe butyri recentis. 3. i. i. & pone in captia & li-
quesfac : & postea adde croci. 3. i. i. i. & misce omnia simul in
captia & pone super ignem semper agitando cum spatula
& nō detrahas ab igne donec erit siccum paruum, & postea
pone ad cribellum ut totum transeat: & si non uult transire
ite r residuum pone ad ignem ad exiccandum donec exeat
totum de cribro & serua.

P I L V L A R alphanginz Mef. & interpretantur pilulæ
de aromatibus ex inuentione nostra: ualent ad dolorem sto-
machi propter phlegma ipsum: & sunt uehementis iuuamē-
ti in mundificando stomachum, & cerchū, & humores gros-
sos, & instrumenta sensum, stomachum uero confortant &
digestionem procurant.

R. Cinnamomi electi, Nucis muscatæ,
Cubebæ, Cardamomi maioris &
Ligni aloes, Calami aromatici, minoris,
Macis. ana. 3. viii. Garyophyllorum,
Malticis, Asfari. ana. 3. viii.
Squinant, Carpopalsami. 3. viii.
Spicæ. ana. 3. viii. Absinthii sicci,
Rosarū rubearum. an. 3. v.

Terantur hæc oia contritione grossa, et infundantur sup
ea aquæ lib. xii. et coquantur usq; ad consumptionē duarum
partū, deinde fricent manibus, et colent, exprimēdo. aquo
sitate eius: postea accipe aloes succotini lib. i. et lauet in
scutella lapidea utreaque lauatiōibus pluribus cū aqua plu-
uiali: postea remota aqua proiciantur super eū de prædicta
decotione lib. ii. et ponatur in sole et permittatur desicca-
ri oī die cū spatula agitando: deinde post ipsius exiccationē
conterantur subtiliter et puluerizentur et superponantur.

Myrrhe

Myrrhæ, Masticis. an. 3.v. Croci. 3.iii. Et æ permisce cum aloë loto, & post residuum decoctionis adde & soli expone omni die commiscendo cum spatula : & tunc permittatur stare q̃ exiccetur & serua. dosi est. 3. i. ufq; ad aur. i.

Istæ pilulæ non possunt confici nisi feli in anno scilicet pilulæ alephanginæ in aestate. feli in mense Iunii uel mense Iulii, & sic tantum ista species pilularum per annum conserua tur in sua uirtute & non plus.

Magna diuersitas reperitur in Mes. de dosi rosarum & ab finthii, quidam ponunt an. 3.v. quidam uero. 3.v. & ista lites a uerior & melior est. nam rosæ ponitur ut expellant ma licia caliditatis aloës a stomacho & capite. abfinthium uero ut aggreget sua stipticitate partes laxatas ab aloë. quare 3.v. est dosi quæ in dicta recepta apponi debet.

Aloës lauatur cum aqua pluuiali propter hanc causam, quia illa subtilior est quam cõmunis: id eoq; magis penetrat per omnes partes aloës quam possit communis facere pro pter grossiciem suæ substantiæ:quare cum illa lauatur.

Aloës lauatur hoc modo. Accipe de aloë succotrinò mû do, q̃ cito frangatur, & boni feli odoris quantitatem quam uolueris, bene teratur, & cribelletur: deinde proiciatur in scutella lapidea uitreata & roretur. aloës ex aqua pluuiali donec imbibatur ab æ per totum: hanc soli exponatur, & exiccare permittatur ab illa aqua. Et cum deficcatum fuerit iterum teratur & secundo iterum imbibatur ex aqua pluuiali, & dimitte siccare sicut prius, & iterato hoc facias, & tertio usquequo aqua omnes partes eius penetrauerit, & hoc modo aloës erit lotus, nec alio modo lauari debet.

Pilulæ masticinæ Petri de Ebano super additionibus factis Mes. cap. de medicinis appetitus corrupti in fine capituli prescribitur stomachi ab omni læsione intrinseca nec permittunt humores putrefieri in eo: immo abstergerit, & mûdicat rugas, & parietes, & qui assiduæ uisum earum diebus singulis permanebit illarum a doloribus stomachi, nec a doloribus capitis uexabitur unquam, & nihil est oculis mihi crede salubrius istis, & qui tristantur subueniunt, & est medicina matricis uiscosæ, & uiscerum interiorum.

R. Masticis. 3.iiii. Agarici albi. 3.iii. Aloës electi. 3.x. Misce & fiant pilulæ cû succo altitiz. i. succo artemisiz, & potest etiam reformari cû syrupo de stœchado. s. dosi est pilulæ. ii. uel. iii. quâdo uadit dormitum, & potest recipi secundum mentem uoluntatum usq; ad. xxi. au. 3. i. uel. ii.

De altitia, aut altimilia, q̃ id est, o quanta differentia reperitur in hac maxime ab ignorantibus aromataris. Quid dñt, q̃ altitia est uini, uel sapa, uel rob. falsum est, si Cõciliator diceret conficiantur cû tili esset uinũ coctum, sed ait cû succo altitiz. i. artemisiz. nã istud uocabulũ egomet audiui in Hispania, & dicit altimilia. i. artemisia. Auic. in. 5. can. in cyriaca Eldre inquit sicci altitiz: & est albelengesi. & dicitur abrotanũ syluestre. ergo est artemisia. nam albelengesi apud Galenum in. vi. simplicium est artemisia. Præterea Cõciliator feli Petrus de Ebã dicit, q̃ copositio hæc pilulari est medicina matricis uitiosæ, & uiscerũ interiorũ prout su pra scripsi. ergo artemisia ad id mirabiliter ualet, & sic est, q̃ altitia est mater herbarum, siue artemisia. Et loco eius potest poni syrupo de stœcados, ut supra dictum est.

Pilulæ aureæ Nico. ab excellentia auri. sicut. n. aurum inter alia metalla præciosissimũ habetur, sic pilulæ istæ inter alias meliores approbant, purgât caput, acuiunt uisum & aurũ auditũ, & cõferunt uetustati stomachi, & intestinorũ, & cõferunt colicę, & purgant sine molestia, & sunt in usu.

R. Aloës electi, Seminis fœniculi. 3. i. s.

Diagrydii. an. 3. v. Croci, Coloquintidæ interioris,

Rosarum rubearum, Masticis an. 3. i. s.

Seminis apii. an. 3. i. s.

Seminis anisi. an. 3. i. s.

Puluerizentur non multum subtiliter, & formentur pilulæ cum aqua infusionis dragacanthi.

De colloquintida inter doctores & discordia: multi ponũt q̃ reperit interioris colloquintidæ, & femina; & pulpã ut uult Circumstantis, & male faciũt. alii uero ponũt pulpam si

ne semine, ut alii omnes scribunt doctores, & isti melius faciunt, & sic communiter ab omnibus ponitur, ut Seruitor de modo præparandi ponit, & sic Mes. in descriptione trochiscorum alandal iubet illam a granis mundari.

Pilulæ de quatuor rebus secundum Franciscum de Pedemontium in cap. de dolore intestinorum, & medicinis eius, & sunt expertissimæ.

R. Coloquintidæ, loco Serapini. an. 3. ii.

eius trochiscorũ alandal. Salis gemmæ,

Diagrydii. an. 3. ii.

Terantur & conficiantur cû succo porri: istæ pilulæ non sunt in usu apud nos, dicuntur aut̃ secus facerentur si eis potueretur: zingiber. n. per mixtum cum turbi fortificat ipsius solutionem, & facit, q̃ a longinquo attrahat.

Pilulæ turbithatæ, & dñr aureæ Mes. & sunt primæ, choleram, & phlegma sine molestia purgant, stomachum, & hepã confortant, & digestionem procurant.

R. Turbith albi, & boni, Masticis. 3. vii.

3. xvi. Rosarum. 3. vii.

Aloës. 3. xii. Croci. 3. iii.

Puluerizentur, & conficiantur cum succo abfinthii. In istis pilulis non ponitur zingiber, & hoc est ut debilio res sint, & a longe non trahant qđ secus facerent si in eis potueretur: zingiber. n. per mixtum cum turbi fortificat ipsius solutionem, & facit, q̃ a longinquo attrahat.

Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione nostra Mes. quæ sunt in usu contingentes aggregationem expertorum iuuamentorum ad febres antiquas, & ad febres diuersitatis, & ad ægri tudines capitis stomachi, & hepatis, & educunt putrefactiones utriusq; cholera & phlegma: & mûdicant instrumenta sensum, & sunt mûdicatium bonum:

R. Myrobalanorum citrin. Polipodii. 3. ii.

Raued feli. an. 3. iii. Turbith,

Succi cupatorii, Aloës. an. 3. vi.

Succi abfinthii. an. 3. ii. Masticis,

Diagrydii. 3. vi. Rosarum rubearum,

Myrobalano. Kebuturum. Salis gemmæ,

Myroba. indorum, Epithymi,

Agarici albi, Anisi,

Coloquint. interioris. an. 3. ii. Zingiberis. an. 3. i.

Misce & reformentur cum electuario rosato Mes. omnibus prius puluerizatis. dosi est 3. i. ufq; ad 3. i. s.

Nota q̃ succi intrantes in istis, & alii pilulis seu confessionibus hoc modo sunt. Accipitur abfinthium, & bene conteratur: deinde in pecia rara inuolutur, & postea cum torculari exprimitur, & abq; alia colatura in uesica ponatur, & soli ad exiccandũ permittatur. si. n. a parte grossa colaretur, in uesica nihil remaneret, eo quia pars aquæ a sole consumeretur, & ut de abfinthio dico: ita & de aliis omnibus herbis intelligatur, & per annum conseruatur.

Nota q̃ istæ pilulæ, & pilulæ de hermodactylis minores, & de hermodactylis ex inuentione nostra Mes. reformentur cum electuario rosato Mes. & nō cum electuario de succo rosarum sicut faciunt quidam ignari aromatarii, qui reformant cum superscripto electuario de succo rosarum, & hoc propter auaritiam.

Nota insuper, quod si simpliciter scriptum reperies pilularum aggregatarum, de istis superscriptis est intelligendum, & non de aliis.

Pilulæ de fumoterræ. Auic. lib. 4. Fen. 7. capitulo de scabiei cura. purgant materias adultas, & conferunt scabiei. Cuius permixtio.

R. Myrobalanorum citrinorum.

Myrobalanorum indorum. ana. 3. v.

Scamonea. 3. v.

Aloës succotri. 3. vii.

Puluerizentur oia nō multũ subtiliter. Et confice cû succo fumiterræ depurato, aut cû aqua fumiterræ irrorando ea & dimittatur ad solē donec exiccetur, & imbibatur uice al tera & dimittatur donec exiccetur, & fiat illud tribus uicibus & in oī uice fiat ficut forbitio: deinde dimittatur donec inspissetur, & cum factum fuerit fiant inde pilulæ.

Hic intelligendũ est, & in oibus aliis locis in quibus scri

buntur myrobalaani, quòd solum cortices amotis ofisibus accipi debent myrobalaani.

Modus faciendi supra scriptas pilulas uidetur obfcurus, sed hoc modo fieri debet. Terant pferipta in eis: deinde irrorentur succo fumiterre cocto, et depurato, aut aqua fumiterre, in tñs, q' oēs partes ipsarum penetrent: deinde in sole ad exiccandam ponantur, & ante perfctā exiccationē, sed post aliqualem suctionē iterū aqua fumiterre irrorent, & soli exponantur, et hoc ter fiat, ultimo in sole exponantur, & tantum permittantur, donec pilularum formam accipere possint: deinde remoueantur, & conseruentur.

PILVLAE de mezeon Mesie, et sunt medicina mirabilis ad hidropisim, et educunt aquam citrinam, & sunt experte. Cuius permixtio.

R. Foliorum mezeon preparatorum. 3. v.

Myrobalarum citrinorum. 3. iiii.

Myrobalarum Kebuturum. 3. iiii.

Misce & puluerizentur oia non multum subtiliter, et cōfice cum aqua endiuiz in qua dissoluti sunt tamarindi, et terebinthin. an. 3. i. et fiant, dosis est 3. i. s. Mezeon pparatur hoc modo. Infundatur in fortissimo aceto, et per diem dimittatur, et excicari pmittatur: deinde cōteratur, & admixtoretur, hoc. n. modo pparatur, ut serofitas, et inflāmatio q̄ in eo est amoueatur, parum. n. fustinent de decoctione, & laboriosa contritio uirtutem eius destruit, & resoluit.

PILVLAE de hiera simplici Galeni. 2. terapeuticę. cap. 12. ualeat ad uniuersas passiones capitis aurium & oculorum, stomachum, & splen purgant.

R. Specierū hierę simplicis Galeni. 3. iiii. Et cōficiantur cum melle rosato & fiant. Nec aliud est addendum, nec diminuendum, & hoc modo Galenus describit loco allegato.

Necessitas compositionis pilularum fuit: quia medici uolētes dare suam medicinā in forma in qua diu moretur in stomacho oportuit eas aptare in forma pilularum, cum solidum magis in stomacho stet, quanqueq; alia forma.

PILVLAE de hiera cōposita, siue de hiera cū agarico magis grales, et ualeat ad dolorē capitis: pectus mūdificat et humores, grossos, & putridos, & cōferūt asthma, et tussi antiq̄.

R. Specierum hierę simplicis Galeni.

Agarici trochiscati. an. 3. iiii.

Aloes boni puluerizati. 3. viii.

Misce, & cum melle rosato fiant pilule.

In hoc libello notādū est, q' in aliquibus descriptionibus, & cōponibus reperit terantur, & in aliquibus contemantur: idē differentia est inter tero & cōtero. Terere. n. idē est q' rem aliquā diuidere per partes grossas. Contemere uero idē est quod rē diuidere per partes subtilissimas: imo qū intendo species subtilissimē teri debere, scribo, & dico cōterantur. Quando uero uolo, quòd grosso modo puluerizentur, dico, & scribo terantur. quare & in supra scriptis, & in infra scriptis compositionibus ad hoc aduertatur.

PILVLAE de hiera magna Galeni, ualeat ad diuersas capitis passiones, aurium, & oculorum, et stomachum optime purgant, & causas hepatis, et splenis duritiem molliunt, & extenuant, uescique proficiunt.

R. Cinnamomi fini, Squinanti,
Rosarum rubearum, Radicum assari,
Spicę, Mastitis, Violarum,
Xylbalsami, Epithymi,
Carpobalsami, Agarici albi,
Cassię lignę, Turbith albi,
Abstinii, Colloquintidę, an. 3. i.
Croci, an. 3. i. Aloes boni 3. ii.

Puluerizentur omnia non multum subtiliter, & fiant pilule cum uino, aut cum melle rosato.

PILVLAE fortidę maiores Mesie de mente Gal. experiorum iuuamentorum ad ægitudines omnes neruorū quę sunt a materia grossa uiscosa difficilis eradicationis, & ad dolores inuētarum qui sunt ab eadem causā, & omnes dolores totius corporis quam eidem habent naturam, similiter, & ad uertiginem, & ad epilepsiam, & hemicraniam difficilem, & fodam, & morpheam, & albaras, & lepram.

R. Serapini, Armoniaci, Opoponaci, Bdelli, Colloquintidę, Hermeli. i. semen cicutę, Aloes, Epithymi. ana. 3. v. Alsebram. i. xula, & colligitur in mense Octo. Terantur omnia, & gumme dissoluantur in aqua porri, & fiant pilule.

Nota de mente authoris pandectarū: q' harmel scriptū per h. idem significat quod semen cicutę, quando uero per a. idē est quod semen rutę. Ex hoc igitur intelligas, q' diuersus modus scribendi diuersificat nomen uocabuli, quare semper respiciendę sunt literę, & syllabę uocabulorum ponentes in medicina scriptum, eo quod uariatur secundum uarietatem compositionis literarū, quare bene nota.

PILVLAE fortidę minores Mesie. quę sunt in potestate maiorum.

R. Serapini, Armoniaci, Opoponaci, Bdellii. an. drac. v. Dissoluantur gumme in aqua porri, & cetera terantur, & cum ea conseruantur.

Vñ gñale hic nota, et incidenter. Qd illud quod de natura sua est aromaticū: quāto ē aromaticius tāto melius, & qd est fortidū q̄to fortidius tāto melius, excepto aloē. Sifr oē qd dēt hēre aliquē sapore, q̄to in suo sapore ē intensius tāto melius: excepto aloē. Nā cū sit de natura rerū amaritudo nem habentium: quanto minus amarum, tanto laudabilius.

Gumme dissoluant in aqua porri uel in aceto, ut in aliquo alio liquore hoc mō. Infundant in aqua, uel aceto p noctem, & debet acetū, uel aqua esse in tanta copia, q' eas tēgat. In mane, si gumme totam biberint aquā, uel acetū, & durę sint, adiungat ipsorū alterū, postea accipias eas, et fricabis manibus super sedaciū: qua fricatione bona transibit substantia, palez uero, & immunditię remanebunt, & tunc uere.

PILVLAE de sarcocolla Mesie in cap. de sarcocolla: & in antidota. & sunt pilule aliz educētes phlegma, & conseruant ad ægitudines phlegmaticas. Cuius pmixtio hęc est. R. Sarcocollę prepar. 3. iiii. Zingibegis drac. i. s. Turbith albi. drac. iii. Salis gemme, drac. i. Colognidę interioris. 3. i. s. Dissolue sarcocollā in aqua rosata, cetera terantur, & cum ea fiat massa.

Sarcocolla hoc modo pparatur. Infundatur in lactē asinę per dies quinque semper, & omni die lac innouando, & primum abiciendo, demum dissoluatur in aqua rosata ut in superioribus pilulis tibi monstrauit.

PILVLAE de bdellio maiores Mesie. expertę ad fluxum hemorrhoidarum, & ulcerum in eis, & ad fluxum mēstruorum. Cuius permixtio.

R. Bdellii. 3. i. s. an. drac. i. s. Seminis ameos, drac. iiii. Myrobalarorū emblicorum. Myrobalarum Kebuturū, Venarum adustarum. i. radix Myrobalo. indorum, acori adusti, Myrobalo. bellericorum, Karabę. an. 3. i. s. i.

Infundatur bdellium in succo porri, cetera terantur, & cum eo fiat massa, & dentur pilule in modum ciceris.

De porro nota, q' quoddā est porrum capitātū. trāplantatū, & esui illud cōpetit. Aliud est fessile. nō transplantatū, & istud usui medicinę cōpetit. Igitur de isto fit succus de quouis pilulę reformantur, & ex his etiam fiat aqua, uel per sublimationem, uel per decoctionem, & iste ultimus modus magis mihi placet de qua reformentur, & dissoluantur gumme intra ntes in pilulis fessidis, quare nota.

Diuersitas magna reperit in receptis harū pilularū fere oēs Mesie. dicit uenarum adustarū. Et hanc literam reprobat Math. Syl. in synonimis ponitur sub ca. 690. dicens. q' ē er ror scriptoris: et q' debet dicere anellanarum adustarū. Sed salua semp eius pace in errore eis sed dēt dicere uenarū adustarū.

adustarum, ut a quodam antiquissimo Mef. scriptum reperi. Et q. sic dicere debeat, patet eo quia ueneriz. i. acorus f. radix quæ radix supra aliquem est portata illi cõferuat a fluxu sanguinis, ut ipse, ponit ca. 181. quare se ipsum corrigit.

Radix acori hoc mō aduritur, post ipsam exiccationem per grossa fatis frusta incidit: deinde super laminā ferream, ignita incessanter agitur, & reuoluit quousq. color eius de toto mutetur, & tunc remoueat, quia adusta est.

P. I. L. V. L. A. E. lucis maiores Mef. addunt in usu, & corroborant eum, & auditum, & abstergeunt instrumenta sensui, & expellunt superfluitates, & custodiunt sanitatem totius corporis, & præfunt super eis absq. necessitate abstinenti cuius permixtio hæc est.

R. Rosarum rubearum, Cinnamomi,
Violarum, Anisi,
Abinthii, Seminis foeniculi,
Colloquintidæ, Seminis apii,
Turbit, Calsis ligæz,
Cubebæ, Croci,
Calami aromatici, Macis an. 3. ii.
Nucis muscatæ, Myrobalanorum citrinorum,
Spicæ, Myrobalano. kebulorum,
Epithymi, Myrobalano. indorum,
Carpobalsami, idest lignum Myrobalano. bellitricorum,
balsami, Myrobalanorum emblico.
Sileris montani, Raudeseni, idest rheubarbar.
Seminis rutæ, ana 3. iiiii.
Squinanti, Agricci,
Assari, Senæ an. 3. v.
Masticis, Euphrasiz. 3. vii.
Garyophyllorum, an. 3. ii.

Aloes succotrinæ ad pondus omnium, terantur omnia, & conficiantur cum succo foeniculi, & fiat massa. dosis est a 3. ii. usq. ad drach. iiii.

De colloquintida pauca sunt qui in receptis ponant colloquintidam, fundant se super dictum Mef. in descriptione trochiscorū alandali, qui dicit Trochisci alandali: quos ponuntur in hiera Hermetis, & in aliis cõfectionibus loco colloquintidæ: & pp. suam uenofositatem dicunt non esse ausi in receptis ponere. Alii uero ponunt colloquintidam, & nō trochiscos alandali, dicentes, q. magis solutiuæ est, q. a doctoribus ponit in cõpõnibus tantum calcar, ut et faciunt diatriam, & sic his rōnibus uarij uarias cõpõnes faciunt. Ego uero soleo hoc fieri facere, si in receptis authorē reperi, considero si in eis ipsi malitiam frangentes sunt posita, uel nō si sic audacter illam apponi facio, ut in ista recepta. Si non: loco ipsius pono trochiscos alandali, & hoc est quod dicit bonus Mef. & propter hoc in hiera Hermetis posuit in qua multæ, & multæ sunt medicinz uenofosæ, & paucæ earum uenofositatem corrigentes, & tu hoc considera bene.

P. I. L. V. L. A. E. de hermodactylis maiores Mef. expertæ ad dolorem iuncturarum, & podagra frigidæ.

R. Hermodactylorum, Calforei,
Aloes, Sarcocollæ,
Myrobalanorū citrinorum, Euphorbiæ,
Turbit, Opopanaci,
Colloquintidæ, Harmel. s. semen cicutz,
Bdelli, Seminis apii,
Serapini, an. 3. vi.
Croci. 3. i. s.

Conterantur omnia, & cum succo caulium fiat massa. dosis 3. in 3. ii.

Colloquintida antequam in cõpõne ponat debet vltimate conteritur: iubet Mef. in cap. de rectificatione medicinarum per trituracionem sic dicere. Oportet q. colloquintida ultime puluerizetur: nec fit contentus aliquis in trituracione eius.

De contritione iterū nota, q. duplex est, quedam n. est multa: quedam pauca: multa contritio fit duabus de causis. Prima ut per illā contritionem remoueat malitia medicinz quā cum faceret, si grossa esset: & ob hoc bene conteritur pulpa colloquintidæ. Secunda est, quia membrum quod curare uolumus est situm in remotis partibus, & immo bene conterendæ sunt, ut medicinz resū hepatis. Grossa uero contri-

tio fit duabus de causis. Vna est ne ultimata contritione virtus medicinz, & operatio eius propria corrumpatur, ut sca monest: in ultimo conteratur perdit uirtutem solutiua. Secunda est ut multo tempore remaneat in stomacho, & in uet digestione, uel magis attrahat, & sic medicinz stomachicæ, & solutiue grossi modo conteruntur.

P. I. L. V. L. A. E. de hermodactylis minores Mef. ualent ad podagram calidam. Cuius permixtio.

R. Hermodactylorum. 3. v. Rosarum rubearum. 3. ii.

Scamoneæ præparatæ. 3. ii. s. Aloes. 3. x.

Myrobalanorum citrinorum. 3. iiii. Conscice cum cathartico rosarum. 3. iiii. Conscice cum cathartico rosarum. 3. iiii.

Terendo prius terenda, & da 3. ii.

Catharticū. i. purgatiuū, ut doctores exponunt. igitur catharticum rosarum idē est quod purgatiuū factū cum succo rosari. Et sic electuarium de succo rosarum & electuariū rosarum dici potest catharticum rosarum, uerum ego magis laudo reformari debere cū electuario rosato: quia illud magis benignum est, & minori uenofositate participat.

P. I. L. V. L. A. E. de hermodactylis ex intentione nostra Mef.

R. Hermodactylorū. 3. v. Myrobalanorum citrinorum. 3. v.

Zingiberis. 3. ii. Turbit. an. 3. iiii.

Et fac pilulas cum electuario rosato: & da 3. ii.

P. I. L. V. L. A. E. de rheubarbaro Mef. cõferunt ad febres anti quas gnatas ex diuersis humoribus uiscosis, et putridis multarū putredinū, & dolorē hepatis, & principij hydrospis.

R. Raudeseni. idest rheubarbari. 3. iiii. Succu abinthii, ana. 3. i.

Masticis. 3. i. Seminis apii,

Myrobalano. citrino. 3. iiii. s. Trochiscorum diarhodon,

Succi liquiritæ, 3. iiii. s.

Specierum hieræ picræ. i. hieræ simplicis. 3. x.

Terantur terenda, & conficiantur in magdaleone cum aqua foeniculi, & da cum aqua caféi. 3. ii. in lero.

Pro reformatione pilularum nota, q. nisi pilulæ reformantur cum aliqua re uiscosa non possunt simul teneri, ut faciūt istæ pilulæ, et pilulæ cochæ quæ reformantur cum uino albo. Ideo si istæ reformantur cum syrupo acetoso, uel cum oxymelle simplici non esset inconueniens, & pilulæ cochæ cum melle rosato. Igitur ut dico de istis, & de aliis etiam in telligis quæ cum aqua uel uino reformantur &c.

P. I. L. V. L. A. E. Indæ Mef. scripsit Haly, quarum iuuamentum est multum ad ægritudines melancholicas, & cancrum, & lepram, & morpheam nigrā difficilem, & sunt bonæ melancholicæ, & timorē, et quartanæ, et ad dolorem splenis, & icteritiam splenalem. Cuius permixtio.

R. Myrobalanorum nigrorum indorum.

Ellebori nigri.

Polypodii. an. 3. v.

Epithymi.

Stochados. an. 3. vi.

Agarici.

Lapis lazuli loti, modus laplicis. 3. xii.

Terant, & fiat massa cum succo apii: dosis eius est an. 3. ii. usq. ad au. ii. & sunt sanæ, et expæ, et da eum aqua caféi.

Nota q. pilulæ omnes conseruantur cum bona earum uirtute & operatione usq. ad menses sex. Et debet teneri magdaleonibus, & non in pulgure, quia non conseruantur: immo nullam uel remissam faciunt operationem. Et non debent cõferuari in loco excessiue calido, nec prope ignem, nec ad solem, quia in excessiuam duritiem, & lapideitatem conuerterentur, et tunc nullo modo debent aromatari eas exhibere, eo quia si darentur corquent corpus, & nullam penitus operationem facerent.

P. I. L. V. L. A. E. sine quibus esse nolo Nico. pilulæ a rotunditate dñr, sine quibus esse nolo pp. magnā efficaciam q. habere dñr, superiores purgant humores: præcipue ualent ad catarractas oculorū, et obfcuritates eorum, caput purgant a cholera, et phlegmate, et melancholia, uisum confortant, et iliosos conserunt, aurium dolorem sanant. Cuius permixtio hæc est.

R. Aloes optimi ablu.
3.iii.
Myrobalano. citrino.
Myrobalano. Kebulorum.
Myrobalanorum bellerico-
rum, an. 3. i.
Myrobalanorū emblicorum, Agarici electi,
Myrobalanorum indorum, Cuscutæ, an. 3. i.

Rheubarbari, an. 3. i.
Rofarum,
Malticis, an. 3. i.
Abfinthii,
Violarum,
Folliculorum fenæ,

bus temporibus, sine molestia in uiris, & mulieribus pur-
gant. Cuius permixtio.

R. aloes electi. 3.iii. Affari, deest radicem,
Radicum brionæ, Rofarum rubearum,
Myrobalanorum omnium, an. 3.iii.
Malticis, Zingiberis. 3. i.
Diagrydii, an. 3.iii. Cafforei. 3.iii.
Milce, fiant pilulæ, cum succo foeniculi uel abfinthii.

Terantur omnia deinde accipe scamoneæ pparatæ subti-
liter puluerizatæ. 3. vi. s. ligetur scamonea in pecia: et infun-
datur in succo foeniculi quantitate qua pilulæ possint refor-
mari: deinde exprimat scamonea manibus: prius tñ inun-
ctis oleo uiolato uel communi, & tantum dicta scamonea
exprimatur & manibus ptractetur, q in lactis similitudinē
a panno exeat tota eius humiditas, et scamonea: et de illa
expresione pilulæ formētur abiciēdo quod intra peciā de
scamonea remanebit. Succū foeniculi cū expresione facta
de scamonea accipiendo, & pilulas formando.

Aloes quando simpliciter ponitur pro succotrino: & de
succotrino intelligitur ponit Matth. Syl. capitulo. pprio.
Pilulæ a pila dicuntur: quia sicut pila est rotunda: ita pi-
lulæ debent esse rotundæ.

Pilulæ quare dantur in forma rotundæ: est qia figura sphe-
rica non tangit planum nisi in puncto. Sed coccaum ipsum
tangit undiq; qñ ergo pilula ponitur in stomacho quod est
concauum ipsa æqualiter tangitur a qualibet parte stoma-
chi: & ideo undiq; & in omni sui parte ad actum reduci-
tur propter calorem stomachi, & ideo ipse in qualibet sui par-
te reducta ad actū attrahit undiq; æqualiter a membris om-
nibus, ideo datur, & dari debent in forma rotunda &c.

P I L V L A E cocix Galenacant humores diuersos a ca-
pite, & toto corpore, & acuant alias medicinas quando
mifcuntur cum eis. Cuius permixtio hæc est.

R. Aloes, Malticis,
Scamoneæ præparatæ, Colloquintidæ an. 3.iii.
Abfinthii, an. drach. iiii.

Terantur & conficiantur cum succo abfinthii, & referua
&c. Quare enim hæ pilulæ dicuntur cocix. Cocix. i. capi-
tales, a cocos quod est caput.

Pilulæ cur dantur in impari numero.

Pythagoras. n. posuit in impari numero uirtutē multam,
& dixit numerū imparem masculū, igitur perfectiorem. Et
ob hoc uulgares seq̃etes cum credunt, q dando eas in nu-
mero impari sit maior perfectio, & multum errant. Nume-
rus. n. non est principium actionis, & passionis. ut. 5. Meta-
physicæ, cōmēto. 2. Et ideo facta doli conuenienti medici-
næ potest formari numerus pilularum par, & impar.

P I L V L A E cocix Almanforis uisuales, ualent ad dolo-
rem capitis, & stomachi, & euacuant humores malos qui
sunt in capite & in stomacho.

R. Pulueris hieræ picræ, Turbith,
Almanforis. 3. x. Stoeccados, an. 3. v.
Colloquintidæ. 3.iii. s. 3. i. Dyagrydii. 3.iii. s.

Terantur hæc, & conficiantur cum uino albo. hæc est spe-
cies pul. hieræ picræ Almanforis quæ intrant in suprascrip-
tis pilulis. Cuius permixtio.

R. Rofarum rubearum, Cinnamomi,
Spicæ indæ, Xilocaſiæ,
Malticis, Radicum affari, an. 3. i.
Xylobalſami an. 3. i. gr. vi. gra. vi.
Carpoballami. 3. i. gr. vi. Aloes boni 3. vi. 3. ii.

Pilulæ fuerunt inuentæ. Primo propter earum minorē
displicentiam gustui, cum uniuersaliter componantur ex
rebus amaris. Secundo, ut magis a remotis attrahant: quan-
to. n. medicina longiori tempore fiat in stomacho, tanto ma-
gis, & a longinquiorebus attrahit.

P I L V L A E arabicæ Nicolai, purgant mirabiliter oēs hu-
mores. i. sanguinem, & choleram rubræ, & nigræ, & lætitiā
afferunt, tristitiā remouent, mentem acuant, uisum auda-
cter restaurant, memoriā trahunt, scorhomiam, uertiginē,
hemicranæā, oculos, dentes, gingiuas, stomachū, splenem,
sonitum aurium, oēs humores, omnibus actibus, & omni

P I L V L A E alfaiaret. Auic. in prima fen. tertii. in cap.
de canonibus uniuersalibus curationis capitis, et exponi-
tur a Gentili in hunc modum.

R. Specierū hieræ simplicis. 3. ii. Malticis. 3. i.
Myrobalanorum citri. 3. i. Aloes boni. 3.iii.
Terantur, & cum uino optimo fiant pilulæ.

De myrobalanis nota, q aliqui reperiunt scriptū in recep-
tis myrobalanorū absolute, et tunc de oibus myrobalanis
est intelligendum. I. de quinq; generibus myrobalanorum.
Si uero scriptū reperiatur myrobalani absolute de citrinis
est intelligendum sicut de melioribus, et perfectioribus.

P I L V L A E stomachicæ penultimæ descriptionis Mes-
& sunt illæ quæ dari possunt omni tempore, & sunt in usu,
stomachum, & caput mundificant.

R. Turbith boni. 3. x. Rofarum rubearum. 3.iii.
Malticis. 3.iii. Aloes optimi. 3. xvi.
Terantur, et conficiantur cum succo abfinthii.

Hic nota, quod si zingiber cum turbith poneretur fortifi-
carentur operationes eius. nā turbith sui uirtute, et de se,
phlegma subtiliter trahit, sed si cū eo zingiber admifceatur for-
tificando ipsum, facit, q attrahit, etiam phlegma grossum.

P I L V L A E stomachicæ secundæ descriptionis Mesue
et sunt in usu, stomachum, et digestionem confortant, cereb-
rum, et stomachum a corruptis humoribus purgant, et ap-
petitum excitant.

R. Hieræ picræ. 3. x. Myrobalanorum belleri-
corum.
Trium myrobalanorum, Agarici albi, an. 3.iii. s.
Abfinthii sicci, an. 3.iii. Zingiberis. 3. ii.
Malticis, Squinanti. 3. i.
Seminis anisi, Turbith albi, et gummosi.
Myrobalanorum emblico- 3. xii.
rum, an. 3.iii. s.

Terant, et conficiantur cū succo abfinthii, et da. 3. ii. uel. 3. iii.

P I L V L A E imperiales, siue laudabiles. N. quas ipse in-
titulauit Pilulæ alix ante cibum, & post cibum, et sunt illæ
quæ sunt in usu, et bonæ, ualent ad confortandum stom-
achum, et purgant sine molestia.

R. Nucis muscatæ, Malticis,
Spicæ indæ, Seminis foeniculi,
Crocii, Carpopallami,
Ligni aloes, Quinque generum myroba-
lanorum.
Cardamomi maio. et mino. Turbith albi, et gummosi,
Garyophyllorum. Mannæ granatæ,
Amomi, Agarici albi,
Cinnamomi. an. 3. s. Folliculorum fenæ. an. 3. s.
Zingiberis, Rheubarbari boni ad pondus
Galangæ, cū suprascriptarū sunt
Zedoariæ. an. 3. s. 3. xiii. s.
Cubebarum, 3. xiii. s.
Macis, Aloes boni ad pōdus oīum su-
Seminis anisi. an. 3. s. p̃scriptarū sunt. 3. xxvii.

Terant oia. et aloes de p̃se, & postea misce, et fiat pilulæ
cū uino albo optimo. Et inunctis manibus cū oleo laurino
reformen, et aliqui possunt reformari cum syrupo uiolato.

Senæ cum simpliciter scriptum reperitur in composio-
nibus solutiuis uel lenitiuis, de folliculis semper est intelli-
gendum, cum magis solutiui, & meliores sint.

P I L V L A E communes. Auic. prima fen. quarti. tract.
4. cap. de præseruatione pestilentie.

R. Aloes electi. 3. ii. Myrrhæ, Croci ana. 3. i.
Terantur, & cum uino optimo fiant pilulæ.

Pilulæ

Pilulæ omnes præscriptæ, & infra scribendæ exhibendæ non sunt immediate post ipsarum compositionem, sed saltem statim est per quindecim dies ut possint simul commisceri. Et tunc agent operationem suam ratione compositionis. Secundo aut faciunt si ante dictum tempus exhibentur: utrum aut in illo tpe fermententur, & nunquid dici possit vera fermentatio. Satis in quæstioncula mea de narcoticis per longum processum declarauimus uidere uult ad ipsam recurrat.

Pilulæ quæ ab aromatis exhibentur, magis obfunt quæ cõferantur tpe debito nõ exhibentur, ideo modum exhibitionis inscribi, ne sua impericia, & temeritate, uiri ad aliquas graues ægritudines incurant. Pilulæ quæ dantur quantum uiuat nostro proposito, spectant, aut dantur ad euacuandum aliqualem materiam in stomacho existentem, & tunc dari debent ante cenam immediate. Aut ad euacuandum aliquam humiditatem cerebri, & tunc post cenam per duas horas saltem exhibendæ sunt, & hæc intelligatur de pilulis non scamoneatis, & leuibis, aut masticinæ, & elephanginæ, de hie rasimplici &c. Aut dantur ad purgandum humorem loco medicinæ, & tunc dari debent facta digestionem cibi in stomacho, & post tardandus est, cibis saltem per horas sex, & hoc modo doctores exhiberi iubent.

PILVLAR bichichie Mef. in suo de appropriatis capitulo de cura tulsis siccæ, sicut catarrhum, & dilatant pectus & guttur.

R. Succi liquiritæ, Dragacanthi,
Zucchari albi an. 3. x. Amygdalarum dulcium. ana
Amydi. 3. i. s. drach. i. s.

Misce, & fiant pilulæ cum mucillagine cydoniorum.

Species omnium pilularum grosso modo sunt conterendæ, & per rarum sedacium transiri debent, & sic melior est sua operatio, & a longinquiribus partibus attrahunt ratio supra est assignata in electuariis.

PILVLAR de agarico Mef. pectus mundificant, & humores grossos, & putridos, & cõferunt asthma, & tussis antiq. R. Agarici electi, Radicum ieros,
Masticis an. 3. iiii. Prasii 3. i. i.

Terantur, & consiciantur cum uino cocto.

In istis pilulis soleo apponi facere loco agarici agaricū trochiscatum, & trochiscos alandæ loco colloquintidæ, eo quia in eis sunt multæ medicinæ uenofæ, & fere nullæ sunt medicinæ earum uenositatem refrangentes: immo refractæ esse debent, medicinæ apponendæ sunt trochisci alandæ & agarici trochiscati.

PILVLAR de lapide lazuli Mef. ualent ad ægritudines melancholicas, & cholerae adultæ sanæ, & expertæ.

R. Lapidis lazuli loti. 3. vi. Salis indi. 3. iiii. s.
Epithymi, Agarici 3. viiii.
Polypodii an. 3. viiii. Garyophyllorum,
Diagridii, Seminis anisi an. 3. iiii.
Ellebori nigri an. 3. iiii. Hieræ picræ 3. xv.
Cõfice cū aqua endiuiz, uel succo, & da. 3. iiii. cū aqua caesi.

PILVLAR de euphorbio Mef. educunt phlegma frigidum: & conferunt ad mollificationem paralysis: & educunt humores grossos, qui descendunt ad neruos.

R. Euphorbii, Serapini,
Agarici, Bdellii an. 3. iiii.
Coloquintidæ ana. 3. ii. Aloes. 3. v.

Misce cum aqua portii dosis. 3. s. v. que. ad 3. i.

PILVLAR ad omnes morbos catarrhi Mesue, ualent ad tussim catarrhalem & dicuntur pilulæ de cinoglossa.

R. Myrrhæ puræ 3. vi. Croci. 3. i. s.
Olibani. 3. v. Radicū linguæ canis. 3. iiii. s.
Opii, Et fiant pilulæ, quarum dosis
Iulquiami ana. 3. iiii. 3. s. uel 3. i.

PILVLAR de opoponaco Mef. conferunt paralysis, & torturæ, & ægritudinis neruorum frigidis, & dolori iuncturæ, & genuum, & dorsi.

R. Opoponaci, Myrrhæ,
Hermoadistylorum, Zingiberis,
Serapini, Piperis nigri,
Bdellii an. 3. v. Piperis longi,

Cassie fistulæ,
Myrobalano. citrinorum,
Myrobal. emblicorum,
Armoniæ,
Colloquintidæ ana. 3. v.
Croci,
Castorei an. 3. i.

Myrobalanorum bellerico-
rum,
Myrobal. indorum, an. 3. i.
Diagrydii. 3. iiii.
Turbith. 3. iiii.
Aloes boni. 3. xii.

Infundantur gume in aqua caulium, & consiciantur cum aliis, dosis eius est. 3. i. usque ad aur. i. & da cum aqua iux.

PILVLAR alexandrinæ magistræ, ualent ad ægritudines melancholicas, & cancrum, & lepram, & morseum nigram difficilē, & ægritudines neruorum frigidæ habebunt humiditatem difficilis eradicationis, & phlegma uiscosum & confert colicæ, phlegmaticæ, uentose, & confert hydropi, & dolori splenis, & stomachi frigiditati.

R. Aloes boni, & sublimis
3. i. Anieos. 3. s.
Colloquintidæ interioris, Masticis. 3. iiii.
Diagrydii, Anisi. 3. ii.
Abinthii, Euphorbii. 3. iiii. s.
Bdellii ana. 3. s. Ellebori nigri. 3. ii.

Et fac cum succo caulium, dosis. 3. i. uel 3. ii.

PILVLAR de serapini Mef. experte ad dolorem iuncturarum, & sciaticam, & podagram, & conferunt ad dolorem matricis, & prouocat menstrua.

R. Serapini, Fumiteræ,
Armoniæ, Calamenti,
Opoponaci, Folii, an. 3. s.
Bdellii, an. 3. ii. s. Centauræ,
Seminis apii, Polii,
Seminis ameos, Costi,
Armel, Salis gemmæ an. 3. s.
Seminis anisi an. 3. i. Aloes boni. 3. vi.
Acori 3. s. Coloquintidæ. 3. v.

Fiant pilulæ cum uino, dosis. 3. i. usque ad 3. ii. P O M M laudani quod portatur in manu tẽpore pestis.
Cinnamomi electi, Thuris albi,
Garyophyllorum, Myrrhæ an. 3. i.
Ambræ bonæ, Sandali citrini,
Muscæ, Boli armeni,
Storacis calamitæ an. 3. i. Calami aromatici an. 3. ii.
Macis, Camphoræ. 3. iiii.
Seminis iuniperi, Laudani boni. 3. vi.
Rosarum rubearum an. 3. i. s.

Ceræ q. s. & fiant poma in mortario cum pistello calido, & cum paucio uino maluatico, uel uernacia.

P O M A ambræ quæ portantur ut supra.
Laudani boni. 3. iiii. ana. 3. i. s.
Storacis calamitæ. 3. iiii. Rosarum rubearum,
Ligni aloes, ana. 3. i.
Cardamomi, Thuris alb. 3. i. s.
Myrrhæ, Ambræ bonæ. 3. s.
Sampfuchi, idest maioranæ. Musci boni. 3. i.

Ceræ q. s. & fiant poma in mortario. cum pistello ferreo calido, ut supra.

R O S A trochiscata, Nicolai rubea dicitur ab ipso colore, trochiscata, quia trochisci in ea ponuntur ualeat tertianariis, quotidianariis, ante horam accessionis data cum rhodostomate ad modum auellanz. Na ribus & pulibus ex ea inunclis sanitate præstat: tenuati ex acri phlegmate facto data cum pisanâ subuenit.

R. Liquiritæ rasæ, Croci,
Cinnamomi, Rosarum,
Papaueris albi ana. 3. iiii. 3. ii. Seminis iusquiami,
Gra. vii. s. Seminis apii ana. 3. iiii.
Spicæ nardi, gra. xv.
Violarum an. 3. i. gra. vii. s. Trochisco & croci magnetis.
Garyophyllorum, Trochiscorum idiocni,
Storacis calami ana. 3. s. Myrrhæ,
Opii thebaici. 3. s. Seminis anisi ana. gr. xv.

Mellis quantum sufficit & da ut supra.

R O S A nouella Nicolai: rosata dicitur a rosis: ne-

uella respectu ueteris quæ recipiebat tabar: idest sulphur uiuum: uomicum & subuerfionem stomachi auferre: debilitatem, & sum reprimere: defectus ex lōga infirmitate mire subuenit: sudores diaforeticos compellit: cuius permixtio.

R. Rosarum rubearum, Galangæ,
Zuchari, Nucis muscatæ,
Liquiritiæ rafæ. an. ʒ. i. ʒ. i. s.
Cinnamomi. ʒ. i. ʒ. ii. gr. ii.
Garyophyllorum, Storacis calamitæ,
Spicæ nardi, Cardamomi maioris & minoris,
Zingiberis an. ʒ. i. gra. ix. Seminis apii ana. ʒ. i. gra. ix.

Puluerizent puluerizadæ: et cū mellis li. i. ʒ. viii. fiat in forma liquida. Si uero i forma solida: facias ut supra tibi ostēdi.

Nardi si reperitur scriptum in aliqua compositione ut in hac communiter reperitur: de spica nardi intelligēdum est: non autem de compositione cuiusdam unguenti præciosi, ut quidam dementes ausi sunt dicere.

R. Q V I S Nito. requies dicitur quia requiē accipiētibz p̄stare maxime typice febricitantibus, quotidianariis tertianariis quartanariis, acutis, & peracutis. Cuius permixtio.

R. Rosarum rubearum, Seminis psillii,
Violarum. an. ʒ. iii. Nucis muscatæ.
Seminis iusquiami, Cinnamomi,
Opīi, Zuchari. an. ʒ. i. s.
Papaueris albi, Sandalorum alborum.
Corticum mandragoræ, Sandalorum rubrorum,
Seminis scariolæ. an. ʒ. i. s. Sandalorum citrinorum.
Seminis lactucæ, Spodii de caena,
Seminis portulacæ. an. ʒ. i. s. Dragacanthi an. ʒ. ii. gra. v.

Puluerizentur subtiliter puluerizadæ mellis cocti & despumati lib. i. & ʒ. iii. & fiat electuarium.

Ista compositio a multis corrupta est, & male cōponitur multi. n. addunt & in suis receptis reperiunt ultra præscripta Miconis: & exponunt quod est papauer nigrum & falsenam idem est quod papauer album: ut uult Gentilis super 5. c. sed litera debet stare ut præscriptum.

Vfus istorum opiatorum non debet ēt nisi transactis sex mensibus. Et inueterata ultra sex annos non agetur: electuaria hæc operantur nimio declinant ab eorum uirtute, maxime stupefactiua sen opiatæ &c.

S V F F aromaticum Mes. confortat stomachum digestionem facit bonam: ventositatem dissoluit: oris odorem facit bonum. Cuius permixtio hæc est.

R. Anisi aur. xii. Ligni aloes,
Seminis foeniculi. aur. iiii. Corticis citri. an. aur. i. s.
Liquiritiæ rafæ, Mucis boni. gra. xv.
Zingiberis. an. aur. iiii. Zuchari tabaræ et ad pondus omnium.
Garyophyllorum, Zuchari habet medium pondus omnium.
Macis, Dosis eius est aur. ii. cum vino bono.
Cinnamomi electi,
Galangæ. an. aur. ii.
Gallix muscatæ. aur. i.

S I E F album cum opio Mesue: conferens ophthalmiæ & doloribus oculorum. Cuius permixtio hæc est.

R. Cerussæ lotæ in aqua Amyli. ʒ. iiii.
rofa. ʒ. x. Dragacanthi albi. ʒ. i.
Sarcocollæ. ʒ. iiii. Opīi. ʒ. s.

Fiant trochisci parui longisicut suppositoria.

S I E F Album sine opio Mesue. ualet ut supra. Cuius permixtio.

R. Cerussæ lotæ in aqua Amyli. ʒ. iiii.
rofa. ʒ. x. Dragacanthi. ʒ. i.

Fiant trochisci parui longi ad modum suppositorii de. ʒ. s. pro quolibet uel circa.

S V P P O S I T O R I A ad tenasimon magistralia: ualet tenasimon & ægritudinibus ani.

R. Terrebenthinæ, Croci. ʒ. i.
Myrrhæ, Opīi,
Thuris. ana. ʒ. i. Licii. i. succi. an. ʒ. ii.

Et cum albimine oui fiant suppositoria ad longitudinem

unius digiti & applicetur, parum unum filii: & sic fit.

S V P P O S I T O R I A alia ad tenasimon. Cuius permixtio.

R. Thuris. Licii,
Vernicis, Myrrhæ,
Opīi, Croci. ana. ʒ. i.

Sanguinis draconis an. ʒ. i. Et fiant suppositoria cum uino uel albimine oui & cum filo: ut supra.

S V P P O S I T O R I A de Cyclamine & de aliis gummis.

R. Myrrhæ, Opopanaci,
Castorei, Cyclaminis, idest panis porcinus an. ʒ. i.
Nigellæ. ana. ʒ. i.

Et fiant suppositoria cum tryphæa & cum filo.

S V P P O S I T O R I A Constructiua.

R. Litargyrii, Croci,
Olibani, Opīi. an. ʒ. iiii.

Masticis. an. ʒ. iiii. s.

Et fiant suppositoria cum filo.

S A C C V L V S pro corde sic fit.

Require in isto capit. de pulueribus pro sacco cordis.

S A C C V L V S pro capite sic ut patet in isto ca. de pulueribus, & incipit. Puluis pro capite.

S A C C V L V S alius pro capite.

R. Vernicis ʒ. iiii. Garyophyllorum, an. ʒ. iiii.

Macis, Misce & fiat sacculus.

S A C C V L V S pro stomacho sic fit.

R. Abinthii succi. M. i. Cinnamomi. ʒ. iiii.

Mentæ siccæ, Macis,

Rosarum rubearum, Garyophyllorum,

Coriandrōrum præparatorum, an. M. i. Spicæ,

Masticis. ʒ. i. Galangæ. an. ʒ. s.

Conterantur grosso modo: & fiat sacculus.

S A C C V L V S alius pro stomacho.

R. Rosarum rubearum. M. i. Coriandrōrum præparatorum,

Abinthii succi, Seminis anisi. an. ʒ. ii.

Mentæ siccæ. an. M. i.

Misce & conterantur grosso modo & fiat.

S A C C V L V S pro pulibus.

R. Chelidonix. M. s. Papaueris. an. M. s.

Meliloti,

Pistenter grosso modo & fiat sacculus.

S A C C V L V S pro fianchis sic fit.

R. Furfuris frumenti, Florum camemillæ. ana quā

Seminis anethi, tum sufficit.

STOMACHICVM calidum Nicolai: confortat digestionem uirtutem adiuuat, & iliosis fatis ualet.

R. Cinnamomi, Spicæ,

Zingiberis an. ʒ. ii. Macis,

Garyophyllorum, Ligni aloes,

Galangæ, Cardamomi an. ʒ. s.

Nucis Muscatæ an. ʒ. s. Zuchari albi. lib. i.

Misce & fiat confectio in morfellis aut in puluere.

STOMACHICVM frigidum Nicolai: ualet contra omnem calorem: sitim reprimat: & patientibus debilitatem ex calore nimio potenter subuenit acutis et peracutis mi-

rice prodest.

R. Sandali albi, Seminis melonis,

Sandali rubei. an. ʒ. i. s. Succu liquiritiæ,

Spodii, Rosarum rubearum,

Berberis, Violarum,

Seminis portulacæ, Florum nenupharis. an. ʒ. i.

Seminis scariolæ. an. ʒ. i. Zuccari albi.

Et fiat confectio cum lib. i. aquæ rosæ.

STOMACHICVM laxatiuum.

R. Diagrydii. ʒ. i. Seminis anisi. an. ʒ. i.

Turbith, Cinnamomi,

Folliculorum fenæ. an. ʒ. i. Garyophyllorum,

Masticis, Spicæ. an. ʒ. i.

Rosarum rubearum an. ʒ. ii. Zuchari albi. lib. ii.

Et misce, & fiat, & detur dosis eius est. ʒ. iiii.

S P E C I E S pro composita de rapis.

ꝥ. Semen is fœniculi. lib. iiii. Seminis carui, lib. i.
 Seminis coriandrorum, lib. i. Seminis auiſi. ꝥ. vi.
 ꝥ. vi.
 Piſtentur groſſo modo & alpergantur ſuper rapis & ſuper ponatur acetum quantum ſufficiat.
 SPECIERVM pro cerualo.
 ꝥ. Piperis. ꝥ. iiii. Croci. ꝥ. i.
 Garyophyllorum, Salis communis. ꝥ. iiii. s.
 Zingiberis an. ꝥ. ii. Carnes porcinae lib. iiii.
 Cinnamomi ſiui. ꝥ. iiii. de ꝥ. xxviii. per. lib.
 Nucis muſcatæ, Cafei ueteris & boni ꝥ. xii.
 Macis an. ꝥ. i. Et fiat cerualatum bonum.
 SALSÆ CONFECTÆ ſic fit.
 ꝥ. Zingiberis ꝥ. ii. Synapiſ ꝥ. iiii.
 Cinnamomi, Nucis muſcatæ,
 Piperis an. ꝥ. ii. Piperis longi,
 Garyophyllorum, Coriandrorum præparato-
 Galangæ, rum ana. ꝥ. iiii.
 Macis an. ꝥ. ii. Allii mundi. ꝥ. i. s.
 Serpilli, Salis communis. ꝥ. ii.
 Petroſillii ana. ꝥ. ii. Amygdalarum mundata-
 Maioranzæ, rum,
 Mentæ, Paſſularum an. lib. ii.
 Croci an. ꝥ. iiii. Mellis deſpumati lib. xii.
 Piſtentur omnia ſubtiliter & incorporentur cū melle & reſeruentur: & quando operari oportet diſſolue cum forti.
 SYRVPVS acetofus ſimplex Meſue, ualet ad materias calidas, frigidas, ſubtiles & groſſas & uiſcoſas ſiue adhzrentes & facit penetrare medicinas in partes quas forte non penetrant. Et facit acquirere diuiſus ſectiões duri & diſſicilis: & modus operationis eſt.
 ꝥ. Zuehari albi lib. v. Aquæ fontium lib. iiii. Et cū ea clarificetur zuecharum: quo clarificato cū igne lento ſemper ſpumam abiiciendo: deinde proiciatur ſuper illud, Aceti vini albi lib. ii. in leui & forti lib. iiii. & in mediocri lib. iiii. & da ei poſt illud perfectiõnem decoctionis. Sed uſitatus modus eſt ponere lib. ii. aceti & facere ſyrupum: & hic in uſu eſt.
 Multi dubitant in hac recepta: & apparet eſe ambiguum id quod Meſ. dicit: & reſerunt illud forte: & illud debile: & illud bene ad acetum. Et non debet reſerri ad acetum: ſed ad uirtutem ſyrupi: & ſic clara eſt litera.
 SYRVPVS de radicibus Meſ. ſue acetofus compoſitus in alia eſt magiſtralis: ualet ad coleram groſſam diſſicili & ad phlegma. Incidit. n. & abſtergit & aperit oppilationes quæ ſunt in hepate & ſplene & renibus. Cuius permixtio.
 ꝥ. Radicum apii, Seminis fœniculi,
 Radicum fœniculi, Seminis aniſi,
 Radicum petroſillii, Seminis ameos,
 Cadicum endiuiz an. M. i. Seminis ſparagi an. ꝥ. iiii.
 Seminis apii. ꝥ. iiii. Aceti boni lib. ii.
 Omnia præter acetum bulliant in lib. xx. aquæ fm artem uſq; ad conſumptionem & perfectam coctionem: deinde coſentur & in colatura addatur Mellis purificati aut zuehari lib. iiii. Et aceti quantitas præſcripta: & coquatur ad perfectam coctionem: & appellatur ſyrupus iſte de radicibus cū aceto, ꝥ. uero facere uiſum illum fine aceto remoueat acetum & erit factum & erit radicibus.
 Triplex fuit neceſſitas ſyruporum coſitionis: prima fuit conſeruatione uirtutum rerū in toto anno: ſecunda exhibitio nis rerū in forma potabili: uel ad uirtutem rei præter eius ſubſtantia, tertia ꝥꝥ infirmos qui non poſſunt ſumere medicinas niſi in hac forma: & ꝥꝥ has cauſas ſyrupi reperti ſunt.
 Radices ante ꝥ exiccantur bene lauandæ ſunt & ab interiori ligno mundandæ: deinde ad ſolem ſiccandæ: deinde reſeruandæ a fumo & humiditate ſunt: & ita fere omnes herbe bene exiccantur & conſeruantur. Flores uero in umbra.
 Radices ſimpliciter prolatæ ſunt quinq; numero. ſ. radix fœniculi: apii: petroſilli: bruci: & ſparagi.
 Semina quatuor frigida communia minora ſunt iſta. Semen endiuiz: lactuce: cariola: & ſemen portulacæ: ideo ſi ſimpliciter ſcriptum reperitur ſeminum communium frigidorum minorum de iſtis intelligatur.

Si uero ſcriptum reperitur quatuor ſeminum communium calidorum maiorum. iſta ponantur. ſ. ſemen aniſi fœniculi: carui: & ameos: qui illa ſunt.
 Semina uero quatuor cõia minora calida ſunt iſta: ſemen apii: petroſilli: cymini, & naſturtii: immo ſi ſimpliciter ſcribatur quatuor ſemina cõia minora calida de iſtis intelligat.
 Syrupus factus cū melle ſimpliciter melius ualet ꝥ factus cū zuecharo: & quadruplex eſt cā. Prima eſt: quia mel cū ſit uiſcoſum melius coſeruat medicinas cõponentes ſyrupū ꝥ zuecharū. Secunda ratio: quia mel magis mundificat materias, tegit: & horribilitate medicinarū quā zuecharū. Tertia quia mel eſt dulcius. Quarta cauſa: quia melius digerit quā zuecharū. Et licet ſyrupus factus cū melle melius ſit ad digerendum & mundificandū: tñ ad inſrigidandum & confortandum melius ualet ſyrupus factus cū zuecharo quā cū melle. Vnde ſi intendimus digerere, abſtergere, caleſcere, & mundificare fortiter, debemus facere ſyrupum cum melle. Si inſrigidare, confortare, leniter: aperire: cum zuecharo bono. Si utruq; fiat cū utroq; ideo notent ignari & trouantuli aromatarii, qui ſuos ſyrupos propter auariciam cū mel faciunt. Maior, n. intentio ſyrupi eſt confortare, inſrigidare, & leuiter digerere, quā alud facere, quare &c.
 SYRVPVS de duabus radicibus & eſt magiſtralis.
 ꝥ. Radicum petroſilli.
 Radicum fœniculi an. M. i. Bene lauentur & a ligno interiori mundentur & abradantur: deinde bulliant in li. viii. aquæ uſq; ad conſumptionem medietatis: deinde coſentur & prædictæ colaturæ addantur zuechari albi clarificati li. ii. & bulliant uſq; ad perfectam decoctionem: in formam ſyrupi.
 In iſto ſyrupo ſunt qui ponunt radicem apii loco radicis petroſilli. Sed quia apium habet in ſe hac proprietatem ꝥ epilepſiam mouet: ideo mihi ſuſpectum eſt: & loco ipſius poni facio petroſillum.
 SYRVPVS de ſucco endiuiz ualet ad oppilationem hepatis: & extinguit inflammationes febrium & ſitim & hepaticalem. Cuius permixtio.
 ꝥ. Succu endiuiz cocti & depurati & colati li. iiii. Zuechari. iiii. Et fiat ſyrupus decoquendo debito mō: & eſt in uſu.
 Succu omnium herbarum conſeruantur per annum & nō ultra ſi ſupra eos ponatur: parum olei oliuarum & bene ſint clarificati: ut in ſyrupo de bizantiis oſte nditur: & apponendi ſunt in uſu uſq; uel ſaltim uitreato: demum tranſaſto anno ſunt abiiciendi.
 SYRVPVS de endiuia magiſtralis.
 ꝥ. Foliorum endiuiz, Diantos. M. ii.
 Hepaticæ, Radicum endiuiz,
 Capillorum ueni. an. M. iiii. Aquæ endiuiz an. lib. i.
 Bulliant hæc tñ artē in li. xvi. aquæ uſq; ad conſumptionem duarum partium deinde coſentur & colaturæ addantur. Zuechari clarificati li. vi. & fiat ſyrupus coquendo debito mō.
 Nota hic unū uniuerſale, ꝥ ſi uiſi facere ſyrupum magis clarificat: tñ in decoctione debes Zuecharū clarificare: ſed tñ ſyrupus non eſt tantæ uirtutis. Ideo ſemper zuecharum ꝥe ſe clarificari ſoleo facere deinde decoctionem ſupra addo.
 SYRVPVS alius de endiuia, cuius inuentor fuit Gentilis de Fulgineo quæ manu propria eius deſcriptū ego iā uidi: efficitur & melior præſcripto. Cuius permixtio hæc eſt.
 ꝥ. Succu endiuiz, Succu hepaticæ an. lib. iiii.
 Clarificet ſeu purgent prædicti ſucci ad ignem ut expedit.
 ꝥ. Roſarum, Capillorum ueneris,
 Violarum, Hordei mundi.
 Lentiginis aquæ. i. loraminæ Seminum communium frigidorum maiorum an. ꝥ. i.
 Florum nenupharis,
 Polytrichi. an. ꝥ. s.
 Bulliant omnia hæc fm artem in lib. vi. aquæ uſq; ad conſumptionem tertiæ partis: deinde coſentur, & colaturæ addantur Zuechari clarificati lib. iiii. & fiat ſyrupus qui aromatizetur cum inſcriſcriptis ſubtili modo puluerizatis.
 ꝥ. Sandalorum alborum, Ligni aloes,
 Sandalorum rubeorum, Cinnamomi,
 Berberorum, Corticis citri. an. ꝥ. i.
 Seminis cydoniorum an. ꝥ. i.

Subtiliter pulverizentur, & syrupus aromatizetur, est enim efficacior.

Aromatizatio dupliciter fieri potest. primo q̄ postquam syrupus perfecte coctus est prouinciat eā ex quibus debet aromatizari: & permittantur solum una ebullitione bullire: deinde ab igne remoueantur & referuentur.

Alio modo postquam syrupus perfecte coctus est, & ab igne remotus: possunt aromata ex quibus aromatizari debet ignis apponi: & simul longo tempore concutendo misce & sic uirtutem accipiet eorum: & hoc modo aromatizatio fit: uterq; modus est laudabilis.

Syrupus rosatus ex infusione rosarum Mesue confertur aduersioni febrium uehementer, siti & inflammationi pectoris. Cuius permixtio.

R. Infusionis rosarum uiridū lib. v. Zuechari bo. li. iiii. Misce & fiat syrupus decoquendo debito modo.

Modus infusionis rosarum talis est. Accipe foliorum rosarū uiridū mundatarū li. vi. ponantur in uase uitreato stricti orificiū: & super eas fundantur aquæ feruentis lib. xv. & stringatur orificiū uasis: & dimittatur per horas ix. Deinde coletur & bene rosæ exprimantur: & postea abiciantur. Et iterum tantundem foliorū rosarū recentū in dicto uase ponantur. & supra dictā aquam colantur quæ denuo fuerit calefacta prouinciat & obturetur & permittatur ut supra: & iterum tertio hoc fiat: deinde coletur & si referuare uolueris apponatur ad solē per dies xlii. in uase uitreato stricti orificiū, et distilletur parum olei olinarum in orificio eius: postmodū referatur. & de dicta infusione accipe quando uolueris ponendo æqualem quantitatem zuechari cum ea.

Syrupus de rosis sicis magistralis confert fluxui uentris ex caliditate.

R. Infusionis rosarum siccarum rubearum. Zuechari clarificati an. lib. ii.

Misce & fiat syrupus decoquendo debito modo.

Infusio rosarum siccarum fit ut infusio rosarum uiridum hoc excepto, quod loco uiridum ponantur rosæ sicæ: sed secundum eandem quantitatem tam de rosis quam de aqua. Omnes syrapi refrigerantes ut syrupus rosarū, de granatis de myrtis: & ceteri restrictiui debent bene decoqui: leuitiui uero uolati & contrario.

Syrupus de succo rosarum confert in acutis & peracutis febribus & soluit natura cum facilitate.

R. Succu rosarum rubearum lib. iiii. Zuechari lib. iiii. Et cum aqua fontium clarificetur: & fiat syrupus.

Syrupus de succo acetosæ Mesue confert febribus cholericis, & inflammationi stomachi & confortat cor calidū & stomachum, & est conueniens febribus phlegmaticis.

R. Succu acetosæ purificati lib. iiii. Zuechari clarificati li. ii. Et fiat syrupus decoquendo debito modo & referuetur.

In syrapiis nnum uniuersale nota. Syrapi enim aut cum Zuecharo aut cum melle aut sapa fiunt.

Syrapus qui de zuecharo fit, melius debet decoqui q̄ qui cum melle componitur: cū mel sit magis cōseruarium & minus corruptibile. Et ideo syrupus cum melle factus diutius cōseruatur. Syrupus factus de melle quāto minus decoquitur, tanto magis laxat: & quanto plus coquitur, tanto plus restringit. Syrapi in æstate magis coquendi sunt q̄ in hyeme & oī tpe, syrupus quanto magis coquitur tanto melior est.

Syrupus de agrestē Mesue confert uomitui & solutioni choleicæ, & inflammationi stomachi, & siti laboriosæ & febribus cholericis: & confortat stomachū prægnantium quæ facile recipiunt superfluitates: & ualet contra uenena & modus operationis eius est sic ut syrupus de acetositate citri: & quidam coniungunt cum garyophyllis. Cui permixtio.

R. Succu uicæ acerbæ lib. xii. Decoquantur lento igne usq; ad consumptionem tertie partis, deinde coletur & postea permittatur donec clarescat: & postea, accipe de eo claro lib. vii. Zuechari clarificati li. v. Et simul coquantur usq; ad perfectam coctionem & referuetur.

Succus iste extrahi debet ex uuis citrinis declinantibus ad rubedinē non maturis ultima hebdomada Iulii, & post ipsarū collectionē stent per tres dies, deinde succus extrahā

anteq̄ hebdomada illa transeat: quia elapsa illa hebdomada stella canis abscondit & succus eius nō est tæz pfectionis. Insuper incidenter hic est notandū q̄ illa quæ dantur pro fluxu uentris ad confringendum: debent exhiberi statim ante cibum. Quæ uero propter uomitum dantur, immediate sumpro cibo danda sunt.

Syrupus de papauere Mesue confertur ad tussim siccam & phthisim, & catarrhum, faciens ad somnum.

R. Papaueris albi, Seminis lactuæ. 3. xl.
Papaueris nigri & proprie Seminis malux,
capita eorum an. 3. l. Seminis cydoniorum, ana
3. vi.
Liquiritiz. 3. v. Zuechari albi,
Iulubarum num. xxx. Penidiorum an. 3. viii.

Coquantur omnia in lib. iiii. aquæ pluuialis usq; ad consumptionem medietatis: deinde coletur. Et clarificentur cum prædicto zuecharo & penidis & fiat syrupus.

Semina omnia mucilaginem faciētia non sunt sic ad bulliendum pro decoquendo cum aliis rebus ponenda: sed sunt in pecia liganda demum, ad bulliendum ponenda: & sic uirtus earum in syrupo transit: & uisofitas quæ syrupum ui scolum redderet retinetur &c.

Alii sunt qui addunt sapa mes uinum coctum in hoc syrupo. 3. vi. ut dirigat uirtutem aliarum medicinarum ad pectus. sapa enim multum pectori amicitur.

Syrupus de pomis simplex Mesue confortat cor debile & sanat syncope & tremorem cordis.

R. Succu pomorum dulcium. Succu pomorum acetorum an. lib. v. Bulliant ambo simul usq; ad consumptionem medietatis: deinde infunde in eis setam tinctam in Kermes. i. tincta in gr. 3. s. & dimittatur in eis per dies duos usque dum clarescat deinde coletur. Et colatur addantur zuechari clarificati lib. iiii. & fiat syrupus.

Seta tincta in Kermes. Nota q̄ Kermes scriptū cum r, sine lideam est q̄ granum cum quo seta tingitur: scriptum uero cum s, scilicet Kermes. i. passulæ. hoc bene nota: quia diuersitas literæ diuersificat rem.

Omnes syrapi facti ex succis, semper zuecharum debent esse clarificatum & coctū per se postea uero succi sunt addendi: & ratio est, quia pro longa ebullitione succi uirtus perditur: & hoc intelligas de succis fructuum & uinis aromaticis, quia hi parum sustinent de decoctione. Succu uero radicum quanto magis decoquantur, tanto puriores redduntur. Herbarum uero succi mediocrem sustinent de decoctione, & illa mediocri purificantur.

Pomum simpliciter si scripserim repertur, de malo est intelligendum, ut Mattheus Syl. scribit.

Syrupus de pomis compositus Mesue in sua practica capitulo de foda ex aggregatione cholerae & phlegmatis, & confert ad ea quæ diximus in capitulo: & est nobile & expertum, & confert quartanæ & oppilationi splenis & omni ægritudine quæ est de melancholia.

R. Capillorum ueneris, Camæpithyos,
Radicum buglossæ domesticæ, Stœcados,
Radicum buglossæ sylvestris, Chamædryos an. 3. vii.
Florum Zuecharum, Squinanti,
Polypodi, Ellebori nigri an. 3. iiii.
Epithymian, 3. i. Fumiteræ 3. i.
Folliculorum fenæ 3. vii. Eupatoriæ 3. iiii.
Succi pomorum dul. vnc. viii.

Omnia præscripta præter epithymum, succum pomorum & capillorum ueneris, bulliant in lib. iiii. aquæ usque ad consumptionem medietatis: deinde bulliant cum eis ebullitione una epithymum & capilli ueneris: postea coletur, & cum succorum pomorum & zuechari clarificati lib. ii. fiat syrupus debito modo decoquendo.

Zuecharum q̄ in syrapiis ingreditur semper debet clarificari & purgari: & non solum in syrapiis sed in omnibus compositis, in quibus zuecharū intrat. Modus igitur clarificandi talis est: qd̄ pro lib. zuechari accipias lunt duo albumina ouorum uel unum ad minus & lib. i. aquæ & simul aqua

& albumina ouorū manibus sunt concutienda. Illa concussione multa spuma refulabit: & quanto magis concutietur tanto maior fiet. In illa igitur spuma exponatur: et diu bullire permittatur: usque ad consumptionem medietatis: deinde ad stamineam panni bene lotam illa oia bene colabis & sic erit zuchchar clarificatū seu purificatum. Sed si uis clarificari syrupus & iulep sine albuminibus ouorum: ita quod remaneant clarissimi & aurei coloris dum coquantur, ponatur in uase succi granatorum acetosorum in fine decoctionis. 3. i. s. mirabiliter. n. clarificat. Et idem facit parum uini boni electi quando uinum granatorum non habetur.

Syrupus de grana myrti Mesue usualis: confert solutioni antiquæ & tussi, & confortat stomachum et pulmonem et uiscera. Et eius modus est sicut syrupus de agresta. Cuius permixtio.

R. Succu myrtillorum lib. vi. Zuchchari lib. iii. s.

Misce & fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de myrtis magistralis ualet ut supra.

R. Granatorum myrtillorum, Rosarum rubearum, ana. 3. i. lorum, Spodii, Carnium cydoniorum, Hypoquistidos. ana. 3. iii. Sumach, Gummi arabici. 3. ii. Acacia, Malticis. 3. s.

Bulliant hæc omnia in lib. iii. aquæ fm artem usque ad consumptionem tertie partis: deinde coletur, & colaturæ addatur zuchchari clarificati lib. iii. & fiat syrupus.

Syrupus de myrtis Mesue non fit in certis partibus, quia succus myrtillorum haberi non potest: & si haberi posset melior, & perfectior isto esset.

Syrupus de corticibus citri Mesue stomachum confortat, & facit oris odorem bonum. Cuius permixtio.

R. Corticum pomorum citri recentium lib. i. Setæ tintæ in Kermes 3. s. idest in grana. Corticum cydoniorū li. s. Decoquantur in aqua fontium lib. v. usque ad consumptionem duarum partium, deinde addatur zuchchari clarificati & cocti lib. i. coquantur usque ad formam syrupi: & in fine aromatizetur cum muci granis. iii.

Aduerte hic & cortices cydoniorum debent poni in fine quasi decoctionis, eo quia parum sificant de decoctione: & hoc ratione aromaticatis suæ.

Ad clarificandum zuchcharum apponenda est pro omni lib. i. zuchchari aquæ communis lib. i. & dicta quantitate bene clarificatur & purgatur.

Syrupus de acetositate citri Mesue. Cuius iuuamentum est magnum in extinguendo inflammationes cholerae rubrae: & febres inflammationes uehementes, & febres peitilentes: & propriæ quæ sunt in rebus uenofa. Et confert ebrietati, vertigini, & siti uehementi. Cuius permixtio hæc est. **R.** Succu acetositatis citri li. xii. Decoquatur in uase uitreato super prunas usque ad consumptionem tertie partis, deinde coletur & permittatur clarescere. Postea accipe ex eo clarior lib. vii. Zuchchari albi clarificati li. v. Misceantur simul & coquantur ad ignem usque ad perfectam coctionem.

Ego autem aliter soleo fieri facere, & pauci sunt aromatarii qui sciunt facere illud. Inmo fere oēs facientes hunc syrupum, diu in forma syrupi non potest stare, sed congelatur tanquam gella, & hoc aduenit imperitiæ faciendum. Sic igitur est faciendum. Accipiatur illud in quo acetositas reperitur citri: & ipsam in pecia subtili & ipsa pone, leuiter que peciam exprimas non uiolenter, exiit liquor clarus non mucilaginosus. Accipe igitur de dicto liquore quantitatem dictam zuchchari albi bene clarificati, & debito modo cocti, quantitatem ut supra: & cum eo pone acetositatem, & soli exponas. Sol. n. cōsumet & paruo tpe humiditatem superfluum acetositatis. Et remanebit clarum & illustum tanquā aqua. hoc enim modo cypriani facium ut ab eis accepi.

Nota quod Mesue dicit. accipe de iulep depurato. Istud accipe de zuchcharo clarificato & iulepizato. non autem de iulep intelligit, ut quidam aromatarii fati credunt &c.

Syrupus uiolatus compositus Mesue. confert tussi calidæ & pleurei.

R. Violarum. vnc. ii. sem. cydoniorum vnc. i. seminis malug.

vnc. i. iuiubæ. Sebesten. ana. numero. xx. Coquantur hæc cum lib. vi. aquæ cucurbitæ secundum artem usque ad consumptionem tertie partis. Zuchchari clarificati lib. i. s. & fiat syrupus debito modo decoquendo.

Aqua cucurbitæ fit incidendo cucurbitas in grossa frusta, deinde ponantur in alembico, & aqua extrahatur.

Syrupus uiolatus ex infusione Mesue confert ad febrem & inflammationem & asperitatem pectoris & tussim & pleuresim. Cuius permixtio.

R. Aquæ infusionis uiolarum. lib. v. Zuchchari clarificati lib. iii. Misce & coquantur cum facilitate, & reseruentur.

Modus infusionis uiolarum hoc modo fit. Accipe uiolarum recentium lib. vi. ponantur in uase uitreato stricti orificii: & postea fundantur super eas aquæ pluuias bulliētis, lib. xv. & stringatur orificium uasis, deinde permittatur per horas ix. His elapsis coletur aliquoties exprimendo & de nouo in uase predicto tñ de floribus uiolarum recentium ponatur, & denuo eadem aqua bene calefacta super eas mittatur & stringatur orificium uasis, & sic per horas ix. dimittatur & iterum tertio hoc fiat seruando modum bis per te seruatum, & dimitte per horas. ix. & postquam aqua infrigidata fuerit coletur a uiolis. Et si illam conseruare uolueris, ponatur in uase uitreato stricti orificii, & distilletur parum olei in orificio eius: & stringatur caput eius, deinde foli exponat per dies. xl. deinde remoueatur & conseruetur.

Violæ sunt colligendæ in mense Martii, & de eis syrupum facias, & omnia alia necessaria.

Syrupus uiolatus si simpliciter reperitur scriptum, de syrupo isto ex infusione semper est intelligendum: & non de composito, siue de syrupo uiolato composito &c.

Syrupus de iuiubis Mesue confert ad raucedinem uocis & tussim et pleurism. Cuius permixtio.

R. Iuiubarum no. lx. Seminis melonum.

Violarum, Seminis lactuæ,

Seminis maluarum. ana. 3. v. Dragacanthi. ana. 3. iii.

Capillorum ueneris. vnc. i. Liquiritiz,

Seminis cydoniorum. Hordei mundi ex corticati.

Seminis papa. albi ana. 3. iii. ana. vnc. i.

Decoquantur in lib. iii. aquæ fontium scdm artem uel aqua pluuiali usque ad consumptionem medietatis: deinde coletur & colaturæ addatur zuchchari clarificati lib. ii. & fiat syrupus debito modo decoquendo. In hac compositione fere omnes textus sunt corrupti, litera. n. multorum dicit iuiubarum. lib. x. quod hæc litera falsa fit apparet cum dicit coquantur in lib. iii. aquæ: non enim possibile est: cum maior sit quantitas iuiubarum quam aquæ.

De hordeo nota quod auctor uult quod excorticetur.amoto enim cortice exteriori tollitur uirtus eius absterfusia & remanet uirtus lenitua cum aliquali siccitate.

Dicit insuper in aqua fontis coqui debet, eo quia post pluuialem subtilior est & penetrationi aptior.

De aqua pluuiali multa infra dicentur.

Syrupus de scabiosa magistralis.

R. Radicum scabiosæ. M. i. hordei mundi a cortice superiori. M. ii. Corallorum rubeo. 3. ii. Aquæ pluuialis lib. x. Bulliant oia simul usque ad crepauram hordei, & cocturam radicis, deinde coletur exprimendo. Cui colaturæ & expressio n. addatur. Succu scabiosæ lib. i. Et iterum cum predictis bulliat succus usque ad ipsius purificationem, deinde coletur, & his addantur zuchchari clarificati li. ii. Pulueris corallorum rubeo. 3. ii. Coquantur usque ad perfectam coctionem & reseruentur. De aqua pluuiali & de corallis in isto syrupo cur restringat, & syrupus iste dilatat partes pectoris, rō d. fit in syrupo de liquiritia ponitur aqua rosata, quia eadem est rō &c.

Syrupus de granatis Mesue. ualet contra febres cholericas & phlegmaticas multæ inflammationis & sitim. Cuius permixtio hæc est.

R. Vini granatorum dulcium, & uini grana. aceto. ana. lib. v.

Coquantur simul usque ad consumptionem medietatis, & dimittat postea per duos dies diu clarescat & resideat, postea remois residua coletur, & his addatur zuchchari clarificati lib. iii. & coquantur ad formam syrupi. Et in medio coctio-

nis addatur seta tindz in Kermes. i. in gra. 3. ii. & permittantur vsque dum facta sit perfecta decoctio. Vinum granatorum fit. Accipiendo grana granati munda data a corticibus & inuoluuntur pecia, & sub torculari ponuntur & exprimuntur & facta expressione colatur & in ampullis ponitur & soli exponit p aliquot dies: deinde sine residetia seu sine fece mittat postmodum oleū oliuaz sup illā apponit & referuat bene, p annos. iiii. cōseruat i bonitate.

Hic notandum q̄ zucharam quod ingreditur in isto syrupo debet esse ab aliqua decocta purgatum: ita quod in eo nulla uel bene pauca sit aqua, quando uinum prædictum granatorum cum eo misceatur: eo quia si longa coctioe cū aqua coqueretur uirtus eius deperderetur.

Syrupus de menta Mef. ex inuentione nostra: & est in usu: ualeat ad stomachū frigidū, confortat nauſeam: uomi tū fluxū uentris, singultū sedat. Cuius permixtio hæc est. R. Succī cydoniorum mizorum & dulciū. Succī granatorum acetosorū dulciū & mizorum. an. lib. i. s. Proiciatur super eos menta siccz. lib. i. s. Foliorū rosarū rubearū. 3. ii. Et si mul dimittant p diē & noctē, deinde coquantur cum facilitate usq; ad medium. i. mediocri decoctione: deinde coletur & his addatur. Zuchari clarificati. lib. ii. Et fiat syrupus debito modo coquendo & aromatizetur cum gallia.

Syrupus nihil aliud est quā decoctio uel succus inspissatus cum aliqua re dulci. s. uel cum melle, uel cum zucharo uel cum fapa. Syccus autem est rob. Rob enim est succus inspissatus per decoctionem ab igne uel fole sine aliqua re dulci: & hæc est ipsorum differentia.

Mizum enim proprie dicitur: cuius sapor est compositus ex dulci & acetoso.

In hoc syrupo sunt qui loco zuchari ponūt mel. Ego. n. zucharo facto cōueniat maiorēq; tēperatiā habeat. Vbi uero intenderent calēfactionem maiorē cū melle fieri pōt.

Syrupus dinarii & eius interpretatio est syrupus de bizantiis Mesue faciens ad febres oppilationem & febres colericas & phlegmaticas: quarum difficilis est eradicatio & ad iteritiam. Cuius permixtio hæc est.

R. Succī endiuiz.	Succī boraginis uel
Succī apii. an. lib. ii.	Succī buglossiz. an. lib. i.
Succī lupulorum.	

Bene depurentur, deinde depurati bulliant in eis.

Foliorū rosarū rubearū. 3. ii.	Seminis anisi.
	Seminis fœniculi.

Liquiritiz. 3. iii.	Seminis apii. an. 3. iii.
Spicz. 3. ii.	Postea coletur.

Accipe igitur de prædicta colatura lib. iiii. zuchari boni & clarificati lib. i. s. Et coquantur cum facilitate omnia simul, donec ad formam syrupi coquantur & referuentur: & hic erit syrupus de bizantiis sine aceto.

Si uero facere uolueris dictum syrupum cum aceto, addas ad omnem partem succorum depuratorum partem mediam. Cum igitur in dicto syrupo apposueris lib. iiii. succorum in quibus fuerint bullite, res præscriptæ ponas aceti lib. ii. Et erit syrupus de bizantiis cum aceto. nihil ultra erit addendum uel minuendum.

Hic multi l. borant aromatarii diuersimode ut succos cōseruare possint: et nō tñ istos, sed oēs alios. Quidam uero post expressionem dictorū succorum bullire ad ignem eos faciunt: deinde referuāt: & hoc mōdo corrumpuntur. Alii post expressionem & colaturā factam cum staminia ad solē ponunt: & facta residetia remouēt illos ad residetia, deinde referuant: & hoc modo etiā corrumpuntur. Ego uero post expressionē illos colari facio p staminia: deinde iterū colari facio per sacculū factū ex tela spissa, ac sic clarificarem syrupum, intantum quod pars grossa superflua hoc modo purificatur. Et quia quādo nō trāsit pp partē spissā claudetem sacculum, tūc uacuo. & sacculi bene lauō: deinde repono succum: & sic facio donec totū sit colatū: deinde in ampulla pono, & supra parum olei oliuatum, deinde soli expono per dies. xv. & si residetiam aliquam faciunt, illam amoueo: & illos sic colatos referuo, nō solū per annum: sed per

annos, & menses: & sic facio de uino granatorum & cydoniorum semper ponendo oleum.

Illud enim a putrefactione conseruat: & tu bene nota. Succī enim isti & similes herbarum in uasis uitreatis uel uitri conseruari debent. Liqueores uero oculorum debent referuari in uase aneo.

Hic nota q̄ succi hi & omnium herbarū solum per annū conseruantur in sua bonitate si cū oleo ut supra apertur & nō plus quare in capite anni debet succi de nouo fieri, et antiqui alterius anni abiici, cū iam oēm uirtutē suā amiserint.

Syrupus de fumoterræ maior Mesue, quod est in uis, stomachum & hepar confortat, oppilationē aperit, & morbos cutis curat: & proprie quorum materia sunt humores falsi aut adulti sicut est scabies, impetigo, serpigo, & lepra. Cuius permixtio.

R. Myrobalanorum citrinorum.	Liquiritiz.
Myrobalanorum Kebulorum. ana. 3. xxx.	Rosarum rub. an. 3. iiii.
Florum bora. uel buglossiz.	Ephithimi.
Violarum.	Polipodii. an. 3. vii.
Abfinthii.	Prinorum.
Cuscucz. ana. 3. i.	Passularum. ana. 3. vi.
	Tamarindorum.
	Cassiz fistulæ. ana. 3. ii.

Hæc omnia bulliant secundum artem in lib. x. aque usq; ad perfectam coctionem cassia, & tamarindis exceptis: deinde coletur: in qua colatura dissoluatur cassia & tamarindis: deinde addatur Zuchari clarificati. Succī fumitæ depurati. an. lib. iiii. Et coquantur ad formam syrupi.

Bulliant in aqua tunc de aqua communi est intelligendū scilicet uel pluuiali uel fontis, & non solum in hoc syrupo: sed in omnibus aliis compositionibus: in quibus absolute reperitur bulliant in aqua.

In aliquibus receptis, & etiā fuit opinio multorum q̄ in hac recepta rosæ non essent apponendæ: & dñt quoddam error scriptoris, qui scribere debebat liquiritiz rasæ & scripsit rosæ: sed falsa pasc scriptorum dico, q̄ rosæ apponendæ sunt: et auctor illas apposuit, ut ipsarum uirtutē reprimatur acuitas multarum medicinarum in ista compositioe intrantū.

Syrupus de prasio Mesue confersens febribus & frigidis naturæ, & ægritudinibus q̄ sunt in pectoris eorum, & tussi antiqua, & asthma, et phlegmate grosso, & putrido, & proprie ei cuius difficilis est spiratio. Cuius pmixtio.

R. Prasii 3. ii.	Seminis maluz.
Hyslopi.	Pœnugreci.
Capillorum uene. an. 3. vi.	Ireos. ana. 3. iiii.
Liquiritiz. 3. i.	Seminis lini.
Calamenti.	Seminis cydon. ana. 3. ii.
Seminis anisi.	Passularum. 3. ii.
Radicum apii.	Ficuum siccarum. nu. xv.
Seminis fœniculi. ana. 3. v.	

Bulliant hæc omnia secundum artem in lib. x. aque usque ad consumptionem medietatis: deinde coletur et his addantur. Penidiarum, lib. ii. Mellis purificati li. ii. Et fiat syrupus debito modo coquendo.

De prasio, nota quod in hoc syrupo ponenda est herba prasii non succus. Selectuarium uero fieri debet ex succo non de herba.

Varia reperitur litera in diuersis Mesue de hoc syrupo. In aliquibus. n. basis huius syrupi est radix fœniculi & apit in aliquibus ficus: in aliquibus hyssopi: in aliquibus capillorum ueneris. Et si sic nō debet appellari syrupus de prasio: quia alia et alia est intentio quam ponunt Mesue: sed recepta debet stare ut supra scripta est: & sic erit intentio syrupi de prasio secundum Mesue.

Syrupus de abfinthio Mesue confersens ad casum appetitus & debilitatem stomachi: & mollificationē uiscerū & debilitatem hepatis & dolorem. Cuius permixtio.

R. Abfinthij romani 3. vi. Foliorū rosarū rubearum 3. ij. Spicz 3. iiii. infundantur hæc omnia per diem & noctē in ui no albo bono antiquo & odorifero. Succī cydoniorū. an. lib. ii. s. ponendo in lapideo uase, deinde coquantur cū facilitate usque ad consumptionem medietatis: deinde coletur, &

colaturæ

colaturæ addantur mellis bene purificati lib.ii. & fiat syrupus debito modo coquendo.

In vna compositione si inuenitur vna res. Cuius plures sunt species quam illarum rerum debemus intelligere. vrbigratia cum scribitur spica vel rosarum &c. dico q̄ debemus intelligere speciem prævalentem aliis in virtute, ut de spica nardi quæ melior est & de rosâ rubea, quia illa prævalente albis in virtute.

Syrpvs de epithymo Mef. choleram nigrâ & humores adultos cum virtute expellens morbos ex eis factos curat: & confert propriæ eis qui parati sunt ad lepram: & qui cancrum patiuntur: & vulnera fraudulenta & fistulas & scabiem & saphati. Cuius permixtio hæc est.

R̄. Epithymi boni & hortensis. 3. xx.
Myrobalanorū citrinorum
Myrobalanorum indorum.
ana. 3. xv.
Cuscuta,
Fumiterræ. an. 3. x.
Thymi,
Calamenti,
Buglossæ. herbæ,
Myrobalanorum emblicorum ana. 3. vi.
Myrobalanorum belliricorū.
Liquiritiæ,
Polypodii,
Agarici,
Stœchados. an. 3. vi.
Rosarum rubearum,
Seminis fœniculi,
Seminis anisi ana. 3. ii. s.
Prunorum nume. xx.
Passularum enuclea. 3. iiiii.
Tamarindorum 3. ii. s.

Bulliant hæc omnia tamarindis exceptis in lib. xv. aquæ fm̄ artem usq; ad consumptionē mediæ tatis, deinde colent, & cum prædicta colatura dissoluantur tamarindi, deinde addantur zucchari clarificati lib. iii. Rob. i. iunium coctum seu sapa lib. ii. & fiat syrupus debito modo coctus.

Epithymi hortensis, dicitur hortensis, eo quia hortense minus vigorosum est quam quod in montibus nascitur, & cōiter minore habet malitiam. Et hoc scribit Saouanrola in sua practica capitulum, de hydropisii asclite de succo radicis ieros & tu uide: & Auic. lib. 1. cap. vi. vbi dicit q̄ res sylvestres sunt omnibus domesticis fortiores, & de sylvestribus q̄ montanæ sunt fortiores.

Passule in hoc syrupo ponuntur vt vigorent operationē epithymi, & remoueat malitiam ipsius quæ timetur ex sua nitrositate. Et ut conferent operationem myrobalanorum & remoueat ab eis malitiam hanc quæ est ut non remaneat in villis stomachi & intestinorum. Folia colligenda sunt q̄ habent quantitatem debitam & non sunt parata ad casum, & non amiserunt colorem suum proprium.

Syrpvs de thymo Mef. confertens ægritudinibus pectoris & pulmonis frigidis, & stomachi, & hepatis & est medicamentum bonum, & confert frigidis qui sunt in hyeme, & confert frigidis complexionē. Cuius permixtio.

R̄. Extremitatum thymi 3. ii. Seminis apii,
Calamenti, Seminis dauci. an. 3. iiiii.
Mentæ siccæ. an. 3. v. Passularum enucleatarum. i.
Seminis anisi, ab omni immunditia purgatarum 3. iiiii.
Seminis fœniculi. an. 3. iiiii.

Bulliant hæc oia fm̄ artem in lib. x. aquæ usq; ad consumptionē mediæ tatis, deinde colentur & colaturæ addatur mellis purificati lib. ii. & fiat syrupus debito modo coquendo, & aromatizetur cum galliæ. 3. ii.

Si in receptis reperitur gallia absolutæ scripta de gallia magna est intelligendū tanquā de digniori & perfectiori.

Passule hoc in syrupo ponunt, ut corrigant & uigoret, virtutem thymi: quemadmodum de epithymo supra dictū est.

Syrpvs de arthemisia Magistralis. valet ad oppilationem matricis, doloribus, eius & male complexioni.

R̄. Arthemisiæ,
Capillorum veneris.
Saurinæ,
Chamædryos,
Chamæphyos,
Origani,
Hypericon,
Cyperi,
Squintanti,
Lupuli,
Polypodii,
Gentianæ,
Rubæ tinctorum. an. M. i.
Spicæ,
Asari,
Thymi,
Epithymi,
Camæmillæ,

Rosarum. ana. 3. j.

Ozimi,
Sampfuchi,
Calamenti,
Scolopendriæ,
Betonice,
Scabiosæ. an. M. i.
Violarum. 3. j.

Sandalorum rubeorum.

Seminum communium

Bulliant omnia hæc in aqua sufficientis quantitatis fm̄ artem, & stent prius in ea infusi per horas. x. Cinamomi. 3. i. s. Serapii. Armoniaci. an. 3. s. Dicitæ gumme ligentur in pecia. Et oia simul bulliant usq; ad consumptionem mediæ tatis: deinde colentur & colaturæ addantur. Mellis purificati lib. vi. & fiat syrupus debito modo coquendo.

Cœqui secundum artem hoc modo intelligitur. Est enim aliqua medicina quæ multū sustinet de decoctione ut sunt radices. Aliqua minus illa ut sunt stipites plantarum. Aliqua iterum minus ut sunt folia. Aliqua adhuc minus & sunt fructus. Aliqua iterum minus & sunt semina. Aliqua minus & minus & sunt flores. Igitur cum tu decoquere uis aliquem syrupum vel aliquam decoctionem. Primo ponas ad bulliendum radicem, secundo stipites, tertio folia, quarto fructus, quinto semens, sexto flores: & hoc modo coques secundum artem. Ista regula non generalis est: sed ab ea excipiuntur quædam herbæ & semina ut inferius declarabitur, ubi numerabuntur & semina & herbæ parum sufficientia de decoctione: sed hanc regulam p̄soluiquia sicut in pluribus euenit & fieri debet, inferius clarius dicitur, declarabitur quæ sigillatim quæ medicinarum sustineant & quæ non.

Semina omnia colligenda sunt quando sunt matura, & a quolisitas propria ab eis est separata.

Syrpvs de, de stœcados Mef. expertus ad omnes ægritudines neruorum frigiditas, sicut est paralysis, epilepsia spasmi, tremor & tortura. Cuius permixtio.

R̄. Stœchados. 3. xxx.

Asiæ. i. thymus,

Calamenti,

Origani. an. 3. x.

Seminis anisi. 3. vii.

Bulliant hæc secundum artem in aqua sufficientis quantitatis usq; ad consumptionem tertiæ partis. Postea colentur & colaturæ addantur Mellis purificati lib. v. Et fiat syrupus debito modo coquendo. Et facta quasi perfecta decoctione vel parum distante a decoctione, ponantur hæc grosso modo contracta & in pecia ligata videlicet.

Cinamomi,

Calami aromatici,

Spicæ,

Croci. ana. 3. i. s.

Et referuetur in vitreato vase, in quo si vis peciam potes relinquare in qua sunt aromata.

Bulliant in aqua sufficientis quantitatis. Nota quod ista sufficiens quantitas, diuersificatur multipliciter. Nam quanto sunt res quæ multum sustinent de decoctione, tunc p̄ro omni manipulo, ipsarum apponi debent aquæ bocalia quatuor. Si vero mediocriter medietatem. Si parum, bocale vnū tantum. Si vero mensuretur vnciis, debes p̄ro omni lib. rem ponere lib. vi. aquæ si multum sustinet de decoctione. Si mediocrem lib. iii. Si parum lib. i. s. Etideo caueant viri in manibus rudium aromatariarum se ponentes. Et domini medici bene considerent quæ aromataria sit quæ suas ordinationes dispensat, quia si ignarus, ne & animæ & honoris suo &c.

Syrpvs de hyssopo Mef. confert asthmati & tussi, & dolori pectoris, & laterum, & lacertis pectoris. Cuius permixtio hæc est.

R̄. Hyssopi siccæ,

Radicum apii,

Radicum fœniculi,

Radicum petrosilii,

Liquiritiæ. an. 3. x.

Hordei mundi. 3. iiiii.

Seminis maluæ,

Dragacanthi. an. 3. iiiii.

The. arom.

BB

Seminis cydoniorum. 3. iii. Passularum enucleatarum.
 Capillorum ueneris. 3. vi. vnc. i. s.
 Iuiuberum, Ficuum siccarum.
 Sebelten. an. nu. xxx. Daſylorum pin. an. nu. x.

Coquantur omnia fm artem in aqua sufficientis quantitatibus, in aqua pluuiali usq; ad consumptionem duarum partium, deinde colentur & colaturæ addantur, Albarum penidiarum lib. ii. & fiat syrupus debito modo coctus.

Radices colligende sunt cum folia crediderint quia tunc & natura & uirtus foliorum reuertitur ad radicem, & tunc fortior est uirtus radices.

Radix si simpliciter scripta reperitur in compositis, de ratione domestico est intelligendum. Sic enim & Romani & Græci hodie accipiunt.

Syrupi omnes isti, scilicet uiolatus, de hyssopo, de scabiosa, de liquiritia, de prasio, de iuiubis, et oēs decoctiones peccatorales cum aqua pluuiali faciendi sunt : non cum aqua cōmuni, et ratio, est quia aqua pluuialis est magis subtilis, & ratione subtilitatis magis penetratua, facitque uirtutes aliarum medicinarum ad partes peccoris penetrare: quæ cū alia aqua non penetrarent. Et ad dominum Auicennam dicentem, quod aqua pluuialis ratione subtilitatis suæ substantiæ citius periret: dico quod uerum dicit, & hoc propter impressionē aeris ab extra. Sed ab ira sec' ē, quare bñ nota: Albarum dicit auctor penidiarum, eo quia penidi fieri debent ex zuchcharo albo: non cum puluere rubeo ut quidam faciunt aromatarii nostri temporis &c.

Syrupus de liquiritia Mef. confert tussis antiquæ, & mundificat peccus et pulmonem. Cuius permixtio hæc est.
 B. Liquiritiæ rasæ & mundæ. Capillorum ueneris. 3. i.
 dz. 3. ii. Hyssopi sicæ. 3. iii.

Prolice super his aquæ pluuialis lib. iiii. & dimitte p diē & noctē, deinde coquantur fm artem usque ad consumptionem medietatis: deinde colentur & colaturæ addantur. Mellis purificati, Penidiarum. ana. 3. viii.
 Zuchchari clarificati, Aquæ rosarum. 3. vi.

Bulliant & coquant usq; ad formā syrupi & referuetur. Hic notandum quod absurdum uidetur quod in isto syrupo auctor ponat aquam rosam: cum ipsa redingat. & hic syrupus debet dilatare partes peccoris: & hoc nō solum uidetur contra rationem: sed et est contra facientes hunc syrupum: eo quia nulli sunt qui aquam rosam in eo ponant. Ad hoc dicendum quod recte ponitur: & quoniam non ponunt multum errant, & ratio est. Nam ad hoc quod syrupus iste ualeat tussis antiquæ et pulmonem et peccus mundificare: non solum oportet quod in eo sint dilatantia partes peccoris, lenientia & maturatua catarrhū ut plurius capillos ueneris et hyssopi sit. Sed et necesse est quod in eo sint ea quæ partes relaxatas adiuuent, & uirtute expulsiuā confortent atque refocillent: & fortificent: et hoc fit per aquam rosam, igitur rationaliter ponitur. Et sunt aliqui qui ponunt aquæ infusionis rosarum uiridum.

Tribus modis uel altero trium modorum cognoscitur quod syrupus est coctus primo quando accipitur cū spatula distillat continuè sicut oleū. secundo quod adheret spatulæ. tertio si ponatur super unguem una gutta remaneat, & non discutitur huc uel illuc: & hæc est uera cognitio coctionis.

Syrupus de eupatorio Mef. confert febres antiquas, & proprie eis quibus corrumpitur forma stomachi: & hepatis, oppilationes aperit: & confert frigiditati hypochondriorum & iniectioni hydropis.

B. Radicum apii, Sucka. Radix cardonis benedicti semi.
 Radicum foeniculi, Florum buglossæ,
 Radicum endiuie an. 3. ii. Seminis foeniculi,
 Liquiritiæ, Seminis anisi,
 Squinanti, Eupatorii. ana. 3. v.
 Cuscutæ, an. 3. ii. Raud. Rheubarbari,
 Absinthii, Malticis. ana. 3. iiii.
 Rosarum tubearum an. 3. ii. Spicæ,
 Capillorum ueneris, Affari,
 Bedegari. radix cardonis benedicti masculi
 ana. drach. v. Folii. ana. 3. ii.

Coquantur in lib. viii. aquæ secundum artem usq; ad cōsumptionem tertiæ partis: deinde coletur & colaturæ addantur zuchchari clarificati lib. iiii. Succii apii, Succii endiuie de purati. ana. lib. iiii. 3. ii. 3. iiii. & grana. xii. Et fiat syrupus debito modo coquendo.

De bedegar et sucka ē magna diuersitas inter doctores Auic. Math. Syluaticus. Dioscorides. Simon Ianuenis Plinius, & Gentilis exponunt quod est spina alba. Gentilis etiam exponens receptam sotæ: quæ quinto canon. describitur, dicit iterum quod est maneria spinæ, pro qua communiter sumitur alba spina. Et infra eo lib. pro expositione pilularum: dicit: & bedegar est modus spinæ, et creditur quod fit spina alba hoc est quod a doctoribus elicere potuit: qui consule loquentur, quia dato quod fit spina alba non ponunt quam partem ipsius plantæ apponere debemus. Cum munitur aromataria ponunt quandam rem habentem similitudinem spongiz quæ reperitur adhæreere plantæ rosæ syluestris, & dicunt esse bedegar.

Sucka de sucka dicit Simon Ianuenis quod est nomen arabicum, & idem importat quod spina arabica: & hoc idē dicit Galenus, Rasis, Halyabas, Matth. Syluaticus. Paulus uero ualens ostendit, e quid sit sucka. est herba dulcis quæ extenditur super terram: & facit capita grossa, & flores sanguinei coloris: sed hæc apud nos non reperitur. Alii uero dicunt quod sucka. i. bedegar & bedegar. i. sucka. & sic exponunt ignotum per ignotum.

Alii uero postponentes cantōrū uiuorum ambiguitates solent hoc in syrupo apponi facere iuncos marinos & radices cardonis benedicti: & dicunt quod hæc uidetur de mente auctoris cum illa sit aperitiua prouocatiua urinæ: confortatiua hepatis, quæ oia queruntur a syrupo de eupatorio, & quod reperitur experimento bene eis succedere.

Sed & hæc illi a ueritate sunt multum distantes. Igitur scias quod, bedegar est radix cardonis benedicti, quæ masculus dicitur nullum florem faciens, nec tirsium, sed folia extenduntur super terram & folia striciora sunt & breuiora sucka magis incisa. Sucka nota est radix cardonis benedicti florem faciens cum grosso capite cum paruo tirsio. immo a radice non extenditur per longitudinem spatæ seu leuati, & in futura & propinqua pluuiā contrahitur, & in sereno dilatatur et femina dicitur. differt a superiori cardone per folia tirsium & florem. Apud nos non reperitur uel raro duo hi cardones, sed portantur a montibus Bilinzone in confinibus Tentonicorum ducis Mediolani in montibus & faxis oriuntur & hæc est uera expositio & declaratio bedegar & sucka &c. et duæ hæc radices in hoc syrupo ponuntur non aliud &c.

Pauci super sunt qui hunc syrupum sciunt facere. Mef. enī dicit fiat syrupus cū succi apii & endiuie quantitate sufficienti, & nulli sunt qui hanc sufficientem quantitatem eligere sciunt. Igitur nota quod per hanc sufficientem quantitatem intelligitur proportio quantitas zuchchari ad succos, quemadmodum proportionauit & posuit in syrupo de bizantiis. succi lib. iiii. zuchchari lib. ii. s. quod est pro omni lib. zuchchari succi depurati. 3. xix. cum. 3. i. 3. i. gra. xvi. nec plus nec minus. Illo igitur modo proportionando resultat succi quantitas prescripta supra nec plus nec minus, & hæc fuit & est opinio doctoris quare bene nota quia pauci faciunt hunc syrupum secundum rationem.

Flores colligendi sunt quando perfectè sunt maturi et antequam cadant & antequam dimittant colorem suum &c.

Syrupus de calamito Mef.ue spleneticis, & frigida habentibus uiscera, & senibus, & tussis antiquæ, et asthma ti. Cuius permixtio hæc est.

B. Calamenti domesticī, Cheisim. i. semen leuistici,
 Calamenti syluest, drach. vi.
 ana. 3. ii. Dauci. ana. 3. vi.
 Passularum mundatarum. 3. iiii. Squinanti,
 Mellis purificati. lib. ii.

Et fiat syrupus secundum artem.

Syrupus ad matricem Magistralis. ualeat ad omne uitium matricis, et maxime mulieribus quæ sūt frigide naturæ.
 R. Cala-

R. Calamenti,
Stœcados,
Petrosillii ana. 3.iii.
Saurina,
Chamadryos,
Chamepithyos,
Poli montani ana. 3.iii.
Maioranz, Ameos,
Dauci, ana. 3.ii.

Squintani,
Cyperi,
Cuscute ana. 3.ii.
Cassia lignea,
Aristolochia longæ,
Gentianæ,
Baccarum lauri,
Reupontici. an. 3.i.s.
Aque fontium lib. ix.

Coquantur omnia in dicta aqua usq; ad consumptionem tertie partis: deinde coletur & colatur addantur Zuechari clarificati lib.iii. & fiat syrupus secundum artem &c.

Syrpvs cordialis Magistralis. valet ad tremorē cordis, & eū cōfortat & stomacho libuenit: syncopi & mania- eis subuenit: & auert calōrē: & scim in corpore extingit.

R. Melissæ, Florum boraginis,
Endiuiz an. M.ii. Florum buglossæ an. M.ii.

Et fiat de prædictis decoctio secundum artem ut superius declarauimus in aquis uidelicet.

Aque endiuiz, Seminis acetosæ 3.s.
Aque buglossæ, Vini pomorum ranciorum,
Aque rosarum rubearum, Vini granatorum an. 3.iii.
Aque melissæ an. 3.iii.
Seminis quatuor frigidorum
minorum 3.iiii.

Suspensatur cum pecia ligata in syrupo. Zuechari albi clarificati q. l. Et fiat syrupus secundum artem &c.

Syrpvs de cicorea Guillemi de Sali. ualet contra omnem materiam uenenosam in alterando & mundificando eam & propriæ ualens in antrace & carbunculo: & similibus & febre pestilentiali æstuali & autumnali. confortat eor & nutritia extinguendo calorem materialem: mundificando materiam per urinam & fecessum: & facit appetere cibum, & inducit somnum & fit ut infra.

Foliorum cicoreæ M.ii. Acetose,
Foliorum boraginis, Scario agrestis i. batile,
Lactucarum, fere sue flores quæ di-
cuntur monegete &
Violarum dico flores, nascuntur in bladis.
Florum scariolæ, an. M.s.
Linguz bouine,

Conterantur grosso modo, & bulliant secundum artem in lib.iii. aque usq; ad consumptionem tertie partis: & co- lentur, & in colatura addantur Zuechari clarificati lib.ii. Et bulliant simul & in dicta bullitione addantur Rheubarbari electi & puluerizati 3.ii. & aliquando rheubarbari 3.ii. Et in usu est communiter de 3.ii. Rheubarbarum suspensatur in pecia in dicto syrupo & saepe exprimitur pecia rheubar- bari cum manu usquequo coctus sit syrupus.

Et nota q; rheubarbarū dēt poni qd syrupus erit mediocri- ter coctus, quia rheubarbarū parum sustinet de decoctione.

Syrpvs Sabor regis Meli in practica in ca. de melan- cholia & mania, & uocatur Sabor rex Medorum confers mania & melancholia ex adustione cholæ citrinæ. Cuius permixtio.

R. Succu buglossæ domesti- Folliculorum senæ,
cæ, vnc.iiii.
Succu buglossæ sylvætris an. Croci 3.ii.
lib.ii. Zuechari tabazet.
lib.iii.

Fit autē sic senæ proiciantur in succis per diem & noctē post contritionem eorum: deinde bulliant ebullitione una, aut ii. deinde cum zucchero fiat syrupus crocus autem con- fricetur in panno cū decoctione: da 3.ii. uel. iii. cū aqua bu- glossæ: & q;que apud necessitatem daturus cum aqua cæsi.

Syrpvs diamoroni Mef. & est conueniens ad aposte- mata gutturis, & uicæ: & ad omnia genera præfocationem.

R. Expressionis mororum seni seu baci an. lib. i.s.
celi. Rob. i. vinum coctum,
Expressionis mororum de Mellis purificati an. lib. i.

Coquantur omnia simul usq; ad spissitudinē & referuet.

Rob idem est quod sapa sec uinum ultimate decoctū Ro

bub autem propriæ est quicquid succus inspissatus uel cali- ditate solis uel ignis. unde licera Mef. quæ dicit rob est cor- rupta ex defectu transitoris, debet enim dicere rob ubi- gatur quando Mef. dicit Rob. i. rob ubi suppleatur &c.

Syrpvs de lymonibus ualet mirabiliter in febribus idest contra febres pestilenciales. Cuius permixtio.

R. Succu lymoncelli li. xii. Zuechari albi li. v. Et fiat syrupus sicut syrupi de acetositate citri nec plus nec minus prout patet in isto.

Syrpvs de Ribes stomachum calidum confortat: vo- mitum colericum sedat: scim extinguit: cordis ebullitionem mitigat & ipsum confortat: solutionem cholicam fringit & alterat.

R. Succu ribes lib. xii. Zuechari albi lib. v. Et fiat syrupus hoc modo primo bulliat succus ebullitione una: aut duabus & dimittat frigelet & clarifieri, & coletur; & cum zuc- charo superscripto & clarificato fiat syrupus secundum ar- tem & seruetur in uase nitreato &c.

Ribes quidā dicunt q; est acetosa: & quidam dicunt quod est coctus sed falso: qm non est acetosa: qm Mef. facit semo- tim capitulū de rob de ribes a capitulo de rob de acetosa. Si- militer ubi ponit capitulum de rob de ribes aucti, quod ualet sicut rob de acetosa. Item non est coctus: qm coctus est cali- dz & sicca complexionis: sed ribes sunt frigide & sicca.

Albani est planta stipitem habens rubrum ad uiriditatem decliuem, tenerum: cuius sapor est dulcis, acetosus mixtus habet folia rotunda uiridia nigra: cuius granum portatur de corale: cuius acidus saporis de quo fit rob &c. Nos autem loco eius accipimus succum acetosæ, quæ est lapacium agreste quod ponere possumus.

Serapio in libro aggregationū. capitulo de ribes auctori- tate Isaac uenarum Ribes ex planta habens capreolos recē- tes rubeos ad uiriditatem declinantes: & habet folia magna lata rotunda uiridia & habet grana: qm sapor est dulcis cum acetositate, & ipsa est frigida & sicca in secundo gradu, & si- gnum super hoc est acetositas eius & stipicitas: & ex hoc contingit q; infrigidat stomachum: & aliqui dicunt q; est fri- gidus & siccus in tertio gradu. Nascitur autem planta ista in montibus Syriæ frigidis, nuiusius patet in pandectis.

TRIANDALI Nicolai dicuntur a tribus generi- bus sandalorum qui ibi intrant. Dantur propriæ contra calorem hepatis, stomachi, phthisicis, iëtericis. Cuius permixtio.

R. Sandalorum alborum, Gummi arabici,
Sandalorum rubeorum, Dragachanti ana solidum. i.
Sandalorum citrinorum, idest an. 3.i.s.
Zuechari albi ana solidos Seminis melonum,
duos idest ana. 3.iii. Seminis cucumeris,
Rheubarbari, Seminis citrulli,
Spodii s. de canna, Seminis cucurbitæ,
Succu liquiritiz, Seminis scariolæ an. solidum
Seminis portulacæ s. dome. i. idest an. 3.i.s.
sticæ an. solidum. i.s. idest Amphoræ 3.i.s.
3.i.s. 3.i. gr. i.s. Rosarum rubearum,
Amydi solidum. i. idest vnc. i.s.
3.i.s. Puluerizetur subtiliter.

Syrupi rosati lib. ii. & fiat electuarium. Sed communiter fit in forma solida.

Solidus. n. idem est quod 3.i.s. ut omnes doctores affir- mant: & exagium: idem etiam est: & non differt a solido nisi solum nomine.

Omnia simplicia ex quibus cōfectiones electuaria & cō- positiones oēs cōponuntur nō sunt simul terenda. Sed quæli- bet simplex medicina per se conterenda est & puluerizanda & ratio est quia oia nō sunt eiusdē cōplexionis & subtilitatis. Immo quæda sunt multo de contritione & quædam mi- nus. Cinnamomum enim & macis sunt raræ subtilitatis, ga- riofilli uero & gumme, sunt densioris subtilitatis, quapro- pter ut ex contritione uirtus ipsorum non depēdatur, omnia de per se debent puluerizari, quod secus faciunt aro- matici nostri temporis & male: immo nimirum si compo- sita non habent uirtutem a doctoribus limitatam. Et hoc

idem in decoctionibus est aduertendum ut in tractatu syrporum te scire feci.

TERZEA ad ardore urinae Magistralis. Cuius permixtio.
℞. Seminibus melonis mundi Seminibus portulacae,
3. xv. Seminibus papaueris al.
Cucurbitur. i. semen mundae an. 3. i. s.

Incidentur minutissime & cum zuccharo albo ad pondus omnium fiat terzea.

TRIPIPERA magna Nicolai magna dicitur: quia magnam utilitatem & fructum mulieribus confert, datur contra dolorem stomachi uirorum & mulierum cum aqua in qua cocta sunt semina foeniculi, anisi, & masticis, datur contra uitia matricis ex friguitate: si disterperata bibatur cum uino in quo cocta sit arthemisia: prouocat etiam menstrua si fuerit cum arthemisia bene trita: & oleo musciculi commixta, & pessarius ex bombice factus, si fuerit ex ea inunctus in naturam mulieri immixtus non concipiet. Si datur cum uino in quo cocta sit mandragora uel sambucum miro modo prodest pueris qui non possunt dormire, & in nocte nimis garrigunt: disterperata cum lacte mulieris in modum ciceris & bibita prodest. Cuius permixtio.

℞. Cinnamomi, Acori,
Galangae, Rosarum rubearum,
Garyophyllorum, Piperis nigri,
Zedoariae, Seminibus anisi,
Zingiberis, Seminibus apii,
Coli, Seminibus petrosillii,
Storacis ca lamitae, Seminibus foeniculi,
Calami aromatici, Macedonici,
Cyperi, Dauci,
Radicum ieros, Ozimii, semen basiliconis,
Peucedani, Seminibus iusquiami,
Corticum mandragorae, Cymini,
Spice celticae, Diptami, an. 3. i.

Puluerizentur omnia subtiliter, & cum mellis li. i. 3. ii. cocti & deputati fiat confectio: & hoc modo faciendum nihil addendo uel minuendo erit triphera sine opio. Si uero cum opio facere uis, addas praedictis omnibus opii thebaici. 3. ii. & cum opio trisera erit. Sed in hac prima mulieres uolunt illam in zuccharo. Accipe igitur suprascriptarum specierum sine opio. 3. i. zucchari lib. i. & facias. Confectio haec danda est stomacho uacuo, & differenda est confectio usquequo de ea facta sit digestio. Et dicitur species subtilissime sunt terendae ac puluerizandae. Dicitur enim compositio haec triphera i. hominem iuuenem reddens.

Nota q. quauis in multis confectionibus reperias scriptum mellis cocti, q. tamen cum melle crudo & mundo posunt confectiones fieri: & illud habet minus de spissitudine & magis de penetratione. Igitur ab auctoribus saepe inuenies scriptum mellis cocti, & quandoque mellis crudi, ut per hoc intelligas q. utrunq. potes ponere & conuenienter.

TRIPIPERA perfica Mesue, experta apud perfas: & coferet febribus acutis & inflammationi stomachi: & hepatitis, & ictericis calidis, de oppilatione incolumitatem acquirit. usum a fumis cholicis deperditum reparat. Sitim mitigat morbos aditionis fieri prohibet, & est medicina magna in aestate pestilentiali & autumnali. Cuius permixtio.

℞. Succu solatri, Prunorum damascenorum
Succi endiuiae, num. 50.
Succi apii, Cuscutae. 3. iiii.
Succi lupi. depu. an. lib. i. Myroba. kebulorum,
Folliculorum fenae. 3. ii. Myroba. indorum.
Violarum siccarum: aut uiridum. 3. iiii. Myroba. citri. an. 3. ii.
Agarici. 3. i. Epithymi. 3. xl.
Inuoluantur myrobalani in oleo amygdalarum dulcium. Rheubarbari. 3. ii.
Tamarindorum. 3. iiii. Myroba. citrinorum. 3. i. s.
Mannae electae. 3. i. s. Myroba. kebulorum,
Casiae fistulae. 3. iiii. Myrobalano. indorum ana
Zucchari uiolati lib. i. 3. viii.
Zucchari fini albi lib. iiii.
Aceti uini lib. i. Myroba. emblicor. 3. iiii.

Myroba. bellerico. 3. iiii.
Granorum sumiterae,
Trochiscorum diarhodoni,
Macis,
Masticis,
Cubebe,

Spodii,
Sandali citrini,
Quatuor feminum. s. femina
comunia frigida. an. 3. ii.
Anisi. 3. iiii.
Spice. 3. ii.

Modus confectionis eius est, ubi dicit Solatri, Endiuiae, Apii, & lupulorum, unte ut sit succus depurati an. li. i. & proiciatur super eos uiolari folliculorum agarici prunorum cuscutae: myrobalani Kebuli: myrobalani indii: myroba. citrini: spice, & accipiat de suprascriptis quantitas fuit prius diximus: & bulliat super prunas co. facilitate dum remaneant li. ii. & in istis suprascriptis sint succi lib. ii. & bulliant simul & proiciatur super ista epithymi boni. inuoluantur myrobalani in oleo amygdalarum dulcium uel oleo uiolati, & bulliant ebullitione una, & deponatur ab igne & excoletur: & dissoluantur in una parte istius colaturae tamarindorum, calisae, mannae, zucchari uiolati: colentur & mudentur a granis & scopis. & in alia parte aquae proiciatur zucchari. fini, & aceti: coquantur cum facilitate: deinde pone syrupum istud quod dissolutum est in succis, & aggregentur similiter & coquantur usq. ad mellis spissitudinem. ultimo uero proicias super istud rheubarbari: myrobalani citrini: myrobalani indii: myroba. Kebuli: myrob. bellerici quantitate sicut prius diximus, quatuor granorum sumiterae: trochiscorum diarhodoni: macis: masticis: cubebe: & clarificat colorem: & confortat uiscera: & abscondit fluxum ueteris. Cuius permixtio.

TRIPIPERA minor ex arte Phenonis Mesuaelet ad corruptionem & exuberantiam menstruum & haemorrhoidarum: & ad corruptionem formae: & debilitatem stomachi: & destruit humorem crudum: & clarificat colorem: & confortat uiscera: & abscondit fluxum ueteris. Cuius permixtio.

℞. Myrobalanorum Kebulorum,
Myrobal. indorum,
Myrobal. bellericorum,
Myrobal. emblicorum,
Nucis muscatae an. 3. v.
Nastureii,
Assari,
Origani persici,
Piperis,

Olibani ana. 3. iiii.
Ameos,
Zingiberis,
Carmeziti. i. fructus tamarisci uel flos.
Spice,
Squinanti,
Cyperi. an. 3. iiii.
Scoriae ferri nutritae in aceto 3. dies v. & affat. 3. xx.

Myrobalani assentur cum butyro uaccino & c. inuoluantur cum oleo amygdalarum dulcium & aromatizentur cum. 3. i. Musci. Mellis. q. f. & da post sex menses, dosis est a. 3. i. usque ad. 3. iiii. Est enim expertum & efficax & proprie ad humoresitatem stomachi & putrefactionem in ipso.

TYRIACA magna Andromachi quae melior est omnibus, & quae fieri debet. Cuius descriptione reperi in quodam libello Gentilis de uenenis: quam ut ipse testatur habuit & extraxit a quodam libello Andromae. propria manu scripto.

Tyriaca magna Andromachi dicitur: quia ab eo composita fuit ualeat contra grauissimas passiones humani corporis: epilepticas: apoplepticas: stomachicas, cephalalgicas, & hemigranicas: prodest ad rauendae uocis: constrictione pectoris: prima est arteriacis, asthmaticis, emoptoticis, ictericis: hydropticis, peripneumoniacis: iliois: & uulnera in intestinis habentibus phreneticis: iliois: colicis subuenit: mentis educit, & foetum mortuum expellit: lepra curat: & frigori prodest: & ceteras passiones inueteratas emendat: praecipue contra oia uenena & serpentum morsus & reptilium ualeat: sed in uersa est eius dos. s. pro quantitate & qualitate uniuscuiusque passionis quae in Andronacho scribitur.

℞. Trochiscorum de squilla aur. xlviii.
Trochiscorum de tyro.
Trochiscorum andaracharon.
Piperis nigri,
Opium thebaicum ana aureos
xxiiii.

Cinnamomi electi,
Rosarum rabeorum siccarum,
Seminis napi syluestris.
Scordeon. i. allium syluestre,
Ireos. i. radicem,
Agarici albi,
Succi liquoricis,

Opobalsami, idest olei. ana.

aur. xii.

Myrrhæ puræ,

Croci,

Zingiberis,

Rheubarbari,

Radicum pentaphyllon,

Calamenti montani,

Prasfi, alii petrosillii,

Macedonici. i. semen,

Stœcædos arabici,

Costi amari,

Piperis longi,

Pulegii indi,

Olibani,

Floris squinanti,

Terebenthinæ,

Castiæ lignæ an. au. vi.

Edellii,

Galbani,

Aspalti,

Opopanaci,

Centauræ mi. ana. aur. ii.

Spicæ nardi,

Polii montani,

Piperis albi an. aur. vi.

Storacis liquidæ,

Seminis apii,

Sileris montani,

Dauci. i. semen,

Et nota q̄ pro omni libra mellis sunt. j. iii. specierum præ-

dictarum, & hoc uoluit bonus Andromachus & apponi de-

bet si tyriaca debet habere uirtutem descriptam a doctori-

bus & in alia. j. vi.

In hac descriptione multa sunt intelligenda. Et primo de

opio thebaico, d. n. opii thebaici quia factū & collectū ē

Thebis: quia illud est melius & perfectius quocūq; alio opio

ubiūq; collecto, & est minoris piculi & timoris usus eius.

De calamento dicitur montanum : & ponitur quia habet

maiores caliditatem & siccitatem quam calamentum fluui-

le: quod nascitur iuxta aquas.

Stœcædos arabici dicitur arabici quia in Arabia oritur

& ille melior ē, & in illis tribus montū colligit. Sed nos uti-

mur stœchados q̄ colligit in partibus Romæ, & est pfectū.

Loco chamæpithyos si non haberetur accipi potest ina-

muscata quæ a Mes. in capitulo de ægritudinibus neruorum

appellatur zinzem.

Hypoquistidos succus est barbæ hircinæ, & illud ponitur

non herba, non solum in hac compositione, sed in omnibus

medicinis, in quibus simpliciter reperies scriptum hypoqui-

stidos, & qui herbam ponunt, male immo pessime faciunt.

Cetauræ de minori intelligendū est, & illa in medicinis

administretur, quia si simpliciter reperitur, de ea est intelligen-

dū. Et radix accipi debet nō herba, ut quidā rudes faciunt,

Vetriolum seu colcotar hoc modo aduritur. Accipe de eo

quantitatem q̄ uolueris, & pone in patella ad ignē, & conti-

nue sub ea insufflatur donec ignitur, & continue utriolo-

rum uolatur, & tantum hoc fiat, quod eius naturalis calor

muret, & tunc remoueatur : quia adustum est.

Species istæ tyriacæ debent subtiliter teri seu pulueriza-

ti & bene cribellari per subtilem & spissum sedacium, ut

melius, & citius res filum fermentari possint, ut Mesue, &

Auicenna scribit in capitulo de tyriaca.

Puluerizabile enim idem est quod comminubile, uel di-

uisibile in partes paruas, & hoc aliud quam frangibile.

Vilitas autē puluerizationis est, quia facit penetrare uir-

tutes medicinarum ad partes, ad quas non penetrarent.

Ætates. n. tyriacæ sunt quatuor. Prima dicitur infantia,

& incipit a die cōpositionis usq; ad sex menses. Secunda pu-

bertas quæ incipit post illud tēpus, & durat usq; ad decem

annos. Tertia adoleſcentia, & incipit post illud, & durat us-

que ad xx. annos. Quarta senectus, & incipit post illud, &

durat usque ad xxx. annos, post illud expoliatur a uirtute

tyriacæ.

In uase plumbi tyriaca debet poni uel conseruari, uel ar-

genti, in alio. n. uase posita facit quandam feruginem quæ ap-

pellatur zinian, & consumitur humiditas eius naturalis, &

necessaria in tyriaca. quare in plumbo bene conseruatur

Et uas in quo ponitur non debet repleri, sed saltem tertia

pars uasis debet esse uacua, ut medicinæ possint respirare,

& exhalare ne seſe suffocent.

TYRIACA Galeni quæ communiter fit, licet non fit tan-

tæ perfectionis quantæ est præscripta Andromachi. Cuius

permixtio hæc est.

R. Trochiscorum de squilla

lib. iiii.

Piperis longi. lib. ii. j. iii.

Trochiscorum tyri. lib. i. s.

Trochiscorum diacoral.

lib. i. s.

Xylobalsami. i. lignum bal-

sami. lib. iiii. j. x. s.

Opii thebaici. i. illius pro-

uincæ. j. vii. s.

Rheubarbari,

Spicæ nardi,

Costi,

Squinanti an. j. vi.

Croci,

Zingiberis.

Castiæ lignæ,

Storacis calami,

Myrrhæ,

Terebenthinæ,

Calamenti montani,

Thuris,

Diptami an. j. vi.

Stœcædos arabici,

Polii montani,

Pentaphylli,

Piperis an. j. vi.

Folii,

Petrosillii,

Gummi arabici,

Agarici,

Rofarum,

Radicum ireos lilii celestis

Leuistici an. j. vii. s.

Et est fermen pestinacæ syluestris. Mellis costi, & despu-

mati rubos. y. & lib. v. quod est pro omni lib. i. mellis. j. iii.

specierū. Sed aromatarii auaritia ducti hoc tempore solum

ponunt lib. iiii. specierum pro rubo vno mellis, & malefaci-

ciunt & ob hoc tyriacæ non habet uirtutes a doctoribus de-

scriptas: quare semper ponas j. iii. specierum pro omni li. i.

mellis. Et præscriptum mel si coctum bona coctione.

Crocus uero, & hypoquistidos per se puluerizantur ac ui-

triolum. gummx uero in optimo uino albo dissoluuntur,

alia uero omnia simul, mel uero infrigidat, terebentina, &

hypoquistidos intus ponantur: deinde oēs aliz species. Cro-

cus uero infundatur in uno locali optimi uini nigri : & di-

mittatur per tres dies: deinde cum dicto uino in tyriaca po-

natur: utriolum uero etiam in uino dissoluatur, & in tyria-

ca ponatur. & simul misceantur. Sunt qui addunt galletti su-

btiliter puluerizati. j. s. ut tyriaca maiorem nigredinem ha-

beat. Sed hoc ego non laudo. Cum extra mentem Galeii

& omnium doctorum fuerit, & nunc præsentium fit.

Hoc nomen tyriacæ est nomen impositum ab effectu. idē

enim est dicere tyriacæ, quod conferens uenenis, sed præsen-

tium, & aliarum medicinarum uenenosarum. Et ideo hoc

nomen habet duas partes, tyria. n. significat serpētem, & Ka,

quod significat medicinas uenenosas cum componitur. igit-

ur tyriacæ est nomen quod significat rem quæ uiuat in ue-

nenis serpentum : & medicinarum uenenosarum, & est uo-

cata tyriaca a carne tyri.

Scordeon. i. allium syluestre,

Seminis rapæ syluestris,

Cinnamomi ana. j. vii. s.

Colcotar ustri: idest utrioli

adusti,

Serapini,

Terræ sigillatæ,

Hypoquistidos, idest succus

barbæ hircinæ,

Spicæ celticæ,

Radicum acori,

Chamædryos,

Gentianæ. i. radix,

Sistræ. i. ualeriana,

Carpobalsami, idest semen

balsami.

Seminis apii,

Amœos,

Amomi,

Seminis foeniculi.

Carui,

Sileris montani. i. semen.

Nasturtii,

Anisi,

Mummiæ,

Opopanaci,

Galbani,

Aristolochiæ longæ,

Hypericon an. j. iiii. s.

Caltorei,

Asphaliti,

Centauræ minoris, scilicet

radix.

Dauci an. j. ii. j. vi.

Agaricus, iros, & radix acori ponuntur in hac recepta & in aliis: quia habent in se uirtutem conferuandam alias medicinas, ne cito corrumpantur, & augent earum uirtutes. Et sic ponitur, ut conferuet zingiber a corruptione.

Anacardi corrumpunt uirtutē trochiscorum tyri. dictique trochisci debent esse parui, & bene compressi, si conferuari debent, & non debent excicari in sole. Sol. n. habet uirtutē dissoluendi, & destruendi uirtutē carniū tyri, & uiperarum.

Tyriaca non debet dari nisi sit fermentata, & fermentatio fit in tpe sex mēsiū. Quid aut sit fermentatio nota. Nam cōpositū habens unam formā, & uirtutē resultantē ex simpliciū compositione. Significat hoc uocabulum fermentata.

Vinum in tyriaca ponitur primo ut per cum fiat medicinarum conferuatio, & commixtio. secundo quia ipsum conferuat cor, & est contra uenenum.

In exhibitione tyriacae istae conditiones sunt seruandae. Primo q̄ sit fermentata. Secundo q̄ detur sanis, & in parua quantitate, & raro. Tercio q̄ non detur in tpe calido: sed in temperato, uel frigido. Quarto q̄ non detur pueris usq; ad decimum quartum annum. Quinto q̄ non exhibeatur in cōplexione calida. nec in homine parato inflammationi. Sexto quod non detur stomacho repleto cibo. Et hae sunt conditiones attendendae in exhibitione tyriacae.

Dux praescriptae descriptiones tyriacae per annos xxx. ac etiam ulque ad xl. annos seruantur, dummodo sint conuenienter & debite factae.

Τροχισκοι diarthodon Mes. quorum iuuamentum est magnū ad febres antiquas, & febres permixtionum, & febres phlegmaticas, & febres in quibus corrumpitur forma, & confert ad dolorem stomachi, & abstergit humiditatem eius. Cuius permixtio.

R̄. Foliorum rosarum rubearum aur. vi. idest. 3. ix.

Spicz aur. ii. idest. 3. ii.

Liquiritiz rafez, aur. iiii. idest. 3. iiii. s.

Ligni aloes, au. ii. idest. 3. iiii.

Spodii de canna, aur. i. idest. 3. i. s.

Crociz, aur. s. idest. 3. ii. gra. v.

Masticis. 3. ii.

Conterantur omnia, & conficiantur cum uino albo optimo, & fac trochiscos in forma lupini.

Quid sit trochiscus nota. Et trochiscus compositio quaedam ex diuersis pulueribus, & speciebus, mediante aliquo liquore aggregata, & dicitur trochiscus a trochos quod est rota, quia trochiscus est similis rotæ.

Τροχισκοι de rosis minoris Mes. stomachum, & hepatis confortant, & conferunt febri phlegmaticæ, stomachum præparant, & humorositatem ipsius abstergant. Cuius permixtio.

R̄. Foliorum rosarum rubearum. Liquiritiz rafez. 3. v.

Spicz nardi. 3. i. s.

Conterantur hæc, & conficiantur cum uino albo optimo & fac trochiscos. Et si laxatiuum facere uolueris, adde Scamoneæ præparatæ. 3. iiii.

Quare autem trochisci fiant, est ut medicinz possint melius conferuari, acquirunt etia ista permixtione aliquā uirtutem confortandi, quā prius per naturā non habebant &c.

Τροχισκοι de rosis maioris Mes. sicut confirmatum est in libris plurimum iuuamentorum, quorum maius est ad dolorem stomachi, & malitiam digestionis, & eis proprie quibus corrumpitur forma, & principium hydropis, & febres antiquas. Cuius permixtio hæc est.

R̄. Foliorum rosarum rubearum. Spicz.

Cinnamomi.

Ligni aloes. 3. ii.

Cassiz lignez.

Masticis. 3. i. s.

Florum squinanti ana.

Abfinthii. 3. i.

3. i.

Conterantur, & fiant trochisci cum uino albo optimo. De floribus squinanti nota. Nota enim ad nos portantur sed ipsum loco apponimus rami partem.

Τροχισκοι de rosis, & de eupatorio Mes. expextorū iuuamentorum ad febres antiquas, & febres compositas, & ad dolorem hepatis, & oppilationem ipsius, & ictēritiam.

Cuius permixtio hæc est.

R̄. Foliorum rosarum rubearum. 3. i.

Spicz. 3. iiii.

Rauedfēni, idest rheubarbari. 3. iiii.

Spodii. 3. i. s.

Et fiant trochisci conterendo prius omnia.

Liquiritia si simpliciter scripta reperitur, de radice sicca semper intelligendum est, de qua dux tantum partes usui medicinz conueniunt. scilicet radix & fucus.

Τροχισκοι de rheubarbaro Mes. conferentes ad doctorem hepatis, & oppilationem ipsius, & ad apostemata eius, & antiquas ægitudines in ipso & hydropisim & corripionem formæ, & ictēricis.

R̄. Rauedfēni boni. i. rheubarbari. 3. x.

Succi eupatorii. 3. iiii.

Rosarum rubearum. 3. iiii.

Spicz.

Anisi. an. 3. i.

Liquiritiz rafez. 3. iiii. s.

Succi eupatorii. 3. x.

Tereniabin, accipitur eius loco manna, dissoluta in succo praescripto. 3. iiii.

Rubæz tinctorum,

Seminis apii,

Abfinthii,

Asari an. 3. i.

Amygdalarum amararum.

3. iiii.

Conterantur, & fiant trochisci de aureo. i. pro singulo. Nota q̄ isti trochisci, quia non possunt reformari cum su praescriptis humiditatibus in ipsis ingredientibus. ideo addatur de succo eupatorii intantū, q̄ reformari possint, & quodammodum dixi de istis, ita de cæteris intelligat sequētibz.

Τροχισκοι de camphora Mes. ualent ad febres multæ inflammationis, & scitum uehementem, & incensionem cholerae rubæ, & ebullitionem sanguinis, & supercalefactionem stomachi, & hepatis, & ictēritiam, & conferunt hēctici, & phthisi. Cuius permixtio.

R̄. Rosarum, rubearum.

3. iiii.

Spodii. 3. ii.

Gummi arabici,

Spicz an. 3. i.

Sandalorum citrinorum.

3. ii. s.

Crociz. 3. i.

Liquiritiz rafez. 3. ii.

Seminis citrulli,

Seminis cucumeris,

3. iiii.

Seminis melonis,

Seminis cucurbitæ,

Dragacanthi. an. 3. i.

Ligni aloes,

Cardamomi maioris & minoris,

Amydi,

Camphoræ an. 3. ii.

Zuchari albi,

Tereniabin, idest manna, an.

3. iiii.

Conterantur, & conficiantur cum mucillagine psyllii facti in aqua rosa.

Ad faciendum mucillaginē psyllii accipiendum est. 3. i. feminis, & 3. iiii. aquæ rosæ, & non solum de hoc semine intelligas. sed de omni re de qua mucillaginē facere intēdist.

Nota insuper q̄ sunt quidam ignari aromatarū, quī frangunt dictum semē ad faciendum mucillaginē, & male, co quia interior medulla pars est calida. superior uero est frigida. & hoc in loco quærimus in frigidationem, & habere minus intensissimam calefactionem, & non solum contrahenda non est sed nec diu in aqua debet dimitti, propter causam supra allegatam de contractione.

Τροχισκοι de spodio Mes. qui sunt ultimi ad febres acutas, & inflammationem stomachi, & hepatis & scitum uehementem. Cuius permixtio.

R̄. Spodii. 3. iiii.

Seminis portulacæ,

Rosarum rubearum. 3. vii.

Succi liquiritiz an. 3. ii.

Quatuor seminum communium frigidorum maiorum.

Gummi arabici,

Crociz. 3. i. s.

Dragacanthi an. 3. i. s.

Conterant omnia, & fac trochiscos cō mucillaginē psyllii.

Quatuor semina cōia frigida maiora sunt ista, semē melonis, cucumeris, cucurbitæ, & citrulli. quare si quatuor semina cōia maiora scripta reperiantur supra scripta ponant.

Confic cum mucillaginē psyllii, uel cydoniorum, uel aliterius cuiusuis est intelligendum, q̄ fieri debet in aqua com muni, & hoc intelligas in omnibus in quibus non specificatur liquor in quo fieri debet.

Sunt qui in istis trochiscis nō ponunt nisi quatuor res, succo liquiritiz supra. Sed nō sunt tantæ uirtutis, quare ponēda sunt

sunt alia quatuor, & fiant, ut supra, et erunt efficacissimi.

TROCHISCI de spodio cum semine acetosæ Mesue, conferunt ad febres cholicas, cum quibus est solutio uentris, & sedant inflammationem stomachi, & hepatis, & sitim continuam. Cuius permixtio.

R. Rosarum rubearum. ʒ. i. s. Storum.
Spodii. 3. x. Sumach. ana. 3. ii. s.
Seminis acetosæ. 3. vi. Amydi alsi.
Seminis portulacæ. 3. ii. s. Berberorum,
Seminis coriandrorum præparatorum, & torrefacti Gummi arabici. 3. i. s.

Conterantur omnia, & conficiantur cum succo agrestis, i. cum succo vuz acerbæ.

Modus assandi gummi arabicum, & oēs gūmas. Frangantur in frusta ad magnitudinem ciceris: deinde accipe patellam, uel bernacium, & calefacti forti calefactione: deinde ab igne remota ponantur supra gummas, & sine intermissione misceantur, & supra dictam laminam calidā semper misceant donec albescant, & si illa caliditas non sufficit: calefacta de nouo laminamotis tñ gummis: deinde recalcata supra gummas ponantur, & misceantur donec albescant, & albescit remoueantur, quia alitæ sunt, & hoc modo facias de omnibus gummis.

Coriandrorum semina hoc modo præparantur. Bene cum aqua cōi lauentur, ut ab eis pulvis amoueatur, & per tres dies in aqua permittantur mutando quotidie aquā: postea colentur, & in forti aceto pmitantur per quatuor dies quotidie mouendo cum manu, postea colentur, & superponant succi cydoniorum, & aquæ rosatæ ana partes æquales: & p duos dies intus permittantur semper mouendo sepe, & quo tidie cum manu, postea colent, & soli ad exiccandum apponantur, & sic præparati dicuntur. Sed unum notandum bene exicari permittantur, aliter acquirunt malum saporem.

Semina coriandrorum hoc modo torrefiunt. Calefacta bernacium, uel patella ad ignem mediocri caliditate: deinde supra semina ponantur quæ torrefieri debet, & sic superponantur, & ducantur hinc & inde, donec calorem undiq; sentiant. Per omnem eius substantiam, deinde remoueantur. Et hoc modo omnia semina torrefiunt.

Præparantur autem coriandrorum semina, ut qdam venenositates q in eis est amoueatur. Torrefiunt uero, ut magis itipici reddantur. Torrefactio. n. idem est, quod semicoctio.

Amydum affatur ut fiant gumme ducendo super laminā bene calidam. Et cum incipit eius naturalis color alterari remouetur, & assum est.

TROCHISCI de berberis Mesue primi, qui sunt in v-fu, valent ad febres inflammatorias, extinguunt enim eas, & sitim angustiosam.

R. Berberorum, aut succi eius. Spicæ. 3. i.
Croci.
Spodii. Amydi.
Succi liquiritiæ. Dragacanthi. ana. 3. i.
Seminis portulacæ. an. 3. iii. Seminis citrulli. 3. iii. s.
Rosarum rub. ana. ʒ. vi. Camphoræ. ʒ. s.

Conficiantur cum. ʒ. ii. manne dissolutæ cum succo berberorum. Et si succus non reperitur dissoluantur cum decoctione ipsoꝝ, & refoꝝmentur.

Gummi si simpliciter scriptum reperitur: de gomma arabica est semper intelligendum.

Trochisci a pilulis in tribus diuersificantur. 1. quantitate operatione, & exhibitione. In quantitate, diuersificantur, eo quia in maiori quantitate formantur. Vnde trochisci semper debent formari ad quantitatē de. 3. i. trochiscis de tyro exceptis. Secundo in operatione diuersificantur. pilulæ enim a remotis trahunt, trochisci uero non atterantur. Tercio diuersificantur in exhibitione, quia trochisci semper debet exhiberi cum aliquo liquore uel succo habente respectum ad proprietatem trochiscorum: non autem pilulæ &c.

TROCHISCI de absinthio Mesue, qui conferunt febribus stomachicis, & aperit opilationem hepatis, & stomachi & confortant stomachū, et conferunt dolori membrorum nutritionis, et confortant appetitū. Cuius permixtio hæc est.

R. Absinthii sicci, Apii,
Rosarum rubearum, Amygdalarum amararum mundatarum,
Anisi. ana. 3. ii. Spicæ,
Raued. i. rheubarbari, Masticis,
Succi eupatorii, Folii. ana. 3. i.
Asfari. ana. 3. i.

Conterantur, & fiant trochisci cum succo endiuizæ. Necessitas, & causa compositionis trochiscorū est conferuatio alicuius rei longo tpe, & cōmoditas portandi. Alia est, quia medici aliqui uolunt dare aliquas res cum tota substantia, & puras, & hoc modo præparari iusserūt. Alii uero dñt, q trochisci sunt, ut medicinz possint melius conferuari acquirunt etiam aliquam uirtutem confortatiuam per artem, quam prius per naturam non potuerunt habere.

TROCHISCI de alKeKengi Mesue ad ulcera in renibus, & uescicæ, & dolorem quando ingitit uirina.

R. Granorum alKeKengi, ana. 3. vi.
Seminis citrullorum, Succiliquiritiæ,
Seminis albathecæ, Dragacanthi,
Semi. cucurbitæ, an. 3. ii. s. Amydi,
Boli armeni, Granorum pini. ana. 3. vi.
Gummi arabici, Seminis apii,
Thuris, Karabæ,
Sanguinis draconis, Boli. i. terra sigillata,
Seminis papaueris albi, Iusquiami,
Amygdalarum amararum. Opil. ana. 3. ii.

Conterantur omnia, & conficiantur cum aqua mellis uel iulep uiolatoꝝ.

Albathecæ semen, est semen cuiusdam melonis indi uiridis ad similitudinem cucumeris bene maturi, quod anguria alio noie appellatur, sed si semen illorum non reperitur, loco eius accipere potes semina melonum nostrorum.

Amygdalæ amaræ, & quatuor semina ponitur in hac descriptione trochiscorum hac ratione. bolus. n. armenus, & sanguis draconis habent stationem, & moram in primis uenis, et sua uirtute illas non transcendunt, sed quia in hoc casu indigemus quod ad consolidandum cum sua stipiticate ad uescicam uadant, et per se nō possunt, ideo posuit, author amygdalas, et semina frigida, ut penetrationem faciant, & ad locum ducant.

De bolo notat, q bolus idem est quod terra sigillata, quæ in multis proprietatibus est similis bolo armeno, & adhuc habet excellentiorem uirtutem & operationem.

TROCHISCI de caparibus Mesue resoluentes diuertem splenis, & uentositatem. Cuius permixtio hæc est.

R. Corticum radicum caparum. ana. 3. ii.
Nasturcii,
Seminis agni casti. an. 3. vi.
Nigellæ, Anioniaci,
Calamenti, Foliorum rutæ,
Succi eupatorii, Aristolochiæ rotundæ,
Radicum acori, ana. 3. ii.
Cyperi,
Amygdalarum amararum. Scolopendriæ. ana. 3. i.

Dissoluantur armoniaci cum aceto forti, & cū dicto aceto trochisci reforment conterendo oia alia. Et fit dosis eius aur. i. cū uino in quo coquat radix caparis, cortex frassini & cortex tamarici, aut extremitates ramorum eius, & cortex salicū. Et sunt qui duplicant armoniicum, & est melius. Caparorum radix, & genistræ flores colligendi sunt in mense Decembris.

Trochisci conferuantur vsq; ad sex menses, et debet formari in forma rotunda & deprimi in medio, & hāc bonam uirtutem, & cum transeat dictum tps amittunt uirtutem, & de omnibus trochiscis est intelligendum. Exceptis trochiscis stellæ qui conferuantur usque ad duos annos.

TROCHISCI de eupatorio Mesue, cōferunt ad febres antiquas, & rigorem earum, opillationem hepatis, & splenis apiunt, & sunt medicina bona apostematū in ipsis, & ictericis, & in principio hydropis. Cuius permixtio.

R. Terenibin loco eius ac Rosarum rubearum, 3. iiii.
cipitur manna, Spicæ. 3. iii. s.
Succi eupatorii. ana. 3. i. Raued. i. rheubarbari.

Assari,

Spodii.3.iii.s.

Anisiana.3.ii.s.

Conterantur omnia, et fiant trochisci cum succis herbarum, et referretur

Succi herbarum sunt succi ex quibus cōponitur syrupus de bizantiis, et sunt quatuor. Succi endiuæ, Succi apii, Succi lupulorum. Succi boraginis, uel buglossæ, et his succis dicti trochisci reformatantur, quod si haberi non possent, ipso rum loco accipere possumus syrupum de bizantiis.

TROCHISCI de karabe Melabscondentes sanguinem de omni loco manationis eius.

R. Karabæ.3. vi.

Balaustiz,

Cornu cerui adusti.

Malticis,

Gummi arabici adusti,

Laccæ,

Corallorum adustorum,

Papaueris nigri alesi. an.3. ii.

Dragacanthi,

Thuris,

Acaciæ,

Croci,

Hypoquistidos. an.3. ii.

Opil. an.3. i. s.

Conterantur oia, et fiant trochisci cū mucilagine psyllii.

Modus comburendi omnes gummas, cornu cerui, et corallus talis est. Terantur et ponantur in olla terrea, et ponantur in furno, et dimittantur per totam noctem, si quod posuisti sint coralli, uel cornu cerui, uel gumme sint combustæ, extrahe. aliter iterum in sequenti nocte in furno apponantur, et tantum apponantur, q̄ comburantur, et referantur, et habes combustionis modum. Et hoc modo conchilia omnia comburantur, et ossa animalium.

Operatio ignis in medicinis est triplex. quædam. n. torrefiunt, et cognoscuntur quando sunt torrefactæ, quia quando calor penetrat totam substantiã medicinæ, tunc operatio est perfecta, et per illam remouetur quædam parua humiditas quæ in medicina erat. Secunda operatio est assilatio p̄ quã remouetur pars humida, et viscosa subliatur, ut in semine lini, et ipsius assilatio cognoscitur quãdo incipit in superficie colorem mutare, et ad contrarium quod ante erat reduci, assilata est. Tertia operatio est combustio, et hoc fit transmutando uirtutem unam, et fortificando aliam, ut in rheubarbo, et myrobalanis quando comburantur, pars subtilis soluitur dissoluitur, et terrestris styptica augetur. Et ipsius combustio cognoscitur quando naturalem, et proprium colorem in tota ipsius substantia perdit, et alium acquirit, tunc combusta est. Et hoc nouit bene aromatarii.

Medicina sex de causis auferitur. Prima ut eius acuitas amoueatur, ut de vitriolo. Secunda ut per aduersionem acuitas acquiratur, et sic lapides adurunt, et in calcem transmutantur. Tertia quia ipsa est ualde grossa, p̄ quod ipsa ad partes remotas non potest penetrare nisi sublietur, ut cornu cerui. Quarta ut melius possit conteri, ut fericum. Quinta ut malitia medicinæ remoueat, et sic scorpiones adurunt. Sexta causa, ut humiditas superflua consumetur, et sic myrobalani, et gumme omnes que dantur contra fluxum uentris aduruntur, ut auferatur gūmositas illas per quam laxabat.

Pauper si simpliciter scripti reperiuntur semper de albo intelligatur, et de semine, et non de alia parte plantæ. Modus uero assationis eius est, sic cætera semina supra in dia drachanto calido. Clare modum reperies.

TROCHISCI de myrrha. Ras. g. Almanf. cap. de prouocatione menstruum: valent ad prouocationem menstruum. Cuius permixtio.

R. Myrrhæ.3. iii.

Cymini,

Lupinorum optime trito-

Rubez tinctorum. an.3. iii.

rum.3. v.

Afa. i. afa foetida,

Foliorum rutæ.3. iii.

Serapini,

Mentastri,

Opopānaci. an.3. iii.

Pulegii ceruini,

Conterantur omnia, et conficiantur trochisci cū aqua in qua bullierint, et coctæ fuerint.3. ii. feminis iuniperi.

Notent aromatarii ut a suis erroribus corrigantur. Nam reperiuntur in receptis aha simpliciter scripti, et idem est quod afa foetida. Et afa, duplici, s̄et idem est quod thymus. quare hanc notate differentiam. Et ideo in compositione multi errant ponentes thymum pro afa foetida.

Si reperiuntur scriptum in receptis simpliciter rubez, uel rubea, semper debes intelligere de rubea tinctorum quæ est quædam radix cum qua tinctorum in rubeum tingunt.

TROCHISCI de terra sigillata. Mel. inuentione nostra, qui sunt in usu, et sunt ultimi inuentioni ad spurum, & ad egressionem sanguinis, & proprie sumpti cum aqua arnoglolfæ. Et quicquid linitur ex uno eorū super frontem, et sedant fluxum sanguinis ex naribus. Et linitur ex eo super matricem, ad fluxum mēstruorū, & sedat. Et quicquid mittitur in matricē, & quandoque linitur super pectinem, & mittitur in uescam quicquid linitur super membrum manationis sanguinis, & sunt experti. Cuius permixtio.

R. Sanguinis draconis,

Achaciæ,

Gummi arabici alesi,

Lapidis hæmaphysitis,

Ramich. i. quædā cōpositio.

Eufistides. i. hypoquistidos.

infra describenda,

Balaustiz,

Foliorum rosarum rubea,

Boli armeni seu lutum arme-

Seminis rosarum,

num quod idē est. an.3. ii.

Terræ sigillatæ,

Dragacanthi,

Sehedengi: idest semen

Papaueris nigri. an.3. i. s.

canapis,

Seminis portulacæ alesi.

Coralli, scilicet rubei,

Cornu cerui usti,

Karabæ. ana.3. ii.

Thuris,

Margaritarum,

Gallarum,

Amydi alesi,

Croci. an.3. ii.

Spodii,

Conterantur omnia, & fiant trochisci cū aqua arnoglolfæ, idest cum aqua plantaginis. Et hi sunt sine opio, & dā cū aqua spodii gummi boli armenici, spicæ. Et quando inuitat nec cessitas ponitur in eis opii thebaici.3. ii. & quandoque plus & quandoque minus scire oportet. Modus aut administrationis eorum est secundum tres modos. Ad fluxum sanguinis ex pectore, aut pulmone administrandi sunt cum aqua portulacæ, & ad excoriationem cum rob cydoniorum, aut cum aliquo robur flitpicorum. Et ad manationem sanguinis ex partibus inferioribus, confert iniectione eorum cum aqua virgæ pastoris.

Differencia est inter sedenagi, et schedegi. sedenagi. i. lapis emathitis, sedenagi uero idē est quod semen canapis. Contrarie ramen opinionis fuit Gentilis & Christophorus de honestis exponentis de mente aliquorum, q̄ est finis terræ sedenagi non semen canapis. Ego uero apponi posui dictum semen cum magis hoc in casu conueniat.

Varia est opinio inter hoies de semine rose, quidam. n. dicunt, q̄ semina rose sunt quædam grana quæ reperiuntur inclusa in illa parua grossitie quæ sustinet folia rose, & sunt pilosa. quidam dñt, q̄ non illa, sed illa sunt quæ reperiuntur in medio rose habentia colorem glaucum, et ista opinio est falsa. Nā illa a doctoribus appellatur anthera. Prima ergo opinio est uera, eo quod semen alicius dicitur esse illud quod feminatū producit simile, sed hoc facit illud semen pilosum grossitudinis grossi milii non rotundum, sed compressum, & reperiuntur aperiendo illam paruum grossitiem, ut supra dictum est. & uulgo dicitur vin grattaculo, Et colligenda debet esse de mense Iulii vel Augusti.

In receptis quando simpliciter scriptum reperiuntur coralli, rubei, apponendi sunt, & de eis intelligendum, & nō de aliis. Si uero scriptum reperiatur corallorum, et de rubeis, & albis est intelligendum.

Hypoquistidos. i. succus ipsius herbæ in medicinis apponitur, ut supra dixi qui fieri debet in mēse Aprilis, et Maii, et vsu referuari.

TROCHISCI de aniso. Mel. qui auferunt febres antiquas, et aperiunt oppilationes, et emendant malitias hepatis. Cuius permixtio.

R. Seminis anisi,

Abfinthii,

Eupatorii. an.3. ii.

Assari,

Seminis anethi,

Seminis apii,

Spicæ,

Amygdalarum amararum.

Malticis,

ana.3. s.

Folii. an.3. s.

Aloes boni 3. ii.

Conterantur oia, & fiant trochisci cum succo abfinthii, &

quod remanet conferuetur & aperiatur, & extrahantur viscera eius & proprie fel eius Et bene abluatur cum aqua fusa ablutione exquisitissima hoc facto decoquantur in aqua bene salata: & cum eis addatur anetum & coquantur leuissime deinde fiat collectio carnis ab osse ipsarum: & carnes earum in mortario lapideo bene pistentur: deinde miscantur cum quantitate aequali cortellarum de feni bene contritarum: & fiant trochisci cum iure earum: & qui eos faceres, uult ungat digitos suos oleo balsami: & fiant trochisci parui bene compressi, qui exiccantur in umbra per animum, & conferuentur & administrantur.

Viperæ de qua supracripti trochisci fieri debet debet habere conditiones. Primo debet habere caput planum & latum apud pppinqutatem colli, debet esse minuta & subtilis ualde cauda curta: strepitum faciens & sonitum in incessu uelox: motus & aspectus eius præsumptuosus et audax, et flaua: & de flauis foemina. Cuius cognitio est: quia masculi habent unum dentem in omni latere & foemine plures: cap debent in loco sicco humida, nunt mala, & sint uelocis motus tenentes caput altum ac eleuatum. Et ut capiuntur illico incidat pars capitis & cauda, scdm quantitate in trochiscis dictam: qsi ab eis currit sanguis plurimus & fuerit motus eius in illa dispositione plurimus, & motus ipsius tardatus: scias qest electa. Ex uiperâ igit supracripta signa habent trochisci fieri debent. Trochisci sint parui: imo minuti, subtile, exiccant in umbra et reponant. Custodiatur etiâ a radiis solaribus: & ante et post exiccationem sol enim destruit & priuat eos a uirtute appropriata carnis uiperarum.

T R O C H I S C I ramich Mef. que est medicina composita & reicitur in aliis medicinis: & confortat stomachum, cor, & hepar debile. Et ualeat ad lubricitatem uiscerum iate finorum, & sedat acuitatem: & sistit fluxum cholicum, & uomitum: & sedat animum, & acquiritur ex eo in hoc inuentum magnum: & confert ad fluxum sanguinis undecum que et ex fustia ex eo in nares ppter fluxu sanguinis ex eis. R. Succo acetosæ uel cydoniorum. 3. xvi.

Granatorum myrti. 3. ii. beaurum. 3. i.
Rosarum rubearum. 3. i. Sandali mazachari: idest citrini. 3. x.
Bulliant simul bullitione vna postea coletur & colatur misceantur, Gallarum recentium et humidarum contritarum contritione ultima. vnc. ii.
Et iterum coquantur: deinde puluerizentur, super eos,
Foliorum rosarum rum.

Misceantur omnia simul in scutella lapidea: & illico permittantur donec exiccantur postea puluerizentur subtilissime cum. 3. i. s. Camphoræ dissoluta in aqua rosa. fiant trochisci ad pondus. 3. i. & referua, & nota quod sunt aliqui aromatizant eos cum musci. 3. unius quarta.

Hic multi hesitant propter falsitatem literæ: vna enim litera dicti succi granorum myrtillorum, & illa falsa est: sed dicere debet ut præscripti. f. succi granatorum myrtillorum tritorum: & sic bene fiat & fieri potest.

T O R T E L L E de feni secundum Mattheum Syl. & intrans in trochiscos de uiperâ. Auic. Quarum permixtio. R. Farinæ iritici bene purgatæ a tritico fœ furfure. li. i. Impletur cum aqua infusionis masticis ponendo pro omni. 3. i. aque cõis. 3. i. masticis electi: de dicta farina fiat fugaciarum quæ in furno decoquantur: & coctæ puluerizentur & cum aqua prædicta iterum reformetur ad formam trochiscorum, & decoquantur, postea referuentur.

Appellatur compositio hæc tortella de feni. nam tortella. i. panis azimus bis coctus, de feni. i. de terra Hierusalem: quoniam ibi arabes impstant eas cum aqua masticis. habes igitur ex his modum faciendi & ethymologiam uocabuli tortellarum de feni.

T R O C H I S C I de uiolis Mef. in antido. suo: & sunt in

usu: & uocantur trochisci amech: sedantes inflammationem: & lenientes uentrem, & mundificantes pectus. Cuius permixtio.

R. Foliorum alias florum Turbith albi & gummo-
violarum. i. florum viri-
diu habentium medicatam inter humiditatem & siccitatem. 3. xii.
Succi liquoritizæ. 3. iii.
Tereniabin: idest manna. 3. iii.

Et fiant trochisci cum zucchero aut cum pulpa casis. dosi est. 3. ii. Et quandoque innuat necessitas ponitur in eis diagrydii. 3. ii.

T R O C H I S C I alii de uiolis in cap. de asthma in prædica Mef. ualent autem ad constrictionem anhelitus, & leniunt naturam, & mundificant pectus.

R. Foliorum florum violarum medicorum in exiccatione et humidatione. 3. vi.
Succi liquoritizæ,
Tereniabin. i. manna
Diagrydii. ana. 3. ii.
Et fiant trochisci ut in alia descriptione.

Turbith boni arundineis drach. iii.

T R O C H I S C I de lacte Mesue conferunt ad oppilationes hepatis & splenis: & febres antiquas diuersas, et prouocant urinam.

Lactæ mundæ,
Succi liquoritizæ,
Abfinthii,
Berberorum,
Succi eupatorii,
Rhenobarbari,
Aristolochiæ longæ,
ana. 3. ii.
Costi,
Amygdalarum amararum,
Seminis anisi,
Rubæ tinctorum,
Seminis apii,
Squinantia. ana. 3. i.

Et fiant trochisci cum uino optimo.

T R O C H I S C I chochion Auicenna qui intrant michridato Auicenna.

R. Passularum mundatarum Casis lignæ,
enucleatarum. 3. iii.
Mellioli,
Glutinis abortini: idest terebentina. 3. xlii.
Squinantia,
Myrrhæ. ana. 3. xii.
Cinnamomi,
Bdellii,
Blattæ byzantiæ,
Spicæ romanæ. i. spicæ celesticæ. ana. 3. iii.
Radicum cyperi,
Baccarum lauri. ana. 3. iii.
Calami aromatici. 3. ix.
Croci. 3. i.
Bitumen iudaicum. i. asphaltum. 3. ii. s.
Et fiant trochisci cum melle & uino bono,

T R O C H I S C I deligno aloë Mef. conferentes ad debilitatem corporis, stomachi, et pulsus cordis & syncopiam & debilitatem hepatis, et hydropisim et fetorem oris.

R. Ligni aloës. 3. ii. Rosarum rubearum 3. ii.
Masticis,
Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Galli,
Spicæ,
Macis,
Nucis muscatæ. ana. 3. i. s.
Cubebæ,
Cardamomi,
Ceil. i. cardamo. minus,
Corticum cirri,
Baucis. ana. 3. i. s.
Muscis,
Ambra. ana. 3. s.

Fiant trochisci cum melle passularum. Et administrantur cum uino odorifero aromatico.

T R O C H I S C I de balaustis Auic. conuenientes eis qui habent fluxum uentris et æstionem: emittunt sanguinem & sanies: habent tenasmon.

R. Balaustiarum, Myrtillorum. ana. 3. viii.
Sumach,
Corticum granatorum,
Corticum glandium correctorum. ana. 3. viii.
Hordei torrefacti, ana. 3. iii.

Et fiant trochisci cum aqua rosata uel succo plantaginis uel succo malorum granatorum.

T R O C H I S C I de sandalis Mesue ualent ad febrem inflammariam & malitiam complexionis calidæ in stomacho & hepate.

R. Sandali albi,
Sandali rubei,
Sandali citrini an. 3. viii.
Spodii,
Seminis cucumeris,
Seminis cucurbitæ ana
3. iiii.

Conifice cum aqua portulacæ: & da cum lacte acetoso, aut cum aqua agrestis, aut acetositate citri, aut rob de ribes.

TROCHISCI croci magnetis Nicolai: & intrant in rubea & sotira

R. Croci. 3. iiii.

Rosarium rubearum,

Xyloaloes, idest lignum aloes. 3. ii.

Misce & formentur trochisci cum aqua rosæ.

TROCHISCI idiocri Nicolai qui in rubea & sotira intrant.

R. Anomi. 3. i.

Cinnamomi. 3. s.

Croci,

Folii,

Myrrhæ,

Cassie lignæ ana. 3. s.

Spicæ. 3. i.

Opobalsami,

Costi,

Vini alcaloni, idest uinum pauci coloris optimi q. s. hæc omnia tere & uino illo trochiscos informas, & cum fumo storacis calamitæ sicæ & uisui reserua.

VNGVENTVM, siue cerotum magistri Ganfredi quod dicitur Gratia dei ualeat. n. ad sanandum oēs plagas nouas & ueteres: & generat bonam carnem: & non permittit intrare aliquam corruptionem: nec permittit generare malam carnem: & ualet omnibus neruis in cisis uel conuassatis, & ualet contra uiuersa quolibet bestix uenenoſa, & ad scrophulas: & malum sancti Antonii, & multa alia prout per experientiam uidetur.

R. Galbani. 3. i.

Armoniaci. 3. ii. 3. iii.

Opopanaci,

Viridis æris,

Thuris an. 3. i.

Olibani,

Myrrhæ ana. 3. i.

Lapidis calamitæ. 3. i.

Lapidis hematithis. 3. ii.

Et hæc omnia debent esse bene puluerizata: excepta cera cum tribus, quæ sunt istæ in primis. Et modus faciendi dicti unguenti talis est. Istæ gummæ. s. galbanum, armoniacum, & opopanax distemperentur & ponantur per diem & noctem in forti aceto primo diuise cum culello in minutis particulis: postea bulliant in captia uel in patella super ignem cum lento igne, semper mouendo cū spatula donec totum acetū sit consumptū, postea colentur per pannum lineæ fortiter cum duobus baculis in alia patella, & dimittatur sic stare: & postea recipiatur olei oliuarum & ponatur intus cera in dicto oleo incisa in minutis particulis, & super ignem ponat oleū & cera, quæ cum liquefacta fuerit, ponatur intus lithargyrium optime puluerizatum semper mouendo cum spatula ne fundū capiatur: & coquantur simul, donec color mutetur & fiat nigrū: postea ponatur intus in dictum oleum gummæ & fac paulatim bullire donec gummæ sint bene dissolutæ, & dictæ gummæ paulatim quasi alando semper mouendo cū spatula & saepe deponendo ab igne ne medicina saliat extra quibus gumis sic in oleo prædicto distillatis & bullitis. probetur si sunt coctæ tali modo. Ponatur una gutta in aqua frigida, & si dureſcit, coctæ sunt, & si non dureſcit, ponatur super ignem donec fiat dictū signum, & postea quando coctæ & dureſcunt, ponatur intus uiride æris bene puluerizati & semper mouendo cum spatula ut bene incorporentur, postea addatur myrrha, aristolochia longa, mastix, ultimum uero ponatur intus tus, olibanum, bdellium, lapis hematithis, la-

Seminis citrulli,
Seminis portulacæ an. 3. iiii.
Rosarium rubearum. 3. vii.
Camphoræ. 3. i.
Berberorum aut succi eius
3. vi.
Boli armeni. 3. iiii.

Seminis ameos an. 3. i. s.

Myrrhæ. 3. i. s.

Squinanti ana. gra. xv.

Calami aromatici,

Xylobalami,

Radicum assari,

Radicum ualerianæ: idest

phu. ana. gr. xv.

Marathri. i. semen foenic.

Masticis an. gr. x.

Amarici. i. tama. gra. vi.

pis calamita & colophonia, & coquantur simul miscendo cum spatula ne fundum capiat & mutetur ut ueniat nigrum vel ruberū, & q̄ ista signa uidebis. tunc ponatur una gutta in aqua frigida, si non adheret digitis oleo unctis & sit coloris mediū nigri & rubedinis, tunc est coctum, & tunc remoueat ab igne semper mouendo cū spatula, postea ponatur in aqua frigida, & dimittatur ibi frigidescere, ita q̄ possit ponimanus intus fortiter donec sic ductile ungendo manus cum oleo, tunc inuoluatur ad ultimum superius terebentinæ. 3. vi. ceræ nouæ simul liquefactæ. 3. ii. & fiat.

VNGVENTVM sanans ulcera antiqua difficilis consolationis: & est medicamen expertum Mesue.

R. Aloes boni,

Myrrhæ mundæ ana partes æquales, deinde tere uehementer cum succo absinthii, & succo plantaginis donec fiat sicut mel, & administretur cum corio aut panno subtili.

VNGVENTVM alfeſfricon Mesue, relatum ad Alexandrum mundificans cutim, & sanans scabiem siccam, asperitatem cutis, & impetiginem, & phlegma grossum.

R. Ceruissæ albæ & subti-

lis,

Lithargyrii subtilissime

puluerizati,

Alfeſfricon, idest radi-

Olei de oleandro & acetii ana quantum sufficit & scriptū & post oleum confectum ut uidebis fiat unguentum sicut de cerussa. Oleum quod intrat in isto unguento est inferius cum completum.

Oleum de oleandro quod intrat in supraſcripto unguento, ualet scabiei, & auferit eam omnino.

R. Succi oleandri lib. i.

Rosarium rubearum ui-

olis,

Olei omphacini lib. ii.

Oleum omphacinum. i. oleum de oliui non maturis. Aui cenna in. a. cano. in cap. de oliui inquit. oleum quandoque exprimitur ex oliui ultime maturis, & oleum omphacini idest illud quod expressum est ex immaturis, & quandoque exprimitur ex oliui rubeis mediis inter immaturas & ultime maturas, istud oleum non est in usu.

Oleander autem sū. Au. in. i. can. est syluestris & fluuialis, & ipse computat ipsam inter species uenenosorum idem in 4. in fen. sexta in cap. summa secunda uenenosorum ex platis inquit. Oleander plurimum interficit homines & animalia, & hæc planta est quam diuerson uocat. hæc plura nomina habet. nam ab aliquibus dicitur ueredendron, & ab aliis redendron, & ab aliis lorandrum, & ab aliis redodaphin, & ab aliis uero, eius folia sunt similia, amygdalæ, sed maiora & pinguiora, & florem habent similem rosæ, in locis maritimis nascitur. Leonardus de preda palea in cap. de pruna ab igne perſico inquit oleum de landrod. i. de oleandro. Idem confectio alfeſfricon.

Confectio alfeſfricon Mes. quod est medicamen compositum ad fistulas, & cancerum, & malum mortuum, & ualet ad additionem carnis putidæ, & sanat scabiem siccam.

R. Lithargyrii albi. Calcanti ana partem unam. Floris æris partem mediam. Terantur cum aceto uehementer foris in sole tpe æstiuo, fere per diem unum semper modicum addo de aceto, deinde ponatur in uase uitreato, & stringatur os eius & sepeliatur in simo diebus. xl. deinde administretur.

VNGVENTVM aureum Mesue curat & solidat plagas, & est sanum & expertum. Cuius permixio.

R. Ceræ citrinæ. 3. vi.

Olei cōmunis boni lib. ii. 3. v.

Terebentinæ. 3. ii.

Rasæ pini. 3. i. s.

Misce & fiat unguentum in bona forma.

VNGVENTVM pro rapis & relictis equorum quondam illustriſſimi domini domini Bernabonis.

R. Axungie porci masculi

Ceruissæ

lib. i.

Viridis æris. 3. i.

Pistentur subtiliter & misce cū axungia, & fiat unguentū primo lauent rapas & restas cū aqua & sapone molli bene

Myrrhæ mundæ ana partes

æquales, deinde tere uehementer cum succo absinthii,

& succo plantaginis donec fiat sicut mel, & administretur cum

corio aut panno subtili.

VNGVENTVM alfeſfricon Mesue, relatum ad Ale-

xandrum mundificans cutim, & sanans scabiem siccam, aspe-

ritatem cutis, & impetiginem, & phlegma grossum.

R. Ceruissæ albæ & subti-

lis,

Lithargyrii subtilissime

puluerizati,

Alfeſfricon, idest radi-

Olei de oleandro & acetii ana quantum sufficit & scriptū

& post oleum confectum ut uidebis fiat unguentum sicut

de cerussa. Oleum quod intrat in isto unguento est infer-

ius cum completum.

Oleum de oleandro quod intrat in supraſcripto un-

guento, ualet scabiei, & auferit eam omnino.

R. Succi oleandri lib. i.

Rosarium rubearum ui-

olis,

Olei omphacini lib. ii.

Oleum omphacinum. i. oleum de oliui non maturis. Aui

cenna in. a. cano. in cap. de oliui inquit. oleum quandoque

exprimitur ex oliui ultime maturis, & oleum omphacini

idest illud quod expressum est ex immaturis, & quandoque

exprimitur ex oliui rubeis mediis inter immaturas & ultime

maturas, istud oleum non est in usu.

Oleander autem sū. Au. in. i. can. est syluestris & fluui-

alis, & ipse computat ipsam inter species uenenosorum idem

in 4. in fen. sexta in cap. summa secunda uenenosorum ex platis

inquit. Oleander plurimum interficit homines & anima-

lia, & hæc planta est quam diuerson uocat. hæc plura nomi-

na habet. nam ab aliquibus dicitur ueredendron, & ab aliis

redendron, & ab aliis lorandrum, & ab aliis redodaphin, &

ab aliis uero, eius folia sunt similia, amygdalæ, sed maiora

& pinguiora, & florem habent similem rosæ, in locis mari-

timis nascitur. Leonardus de preda palea in cap. de pruna

ab igne perſico inquit oleum de landrod. i. de oleandro.

Idem confectio alfeſfricon.

Confectio alfeſfricon Mes. quod est medicamen compo-

situm ad fistulas, & cancerum, & malum mortuum, & ualet

ad additionem carnis putidæ, & sanat scabiem siccam.

R. Lithargyrii albi. Calcanti ana partem unam. Floris æris

partem mediam. Terantur cum aceto uehementer foris in

sole tpe æstiuo, fere per diem unum semper modicum addo

de aceto, deinde ponatur in uase uitreato, & stringatur os

eius & sepeliatur in simo diebus. xl. deinde administretur.

VNGVENTVM aureum Mesue curat & solidat plagas,

& est sanum & expertum. Cuius permixio.

R. Ceræ citrinæ. 3. vi.

Olei cōmunis boni lib. ii. 3. v.

Terebentinæ. 3. ii.

Rasæ pini. 3. i. s.

Misce & fiat unguentum in bona forma.

VNGVENTVM pro rapis & relictis equorum quondam

illustriſſimi domini domini Bernabonis.

R. Axungie porci masculi

Ceruissæ

lib. i.

Viridis æris. 3. i.

Pistentur subtiliter & misce cū axungia, & fiat unguentū

primo lauent rapas & restas cū aqua & sapone molli bene

& postea siccantur, & ungantur saepe.

VNGVENTVM aliud ad rapas & restas equorum domini domini Bernabonis expertum.

Re. Litargyrii, Argenti viui extincti cum salina. ana. ʒ. ii.
Cerussa subtiliter puluerizata. ana. ʒ. ii. Olei rosati. ʒ. i.

Misce & fiat unguentum conueniens ad ungendum: sed primo lauetur ut in alia scripsi.

VNGVENTVM mirabile de elleboro ad tineam ibi.

Re. Myrrha, Lithargyrii. ʒ. ii.
Ellebori albi. an. ʒ. i. s. Ceræ nouæ. ʒ. ii. s.

Olei laurini. ʒ. ii. Misce & fiat unguentum molle: istud vnguentum nõ est in usu apud nos.

Elleborus fm Mes. est barba albugi fm Auer. in ʒ. ca. elleborus est conditio quod non creditur verum. multi moderni cõputant cõditi inter species ellebori: eo q̃ per sternutatio nem cõmouet: tñ nostri doctores non ponunt species ellebori nisi duas. album & nigrum: qui satis noti sunt: in oleo de euphorbio ponitur conditi. Conditi nõ est elleborus fm intentionem Mesue qñ niger nascitur apud radices arboris fructuose sunt fructus eius solutui. Papias inquit. Anticia est insula ubi abundauit elleborus ad capitis purgationem necessarius: & ponitur pro elleboro antiqua parte templi quæ ortus respicit. hæc ab aliquibus dicitur velax: & ab aliquibus dicitur stranudella: eo q̃ pulvis ipsius in naribus positis sternutationem commouet.

VNGVENTVM de semperuuiâ ibidem.

Re. Olei violarum. Pinguetinis anseris. ʒ. vi.
Olei rosarum. ʒ. i. Succo semperuuiæ. ʒ. iii.

Bulliant omnia simul usque ad consumptionem succi postea adde croci. ʒ. i. & fiat unguentum.

Istud unguentum non est in usu semperuuiæ. s. maior fm Circa instans dicitur: quia semper uiridis reperitur. Auice. in ʒ. inquit semperuuiæ est succutum. in cap. vero de succuto inquit. succuto dicitur q̃ est semperuuiæ: & dicitur q̃ est spēs feminis mandragore: sed non recte: quia illud capitulum de succo est corruptum, nam apud Arabes est simphitum. ergo è cõsolia maior: & sic legis illud capitulũ de succuto apud Auic. cum ca. de simphito apud Dioscoridem videbis q̃ idẽ sunt. Semperuuiæ apud Dioscoridem, vocatur aizon maius. dicitur quod omni tpe folia uiridia habet. dicitur & bucalmon quod non est, nam bucalmon est oculus bouis: aut zentalmon: aut ambrosia quod non est. aliud facit capitulum de aizon minori: & hæc est vermicularis: & rubenote. Aizon vero est proprie nomen suum: quia componitur ab ai quod est semper & zon quod est viua vnde semperuuiæ dicitur: quia semper folia uiridia habet nascitur super tegulas plurimum & in locis quibus stercorea proiecta fuerit & alibi.

VNGVENTVM de plumbo fm Leonardum de predapalea paduanensem in cap. de crispilla.

Re. Plumbi uisti cum sulphure secundum. Seruitorem vsum. Lithargyrii. an. ʒ. ii. Cerusæ. Antimonii. ana. ʒ. i. Olei rosati q. s. & fiat unguentum molle.

Istud vnguentum est in usu: maxime secundum istam descriptionem idem in cap. de cura cancri habet. idem in cap. de vlcerebus ambulatoriis habet: sed uterque ab isto differt. Plumbũ vero apud Auic. vocatur alamech & alhabar. vñtum vero cum sulphure secundum Seruitorem superius in quadam sc̃e ostendi &c.

VNGVENTVM mirabile de cancri fluuiialibus secundũ eundem in cap. de cura cancri.

Re. De cineribus cancrorum fluuiialium recentium: & de climia auri, & de aqua solatri quod sufficit: & fiat unguentum peroptime ducendo in mortario de plumbo cum pitello aut super tabulam plumbeam. Istud unguentum non est in usu cancri maxime fluuiiales noti sunt. liber qui dicitur Bulchafis. i. Seruitor in tracta. 3. ponit formam comburendi far tasi. cancrus & air accipe cancrus fluuiiales viuos quando sol fuerit in signo arietis. xiii. die mēsis intelligo lunaris: & pone in furno panis quousq; comburantur & non conuertantur in cinerem.

Climia auri fecundum Auic. melior est illa quæ aurea est vt cinctus glaucii cineritii coloris recēs, & laminosa grossior. Gul. Lomb. inquit. climia auri est superfluitas quæ adheret parietibus vasis, in quo purificatur aurum: climia argenti est superfluitas quæ adhæret vasi in quo purificatur argentum. vltimo fit climia ex are: & marchesta est sicut climia auri.

VNGVENTVM pro stomacho magistrale ualet ad confortandum stomachum. Cuius permixtio.

Re. Olei nardi. i. spicæ, & minoris, Galangæ,
Olei masticis, Ligni aloes ana. ʒ. ii.
Olei camemillæ, Ceriallorum rubeorum,
Olei Mentæ, Seminis coriandrorũ præparatorum.
Olei cydoniorum. ʒ. iii. Rosarum rubearum ana. ʒ. ii. s.
Olei rosati. ʒ. i. s. Summitatum abñthii,
Macis, Mentæ,
Masticis, Florum camemillæ,
Garyophyllorum, Summitatum squinantii.
Nucis muscatæ,
Cardamomi scilicet maioris ana. ʒ. i. s.

Conterantur omnia subtilissime: & cū parũ ceræ fiat vnguentũ mediũ tenens inter duritiem & mollitiẽ. Addendo panis brustulati prius in aceto infusi & bene expressi. ʒ. s.

In omni vnguento species debent subtilissime conterri. Nisi .n. bene puluerizarentur non posset virtus earum peccorose penetrare, nec a calore præparari.

Necessitas vnguentorum & emplastrorum & oleorum fuit vt rei alicuius virtus applicaretur in substantia adherētis, & non statim resoluibilis: secundo quia medicinz simplices non faciebant effectum. tertio propter debilitatem medicinarum simplicium.

VNGVENTVM sandalinum pro renibus Mes. ultimum ad sedandum inflammationem & apata calida & super calefactiones quæ sunt in hepate & stomacho. Cuius permixtio.

Re. Rosarum rubearum. ʒ. i. s. Spodij. ʒ. iii. s.
drach. xii. Camphoræ. ʒ. ii. s.
Sandalorum rubearum. ʒ. x. Ceræ albæ. ʒ. xxx.
Sandalorum alborum, Ceræ albæ. ʒ. xxx.
Sandalorum citrino. an. ʒ. vi. Olei rosati lib. i.

Conficiantur & admixtrentur, & sunt qui lauant oleum & ceram prius cum aqua rosæ tribus uel quatuor uicibus, & postea permittunt cum aliis, & est melius.

VNGVENTVM aliud pro renibus expertum domini Blasii de Besana Magistrale ualet priori.

Re. Olei rosati, Sanguinis draconis. ʒ. i. s.
Olei myrtillorum. an. ʒ. iii. s. Mucillaginis pŷlii,
Olei de nenufare. ʒ. i. s. Mucillaginis cydoniorum.
Sandalorum rubearum, ana. ʒ. ii. s.
Myrtillorum. an. ʒ. i. s. Camphoræ. ʒ. s.

Ceræ parum & fiat unguentum, & lauetur oleum & cera cum aqua plantaginis, portulacæ, & lacte mulieris puellam lactantis an. ʒ. i. lauetur bis uel ter.

VNGVENTVM Galeni aliud Mes. ultimum in infrigidatione ualens ad febres acutas & sodam calidam pulsatiuam. Cuius permixtio.

Re. Ceræ albæ. lib. i. Olei rosati lib. iii. s.

Et fit factum ex oleo omphacino. i. ex oliuis immaturis. Liquefiant omnia simul: deinde lauetur cum aqua frigidissima lauationibus pluribus usquequo bene albeant. Et quanto magis lauetur tanto fit perfectior. In fine uero conuassetur seu lauetur cum parui aceti.

Istud unguentum ego lauari soleo facere cum aqua rosata loco aque cõis: & est magis confortatiuum renum.

Vnguentum ab emplastro differt: eo quia unguentum est magis tenerum siue liquidum seu liquabile: sed emplastrũ est solidũ, licet vtrumq; cū oleo & cera componat &c.

Si vis facere unguentum in forma satis dura, debes ponere p̃ omni ʒ. i. olei sp̃erum. ʒ. iii. ceræ. ʒ. ii. s. Si vero molle pro omni ʒ. i. olei. ʒ. ii. ceræ: & ʒ. ii. sp̃erum: & ista est dosis specierum olei & ceræ ad unguenta faciendã.

VNGVENTVM populeon Nicolai dicitur: quia fit de

de oculis populi ualet contra calorem acutę febris in his qui dormire nequeunt inunctis tibus & pulvis & platis manum & pedum hoc idem cū oleo rosato uel uiolato mixtis & supra hepar & umbilicum. Cuius permixtio hæc est.

℞. Oculorum populi.

Lactuce. ana. 3. s.

Semperuiuz. 3. s.

lib. iiii. s.

Foliorum papaueris nigri,

Violarum,

Cimorum rubi.

Scantoncelli,

Foliorum iuquiami,

Vmblici ueneris ana. 3. ix.

Foliorum mandragorę ana.

Axungię porcine recentis

drach. s.

lib. ix.

Solatri, idest uermicularis.

Oculi populi pisentur per se & fortiter terantur: & cū axūgia iterū pisentur, & magdaleones informentur, per duos dies dimittantur tertia uero die oēs prædictę herbę colligantur: & per se bene pisentur, iterū in magdaleones per dies octo referentur: & simul miscantur: postea frustatim cum lib. i. uini odoriferi in caldario ponantur & bulliant ad uini consumptionem: & cū spatula semper agitando: deinde per sacum exprimendo colentur, & dimittantur frigidescere.

℞. Oculi populi in mense aprilis sunt colligendi. & cum axūgia miscendi: & conseruandi sunt in mense maii ulquequoz aliz herbę colligantur.

De foliis mandragorę si haberi non potest, loco ipsorum apponi possunt cortices mandragorę. uel papauer nigrum uel iuquiamum scilicet folia.

VNGVENTVM marcianon Nicolai in suo magno antidotario a Marciano peritissimo medico a quo fuit inventum quod facit ad dolorem & ad frigiditatem capitis, pectoris stomachi, & ad scilicet pleuris, & hepatis: & ad illi dolorem, uel ad solem, uel ad ignem inunctum, statim subuenit paralyticis, arthriticis, sciaticis, phreneticis, alias nephreticis: podagricis prodest: tumores reprimat: & contra omnes dolores ex frigiditate medetur potenter.

℞. Cere albę lib. ii.

Foenugraci. 3. i. s.

Olei communis lib. viii.

Butyri. 3. i. & 3. ii.

Roris marini,

Utricę,

Foliorum lauri ana. 3. i.

Violarum. i. folia uiolarum,

Amaraci. i. maiorana. 3. vi.

Papaueris nigri,

Foliorum rutę. 3. vii.

Mentę faracenice.

Saluie cum floribus.

Alerius mentę: idest menta

Sauinę,

domestica.

Balsamitę: idest mentę aqua-

Polytrichi.

tizę,

Lapacili: idest lapacium

Lilifagi. i. salua syluestris,

acutum,

Ozimi,

Carduncelli: idest cardo ben-

Poli,

nedictus,

Calamenti,

Matris syluz maturę: idest

Artemiszę,

capri folii,

Enulę,

Herbę mercatę,

Betonice,

Aleluia. i. panis cuculi,

Branchę ursinę,

Lingę ceruinę: idest scolo-

Spergulę herbę mitę,

pendria,

Herbę uenti. i. parietę,

Crispulę,

Pimpinellę,

Camphorę,

Agrimonię,

Storacę calamitę,

Abinthii,

Medullę ceruinę ana. 3. s.

Herbę paralytis,

Adipis urfi.

Herbę sanctę marie,

Chamędrei. i. chamędryos,

Cimorum sambuci,

Centaureę. i. maioris,

Crafulę. i. uermicularis,

Fragrarię. i. herbę portans

Mille folij,

fragrans. i. magistra.

Semperuiuz,

Quinq; folij, idest penta-

Herbę tetratidest orobum

phylli.

ana. 3. iiii. s.

Gallinacii,

Euficę. i. radix althęę,

Malticis ana. 3. i.

Cymini,

Thuris vnc. s.

Myrtę. i. folia myrti. ana. 3. iiii.

Olei nardini 3. ii.

Herbę omnes præscriptę colligantur in medietate mensis maii: & omnes in una die uel duobus diebus, & ab hora tertiaria usque ad meridiem.

Conficiantur sic. Herbę terantur subtiliter per dies. vii. in

optimo uino odorifero, octaua uero die ad lētum ignē hæc ponantur. Et cum uinum aliquantulum erit consumptū, addatur eis oleū prædictum: & bulliant donec incipiant diminui: deinde cum diligentia colentur, & proiectis herbis, iterū super ignem ponantur: & cum inceperint bullire, pone storacę, & cum modicū bulierint, pone butyri, & axungias & pinguedines superscriptas aliquantulum totas, & oleum nardinum masticem & olibanum: & postea ceram, semper cū spatula agitando: & cū cera liquefacta fuerit, ab igne deponatur: & cum coagulatum fuerit, referuerit in uale.

Paralytis herba est: cuius folia florere incipiunt tempore hiemis, quę se extendunt in terra quasi alba & crispa habens florem album.

Herba sanctę marie. Ista est quædam herba ad albedinem tendens rugosis foliis.

Menta faracenica, hæc menta habet folia longiora & acutiora quam menta domestica seu hortensis. mentę enim plures sunt species ut Matheus Syluaticus cap. 543.

Herbę mulate, hæc herba est illa quę se expandit in terram, odorem habens mulci, quę satis assimilatur agrimonię sed est minor ea: quidam dicunt, quod est ualeriana.

Inter unguentum & emplastrum est differentia. Nam ad compositionem unguenti reperitur cera & oleum: in emplastris autem non est expediens semper ponere ceram.

VNGVENTVM aragon Nicolai. adiutorium ualet ad omnem dolorem ex frigiditate uiris & mulieribus tali ordine inunctum: in testa uoi primo liquefact ad ignem. ualet ad spasmodum, & ad dolorem illi, & ad renum tali ordine inunctum ut supra dixi. ualet arthriticis, sciaticis multum prodest: quartanaribus si super spinam dorci ungatur: & quando vngitur ex frigiditate sicut prius diximus, ponatur super locum dolentem tegula calefacta.

℞. Roris marini,

Laureolę. 3. ix.

Maiorana,

Nepitę lib. s.

Radicum iari. i. serpentarię,

Masticis,

Serpilij,

Olibani. ana. 3. vii.

Rutę,

Pyrethri.

Radicum siccię. i. cucumeris asinini ana. vnc. iiii. s.

Euphorbii,

Foliorum lauri,

Zingiberis,

Saluiz,

Piperis ana. 3. i.

Sauinę,

Olei muscellini. 3. iiii.

Policarię maioris & minoris. i. ellebori albi & nigri ana. vnc. ix.

Olei petrolei. 3. i.

Bryonice. i. radix cucurbitę saluaticę ana. vnc. iiii.

Adipis urfi,

Butyri. 3. iiii.

Olei laurini. ana. 3. iiii.

Olei communis lib. v.

Cere lib. i.

Herbę & radices colligantur tpe & hora scriptis in prædicto unguento: lauetur & mundentur subtiliter: deinde cõterantur, & per. vii. dies in oleo infundantur octaua uero die super ignem ponantur, & coquantur usque ad perfectam cõctionē: postea per facculum colentur fortiter exprimendo, deinde dicta colatura super ignem ponatur, & cum bullire coeperit addatur oleum laurinum: butyrum: & adeps ac cera: quę liquefacta, adde petroleum & muscellinum: postea masticem, & olibanum, zingiber, piper, & euphorbium, & pithrum, & post ab igne deponatur & recondatur.

Inter doctores magna est differentia de laureola & mezeon. quidam enim dicunt qđ laureola & mezeon idem sunt & falsę. Nam mezeon est planta lactica, & dicitur alio nomine oliuella: laureola uero est arbutum & non habet lactis folia laureolę sunt similia lauro.

Policaria est herba quę habet folia similia oliuiz: sed aspera & pinguis & uiscosa: & sunt duarum specierum. f. maior & minor: maior est grauis odoris quę in fructu est uirgas habens longitudinis cubitis duobus: minor uero unius pedis longitudine porrecta est, florem fragilem & mellinum habens colorem, & amarum saporem: & cum floruierit uelut capillis facit: radix ipsa est inutilis. Sed quia in certis partibus non reperitur nec cognitio habetur: ideo loco ipsorum possunt poni elleborus albus & niger.

De oleo muscellino magna inter doctores est contentio.

The. arom.

CC

quidam.n.dicunt qd dicitur muscellinum: quia in eius compositione intrat muscum. Item muscellinu vocat: quia fit ex humiditate inuenta in tuberositatibus vlni. Ite muscellinu vocant multi olei.de been.i.de semine caputicæ. alii vero hoc modo oleum muscellinum faciunt fm hanc receptam: & ponitur a Galeno in suo antidotario & illud est in usu.

R. Olei. lib. vi. Croci,
Aque. lib. iiii. Cassia lignæ. an. 3. vi.
Folii, Garyophyllorum,
Spice, Carpopallami,
Costi, Bdellii. ana. 3. iiii.
Masticis. ana. 3. i. s. Nelli. indur.
Storacis calamitæ, Macis. ana. 3. i.
Myrrhæ. an. 3. vi.

Conquassentur, deinde bulliant simul usq; ad cōsumptionem aque. deinde colentur & referuntur &c.

Vn. GVENTVM Agrippæ Nico. quo Rex iudeorum utebatur: & est tante dignitatis, qd nemini discipulorum tradere volebat. nalet hydropicis & omnibus tumoribus in quacunque parte corporis fuerit, & ad nervos indignatos: dolori renem ex frigida mire subuenit. vrinam prouocat, & innum. qum super ventrem laxat.

R. Radicum bryoniz. i. radix cucurbitæ syluestris lib. ii. Radicum eboli sps flet sambuci faciens quædam semina nigra, foecientia. Tribuli marini an. 3. ii. Radiciu siccidæ: idest cucumeris asinini lib. i. Squilla 3. ii. Ireos: idest liliæ æolæitis. 3. ii. Radicum silicis. 3. ii. Oēs radices teruel quæ bene lauent & in pul. marmorea bene terantur. Olei lentiscus. l. iiii.

Ponantur in dicto oleo digesti dies: & per dies viii. per mittantur in uno uero die ad ignem. ponantur oia. hæc & tã diu bulliant. qd radices diu dantur. deinde ponantur in facy co exprimendo & colando. & cum colatum fuerit, ad ignem ponatur: & cum fuerit debite fere coctum prociatius & cæ. albe. 3. xv. Et liquefacta cæra ab igne deponatur, & post in frigidationem referetur &c.

Antidotum est quodlibet includens diuersas & descriptiōnes medicinarum ad diuersas & varias passiones: & dicitur antidotum. i. contra vitium datum. quia contra ægritudine principaliter, uel aliter antidotum dicitur. contra datū. ab anti. i. quod est contra. unde dicitur Antidotum quod est libet continens experientia contra morbos data.

Tribuli marini sunt quidam fructus nascentes in aqua cornua habentia, & intus habent quandam medullam ad sili multitudine cæstante: & isti gallice pauperes solent super pileos suos portare.

Botim est duarum specierum domestica & syluestris: domestica est arbor terebentine. Et syluestris lentiscus arbor in montibus nascente: cuius semine fit oleum lentiscus: & si haberi non potest, eius loco ponitur oleum masticis.

Vn. GVENTVM dialtheæ Nico. dialthea masticæ & calasticæ: dialthea a radice ibisci dicitur. masticæ a molificatione: calasticæ. i. calefactium. Cuius permixtio. R. Radices ibisci. lib. ii. Seminis foenugræci. lib. i. s. Seminis lini. lib. i. Squilla. vnc. vi.

Radices omnes bene abluantur, & terantur. similiter semen lini & foenugræci. & squilla: & in vii. lib. aque ponatur per tres dies: quarto uero die super ignem ponantur: & bulliant donec incipiant inspissari paulatim: ponantur in facy: & cum exprimeretur uolueris addatur aliquantulum aque feruentis: & ad extractionem illius succide succo isto accipiantur lib. ii. & mittantur in quatuor lib. olei communis & bulliant usq; ad consumptionem succi. postea addatur cæra lib. i. Cumi: liquefacta fuerit, adde.

Galbani. Colophoniz. Resinæ. an. lib. s.
Gummi hedæz. an. 3. ii.

Ad ultimum ponatur puluis.

Et coctum ab igne deponatur: & cum infrigidatum fuerit & coagulatum fuerit, diligenter colligatur: & reponatur facit propria ad dolorem pectoris ex frigida: & ad pleuræsim in testa: cui aliquantulum calefactum ad ignem: & super pectus inuadum sanat omnia infrigida loca, & deficcata calefacit, molliciat & humectat &c.

In receptis quando reperitur scriptum olei loti, modus lauandi talis est primo ponatur oleum in uase mundo stricti orificii, & supra rotetur aqua clara calidissima: deinde abiciatur aqua, & totiens reiteretur projectio dictæ aque feruetis, qd finaliter exeat eiudem coloris & saporis sicut ante projectionem, & tunc olei erit mundum. Et nota qd hoc fit, debet fieri in uno uase, quod in fundo foratum sit, ut aqua possit exire, oleum. n. remanet semper super aquam, & natat: quia est corpus aerium. Ideo quanto leuior tanto melior.

Vn. GVENTVM staphisagrie magistrale. ualet interficiedo vermes seu pediculos capitis, palpebræ, & inguinu. R. Axungia. Oli lini. s. vnc. iiii.
Saponis mollis. Argenti viui extincti. 3. ii.
Staphisagrie. ana. 3. iiii.

Conterantur subtiliter conterenda, & misceantur. Axungia si simpliciter scripta reperitur semper de axungia porcina est intelligendum.

Hic utiliter est horandum, qd stomachus, & hepar non debet aliquo unguento ungi, aut aliquod emplastrum, uel cerorum super eos ponendum est post cibum, quia attrahendo calorem a loco digestionis impedit cibi digestionem, & naturam a sua digestionem diuerit seu operatione.

Vnguenta, emplastra, & cerota, ut plurimum conferuantur per annum in sua uirtute, & bonitate, & non plus, quia elapso anno paulatim humiditas eorum naturalis deperditur, & terrefactitas acquiritur.

Vn. GVENTVM citrinum Nico. dicitur in ipso pomo citrino decoquere, pulchram reddit faciem, lentigines de facie tollit, impugnet in sole inductum destruit, pustulas in quibusque parte corporis ortas salis signa mirabiliter destruit, & auster cicatricem in corpore, subleuat leprosi faciem si ex eo unguatur, multum emendat, rubori oculorum prouincit, calorem & heris pilula ualet. Cuius permixtio. R. Boracis albe, & claræ. 3. ii. Cristalli.

Camphoræ. 3. i. Analis, & dentalis.
Coralli albi. 3. ii. Olibani albi.
Ameni dulcis. 3. i. Nitri. ana. 3. iiii.
Bellisuli marini. i. vmblici Marmoris albi. 3. ii.
marini 3. iiii. Gerdæ serpentaria. 3. i.
Dragacanthi albi. Cerussæ albe, & subtilis. 3. vi.
Amydi. an. 3. iiii.

Hoc modo terantur dragacanthi, & uniblicos marinos terimus in mortario marmoreo cum pistello ferreo infimus; cætera sigillatim in eodem mortario terantur, & cum panno subtilissimo cernantur, & cum axungia nouellæ porcinæ albisimæ lili. s. septi caprini, uel pecorini. 3. i. s. Axungia gallinæ. 3. i.

Confice sic, scaldarium plenum aque supra ignem bulliat, & cacabus cum axungia in caldario pendat in ipsa aqua, ut de calore ipsius aque axungia liquefcat, & liquefacta per subtilem pannum album colentur in catinu, ut postea totius puluis apponatur præter camphorā, & boracē. cū sparsula semper agitando, ut oium bona fiat incorporatio, hoc facto in uno citrino cænato, uel duobus mittatur, et ponatur et cum spatula semper agitando, et cum inceperit bullire, iterum in caldario ponatur, et cū spatula semper agitando puluis camphoræ, & boracis apponatur, & donec incipiat frigescere agitetur, & cum infrigidatum fuerit recondatur. Et nota qd lib. i. pulueris in lib. viii. axungia colatæ debent poni.

Vn. GVENTVM Marcetæon aliud, qd aliqui habent in usu. R. Foliorum lauri. lib. iiii. Butyri. 3. v.
Rutæ. lib. ii. s. Masticis,
Amariçidis. idest maioranæ lib. ii. Storacis calamitæ,
lib. ii. Medullæ ceruinæ,
Roris marini. lib. i. s. Adipis ursi,
Foliorum myrti. lib. i. Adipis gallinæ. ana. 3. i.
Esuri. i. flos saluiz, Thuris. 3. i. s.
Balsamiz. idest mentæ Olei nardini. 3. i.
aquaticæ, Olei uiridis. i. ex oliui immæ
Ozimi, idest basilicæ. an. lib. s. turis. lib. vi.

Et fiat unguentum prout in unguento aloi marciaeonti bi ostendit.

oleum uiride est olei omphacinum. i. oleum oliuarum immaturarum, & dicitur a uiridendo, eo quia maiorem uiriditatem habet quam cetera olea simplicia.

VNGVENTVM Arthanitzæ magnum Mef. relatum ad Alexandrum quo ungitur uenter, & fumei, et ilia, & soluit solutione cathartici. Et ungitur ex eo stomachus, & facit uomere, & educit uermes, & confert hydropisim, & solutione educit aquam citrinam, & est propinandum non ualentibus funere medicinarum. Cuius permixtio.

℞. Succi arthanitzæ. i. cyclaminis uel panis porcini lib. iiii.
Succi cucumeris asinini li. i. Pulpæ colocintidæ. j. iiii.
Olei irini. lib. ii. Polypodi. j. vi.
Butyri uaccini. lib. i. Euphorbii. j. s.

Quæ sunt terenda tere, & submerge in succis & oleis, & pone in uase uitreo stricto orificii, & stringe caput eius, & permixte per dies octo: deinde bulliant omnia ebullitione una, & coeantur: deinde proiciantur super colaturam.

℞. Serapini. aur. v. Myrrhæ. aur. ii.
Duo hæc dissoluantur prius in forti aceto: deinde proiciantur in dicta colatura, & bulliant simul semper agitando cum spatula, vsque fere ad succorum consumptionem, & tunc proice super ea.

Ceræ. vnc. v. Felli uaccini. aur. vi.
Perueant cum eis vsque dum liquefiat cera: deinde pulverizata super id.

Scamoneæ, Euphorbii. aur. ii.
Aloes, Turbiculi. aur. v.
Mezerion, Piperis longi,
Coloquintidæ. ana. aur. v. Zingiberis,
Salis gemmæ. aur. iiii. Camæmillæ. aur. ii.

Misceantur omnia bene, ut permiscantur, & utere.
Modus extrahendi succi a cucumere asinino talis est. Accipiantur in fine Iulii in diebus canicularibus, et in mense Augusti qui sunt citrini, qui illi sunt maturi, & ponantur in uase, et permixti per nocte: deinde porentur cutello acuto. Exiet aquositas quedam clara, & suba pulposa. Illa aquositas colligatur cum spongia, uel bobice, & abiciatur, & substantia pulposa referuetur, & utatur ad libitum ponendo illam ad solem, & permixtur excicari donec possit educi ad formam trochiscorum: deinde remoueat, & referuet.

VNGVENTVM aliud Arthanitzæ paruum Mef. resoluens apostematam splenis, & lapideitatem ipsius & scrophulas.

℞. Succi arthanitzæ, Hyssopi humidæ. j. v.
Viscositatem quæ mulgetur Armoniaci. j. s.
ex radice filicis, Bdellii. j. s.
Succi Kamenelis. i. an. j. viiii. Aceti quantum sufficit.
Succi extremitatum tamarrici. j. ii.
Olei irini. lib. iiii.
Et fiat sic superius diximus.

VNGVENTVM ægyptiacum Mef. Magnum confert ad uulnera antiqua, & fistulas quæ indigent mundificatione. Absterget enim, & mundificat ea a carne mortua, & putredine. Cuius permixtio.

℞. Floris zris. j. v. Mellis. j. xiiii.
Aceti fortissimi. j. vii.

Coque super ignem donec inspissetur: deinde eo ablato adde, Olibanum bene pulverizatum. j. iiii. Terendo super terenda. Hoc unguentum duobus modis fit, qui n. uolunt illum multum corrosiuum faciant ipsum sine olibano. Qui uero modicoriter, olibanum ponunt.

VNGVENTVM de bdellio Mef. quod confert ad spasmodum, & epilepsiam, & paralysim, & ad ægri tudines neruorum frigidas, & lenit nodositates neruorum.

℞. Bdellii. j. vi. Ceræ nouæ. j. xv.
Euphorbii. j. iiii. Olei sambuci aut de cheiri. j. x.
Castorei. j. iiii.
Serapini. j. iiii.

Bdellium, & serapinum infundantur in aqua rutz agrestis, & cetera liniantur cum aqua calida, & fiat unguentum, & linatur cum eo.

VNGVENTVM pro uermibus Montagnanæ in antido-

tario suorum consiliorum.

℞. Centauræ minoris, Abinthii,
Lupinorum ana. j. s.
Ligni aloes,
Cornu cerui usi,
Diptami ana. j. ii.

Aloes ad pondus omnium quod erit. j. vii. s.
Olei abinthii. j. iiii.
Fellis cauri. j. j.
Ceræ. j. i. s.

Conterantur omnia conterenda, & fiat unguentum.

Lauantur enim cera duplici causa. primo ut acuitas sua amoueat, secundo ut acquirat uirtutem quam non habet, & quam habet deperdat, ut in unguento comitissequia lauantur, ut efficiantur siptica.

Si scriptum reperit ceræ lotæ. tunc dicta cera lauanda est in aqua côi. Aliter lauati in decoctione in qua describitur.

VNGVENTVM pectorale magistrale, & est usuale.

℞. Olei amygdalarum dulcium. j. iiii.
Olei camæmillæ. vnc. i.
Olei violati. ana. vnc. iiii.
Adipis gallinæ, Butyri recentis. vnc. vi.
Adipis anatis. ana. vnc. ii. Ireos subtiliter pulverizati. drach. ii.
Croc. j. s.
Ceræ albæ. vnc. iiii.

Misce, & fiat unguentum omnia simul liquefaciendo, in fine uero ireos, & crocus ponantur, deinde lauetur tribus aut quatuor uicibus cum aqua hordei tepida.

Butyrum melius uaccinum cum in medicinis ponitur, i. ad opus medicinz datur. debet esse sine sale, & conseruatur usque ad sex menses, uel usque ad annum ad plus.

Adeps gallinæ debet esse recens, & non antiquatus amittit n. complexionem, & uirtutem, & efficitur rancidum, et amittit temperamentum, & liquefactum melius conseruatur.

Adeps anatis, & asneris, quanto antiquiores tanto meliores sunt. & cum in medicinis administrantur nullo modo sale condiendi sunt.

Pinguetudines omnes si aspergantur zucchero subtiliter pulverizato diu conseruantur absque corruptione, hoc ego sæpe uidi, & experimento approbaui. Pinguetudines n. quæ pro usu medicinz sunt, nullo modo sale saliendo sunt, sed modo prædicto præparanda.

VNGVENTVM apostolorum Auic. 5. can. tracta. 21. quod in usu est, & est apostolicum, & notatur unguentum ueneris, & est unguentum rectificis cum facilitate fistulas difficles, & scrophulas paruas, nec est aliqd fite ei, & mundificat uulnera ex carne mortua, & pus, & consolidat. Et dicitur quod est medicina. 12. apostolorum. Cuius permixtio.
℞. Ceræ albæ, Thuris, masculi. j. vi.
Resinæ. an. j. xiiii. Myrrhæ,
Opopanacis, Galbanæ. ana. j. iiii.
Floris zris. ana. j. ii. Bdellii. j. vi.
Armoniaci. j. xiiii. Lithargyrii. j. ix.
Aristolochiæ longæ. j. vi.

Infundantur bdellium, & alix gummx in aceto uini, et decoquantur in æstate cum duabus lib. olei, & in hyeme cum lib. iiii. olei &c.

Oleum si simpliciter scriptum reperitur de oleo oliuarum semper est intelligendum, quod oleum est materia omnium oleorum, ut in tractatu de oleis manifeste apparet &c.

VNGVENTVM ad scabiem ingistrale bonum, & expertum.

℞. Olei communis. lib. ii. Terebentinæ,
Axungie porci recentis. Argenti uiui extincti, lib. ii. s. ana. lib. s.
Cerussæ, Argenti sublimati. j. iiii.
Salis communis. ana. lib. i. Ceræ albæ. vnc. v.

Misce, & fiat unguentum secundum artem. Axungia porci melius conseruatur liquefacta, & adeps renum caprarum hoc etiam modo melius conseruatur.

Argentum uiuum hoc modo extinguitur, & præparat. Accipitur argentum uiuum, & ponatur in una ampulla uitri & supra exponatur tanta salina, quæ cooperiatur: deinde concutiat tantum sub et supra, semper salinam addendo, & totum confrangatur, ita quæ possit aspergi tanquam lac, & partibus cui ponit adhæreat, & hoc modo extinctum erit, aliter tantum con-

cutiatur, quòd in illam formam ueniat, & sic extinguitur.

VNGVENTVM aliud ad scabiem p pueris paruis, & mulieribus grauidis, & personis delicatis Montagnanæ,
℞. Terebentinæ benz lo Succi citrangelorum.
tz. 3. iiii. Vitellos ouo. ana. nume. iiii.

Butyri recentis loti. 3. ii. Olei rosati. 3. i.

Salis. 3. i.

Misceantur omnia simul, & fiat unguentum.

Salis si simpliciter scriptum reperitur in compositione bus semper de communi sale est intelligendum.

Terebentina, & butyrū lauandi sunt in aqua cōi, & sic fa cias de omni alia re lauanda, in qua solum dicitur lauetur, & non exprimat cum qua re, cum cōi aqua lauanda est.

VNGVENTVM ad scabiem pro canibus bonum & exp ertum,

℞. Saponis Mellis lib. i. Aluminis nitri,

℞. Axungie porci. 3. vi. Aluminis rocheæ ulsi,

Ellebori nigri. 3. viii. Salis communis,

Sulfuris. 3. vi. Terebentinæ. ana. 3. vi.

Olei laurini quantum sufficit ad incorporandum. & fiat unguentum,

Et si fortius facere uolueris adde. 3. iiii. argenti sublimati, & terræ camelli. 3. iiii.

VNGVENTVM album siue de cerussa crudum magistra le quod est in usu, & ualet ad infrigidandum omnem dori tiem, & batituram, & deruschata, pelaxinam carnis, & combustionem ignis.

℞. Olei rosati, lib. iiii. Cerussæ lib. i.

Ceræ albæ. 3. ix.

Misce omnia, & fiat unguentum.

Et sunt q addunt cāphoræ. 3. i. s. & albumina ouorū duo & tūc erit unguentū camphoratum, & sine cāphora, & sine albumine oui erit unguentū de cerussa crudū, & sic uocat.

VNGVENTVM de cerussa coctum, ualet ad consolidan dum plagas, & in usu est. Magistrale.

℞. Olei communis lib. ii.

Cerussæ subtilis lib. i.

Coquantur lento igne donec coctū sit, & sunt aliqui qui addunt ceræ albæ, & munda. 3. iiii. & fiant magdaleones,

VNGVENTVM de lithargyrio coctum magistrale, & ualet ad malum tibiatur, & præcipue qui fractam habent pellem super tibijs.

℞. Lithargyrii auri subtilissimi puluerizati,

Aceti fortis. lib. i.

Olei rosati clari. lib. ii.

Coquantur lento igne quousq; coctus sit, & fiat magda leon, & aliqui & sunt qui in dicto unguento addunt ceræ, 3. iiii. sed melius est sine cera.

VNGVENTVM de minio coctum, & est Magistrale, ualet sicut unguentum de lithargyrio,

℞. Minii subtilissimi. lib. i. s.

Olei communis. lib. i.

Coquantur lento igne, & fiant magdaleones.

VNGVENTVM Basilicon minus magistrale, ualet ad extrahendum putredinem ab ulceribus, & plagis factis no uiter, & est in usu.

℞. Picis naualis, Colophoniz. i. picis græcæ,

Rasæ pini, puluerizata. 3. vii.

Terebentinæ, Ceræ nouæ mundæ 3. v. s.

Olei communis. ana. 3. ix.

Misce omnia simul, & coletur, & fiat.

VNGVENTVM citrinum, et dicitur vnguentum com mune, ualet sicut unguentum basilicon, sed est plus leniti uum, & est magistrale.

℞. Terebentinæ. lib. i. Ceræ nouæ, & mundæ. lib. s.

Rasæ pini colā. lib. i. 3. iiii. Olei communis. 3. ix.

Misce omnia, & fiat unguentum secundum artem.

VNGVENTVM de dragacanthi pro pectore magi strale.

℞. Gumme dragacanthi mundæ. vnc. iiii.

Aquæ florum uiolatorum. lib. ii.

Infundatur in ea gūma per horas. xii. postea stamigne f.

& his addatur. Olei uiolati. Olei amygdalarum dulcium. Ce ræ albæ. ana. lib. i. Liquefiant oleum, & cera: deinde appona tur gumma ipsi infrigidatis, & misceantur.

Vnguentum hoc nisi ingenio & fiat nunquam bonam for mam habere pōt, sed itat in magdaleonibus grossitudinis fa bz. Igitur hoc mō facias, post liquefactionē ceræ, & olei, & ipsorum infrigidationem addas gummam stamignatam pau latine illam stanchezando ac si uelles stanchezare manu christi, & non cesses addere gummam, & stanchezare do nec habeat bonam formam, & quanto magis elaborabis in ducendo, tanto meliorem formam accipiet.

VNGVENTVM de adipibus Magistrale pectorale.

Adipis gallinæ, Ceræ albæ. 3. iiii.

Adipis anseris, Olei camemillæ,

Adipis Anatidis, Olei amygdalarum dulcium,

Butyri recentis ana. 3. vi. ana. 3. iiii.

Misce & fiat unguentum.

VNGVENTVM Committissæ Gulielmi de Varignana in sua practica. capitulo de retentione mēstruorum: quod est in usu, & est mirabile: & expertum pluries.

℞. Corticum medianarum Oximarum uuarum de labru

castaneorum, fcis. i. granelle,

Glandium, & copularum Sorbarum siccarum immatu

glandium, rarum,

Corticum medianorum Nespillorum immaturato

arboris glandium, rum,

Myrtillorum, Radicum chelidoniz,

Caudæ aquinæ, Foliorum prunorum sylue

Corticum fabarum, strium. ana. 3. i. s.

Terant grosso mō, & bulliant in lib. viii. aquæ plantaginis

usq; ad cōsumptionē medietatis, et postea colet: & postea,

℞. Olei myrtillorum. lib. vi.

Ceræ nouæ. lib. i.

Misce, & laua oleū, et ceram cū supra scripta decoctione nonies semper remouendo aquā, & cum hoc factū fuerit.

℞. Corticum castaneorum, Myrtillorum,

Glandium, Ozimarum uuarum. i. de lam

Corticum medianorum ar brufcis,

boris glandium, Sorbarum siccarum,

Gallarum. ana. 3. ii. ana. 3. i.

Cineris osium cruris bo Trochiscorum de Kara.

uis. 3. i. ync. viii.

Fiat ex his puluis subtilissimus, & misce cum supra scri

pro oleo, & cerā, & fiat unguentum.

Per cortices fabarum auctor intelligit corticem in qua fabæ oriuntur, crescunt, & maturantur, scilicet illa regula.

Modus lauādi cerā talis est. primo debet cera ad ignem liquefieri, deinde in aqua mūda ab oī sapore debet proici, & in aqua illa debet mandibis malaxari, et aqua a cera mani bus exprimi. Deinde ad ignē dēt liquefieri, & in aqua mūda proici, ut prius, & sic iterū atq; iterū est faciendum quo usq; aqua sine sapore exeat, et tunc erit signū lotionis &c.

VNGVENTVM de Anchera Magistrale & est constri ctum.

℞. Myrtillorum, Seminis antheræ,

Gallarum, Rosarum rubearum,

Nucum cupressi, Seminis plantaginis. ana. 3. s.

Corticum granatorum, Terantur hæc omnia subtili

Acaciz, ter & cum

Masticis, Olei rosati. lib. i. s.

Balaustiarum. ana. 3. i. Ceræ nouæ. 3. iiii.

Misce & fiat unguentum.

Modus faciendi acaciam talis est. Accipe succi pomorū syluestrium quantitate quā uolueris propinquorum ma turationi, et pone in caldario, & coq; usque ad cōsumprio nem cōdognatæ de melle, et extende, super tabulam post quam cocta fuerint, et incide cum cultello in frustis par uis, et postea dimitte exsiccare, et usui reserua.

Vnguentum ad combustionem ignis Magistrale sic fit.

℞. Corticis medullæ sambuci. 3. ii.

Bulliant in aqua sufficienti usq; ad cōsumptionem dua rum partium, et coletur: deinde in dicta colatura adde.

Olei

Olei nucum. 3.iii.

Et bulliant lentissimo igne vsque ad consumptionem superprescriptæ decoctionis, postea ad intus in fine.

Ceræ nouæ, & boni coloris. 3.ii.

Milce, & fiat vnguentum.

VNGVENTVM ad scissuras mamillarum magistrale.

R. Lithargyrii argenti, Axungie porci maf. 3.ii.s.

Zingiberis fini, Olei violati. 3.iii.

Myrrhæ. ana. 3.ii. Ceræ nouæ. 3.ii.

Et fiat vnguentum molle.

VNGVENTVM mirabile relatum ad Nicodemum Mesue, valens ad ulcera putrida, & genera in eis carnem, & sigillat, & prohibet in eis fieri putrefactionem. Cuius hæc est permixtio.

R. Myrrhæ, Mellis despumati. 3.vii.

Aloes, Vini albi, & boni. 3.iii.

Sarcocollæ. ana. 3.i.

Decoquantur simul cum facilitate usque dum habeat spissitudinem. Et quæ additur in medicamine Vitæcoli. 3.s. & proprie ad consumptionem carnis additur, & est expertum.

VNGVENTVM basilicon magnum Mef. confert vulneribus, in quibus est calfactio, & proprie in vulneribus nervosis, mundificat. n. & incarnat ea, Cuius permixtio.

R. Ceræ albæ. 3.vi. Picis græcæ: idest colophoniæ. 3.i.s.

Rafæ pini, Picis. 3.iii.

Sepi vaccini, Olei communis. lib.ii.

Olibani,

Myrrhæ. ana. 3.i.s.

Conterant conterenda, & fiat vnguentum in bona forma, Pix si simpliciter scripta reperitur, semper de naturali intelligitur.

VNGVENTVM cerealeos magnum Mef. rectificans vlcerum maligna, & fistulas difficiles, & mundificat a carne mortua, & putrefactione, & perficit sigillationem eorum sigillatione laudabili.

R. Armoniaci. 3.i. Lithargyrii. 3.xv.

Bdellii, Aloes,

Olibani masculi, Opopanacis. ana. 3.ii.

Aristolochiæ, Floris zris. 3.iii.

Sarcocollæ. ana. 3.v. Resinæ. 3.xiii.

Myrrhæ, Ceræ albæ. 3.ii.

Galbani. ana. 3.iii. Olei communis. 3.ii.s.

Armoniacum & bdellium dissoluantur in aceto Lithargyrium teratur & decoquatur cum oleo donec liquefiat, & tunc remoueat ab igne, donec infriigidetur parum, & propterea super ipsum armoniacum, & bdellium dissoluta in aceto, & reduce ad ignem donec coaguletur, & post illud propterea super ipsum reliquis medicinis, & administretur.

VNGVENTVM cerealeos paruum Mef. faciens nasci carnem in vulneribus, & mundificat, & incarnat ea, & confert vulneribus recentibus & antiquis.

R. Aristolochiæ rotundæ, Sarcocollæ. 3.s.

Kadicis ieros, Lithargyrii triti puluerizati.

Sanguinis draconis, yuc. v.

Armoniaci. ana. 3.s.

Decoquatur lithargyrium cum olei cois lib. i. usque dum liquefiat. Et conficiatur cum aliis fere diximus.

VNGVENTVM alabastrum Nardi precioso quod Romani de Hierusalem attulerunt tempore quo dominus noster Iesus Christus fuit crucifixus, & probatum est in omnibus febribus, & rigoribus, & calcolosis doloribus lumborum, & petram de vesica frangit, dolorem illorum auferit, hemicraniam, alias iliacum dolorem amputat, causis matricis optime subuenit Maria, & Martha sorores Lazari hoc vnguentum vsque fuerunt diebus vitæ suæ. Cuius permixtio hæc est.

Sauinæ viridis. 3.v. Millefolii. 3.vi.

Galliarum cupressi viridis, Artemisæ,

3.viii. 3.i. Foenugræci,

Roris marini viridis. 3.vi. Terræ benedictæ,

Hederæ, Seminis lini. ana. 3.vi.

Hæc omnia infunde in aquæ sextario uno medio, & stet in infusione per duos dies, postea adde.

Olei cois sextaria. v. & dimitte eum cum cautela & coquantur usque ad consumptionem aquæ & remoto ab igne coaleatur per sacculum additis,

Ceræ nouæ puræ, & mun-

dz. 3.vi. Resinæ pini,

Colophonie, Olibani,

Terebentinæ, Masticis. ana. 3.v.

Galbani, Storacis calamitæ,

Gummi hederæ. 3.ii. 3.v. Spicæ nardi. an. lib. i.

Picis hispanicæ. 3.v. Balsami. 3.iii.

Quæ terenda sunt terantur, & quæ liquefacienda liquefiat secundum artem, & misce omnia, fiat vnguentum semper agitando cum spatula, & vsui referetur.

ZUCCHARVM rosatum Mef. stomachum, & cor confortat, & omnia viscera. Et confert ad mollificationem eorum, & eius modus talis est.

R. Summorum florum rubeorum rosarum incompletæ maturitatis. 3.iii. Permittantur post eorum collectionem saltem per diem, deinde in lapideo vase ultimate conterantur: postea adde eis zuchari lib. i. & bene pistando permisceantur: deinde reponantur in vase uitreato, & cooperiatur charta, de mum soli exponatur, & per menses. iii. permittatur o die illum miscendo: deinde remoueat, & referetur. Et hoc modo fiat zucharu violatū, buglossatū, & boraginatū permixtum do solum flores. In reliquis vero prescriptus modus seruandus est. Et quidam faciunt illud cum rosis non habentibus aliquid de complemento, & inuenitur magis stypticum.

Et sunt qui non terunt rosas, sed incidunt cum forficibus, & fricant manibus fricatione ultima rosas, & zucharum: deinde exponunt soli. Nota insuper, qd de floribus prescriptis solū summities accipienda est, galia vero abicienda, quia nimis dura. Et si illa quæ in floribus boraginis reperitur abicienda sunt.

ZUCCHARVM violatum Mef. inflammationem, & sitim sedat, ventrem lubricat. Et eius modus est sicut zucharum rosatum, indigente tamen vniolæ expansione longiori, & expositione in sole.

De artificio Ceræ.

CERÆ enim quid sit, & quomodo a melle separatur: quomodoque fiat. A doctoribus longo, & claro sermone pertractatum est ita ut & mulieres, rustici magistri effecti sint. Igitur de ipsius artificio scribere restabat. A cera igitur rubea faciam initium.

Ad faciendum ceram rubeam.

R. Ceræ nouæ lib. i. Terebentinæ subtilis. 3.iii. in æstate: in hyeme. 3.iiii. Cinaprii super lapide pictorū bene triti. Olei oliuarū. ana. 3.i. Liquefiat cera, & terebentina ad ignem: de melle remoueat, & post aliquale infriigidationē addat oleū & cinaprium, beneque simul misceantur, & referetur &c.

Oleum. n. cum cera ponitur, ut ceram simul tenere faciat quæ a cinaprio separatur, & frangibilis redditur, ac ut cinaprium melius conteratur.

Sunt qui loco cinaprii ad faciendum rubeam ceram. ponunt nimum, & fieri potest, sed in triplo ponitur de minio ut pro omni lib. Ceræ minii bene triti cum oleo ut supra. 3.iii. uel. ii. ad minus, sed non habet tantum colorem quantum si sit de cinaprio.

Ad faciendum ceram viridem.

R. Ceræ nouæ lib. i. Viridis zris triti, ut supra. Olei oliuarū ana. 3.i. Liquefiat cera, & post aliquale infriigidationē addatur viride zris, & oleum, & bene misceatur, & viridis fiet.

Si dictam ceram tenacem facere vis, adde quantitatem terebentinæ, superprescriptam in cera rubea. Terebentina. n. in cera ponitur, ut per ipsam tenax reddatur. Ac quia aliquando de ipsa sunt imagines, ut facilius a formis in aqua madefactis separatur.

Ad faciendum ceram nigram.

R. Ceræ nouæ lib. i. Terra nigra trita, ut supra. Olei oliuarū ana. 3.i. Liquefiat cera, & post aliqualem infriigidationem addatur terra nigra, & oleum, & referua.

Si dictam ceram nigram tenacē facere uis, addas quantitatē terebentine supra tibi notatam.

Ad faciendum cere dealbandum ceram.

R. Cere quantitatē quam uolueris. Aquę clarę partes.ii. Misceantur duo hæc, & calefacta aqua ad ignem clarum utique quo cera fit liquefacta, deinde paululum permittatur quiescere, donec tota cera natet super faciē aquę, deinde accipe uis aliquod uitreatum, cuius pars exterior fit lenis, madafac eum in aqua frigida: deinde infundatur fere medieta eius in cera liquefacta, & extrahe cum cera quę sibi adhæret, & permittit ceram illam infrigidare: deinde separa eam a uase, & tantum hoc facias, q̃ tota cera ab aqua fuerit extracta, deinde dictam ceram taliter formatā soli exponas, & rori in mense Maii, & illam fape uoluas, & tantum permittatur, quod fiat alba, ut ceruilla.

Sunt autem quidam alii qui illam dealbant in tribus diebus seruando prædictum modum. Sed expectant in mense Julii quando sol est in maiori calore, & quia cera illa subtilis est facilius: q̃ a caliditate solis possit liquefieri aspergen da est aqua munda bis in die.

Alius modus dealbandi ceram.

R. Cere quantitatē quam uolueris. Aquę clarę partes .ii. Bulliant simul, & coquatur donec nigrescat aqua. Et tunc prociue aquam illam, & pone aliam, & ita fape fiat donec fiat alba: deinde collige ceram & reserua.

Multis aliis modis potest cera dealbari. Sed præscripti duo modi sunt communiore a meliores. Insuper nota, q̃ cera potest omnem colorem accipere tingendo eam cum re tingente ad colorem quem intendis facere. Seruando modum in cera rubea, & uiridi tibi declaratum, & de quantitate tam rei quam olei, & contritione.

Modus laborandi dictam ceram.

MENSURA longitudinis fm diuersitatem ponderis.

Cereum de Rub. xxi. debet esse de br. iiii. & quar. ii.

Cereum de Rub. viii. debet esse de br. iiii. & quar. s.

Cereum de Rub. vii. debet esse de br. iiii.

Cereum de Rub. vi. debet esse de br. iiii. & quar. iii.

Cereum de Rub. v. debet esse de br. iiii. & tertiz. ii.

Cereum de Rub. iiii. debet esse de br. iiii. & tertiz. i.

Cereum de Rub. iiii. debet esse de br. iiii.

Cereum de Rub. ii. debet esse de br. ii. & quar. iiii. s.

Cereum de lib. x. debet esse de br. ii. & quar. ii.

Cereum de lib. x. debet esse de br. ii. & quar. ii.

Cereum de lib. xv. debet esse de br. i. s. & digit. ii.

Cereum de lib. xvi. debet esse de br. i.

Cereum de lib. xii. debet esse de br. ii. minus digitis. iiii.

Cereum de lib. viii. debet esse de quar. vi. s.

Cereum de lib. v. debet esse de quar. v. s.

Cereum de lib. iiii. debet esse de br. ii. & quar. s.

Cereum de lib. iiii. debet esse de br. ii.

Cereum de lib. ii. s. debet esse de br. i. & quar. iiii. s.

Cereum de lib. ii. debet esse de br. i. & quar. iiii.

Cereum de lib. i. s. debet esse de br. i. & tertiz. ii.

Cereum de lib. i. debet esse de br. i. & quar. i.

Cereum de lib. s. debet esse de br. i.

Cereum de lib. vii. debet esse de br. i. & digitis. ii.

Cereum de lib. vii. debet esse de quar. iiii. s. & digitis. ii.

Cereum de lib. iiii. debet esse de quar. ii. & digitis. ii.

Cereum de lib. iiii. debet esse de quar. ii.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. iiii.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. ii.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

Cereum de lib. i. debet esse de quar. i. & digitis. i.

mam cerei nimis grossam qui ut errorem tuum corrigere possint, abradunt cultello partem illam superfluum: cuius modus non laudatur. Sed accipienda est alia cera seruens: & super partem illam superfluum cum illo calore, prociue da, & toties est reiteranda, q̃ pars illa amota sit, & sic error corrigitur. Et nota, q̃ parum debet esse differentia in magnitudine seu in grositie de parte infima, & suprema sificandum rationem laboratum est cereum.

Apponitur quandoq; noua cera, rotundis cereis ut dispēdium cuitetur. Igitur talis est modus. Amoueatur cera in superiori parte cerei antiqui usq; ad lycinium per quartam unam, & lycinium antiquum cum nouo bene ligetur, ita ut si cum fune suspendatur non laxetur: deinde inuoluatur charta tantę altitudinis, quantę cereum esse debet, & in dicta uacuitate cera liquefacta cum captia ponatur usquequo uacuitas plena sit: deinde duo uel tres manus cerei super totum cereum addantur. Et sic nouiter totum factum esse apparebit. Modus hic ab omnibus usitatus est.

De artificio Zuechari.

EX ZUCCHARO multa sunt quę hoc meo libello non describentur. Cum iam trita sint, & rudes in his sint edocti, & non ab omnibus modus faciendi scitur, declarabitur, ut artificium zuechari omnibus pateat huius opusculi beneficio.

Ad faciendum coriandros solidos.

CORIANDRI rotundi fide solidi sunt ex zuecharo sub quo ponitur semen coriandri præparatum, ut supra, & bene exiccatum omni humiditate. Et in principio utque fere ad finem ponitur zuechari bene coctum. In fine uero per tres, uel quatuor manus exhibetur leuis coctionis, ut maiorem rotunditatem accipere possint, sicutq; magis solidi.

Dicti coriandri bene siccandi, & fricandi manibus sunt, & nō solum in fine, sed in omni additione zuechari, eo quia inde duriores redduntur, nec ita facili ter ab humiditatibus denigrantur & molles redduntur, & tunc ab omnibus artificibus laudatur: & hæc est consuetudo Ianuensium quę omnibus approbatur.

Ad faciendum coriandros crispōs.

TEGATVR semen coriandrorū zuecharo manibus fortiter fricando usquequo habeant mediocrem magnitudinē, dando super zuecharum satis fortis cocturę, deinde accipitur captia forata paruo foramine in fundo, & zuecharo impleatur, & ab alto zuecharum dictis coriandris proiciatur semper bacilonum ducendo sub, & supra, hinc, & inde, & sic zuecharum fortis coctū a principio usq; ad finem, & bene exiccetur ducendo bacilonum, ut supra.

Zuecharū datur bene coctū, ut crispū durare diu possit, ac ut tantū simul non adhærent quantum adhærent si leuiter decoquerentur, & hoc bene cocti aromatari faciant.

Ad faciendum cinnamomum confectum.

CINNAMOMVM exorticutum a superiori cortice, & per parua fila incidatur, & in bacilono ponitur, ac zuecharū supra eum proiciatur cum captia paruo foramine forato. Et in principio, ut puta per tres manus zuecharū fit leuis coctionis, postmodum usq; in fine fortiter bacilonum ducendo ut in coriandris crispis dixi, & tantum hoc continuetur, quod grossi reddantur.

Sunt qui post primam profectionem zuechari aspergunt in dictum cinnamomum incisum zingiberis puluerizati, ut fiant magis mordacitius, & gustui fortes. Sed modus ille nō mihi placet. Sed ut linguę mordentes sint, debent fieri ex bono cinnamomo, nec in fundendum est in aqua, ut quidam fatui faciunt, ut facilius incidatur, eo quia illa infusio tollit omnino saporem cinnamomi.

Ad conficiendum amygdalas.

AMYGDALAS & bene cum panno aspero frica, beneq; in bacilono exicca, & ab omni immunditia munda, demum zuecharum fortis coctionis super eas prociue cum captia forata bacilonum huc, & illuc ducendo incessanter sub quo sit ignis carbonum, beneq; exiccetur, & tantum hoc fiat, q̃ bene tegantur, & quanto magis continuatur dicta dictio baciloni, tanto solidiores redduntur.

Sunt

Sunt qui cōficiunt amygdalas cū cortice, & hoc modo confectz longiori tpe durant, nec rancescunt. Sūt vero qui a supiori cortice mūdāt, & sic cōficiunt cū zūcharo. Alii qui illas diuidunt in duas partes, & cōficiunt, illasq; crispas faciunt. Modus vni faciendi, & de coctiōne zūchari, & dūctiōne baciloni est, ut de coriandris crispis tibi mōstrauī.

Ad condendum rancetoso.

R. Corticum aranciorum prepara quantitatē quam uolueris, & super eas proice zūcharum cum captia forata bene coctum, & facias quemadmodum de cinnamomo dixi, & de proiectione zūchari & dūctiōne baciloni.

Cortices ranciorum hoc mō preparātur, infundantur in aqua munda, & permittantur per dies nouem oī die aquam innouando vltimo vero bulliant in aqua decem nel duodecim ebullitionibus, deinde ab igne remoti exprimentur, & remouetur pars alba quę cortici adhæret, & incidunt per longū in fatis minuta frustra, & infundantur in zūcharo li quæstio, & cocto per diem, & noctē, deinde in oleo bulliāt leui ebullitione, postmodū extrahantur, & deficcari permittantur quę deficcate mō quo supra conficiantur, & hoc mō preparantur, & amaritudo ab eis remouetur.

Ad conficiendum garyophyllos.

R. Garyophyllos exicca, beneq; munda ab oībus immunditiis: deinde zūcharū cū captia forata sup eas proice fortis fatis cocturā. Et si illos crispas facere vis, facias, ut de coriandris crispis tibi dixi, & de dūctiōne baciloni. Si uero solidos, ut de amygdalis tibi mōstrauī, & idē intelligas de rancetis.

Ad faciendum confectiōnes bene crispas debet esse forma captiæ paruum, & zūcharum debet dari æqualiter, & vniormiter, & quanto ab alto proiciatur tanto melius: nec permittendz sunt guttæ super eas cadere illz enim opus eorum destruent.

Ad conficiendum anisos.

R. Seminū anisorum bene mūdatorum lib. ii. Et super ea proice zūcharū leuis coctiōnis in principio, & bene manibus ducantur per bacilonum usquequo fere sint cooperta, beneq; excidentur ad oēm manum zūchari, & hoc cōtinue tur usq; in finē si solidos anisos facere uis, Si uero crispas, postquam cooperta erunt, da zūcharum cum captia forata, & ab alto, & sit fortis cocturā, deinde duc bacilonum, ut in coriandris crispis tibi dixi, & hoc facias usq; ad debitam ipsorum magnitudinem.

Anisi quanto paruiores tanto pulchriores, & quanto duriores tanto laudabiliores duri. n. sunt, & non solum anisi, sed & ceteræ aliz confectiōnes si bene ficeantur ad omnem zūchari additionem, quare hoc bene notetur.

Ad conficiendum pineas.

R. Pinearum bene mundatarum quantitatē quam uolueris, & super eas proice zūcharum cum captia forata bonæ cocturæ a principio usq; ad finem, & duc bacilonum prout in coriandris crispis tibi mōstrauī. Si uero solidos facere vis, facias prout de amygdalis tibi mōstrauī, & de proiectione ne zūchari, & dūctiōne baciloni.

Nota q; hæc confectio parum durat: eo quia rancescunt pineæ: & antequam conficiantur est aduertendum ne rancidi sint cognoscantur autē quia sunt nigre: & mali saporis, quare purgandæ sunt cum sulfure: ut supra tibi ostendi.

Nota insuper q; sunt qui in prima exhibitione zūchari ponunt albumen oui bene conuulsatum cum zūcharo nō multum calido ne albumen coqueretur, & hoc faciant, eo quia cum difficultate zūcharum eis adhæret propter oleagi nitatē quæ in eis est, & hic modus non uituperatur.

Ad conficiendum auellanas.

R. Auellanas quantitatē quā uolueris, & facias prout de amygdalis tibi mōstrauī, & crispas, & solidas faciēdo, & seruando modum in istis: sicut de amygdalis tibi dedi.

Auellanz ænequam conficiantur debent bene duci in bacilonum, & calefieri ad hoc, q; subtilis cortex eis adhærens remouetur. Si enim permittet, zūcharum facilius ab eis remouetur.

Ad conficiendum muscardinos.

R. Cinnamomi subtilis, & electi, & bene puluerizati. 3. ii.

Musci optimi dissoluti cū paucissima aqua rosa. 3. s. Misce duo hæc bacilonum, & super eis pone zūcharū bene coctum, beneq; & incessanter manibus zūcharū, et species ducantur, & bene excidentur, & toties hoc fiat, q; ad grositudinē seminis papaueris ueniant, & in fine dando per duas manus zūcharum leuis coctiōnis, ut rotundi fiant.

Muscardini non nisi cū difficultate corpus accipiunt, sed sagax aromatarius, & sollicitus in miscēdo manibus zūcharum, & species cito eos format post uero duas, uel tres manus zūchari cribellandi sunt a quā cribellatione exeunt muscardini grositudinis punctæ acus, & puluis referuetur, & alii qui iam corpus lumpsērunt expleantur. Feci ego semel facere ab uno famulo bene docto, & præsens steti, qui illos cito, & optime pfeicit: Sed ante pfectionē dimisit pellē manus ad baciloni & pauca quæ remanēt uelificata erat.

Insuper nota, q; præscriptæ omnes confectiōnes quæ in bacilonum fieri debent habere sub eo ignem carbonum accēsum sine fumo, non autem lignorum, ut iam a quibusdam falsis uidi facere.

Ad faciendum pignocatam.

R. Zūchari clarificati, & coctiōnis non pfectz lib. i. Stanchetur optime cum baculo amō: a captia ab igne, & post longā eius dūctiōnem additur pineæ mundæ 3. iiii. Et simul misceantur: zūcharū pfecte coquatur, & sit dura coctiō: deinde in morsellis inciduntur.

Pignocata si longo tpe conservari debet, apponenda est quāritas præscripta pinearū. Si uero pauco tpe apponi possunt lib. s. pinearum pro omni lib. i. zūchari.

Ad faciendum morsellatam albam.

R. Zūchari clarificati & coctiōnis non pfectz lib. i. Stanchetur optime cū baculo, & post longam eius dūctiōnem addantur zingiberis minutim incisi. 3. ii. Deinde zūcharū pfecte coquatur, & in morsellis inciduntur.

Sunt autē multi qui maiorem quantitatē zingiberis pro lib. i. zūchari ponunt ut fortior sit. Sed cōis & ab oībus vitata: dos est. 3. ii. zingiberis pro omni lib. i. Zūchari.

Ad faciendum zingiberatam.

R. Zingiberis munda & electi 3. iiii.

Cinnamomi fini. 3. ii.

Macis. Garyophyllorum. an. 3. j.

Puluerizentur hæc subtiliter.

Zūchari clarificati & bene cocti lib. ii.

Et fiat confectio in morsellis.

Confectio hæc est multum delectabilis gustui: sed non est alba. fit in multis bonis vrbibus. Sed in hac nostra urbe non est in usu.

Ad faciendum fructus & animalia oīa ex zūcharo.

R. Zūchari quantitatē quam uolueris & pulueriza: deinde post subtilem puluerizatōnem impastetur cum albuminibus ouorū quantitate sufficēti intantum q; formā pastæ habeat deinde vngantur formæ cū oleo amygdalarum dulcium & de dicta pasta formæ impleantur, postea simul comprimantur: & sic erunt aialia uel fructus facti: & sic oīa fieri possunt, pur q; formæ habeantur: deinde ponantur in stupha ad siccandum, demum pingantur secundum colorem suum.

Sunt quidā alii qui impastāt zūcharum cum gomma dragacanti liquata in aqua rosa: & qui aspergūt formas farina, & hoc fieri potest sed per superior modum melior est.

Ad faciendum penidos.

R. Zūchari lib. ii. infundatur in aqua per noctē: deinde coquantur cū illa aqua abq; aliqua alia clarificatione: prius tamen coletur & sit coctio dura: post quā coctiōnem proiciatur super marmor inunctum oleo amygdalarum dulcium: deinde ducatur ad ferrum antequam infrigidetur, & quanto longiori tempore ducantur, tanto aliores fiunt: deinde forpice inciduntur & in stupha referuntur.

Sunt autē qui ponunt pro omni lib. i. zūchari. 3. s. amydi puluerizati post mediā zūchari coctiōnē uel in fine: & hoc ut zūcharum non candeat: & modus ille non uituperatur.

In aqua autem zūcharum ponitur ut uiscositatem acquirat: quā mediante possint ad ferrum trahi, quā tractione albi penidii fiant.

Zuccharū quanto perfectius, tanto longiori tempore in aqua permittitur infusum. Quanto uero grossum magis ac rubrum, tanto minori tempore relinquendum est in aqua: & hoc nota: zuccharum enim grossum & rubrum multum de uiscositate habet: ideo parum in aqua permittitur; album uero pauca habet humiditatem: immo ad illam acquirendam quæ necessaria est ad hoc quod trahi ad ferrum possit, in aqua infusum stare debet & longo tempore.

Zuccharum in omnibus superscriptis confectionibus clarificari debet. In ista autem non clarificatur: sed tantum modo colatur: ut a superfluis & immunditiis mundetur, &c.

Ad faciendum manuscripti rosatum.

R. Zucchari clarificati & ab aqua consumpti lib. i. Aquæ rosæ lib. s. Misce & bulliant duo simul usq; ad aquæ consumptionem & zucchari fortem coctionem: deinde illum prolixe super marmor asperum farina subtili & referua.

Sunt qui ungunt marmor ex oleo amygdalarum loco farinae. Nec hic modus mihi placet, scias insuper quod zuccharum ex quo fit manuscripti non multum stanchezatur. longa enim stanchezatio prohibet zuccharum candescere.

Ad faciendum manuscripti uiolatum.

R. Zucchari clarificati & ab aqua consumpti. lib. i.

Aquæ florum uiolarum lib. s.

Misce & fiat ut de prescripto tibi monstrauimus.

Nota insuper quod aromati nostri temporis solum. 3. ii. aquæ florum uiolarū & rosarū p. li. i. zucchari ponunt ad faciendum tam manuscripti uiolatum quam rosatum: & tunc pauca uirtus est in eo. ideo quantitas illa apponenda est supra a me descripta.

Potest etiam fieri manuscripti buglossatum & boraginatum: & fiant ut superscripti permittunt solum aquas: & loco rosæ rosarum ponitur aquæ florum buglossæ, uel florum boraginis cum quantitate zucchari præscripta.

Ad faciendum manuscripti perlarum.

R. Zucchari clarificati, & ab aqua consumpti lib. i. Aquæ rosarum lib. s.

Misce & duo simul bulliant usq; ad aquæ consumptionem & zucchari duram coctionem. In fine uero addatur Margaritæ subtilissimæ & puluerizatæ. 3. s. & proiciatur super marmor asperum, ut supra & referetur.

Sunt autem quidam aromati nostri: immo fere omnes qui solum. 3. i. pro omni lib. i. zucchari margaritarum ponunt; & hoc propter ipsarum penuriam: ac emptores nolunt solvere & male. nulla enim minor quantitas apponenda est quam. 3. s. pro omni lib. i. zucchari.

Ad faciendum manuscripti cum fragmentis cor.

R. Zucchari clarificati & ab aqua consumpti. lib. i. Aquæ rosæ lib. s. Bulliant hæc duo simul usq; ad consumptionem aquæ & duram coctionem zucchari: deinde in fine addantur. Fragmentorum præciosorum omnium subtilissime contritorum. 3. iii. Margaritarum. 3. i. Misce & proiciantur super marmor & referetur.

Ad faciendum saponiam.

R. Zucchari clarificati & ab aqua consumpti. lib. i. Aquæ rosarum. 3. iii.

Bulliant oīa sit usq; Amydi puluerizati. 3. iii. ad aquæ consumptionem: & zucchari durā coctionem: deinde in fine addantur. zingiberis subtilissime incis. 3. ii. Et proiciatur super marmor & detur ei forma manuscripti: sed laudat et minor sit.

Hæc coctio fit apud curiales & dios Venetos: & his locis multū in usu, multoq; delectabilis gustui ac nutritiua. Saponia alia de Venetis.

R. Amygdalarum mundatarum dulcium. 3. xvi.

Amydi purissimi & noui. 3. iii.

Zucchari albi & clari. lib. i.

Fiat emulso amygdalarū in lib. i. s. aquæ florū uiolarum. postea R. dictæ emulsionis lib. i. & zuccharum, & dissolue si mul ad ignē, & postea impone amydom, & reliquū emulsionis amygdalarū: & agita cum spatula lento igne usq; ad spissitudinem: et si uis eā facere in mortellis adde zucchari pfecte coctionis. 3. iii. & fiant mortelli. 3. s. pro quolibet, uel circa.

Addandum colorem rubeum zuccharo,

R. Braxilis subtilissime raspati. vnc. i.

Aluminis roche. 3. s. Aquæ. 3. vi. Infundantur duo hæc in pecia ligata in dicta aqua per dies sex: deinde calefant ad ignem leuiter: & cum ea aqua zuccharum coquantur.

Ad faciendum colorem uiridem.

R. Succum caulium uel succum blez uel succum foliorum iros & cum altero eorum zuccharum coquantur.

Ad faciendum colorem celestium uel nigrum.

Indici. Gummi dragacanthi. ana. vnc. iii.

Vini nigri vnc. vi. Ligeantur in pecia duo hæc subtiliter puluerizati, & infunde in uino per dies sex: deinde cum dicto uino zuccharum coquantur, prius tamen ad ignem cum dictis rebus aequaliter calefant.

Ad faciendum colorem glaucum.

R. Croci. 3. ii. id est integri. Aquæ lib. i.

Infundantur in ea per diem & noctem: deinde aliquantulum calefant: simul postea coquantur, & cum dicta aqua zuccharum coquantur: uel accipe succum florum nascencium in paludibus qui sunt glauci: & est opinio quorundam quod sint flores acori, & cum eo coque zuccharum, est enim glaucum pulcherrimum non tamen ita boni odoris.

Ad faciendum colorem turchinum.

R. Indici. 3. iii. Cerullæ. 3. iii. Calcis uiuæ. 3. i. Puluerizentur et in pecia ligentur ac infundantur in lib. i. Aquæ per diem & noctem: deinde simul ad ignem aequaliter calefant, & cum dicta aqua zuccharum coquantur.

Ad faciendum colorem morellum.

R. Succū florū iros & cum eo zuccharum coquantur, & si illo tempore non reperitur, accipe manipulum unum rondatrice corii morelli de quo sunt burse: & fac bullire tribus uel quatuor ebullitionibus: deinde coletur aqua ab illis incisionibus: & cum dicta aqua coquantur zuccharum. Et sic potes facere de rubeis incisionibus: si rubeum colorem facere uis absque braxili.

Ad faciendum marzapanum.

R. Amygdalarum dulcium mundatarum & subtiliter contritarum lib. s. zucchari boni & puluerizati: deinde iterum cum amygdalis bene commisce lib. s. Aquæ rosarum quantum sufficit & fiat.

De decoctione medicinarum: & continet partes tres. Prima est de medicinis quæ multū sūnt de decoctione. Scda est de medicinis quæ parum sūnt de decoctione. Tertia est de medicinis quæ mediocrē sūnt de decoctione.

Hæc sūnt maxime minus utilis quā necessaria est. Nisi enim medicinz debito modo coquantur quæ compositum faciunt, sane uirtus compositi a doctoribus limitata non resulabit. Igitur ut hunc errorem amoueā, summam hæc annotauimus, in qua & vtem & particulare doctrinam comperies.

M E D I C I N A E quæ multū sūnt de decoctione sūnt istæ.

Aristolochia longa & rotunda: apium radix & herba.

Acacia. Alumina omnia.

Bruci. Baccara. Berberi.

Colloquintida. Cucumer asinus. Centauræ omnes Ciera. Cardones. omnes. Cauda equina. Cortices capparo. Cortices mandragoræ. Cortices gra. Cornu cer. calorem. Diptamus. Enula. Euphorbium. Elleborus albus & niger. Foeniculus radix & herba. Fæoli. Gentia. Gramen. Hermodactyli. Ireos. Hypoquilitidos. Lapis armenus Lapis stellatus. Lupuli. Milium folis Poppanacum. Orobus. Omnia habentia multa humiditatem & frigiditatem Omnes succi herbarum Petroselinum, radix & herba. Plantago. Radices pzonij. Raphanus. Rheuponticum. Rubia tinctorum Radices omnes non aromaticæ. Squinantum. Sarcocolla. Serapinum. Serpentaria omnes. Semperuiua. Salis omnes species Staphysagria. Semen canapis. stipites arborum & plantarum: minus tamen quam radices, & plus quam folia coquenda sunt.

M E D I C I N A E quæ parum sūnt de decoctione sūnt istæ.

Aqua lactis. Ambra. Amos Amomum. Anthos. Acerd. Aqua rosarū. Aqua uiolarum. Aromatica omnia. Capilli ueneris. Cardamomum maius & minus. Caphora. Carpopal-

lamum

ſanum cum tota planta. Cinnamomum Camemilla. Cortices citri. Cortices cydoniorum. Calamus aromaticus Epithymum Folii indi. Flores genêtæ. Flores nenupharis. Flores bugloſæ. Flores boraginis. Flores omnes. Garyophylli. Lignum aloes. Manna. Muſcus. Maiorana. Mellilori. Nigella. Ozimum. Origanum. Opium. Omnia habentia uirtutem in ſuperficie. Omnia facilis omnia reſolutionis. Piper omne. Roſæ. Rheubarbarum. Stœchados. Seminis pyſylli. Scamonea. Seminis altheæ. Semina frigida quatuor minora. Seminis papaueris albi & nigri. Satureia. Semen baſiliconis. Serpillum. Sandali omnes. Viola.

MEDICINAE quæ mediocrem ſuſtinent decoctionem ſunt iſtæ.

Aloes. Abſinthiû. Aſſarum. Agaricus. Aniſi. Arthemifia. Betonica. Balauſtia Calamentum. Colloquintida. Ciclamê. Carui. Ciminiû. Cubebæ. Ciceora. Coſtum. Daucus. Eupatorium. Endiuia. Epatica. Folia omnia. Fumuterra. Fœniculi. Herba papaueris utriuſq. Hyſſopus. Ireos. Iuiuibæ. Hypericon. Lupuli. Leuistici. Laurus. Menta. Mezereon. Myrtilli. Menta. Nenuphar. Hordeum. Pruna. Polydodium. Prœonia. Petroſilli. Pimpinella. Parietaria. Radix liquiritiæ & ſuccus. Salvia. Semina omnia. Succus herbarum aromaticarum. Succus roſarum.

Succus uiolarum,	Semen endiuiz,
Squilla,	Semen acetofæ & herba,
Senz,	Semen urticæ,
Semen genêtæ,	Semen coriandrorum,
Semen uſquiami,	Semen iuniperi,
Sauina,	Scolopendria,
Sparagi,	Saxifragia,
Scabioſa,	Tamarindi,
Semen apii,	Turbiti,
Semen rutæ,	Taſſus barbaſſus,
Semen lini,	Tamaricus iſteſt herba,
Semen fœnugræci,	Vinum granatorum,
Semen portulacæ,	Vinum cydoniorum,
Semen laſtucæ,	Zedoaria,
Semen ſcariolæ,	Zingiber,

Et ſic concluditur quæſitum de decoctione medicinarum. De contritione medicinarum continet partes tres. Prima de medicinis quæ multum ſuſtinent de contritione. Secunda de medicinis quæ parum ſuſtinent de contritione. Tertia eſt de medicinis quæ mediocrem ſuſtinent de contritione.

HAEC SYMMA non minus utilis quàm præcedens eſt: & ſi intellectu fuerit & executioni mandata auctorum cõpoſitiones uirtutem ſuam a compoſitore limitatam in recipientem imprimetur. Ad laudem almiſimi qui ſua benignitate opus noſtrum dirigit.

MEDICINAE quæ multum ſuſtinent de cõtritione ſunt iſtæ. Aſtoloche omnes. Aloes. Amygdal. Aurû. Argentû. Argentum ſublimate. Arſenicum. Aurum purgamentû. Baccæ lauri. Balauſtia. Batitura æris. Berberi. Cortices ouorum. Colloquintida. Cucumer aſinus. Centauræz oës. Cicera. Cardones oës. Cauda equina. Cortices capparorum. Cortices mandragoræ. Cortices granatorû. Coſtû. Cornu cerui. Cartamus. Ceruſſa. Coralli utriq. Cryſtallus. Cortices oës plantarû Dactyli. Dipramus. Enula. Ellebori ambo. Eboris. Encinaprium. Fœcoli. Ficus. Fragmenta omnia præcioſa. Flos æris. Gramen. Hermodactyli. Ireos. Lupini. Lignum aloes. Lithargyrium. Lapis lazuli. Lapis iudaicus. Lapis liſſis. Lapidès oës. Margaritæ. Meliû foliis. Myrtilli. Marchefitæ oës. Myiniû. Magnes. Marmor. Medicinæ compoſitæ de opulatiua. Medicinæ compoſitæ hepaticæ. Medicinæ pro renibus. Medicinæ oës ſtupefacientes: metalla oia. Medicinæ peſtorales. Opium. Orobus. Hordeum. Oſæ ſapiz. Omnia alumina: omnia mineralia. Pinæ. Paſſilæ. Plumbum uſtum. Radices Prœoniæ. Raphanus. Rheuponticû. Semen papauerum omnium. Semen lini. Squinantum. Scorïa ferri. Scorpionès. Sandali omnes. Serpenteria oës. Semen fœnugræci. Semina quatuor. Ma. frigida. Saphyſagria. Semen coriandrorum. Semen canapis. Semen iuniperi. Sauina. Sempervi-

ua. Sanguis draconis. Semên iuſquiami. Sulphur. Salis oës ſpès. Species tyriacæ. Species mithridati. Spès triſeræ. Species trochiſcorû. Species hieræ. Spès loch. Terra ſigillata. Vitrum. Vitreolum.

MEDICINAE parû ſuſtinentes de cõtritione ſunt iſtæ. Aloes. Abſinthium. Anethum. Ameos. Anomum. Ambra.

Capil. ueneris. Caſſia lignea. Cardamomum. Cortex citri. Calamus aromaticus. Camphora. Cortices cydoniorum. Epithymi. Euphorbium.

Flores genêtæ. Flores camemillæ. Laudanum. Mezereon. Mellilotum. Muſcus. Nigella.

Opopanax. Ozimû. Oia uina aromatica. Omnes gumme. Oës ſpès aromaticæ. Oia quorû uirtus facile reſoluitur. Oia debilia & raræ texturæ. Oia quæ habent uirtutem in ſuperficie. Oia intenſe caliditatis: & ſiccitatis, Piper omne. Roſæ. Scamonea. Stœchados. Semen pyſylli. Sarcocolla. Serapinum. Succus roſarum. Senz Thymi. Viola.

MEDICINAE quæ mediocrem ſuſtinent contritionem ſunt iſtæ.

Aſſarum. Agaricus. Aniſi. Apium. Acetofa. Arthemifia. Cyminum. Ciclamen. Carui. Cubebæ. Daucus. Diacymum. Dianiſum. Diatrion pipereon. Eupatorium. Epatica. Epar. adip. Fumus terræ. Fœniculum. Garyophylli. Hyſſopus. Ireos. Hypericon. Inteltinum lupi. Lupuli. Leuistici. Laurus. Myrobalani omnes. Medicinæ omnes ſolutiæ. Medicinæ ſtomachicæ. Naſturtium. Nux muſcata. Omnia folia præter ipſa aromatica. Omnia fere femina præter aromatica.

Polydodium. Petroſillum. Pimpinella. Parietaria. Pulmo uulpis. Pilulæ oës. Ruta. Rheubarbarum. Spizæ omnes. Semina omnia. Squilla. Semen genêtæ. Scabioſa. Semen prœoniæ. Sparagi. Semê rutæ. Semen urticæ. Semê endiuiz. Scolopendria. Serpillum. Stomacha gallinarum. Turbiti. Tamarici. Zedoaria. Zingiber.

De urinis non nulla ſcitu non indigna.

SECVNTVR nobiliſſima documenta urinarum ad cognoscendum utilitates naturæ hominum & mulierû & hoc cognofcitur per urinas, ex quibus urinis agnoſcuntur infirmitates corporum. Secundaria cognofcuntur per tactum pulſus. Tertiò per auditum perſonæ patientis. Videlicet per interrogationem ipſius prout ſe ſentit, unde ex iſtis documentis poſſumus infirmis lutcurrere incipiendum ſic.

Primo dico quòd urina eſt quoddam colamentum humorum ſuperans corpus & quæ exit ex uelica corporis &c.

Quando urina eſt aliquidulum amara & oler bono odore: tunc corpus eſt ſanum: & ſi corpus eſt turbatum nō oler: immo foetet malo odore: unde eſt malum ſignum. Et ſi urina eſt ex bona natura, & urinalis ſit bene obturatus, urina ſatis durabit, & aliter efficitur uerſa ſi ſtantiua erit. Tunc & tu facias ipſam ad ignem & uetetur. Sed non fit optimo ad iudicandum infirmitatem & ueritatem ipſius perſonæ: unde ſciat quod non eſt urina uerior quæ urina quæ fit poſt digeſtionem. i. poſtquam dormierit uel urina matutinalis per iudicando: quia quanto urina eſt recentior, tanto eſt melior & etiam cognofcitur melius ad lumen dei uel ſolis, occaſione ut melius poſſit agnoſci. Itaq; pars in qua debetur proſpicere ut medicus reſpiciat quanta eſt urina, & quantum colorem habet, & ſi aliquid uidetur intus.

Et ſcias quæ ſunt quæ dant ad intelligendum uel quæ dant colorem urinae. Prima eſt caliditas naturalis corporis altera eſt frigiditas.

Item duæ ſunt quæ dant ſubſtantiã ad cognoscendû urinã. Prima eſt humiditas corporis, altera ſiccitas, unde calor dat ſibi colorem uermilium: & frigiditas dat colorem albi: & humiditas dat ſibi ſpiſſitudinem & turbiditudo: & ſiccitas dat claritudinē: & ſit ipſam lucidam multum. Et ideo eſt ſciendum quòd ſi urina erit rubea & aliquidulum ſpiſſa & non

lucida, significat nimium sanguinem. Si vrina erit vermilia clara & crocea significat nimis colorem alias choleram. Si vrina erit alba & spissa uel alba & grossa & magis spissa quā clara, significat nimis phlegma. Si vrina erit alba & lucida significat nimis melancholiam. Si vrina bruna, significat quod sanguis est quasi coctus & combustus propter nimium calorem & magnam debilitatem. Si vrina erit viridis & lucida, significat magnā debilitatem. Spiritus & sanguis est prout coctus intus. Vnde est bonum comedere & bibere res ad contrarium: & sic stabit corpus sanum propter temperantiam quæ nascitur in medio duarū rerum contrariarum. Vnde si videas quod habeas nimis sanguinē vtere rebus frigidis & siccis: & si es nimis frigidus vtere rebus calidis & humidis. Et si es nimis cholerosus, vtere rebus frigidis & humidis. Et si es nimis siccus, vtere rebus calidis & humidis.

Rex calidæ & humidæ sunt carnes recentes, & vitellum oui, crocus, vng. recentes & bene maturæ & amygdalæ. Res humide & frigide sunt lactuca, portulaca, & lac. Res calidæ & sicce sunt sal, piper, garyophylli, carnes salæ, pulezolum Res frigide & sicce sunt caseus & albumen oui.

Iterum est sciendum quod in vrinis sunt quatuor circuli: licet isti circuli non sint bene clari ad cognoscendum, & maxime quando quis vnus considerat bene ipsos subtiliter. videlicet si superior circulus vrinæ erit optimæ coloratus, & si vrina erit bene prout spissa, & habebit modicā spumam: si significat nimis sanguinem & magnum dolorem capitis in parte anteriori vel in latere. Si circulus superior erit niger, significat nimis melancholiam: & si facit spumam fatis significat dolorem capitis & lateris debilitatem. Et si spuma erit satis, significat debilitatem multam, & si est pauca spuma, significat paucam debilitatem: Si circulus superior erit albus, significat nimis phlegma: & si tenet nimis spumā significat grauedinem capitis plus versus posteriorem partem quam anteriorem: & habet stomachum frigidum. Si circulus erit croceus supra, significat nimis calorem. Et omnia sunt ista intendenda plus et minus secundum colorem & conditionem et substantiam vrinæ. Item si vrina attrahit infra se ad modū filæ, significat leortementū intus in vesica & in renib⁹. Si vrina attrahit ad se ad modū cruche, significat febrē quotidianam intus in prima & malos humores in renibus adunatos & in vesica. Si vrina erit in colore auri, erit melior quam in alio colore. Item aliquando vrina habet vnam nebulam quæ vocatur hypostasis. Aliquando stat supra aliquando iusta. Nunc est considerandum de tali hypostasi si ipsa est continua, uel longa, uel si ipsa est rotunda, uel alba.

Et si ipsa rubea superius de vrina vel sit albā significat infirmitatem ualde occultam et ariditatem & naturam incipit coqui & si in medio, natura iam est cocta media. Si in fundo, significat quod natura iam habet coctam mediam materiā. Si est rubea vel crocea in colore aureo, significat infirmitatem iam fectinātem et ariditatem. Si est nimis liuida in colore, significat longā infirmitatem. Si est nigra habet peius, i. quod infirmus mutatur in peius, i. quod habet tertianam et mutat in quartanam. Si est in colore ut sanguisita quod color vincat vrinam, significat personam esse in mala dispositione. Si vrina sit large per virgam, signum est bonum. Si vrina sit cum dolore et poena, illud est malum signum. Si abundat in multa quantitate bonum signum. Si fiat pauca, malum significat, eo quia mali humore superat vrinam. Vrina puellæ

non polluat est multū lucida et clara, subtilis, prout crocea. Vrina foemine corruptæ semper est turbida & nunquā bene clara nec lucida: et istud intelligitur in sua sanitate. Vrina foeminae pregnantis habet ista signa, per quæ potest videri et agnosci quando est grauida an ne, quia apparet in ipsa quadam nebula alba prout bonib⁹ optime trita, in hyeme et in æstate habet colorem sanguineū existens in sua sanitate. Et si esset turbida mutaretur in colore secundum conditionem mulieris, et uidebitur imago prope fundum et istud apparet in primo mense, et in secundo, et in tertio. Hypostasis quæ est in vrina alba multum turbida manens in sua sanitate venit clara et lucida et tenet colorem vini albi et subtilis. Et hypostasis est alba magis et clara superius quam inferius idest quod prope fundum sint foeces signum grauedinis.

Vrina foemine quæ non est grauida ē magis alba, et magis subtilis quam vrina foeminae grauidæ.

Vrina omnium foeminarū trahunt magis ad albedinem quam ad alium colorem, et propriæ ad colorem rubeum. Si sunt in sua sanitate.

Vrina foeminae si erit optime alba in fundo vrialis, et subtilis significat magnam molestiam, vel frigiditatem in matrice. Et si habebit spumam significat grauedinem capitis, et in renibus dolorem, et debilitatem stomachi.

Vrina foemine quæ est alba, idest clara in vriali, et luces prout argentum, et non curat comedere, signum est, quod grauida est.

Vrina foeminae quæ habet colorem clarum, et grauem, signum est velle luxuriari.

Vrina hominis, et foeminae qui habet hypostasim aliquantulum nigrā in vriali, et insimul adunatā significat mortē.

Vrina quæ est pauca in quantitate, et in colore nigra significat mortem.

Vrina quæ tenet multam fecem in fundo, et habet nebulam nigram ad modum calcinæ significat mortem.

Vrina quæ mutatur in multis coloribus significat mortē.

Vrina viridiaea, & pauca significat mortem.

Vrina quæ in illo qui febreſcit, & infundo foecem, si infirmus non sudat significat mortem.

Vrina in colore fellis ad fundum, & ad modum similis, si significat mortem.

Vrina quæ habet in fundo ad modum sabioni, & ad modum sanguinis significat mortem.

Vrina in febricitanti, si est nimis alba significat mortem.

Vrina tenens multos colores in vriali significat mortē.

Vrina habens in fundo vrialis feces, & guttas sanguinis significat mortem.

Vrina quæ est multum rubea habens paucam spumam, & in medio sanguinis prope fundum significat mortem.

Vrina puellæ non polluat, & sanæ est pura, & clara sine macula.

Vrina hominis sani habens in mane vrinam albam. ante prandium rubeam, & post prandium albam bonum signum est.

Vrina quando abundat, et non feruet nimis, et reddit odorem quando est satis, et unum modicum rubeat, et nubilosa alba, & æqualis statim in medio vrialis, et alta a fundo et vrinare sepius sanitatem significat. Et etiam bene euacuare corpus est optimum.

T A B V L A T H E S A V R I ,

siue antidotarii aromatariorum per alphabetum.

A V R E A alexandrina Nicolai. car. 121
Athanasia magna Mesue.

Anacardina Mesue. 121
Athanasia Nicolai. 121
Anidozum Nicolai 121
Armoniacum rosatum descriptione Gabrielis. 121
Aromatici rosati. M. 121
Aromatici rosati minus mesue. 122
Aromatici mufcati mesue. 122
Aromatici garyophylla. Mesue. 122
Aromatici nardini mesue 122
Atramentum bonum 122
Atramentum in carmine 122
Acetum squilliticum mesue 122
Aqua ad asthma Rasis 122
Aqua confectiua magistralis 122
Aqua pro oculis rubentibus Magistra lit 122
Aqua pro membro magistralis 122
B E N E D I C T A simplex Nicolai 122
C O N D I T U M defecacul Mesue 122
Conditum de acoris Mesue 122
Conditum de Baucia mesue 122
Conditum de cydonia mesue 122
Conditum de citro Mesue 123
Conditum de zingiber mesue 123
Confectio de zingibere mesue 123
Conditum de Pyris mesue 123
Conditum de pomis Mesue 123
Conditum de Persicis mesue 123
Conditum de KEBULIS mesue 123
Conditum de Emblicis mesue 123
Conditum de Citro alio modo Aui- cen. 123
Conditum de Citro Auicennae 123
Cydonia condita Aui. 123
Cydonia condita alia Aui. 123
Conditum de cucurbitis Magistrale 123
Cornelina magistralis 123
Confectio Amech prima descriptione mesue 123
Confectio de manna mesue 123
Confectio de Storaee magistralis 123
Confectio de Cinnamomo mesue 123
Cassia fistularum pro clysteris magistrale 123
Cassia fistulatum de melle, & zucharo 123
Cassia fistulatum aliud magistra. 123
Codognata de zucharo magist. 123
Conditum de cidoniis cum perlis magistrale 123
Cerotum Galeni emendans uitia stomachi mesue 124
Cerotum Hyffopi dicti philagri Mesue 124
Cerotum, oxyroci Nicolai 124
Cerotum pro colici magistra. 124
Cerotum Hyffopi de pauli mes. 124
Cerotum pro renibus magistra. 124
Cerotum pro crepatis Gentilis 124
Cerotum de mucilaginis magistra

le 124
Cerotum ad crepatos de pelle arietina secundum Rainaldum de Villanoua 124
Cerotum de Laudano magistra. 124
D I A C H I L O N magnum Mesue. 124
Diachylon minus Mesue 125
Diachylon parum mesue 125
Decoctio communis magistra. 125
Decoctio pectoralis magistra. 125
Decoctio carminatiua magistra. 125
Decoctio constrictiua magistra. 125
Diabuglossati mesue 125
Diaboraginati Mesue 125
Diamufci dulcis mesue 125
Diagalax mesue 125
Diacyminum bonum mesue 125
Diambra mesue 125
Diacorali magistralis 126
Diarhodon abbatis Nicolai 126
Diarhodon de communi mes. 126
Diadragacanthi frigidi Nico. 126
Diadragacanthi calidi Nico. 126
Diacalamentum Nicolai 126
Diacalamentum Mesue 126
Diacodi confectio yecur mes. 126
Diapolicicon Auicennae 126
Dianisi mesue 127
Diatrium pipereum Mesue 127
Diacurcuma magna mesue 127
Dialacca magna mesue 127
Diastyrion mesue 127
Diastis de melle Nicolai 127
Diapenidion Nicolai 127
Diabolibanum Nicolai 128
Diacori mesue 128
Diamorifon mesue 128
Diacotum mesue 128
Diaphosphur Mesue 128
Diacubebze in thesauro pauperu. 128
Diareubarbarum Nicolai 128
Diapapauerum Nicolai 128
Diacoralli magistralis 128
Diacholicon Nicolai maio. 128
Diasenz Nicolai 128
Diasiniconis Mesue 128
Diaprunis non solutiui Nic. 128
Diacassiz magistralis 129
Diacartami magistralis 129
Diarob cum turbith cum rheubarbaro magistralis. 129
Diarob cum turbith sine rheubarbaro magistralis 129
Diamargariton Nicolai 129
Diamargariton Auicennae 129
Diacaridiou mesue 129
E L E C T U A R I U M de gemis mes. 129
Electuarium Conciliatio 130
Electua. de aromatibus mesue 130
Electua. de baccis lauri Rasis 130
Electua. de citro mesue 130
Electua. de Cineribus Auicennae. 130
Eggetea mesue 130
Electua. Indi maioris mesue 130
Electua. Indi minoris mesue 131
Electua. Elscos. mesue 131
Electua. rosati mesue 131
Electua. de Succo rosarum Nic. 131
Electua. de Scoria ferri Rasis 131
Electua. de seminibus mesue 131

Electua. de Passulis Auicennae. 131
Electua. Pliris arcoticon Nico. 131
Electua. de Psilio mesue 131
Electua. quo utuntur reges, & prelati mesue 131
Electua. de Pomis mesue 131
Electua. de Sorbis mesue 131
Electua. ad scabiem, & pruritum carnis Almansoris 131
Electua. ad restaurationem humiditatis secundum Nicolaum 132
Electua. almezereon mes. 132
Electua. de Persicis mesue 132
Electua. de Melliloro mes. 132
Empla. Diaphoeniconis mesue 132
Empla. de Granis lauri mesue 132
Emplastrum contra fluxum Montagna. 132
Emplastrum de crusta panis Montagna. 132
Emplastrum filii Zacharie mes. 132
Emplastrum contra morbum magistrale 132
Emplast. ad extrahendum codicellam magistrale 132
Empla. ad pleuresim mesue 132
Emplastrum ad crepatos, magistrale. 132
Emplastrum ad morsum scorpionum magistrale 132
Epithyma pro corde magistrale 132
Epithyma pro hepate magistra. 132
P H I L O N I U M exinuentione prima mesue 132
Philonium persicum mesue 132
G A L L I A E Mufcatz mesue 133
Gallie febelis mesue 133
Gallie elephangine mes. 133
Gallia magna siue regalis mes. 133
H O M O R Y S C I A Auicennae. 133
Hiera a picra Galeni mesue 133
Hiera simplex Galeni 133
Hiera composita Galeni. Nic. 133
Hiera logodion secundum Aui. 133
Hiera Hermetis mesue 133
I Y E T I U M Imperatoris Nicolai 134
Iulep rosati. Mesue 134
Iulep uiolatum mesue 134
Iulep de Iuiubis mesue 134
K A T A R I C O N imperiale Nicolai 134
L I T H O N tripon Nicolai 134
Leficans Rasis 134
Loch de primo mesue 134
Loch de Papauere mesue 134
Loch de squilla mesue 134
Loch sanum & expertum mesue. 134
Loch ad asthma mesue 135
Loch de pulmone uulpis magi. 135
Loch de aliis mesue 135
Loch de caulibus mesue 135
Loch de Farfara magistrale 135
Loch de boni conferens ethicis, & co- sumptis mesue 135
Loch de amygdalis mesue 135
Loch de althea magistrale 135
M I T R I D A T U M magnum Nicolai 135
Mithridatum Auicennae. 135
Michleta Nicolai 136
Mel rosatum mesue 136

T A B V L A

Mel rofatum Nicolai,	136	Pulus fene magis solutius.	139	Suppositoria constrictiua.	142	
Mel uiolatum Nicolai,	136	Pulus pro epithymate cordiali magi	139	Sacculus pro corde magi.	142	
Mel rofatum alio modo Nico.	136	stralis.	139	Sacculus pro capite magi.	142	
Miua cydoniorum cum speciebus me	136	Pulus pro facculo cordis magi.	139	Sacculus pro stomacho magi.	142	
sue.	136	Pulus pro facculo capitis magi.	139	Sacculus alius pro stomacho magi-	142	
Miua cydoniorum sine speciebus me	136	Pulus restrictiuius magist.	139	stralis.	142	
sue.	136	Pulus pro mingentibus in lecto Mo-	139	Sacculus pro pulsibus magi.	142	
Mel myrtinum.	136	tagnanx.	139	Sacculus pro franchis mag.	142	
Melanacardium.	136	Pulus pro bombardis & schiopoet-	139	Stomaticum calidum Nico.	142	
Mula mag na Nico.	136	ris.	139	Stomaticum frigidum Nico.	142	
Marenarum magist.	136	Pulus pro implendo dactylis pro mu-	139	Stomaticum laxatiuum.	142	
Mixtura cordialis magist.	136	lieribus magistralis.	139	Specierum pro composita magi.	142	
Mixtura pectoralis magist.	136	Pastonum pro filomenis ma.	139	Specierum pro ceruclato magi.	142	
O X Y Z A C C H A R A Nico.					143	
Oxymelis simplicis mel.	136	Pilulæ alephanginx Mef.	139	Salsa confecta magi.	143	
Oxymelis compositi Mef.	136	Pilulæ masticinx Petri de Ebano.	140	Syrupi acetosi simplices Mef.	143	
Oxymelis squillitici Mef.	136	Pilulæ aureæ Nicolai.	140	Syrupi de radicibus Mef.	143	
Olei muscellini Mef.	136	Pilulæ de quatuor rebus Francisci de	140	Syrupi de duabus radicibus magistra-	143	
Olei rofati Mef.	137	Pedemontium.	140	lis.	143	
Olei rofati alio modo.	137	Pilulæ turbithatæ siue aureæ Mef.	140	Syrupi de succo Endiuie.	143	
Olei violati Mef.	137	Pilulæ aggregatiuæ Mef. ex inuento	140	Syrupi de endiuia magist.	143	
Olei de lino sine speciebus Mef.	137	ne nostra.	140	Syrupus alius de endiuia Gëtilis.	143	
Oleum de lino cum speciebus.	137	Pilulæ de Fumoterræ Auic.	140	Syrupi rofati ex infusione Mef.	143	
Olei cammilli Mef.	137	Pilulæ de Mezereon Mef.	140	Syrupi de rosis ficcis magi.	143	
Oleum de abinthio magi.	137	Pilulæ de Hiera simplici Gal.	140	Syrupi de succo rofarum.	143	
Oleum de Anetho Mef.	137	Pilulæ de Hiera cum agarico magi-	140	Syrupi de succo acetosæ Mef.	143	
Oleum de ruta Mef.	137	stralis.	140	Syrupi de agreita Mef.	143	
Oleum de menta magist.	137	Pilulæ de Hiera magna Gal.	140	Syrupi de papauere Mef.	143	
Oleum ambuci quum Mef.	137	Pilulæ foetidæ maioris Mef.	140	Syrupi de pomis simplicibus Mef.	143	
Oleum de Nenuphare Mef.	137	Pilulæ foetidæ minores mcf.	140	Syrupi de pomis compositis Mef.	143	
Oleum Cofinum Mef.	137	Pilulæ de Sarcocolla Mef.	140	Syrupi de granis myrti Mef.	144	
Oleum de fornicis violantibus Ni-	137	Pilulæ de bdellio maiores Mef.	140	Syrupi de Myrtis magi.	144	
colai.	137	Pilulæ Lucis maiores Mef.	141	Syrupi de corticibus citri Mef.	144	
Oleum de capparibus magist.	137	Pilulæ de Hermodactylis maiores	141	Syrupi de acetofitate citri Mef.	144	
Oleum de myrtis Ioannis de sancto	137	Mefue.	141	Syrupi violati compositi Mef.	144	
Amando.	137	Pilulæ de Hermodactylis minores	141	Syrupi violati ex infusione Mef.	144	
Oleum Masticinum Mef.	137	Mefue.	141	Syrupi de Iuibus Mef.	144	
Oleum de Castoreo magist.	137	Pilulæ de Hermodactylis ex inuento	141	Syrupi de scabiola magi.	144	
Oleum de scorpiionibus Mef.	137	ne nostra Mef.	141	Syrupi de Granatis Mef.	144	
Olei Cydoniorum Mef.	137	Pilulæ de Rheubarbaro Mef.	141	Syrupi de Menta Mef.	144	
Olei Spicz magistralis.	138	Pilulæ Indæ Mef.	141	Syrupi de Byzantiis siue denariis Me-	144	
Olei Vulpini Mef.	138	Pilulæ sine quibus esse nolo Nico-	141	sue.	144	
Oleum de Hypericon magist.	138	lai.	141	Syrupi de fumoterræ Mef.	144	
Oleum pro doloribus puerorum ma-	138	Pilulæ cocie Galegi.	141	Syrupo de prafio Mef.	144	
gistrale.	138	Pilulæ cocie Alman. vsuales.	141	Syrupo de abinthio Mef.	144	
Olei Amygdalarum dul. Mef.	138	Pilulæ arabice Nico.	141	Syrupi de Epithymo Mef.	145	
Olei Amygdalarum amararum Me-	138	Pilulæ alfaiaet Auic.	141	Syrupi de Thymo Mef.	145	
sue.	138	Pilulæ stomachichæ penultimæ descri-	141	Syrupi de Arthemisia magi.	145	
Olei Amygdalarum pro bibendo ma-	138	ptionis Mef.	141	Syrupi de Stœchados Mef.	145	
gistrale.	138	Pilulæ secundæ descriptionis Mef.	141	Syrupi de Hyssopo Mef.	145	
Olei de Nucleis persicis Mef.	138	Pilulæ imperiales Nico.	141	Syrupi de liquiritia Mef.	145	
Oleum laurinum Mef.	138	Pilulæ communes Auic.	141	Syrupi de eupatorio Mef.	145	
Olei laurini magistralis.	138	Pilulæ bichichie Mef.	142	Syrupi de Calamento Mef.	145	
Olei irini Mef.	138	Pilulæ de agarico Mef.	142	Syrupi ad matricem magi.	145	
Olei de granis Sifami Mef.	138	Pilulæ de lapide lazuli Mef.	142	Syrupi cordialis magi.	146	
Oleum sifaminum magistra.	138	Pilulæ de euphorbio Mef.	142	Syrupi de Cicorea Gulielmi.	146	
Oleum de Chryfomilis Mef.	138	Pilulæ ad omnes morbos catarrhi	142	Syrupi fapor regis Mef.	146	
Oleum de Tartaro magistra.	138	Mef.	142	Syrupi Diamoron Mef.	146	
Oleum Saluiz magistra.	138	Pilulæ de Opopanaco Mef.	142	Syrupi de limonibus.	146	
Oleum de euphorbio Mef.	138	Pilulæ Alexandrinæ Mef.	142	Syrupi de Ribes.	146	
Oleum de femini Lini Mef.	139	Pilulæ de Serapio Mef.	142	T R I A S A N D A L I Nico.		146
Oleum de Cucurbita Mef.	139	Poma Laudani magistra.	142	Terzæ ad ardorem vrinæ.	146	
Oleum de floribus Papaueris Me-	139	Poma Ambræ magistra.	142	Tryphera magna Nico.	146	
sue.	139	R V B E A trochiscata Nico.		Tryphera perlica Mef.	146	
Oleum de Iunipero Mef.	139	Rofata nouella Nico.	142	Tryphera perlica Mef.	146	
P V L V I S cordialis dulcis ma-	139	Requies Nico.	142	Tryphera minor ex arte Fenonis Me	146	
gistralis.	139	S V F F V E aromatici Mef.	142	sue.	146	
Pulus cordialibus pro vermibus ma-	139	Siefalbum cum opio Mef.	142	Tyriaca magna Andromachi.	146	
gistralis.	139	Siefalbum sine opio Mef.	142	Tyriaca Galeni.	146	
Pulus pro botio Montagna.	139	Suppositoria ad tenafinum ma.	142	Trochisci Diarhodon Mef.	147	
Pulus ducalis magist.	139	Suppositoria alia ad tenafinum magi-	142	Trochisci de rosis minores Mef.	147	
Pulus fene montagnanæ.	139	stralis.	142	Trochisci de rosis maio. Mef.	147	
		Suppositoria de ciclamine.	142	Trochisci de rosis & eupatorio me-		

T A B V L A

fuz.	147	Vnguentum Populeon Nico.	151	Alius modus dealbandi ceram	153
Trochisci de rheubarbaro mesf.	147	Vnguentum martiaton Nic.	151	Modus laborandi ceram fuprafcri-	
Trochisci de camphora mesf.	147	Vnguentum aragon Nico.	151	ptam	153
Trochisci de podio mesf.	147	Vnguentum agrippæ Nicolai	151	Modus menfurandi ceram laboran-	
Trochisci de fpodio cum femine acce-		Vnguentum dialtheæ fubtilis Ni-		dam	153
tolæ Mefue	148	colai	151	De artificio Zucchari.	
Trochisci de berberis mesf.	148	Vnguentum ftaphifagiæ magiftra.	151	AD FACIENDVM Coriandros foli-	
Trochisci de Abfynthio mesf.	148	Vnguentum de citro Nico.	151	dos	153
Trochisci de Alkekengi mesf.	148	Vnguentum Martiaton aliud	151	Ad faciendum coriandros crispof	153
Trochisci de Capparibus mesf.	148	Vnguentum artanithæ magnum me-		Ad faciendum cinnamomi confe-	
Trochisci de Eupatorio mesf.	148	fue	152	ctum	153
Trochisci de Karabæ mesf.	148	Vnguentum aliud arthanitæ paruum		Ad conficiendum amygdalas	153
Trochisci de Myrrha Rafis	148	mesue	152	Ad conficiendum rancettos	154
Trochisci de Terra figilla. mesf.	148	Vnguentum ægyptiacum mesf.	152	Ad conficiendum garyophyllos	154
Trochisci Dianifi mesf.	148	Vnguentum de bdellio mesf.	152	Ad conficiendum confectiones bene-	
Trochisci de agarico mesf.	149	Vnguentum pro uermibus Montagna-		crifpas	154
Trochisci Alandal mesf.	149	næ	152	Ad conficiendum anifos	154
Trochisci Diacoralii Nico.	149	Vnguentum pro pectore magi.	152	Ad faciendum pineas	154
Trochisci de Tyro Nico.	149	Vnguentum Apoftolorum Auicen-		Ad conficiendum auellanas	154
Trochisci de Squilla Nico.	149	næ	152	Ad faciendum mufcardinos	154
Trochisci Andracharon, idest Andro.	149	Vnguentum ad fcabiem magi.	152	Ad conficiendum pignocftam	154
Trochisci de Nijpera Auic.	149	Vnguentum ad fcabiem pro pueris		Ad faciendum mortellatam	154
Trochisci de Ramich mesf.	149	Montagnanæ	152	Ad faciendum zingiberatam	154
Tortellæ de fement fecundum Marthum Sylua.	149	Vnguentum ad fcabiæ pro canibus	152	Ad faciendum fructus & animalia	154
Trochisci de uiolis fiue trochisci		Vnguentum de ceruffa crudum magi-		Ad faciendum penidios	154
Ameh in antidotario mesf.	149	ftirale	152	Ad faciendum manufcripti rofa-	
Trochisci de uiolis Mesf. in fua practi-		Vnguentum de litargyrio coctum magi-		tum	154
ca in capitulo de afthmate.	149	ftirale	152	Ad faciendum manufcripti cum per-	
Trochisci de Iacca mesf.	149	Vnguentum de minio coctum magi-		lis	154
Trochisci Cochion Auic.	149	ftirale	152	Ad faciendum manufcripti cum fra-	
Trochisci de ligno aloë mesf.	149	Vnguentum bafilicon minus	152	gmentis	154
Trochisci de balauftiis Auic.	149	Vnguentum citrinum, fiue cœ.	152	Ad faciendum faponeam	154
Trochisci de Sandalis mesf.	150	Vnguentum de dragacanthis pectora-		Ad faciendum faponeam de Vene-	
Trochisci croci Magnetis Nic.	150	le	152	tis	154
Trochisci idiocri Nicolai	150	Vnguentum de adipibus magi.	152	Ad dandum colorem zuchcharo ru-	
Vnguentum gratia dei.	150	Vnguentum commutiffæ Gulielmi de		beum	154
Vnguentum fanans vlcera antiqua	150	Vari gnana	152	Ad faciendum colorem uiridem	154
Vnguentum aliefricon mesf.	150	Vnguentum de anthraxa magi.	152	Ad faciendum colorem coeleftinum	154
Oleum de oleandro quod intrat in		Vnguentum ad coctufione ignis		Ad faciendum colorem glaucum	154
fuprafcripto unguento cum con-		Vnguentum ad fifsuras mammilla-		Ad faciendum colorem turchinû	154
fectio	150	rum	153	Ad faciendum colorem morellum	154
Vnguentum aureum mesf.	150	Vnguentum ad Nicodemum me.	153	Ad faciendum marzapanos	154
Vnguentum ad rapas, & refas equo-		Vnguentum bafilicon magnum Me-		MEDICINÆ quæ multum fufsti-	
rum	150	fue	153	nent de coctione	154
Vnguentum idem ad rapas & refas e-		Vnguentum cerafeos magnum Me-		Medicinæ quæ parum fufstinent de	
quorum quondam domini domini		fue	153	coctione	155
Bernabonis	150	Vnguentum cerafeos parum me.	153	Medicinæ quæ mediocrem fufstinent	
Vnguentum de elleboro ad timeâ	150	Vnguentum alabaftum nardi precio-		decoctione	155
Vnguentum de femperviuia	150	fi.	153	MEDICINÆ quæ multum fu-	
Vnguentum de plumbo Leonardi de pre-		ZUCCHARVM rofatum Me-		ftinent de contritione	155
da palea	150	fue	153	Medicinæ quæ parum fufstinent de	
Vnguentum mirabile de caueris fluui-		Zuchcharum uiolatum Mesf.		contritione	155
libus	150	De artificio Cerz.	153	Medicinæ quæ mediocrem fufsti-	
Vnguentum pro ftomacho magiftra-		AD FACIENDVM ceram ru-		nent de contritione	155
le	150	beam	153	Sequitur nobiliffima doctrina ad	
Vnguentum fandalinum mesf.	150	Ad faciendum ceram uiridem	153	cognofcendum urinas	155
Vnguentum pro renibus Blafii	150	Ad faciendum ceram nigram	153		
Vnguentum, Galeni mesf.	150	Ad faciendum ceram albam	153		

F I N I S.

SERIES CHARTARVM.

* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
A A B B C C,

Terni sunt omnes, præter *, & CC, qui sunt quaterni.

Tria hic clauduntur opuscula, Luminare maius, ad maiore perfectionem redactum
Lumen apothecariorum, Et Thesaurus aromatariorum, distincta, cum suis tabu-
lis, unaquæq; per se posita, Cum copiosissimo in principio operis in-
dice, ad minima quæq; reperienda, Nunc uero nuper
Venetiis excusa Apud Nicolaum be-
uilacquam Tridentinum.
M D L XI.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

